



Field Museum of Natural History


**LIBRARY**

Chicago

From Strecke Collection

Class A A G - 03

Book G 556










ENTOMOLOGISCHE  
B E Y T R Ä G E  
z u  
DES RITTER LINNE  
ZWÖLFTHEN AUSGABE  
DES NATURSYSTEMS

v o n

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE

Pastor an der Kirche S. Blasii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede  
der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin, und  
der Herzoglichen deutschen Gesellschaft  
in Helmstädt.



E R S T E R T H E I L.

34913  
Leipzig,

bey Weidmanns Erben und Reich. 1777.

R.B.  
Gen.

1777  
3

v.1

1000

1000

b |

S

MEINEN FREUNDEN

dem königlich-dänischen Herrn Etaatsrath

H E R R N

OTTO FRIEDRICH  
MÜLLER

und

dem herzoglich-braunschweig-lüneburgischen  
Leibarzt

H E R R N

K A R L G O T T L I E B  
W A G L E R

mit den wärmsten Empfindungen

Ihrer Verdienste

gewidmet

von dem Verfasser.

---

## VORREDE.

**O**b ich zu viel gewagt habe, über des unsterblichen *Linné* Natursystem einige *entomologische Beyträge* herauszugeben, mag das Publikum entscheiden. Blos *Beyträge* nenn' ich sie, diese Zufüsse, weil ich den ungeheuren Umfang dieses Feldes; weil ich die unendliche Menge aller über diesen Gegenstand sprechenden Urkunden; weil ich meine geringe Kenntnisse selbst verkennen müste, wenn ich ihnen einen andern Namen geben, oder eine Vollständigkeit beylegen wollte, die sie jetzt nach Maßgebung der Umstände noch nicht haben können. Denn je wei-

ter ich mich bisher in der Entomologie umfahe; desto mehr Verwirrung, desto mehr verschiedene Namen eines und eben desselben Geschlechts, oder derselben Art der Insekten fielen mir in die Augen. Dies brachte mich auf die Idée, alles zu sammeln, zu vergleichen, zu berichtigen, was über das *Linnéische System* einiges Licht verbreiten könnte, um, wo möglich, die noch herrschenden Unrichtigkeiten einigermaßen in Ordnung zu bringen. Und das ist der Ursprung gegenwärtiger *Beyträge*. Belohnung genug für mich, wenn sie in der Wissenschaft, die in unsern Zeiten so viele Liebhaber findet, einigen Nutzen stiften sollten!

Bey der Einrichtung des Werks hab' ich mir vorzüglich folgende Gesetze vorgeschrieben:

1. Von der Oekonomie der *Geschlechter*, wo es mir nöthig schien, einen kurzen, aber richtigen Begriff zu geben.

2. Bey

2. Bey jedem *Geschlecht* sowohl, als bey jeder *Art*, alle mir bekannte Schriftsteller, alte und neue, anzuführen, die das Infekt entweder beschrieben, oder abgebildet, oder beydes zugleich gethan haben. Die meisten derselben finden sich im *Linné* gar nicht, und wo ich ja einige beybehalten habe, die der Ritter selbst angeführt hat; so ist es theils nur dann geschehen, wenn ein solcher Schriftsteller dem Infekt einen andern Namen gab, theils eine Unrichtigkeit zu bemerken, oder die vollständige Beschreibung aus gedachtem Schriftsteller beyzufügen, wie ich denn die Genauigkeit und Richtigkeit der Beschreibungen eines *Scopoli* in Entom. carn. und anno 5 hist. nat. bey der bündigsten Kürze, und des Herrn Staatsrath *Müllers* in Prodr. Zool. Dan. welches Werkchen sich durch gleiche Vorzüge auszeichnet, nicht genug empfehlen kann.

3. Bey jeder Art, wo es nöthig und mir bekannt war, die *vorzüglichste Merkwürdigkeit* anzugeben.

4. Alle mögliche *Synonymen* der Schriftsteller in allen Sprachen, die ich habe auffinden können, beyzufügen, um dadurch den Leser in den Stand zu setzen, jedes Infekt, wo er es in einem der angeführten Schriftsteller findet, bey Vergleichung dieses Werkchens, sogleich für das, was es ist, zu erkennen. Ein Jeder kann sich also hieraus belehren, ob er das Infekt, was er näher zu kennen wünscht, bey einem aus- oder vaterländischen Schriftsteller zu suchen habe. Wenigstens wird jeder unpartheyische erkennen, wie viel der zwölften *Ausgabe des Linné*, bey allen ihren Verdiensten, in diesem Fache bisher noch gefehlt habe, und wie viel, wenn wir das Ganze nehmen, meinen Beyträgen selbst noch fehlen mögte. Indessen mögen andere urtheilen, ob meine Arbeit etwas mehr als blofse Kompilation zu nennen sey,

5. Hab' ich jedes *Geschlecht* mit einem ansehnlichen Verzeichniß *neuer Arten*, aus den neuesten und berühmtesten entomologischen Schriftstellern, einem *Voet*, *Drury*, *Pallas*, *Lepechin*, *Schaeffer*, *Müller*, *Sulzer*, *Degeer*, *Forster*, u. s. w. bereichert, und solche nach der *Linnéischen Eintheilung* so zusammengeordnet, daß sie der Leser mit einem Blick übersehen kann, und nicht erst nöthig hat, sie in diesen kostbaren Werken mühsam aufzufuchen, worinn sie oft sehr zerstreuet anzutreffen sind. Sollte ich einige nicht in die Klasse gebracht haben, worinn sie nach anderer Meynung stehen müssen; so bin ich ihres Karakters wegen zweifelhaft gewesen.

6. Werden meine Leser selbst ein Paar neue Geschlechter finden, als *Ligniperda* und *Cistela*, die im *Linné* nicht stehen, weil mir die Gründe eines *Pallas*, *Scopoli*, *Schaeffer*, *Füesslin* und *Müller* überwiegend schienen, sie dafür aufzunehmen.

Ob ich

7. in Absicht der *neuen Namen*, die ich einigen beyzulegen gewagt habe, glücklich gewesen bin, wird auf den Auspruch der Kenner ankommen. Wenigstens hab' ich immer solche gewählt, die entweder den wesentlichen Karakter des Infekts in sich fassten, oder doch die Namen des sel. Prof. *Müllers*, die zum Theil ins Possierliche fallen, etwas gefetzter ausdrückten. Bey den *Ausländischen* hab' ich das Vaterland zugleich mit angeführt. Da auch in allen Geschlechtern so viele mit einerley Namen vorkommen, als 2, 3, 4, punctatus, maculatus, pustulatus, guttatus — ferner marginatus, marginalis, rufipes, ruficollis, sanguinolentus, crassipes; u. s. w. so war es nothwendig, die deutschen Namen entweder durch das Vaterland, oder durch einen andern Karakter, noch genauer zu bestimmen. Bey der Erfindung neuer Infektennamen giebt es *zween*

*Abwege:*

*Abwege:* man fällt entweder ins Schwankende und Weitläufige, oder ins Undeutliche und Pof- sierliche. Mir selbst kommen noch verschiedene, die ich gewählt habe, steif und gezwungen vor; allein es war über meine Kräfte, bessere, aber zweckmäßige zu finden. Ich bitte also alle, die mich tadeln werden, diesen Versuch erst selbst zu machen.

8. Bey jedem *Linnéischen* Infekt hab' ich über- dem bemerkt, ob es *abgebildet* sey, oder nicht, und hinten am Ende jedes Geschlechts allemal die Rekapitulation der *unabgebildeten* beygefügt, damit die Liebhaber wissen, welche noch abzu- bilden sind, und andere abgehalten werden, schon abgebildete noch einmal stechen zu lassen, welches Kosten macht, und keinen Nutzen hat. Es wäre überhaupt gut, wenn viele vaterländi- sche Infekten nicht eher abgebildet würden, bis man ihre ganze Geschichte vollständig wüste.

Indessen

Indessen ist möglich, daß einige von mir als *unabgebildet* angegebene, in einigen grossen kostbaren Werken, die ich noch nicht besitze, abgebildet stehen können; allein meine Leser werden dabey nicht viel verlieren, weil sie darinn gemeinlich, z. E. in dem *Edwardischen* und *Seligmannischen* Vögelwerken, blos im Bilde, ohne genaue Beschreibung stehen, folglich bleibt es immer schwer zu bestimmen, welcher Schmetterling, oder Käfer, oder anderes Infekt eigentlich gemeinet sey.

In eben dieser Ordnung werden die *künftigen Bände* folgen. Wie viel es aber noch werden mögten, kann ich jetzt selbst nicht bestimmen, da ich mich wundere, daß dieser erste Band nur die Coleoptera begreift, und gleichwohl so stark angewachsen ist. Beyträge von andern, Nachweisungen der Schriften, die mir etwan entwischt seyn könnten, besonders der neuesten Reisebeschrei-

schreibungen, Magazine und dergleichen, werden mir allezeit willkommen seyn. Denn ich sehe es zum voraus, dass sich diese Beyträge, in unsfern Zeiten, bey jeder Messe werden vermehren lassen. Wenn sich also Liebhaber diesen ersten Band in zween Theile absondern, und mit Papier durchschießen ließen; so würden sie auf die bequemste Weise alles was in Zukunft herauskäme, beytragen können.

Druck und Papier machen dem Herrn Verleger Ehre. Insonderheit hab' ich Ursache, die Genauigkeit der Korrektur zu rühmen, welche bey dieser Art von Schriften nothwendig ist. Doch wolle der geneigte Leser zu Pag. 141. bey *Linn.* *Dermestes Surinamensis* No. 29. noch hinzufügen:

*Degeer* *Inf.* *Tom. V.* p. 54. No. 5. t. 13. f. 12.  
und das *unabgebildete* zurücknehmen,

*Tenebrion de Surinam*

**TENEBRIO** (*Surinamensis*) *alatus*, *elongatus*,  
*testaceo-fuscus*; *elytris striatis*; *thorace striis tri-*  
*bus elevatis marginibusque denticulato.*

Und pag. 151. \*\*) unten statt *taotis taotis*;  
 pag. 161-163. aber statt *Altelabus allezeit Atte-*  
*labus* und pag. 189. \*) statt No. 40. — No. 53.  
 lesen.

Den Namen des Herrn von *Geer* hab' ich in  
 dem Werke selbst *von Geer*, *de Geer*, *von Geerisch*,  
 unrecht geschrieben, indem es *Degeer*, *Degeerisch*  
 heißen muß, weil mir dieser berühmte Naturfor-  
 scher selbst gemeldet hat, daß das *de* in seinem  
 Namen nicht der Deutschen *von* sey; sondern we-  
 sentlich zu demselben gehöre.

Ein *Register* hätte man bey diesem Bande er-  
 warten können; allein ich hab' es lieber bis zum  
 Ende des ganzen Werks versparen, und alsdann  
 nach der Art, wie bey des sel. *Müllers* Erklärung  
 des Linnéischen Systems, einen *eigenen Register-*  
*band*

*band* über dasselbe liefern wollen. Ein Entschluss, den meine Leser, wie ich hoffe, nicht missbilligen werden. Hätt' ich jetzt schon über diesen ersten Band *ein* vollständiges Register beygefügt; so würd' es zu stark geworden seyn, und den Band unverhältnissmässig vergrössert haben. Hätt' ich blos die Geschlechter und Arten hingesetzt; so war es kein Register. Weit bequemer wird es seyn, in dem Hauptregister des ganzen Werks, als in jedem Register einzelner Bände nachzuschlagen.

Dass das ganze Werk mit *lateinischen* Lettern gedruckt wird, geschiehet um der *Einförmigkeit* willen, weil ich glaubte: es würde in meinem Vaterlande gemeinnütziger seyn, als wenn es ganz Lateinisch geschrieben wäre. Die deutschen Namen hätt' ich denn doch müssen mit lateinischen Lettern drucken lassen.

Beym

Beym Schluss ist mir dies noch die angenehmste Pflicht, einem *Martini* für seine gefällige Unterstützung bey dieser mühsamen Arbeit, öffentlich und freudig zu danken, und Ihm zur Ehre Gottes, zur Ehre der Natur, und zur Ehre der Freundschaft, Leben und Gesundheit zu erbitten, in welchen gerechten Wunsch gewiss tausend Seufzer in Europa, und *andern Welttheilen* einstimmen werden.

Vor der Ostermesse

1777.

---

## I. Coleoptera.

mit harten Flügeldecken.

Müllers Linn. Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 45. mit ganzen Deckshilden; oder Flügeldecken.

Sulzers abgekürzte Geschichte der Inf. S. 1. ff. Flügeldecken.

Schäffer von gehörnten Käfern 1758. S. 19.

Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 188.

Erxlebens Anfangsgr. der Naturgesch. S. 254.

Beckmanns Anfangsgr. der Naturhist. S. 89.

Eberhards Versuch eines neuen Entw. der Thiergesch. S. 192.

Wottoni libb. de different. animal. 1552. fol. 191

b. Vaginipennia.

Fabric. Syst. Entomol. p. 1. Eleuterata, Kiefermäuler.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 128.

Commentar. de rebus in Sc. natur. et Medic. gestis Lips. Dec. I. P. V. p. 604. VIII. p. 688.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 48. Insectes à etuis. Coleoptères.

de Geer Insect. Tom. IV. p. 1. Inf. à etuis écaillées.

Müller (Otho Fridr.) Zool. Dan. Prodr. p. 52.

189. GESCHLECHT. *Scarabaeus*. Käfer.

griech. *Cantharus*, *Byrrhus*, *Carabas*.

engl. Chafre, Beetle.

französ. Escarbot, Scarabé.

span. Escarnaja.

ital. Scarafaggio, Scarafasso.

holl. Torren.

*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 1508. *Käfer*.

*Börners* Samml. aus der Naturgesch. 1. Th. S. 458.

### *Mistkäfer.*

*Eberhards* Thiergesch. S. 195. *Maulwurfskäfer*.

*Füesslins* Verzeichn. schweiz. Inf. S. 1. *Kolbenkäfer*.

*Müllers* Linn. Naturs. 5. Th. 1. B. S. 48. *Käfer*.

*Bresl.* Samml. 2. B. 1718. April. S. 965.

*Schäffer* von gehörnten Käfern 1758. S. 20. *Scherr-*  
*oder Scharrkäfer*.

*Lessers* Theologie der Inf. S. 70. 71.

*Sulzers* Kennz. S. 45. *Nashornkäfer*; *Maykäfer*;

*Schröter*; *Goldkäfer*; *Iuniuskäfer*; *Mistkäfer*.

— — abgekürzte Gesch. der Inf. S. 14. *Erdkäfer*.

*Swammerd.* Bibel der Nat. S. 118. ff.

*Catholicon* E. p. 221. *Escarbot*.

*Charlet.* Onom. p. 45. the *Beetle or Bugg*.

*Woyt* Gazoph. med. phys. p. 2024. *Scarabaeus*.

*Schwenkfeld* Theriotr. Silef. p. 552. *Scarabaeus*;

*Cantherius*, Käfer, Keifer.

*Voet.* Scar. p. 1. 2. 3. 35. *Scarab.* *Copris*; *Florilacae* f. *Anthocanthari*; *Arboricolae* f. *Dendrocanthari*; *Terricolae*.

*Mus. Worm.* p. 241. 242.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 901.

*Listeri* App. de Scarabaeis Britannicis. 4. Lond.

1710,

Zonston. hist. nat. de Inf. Franc. ad M. 1653. p. m.  
90. sq.

Commentar. Lips. Dec. I. P. IV. p. 218. V. 605.

Mouffet Theatr. Inf. p. 147. cap. 21. Graeci Κέαρες; Tyrrheni Bugges; Germani Käfer; Itali Escaravago, Polotero; Galli Escarbot; Poloni Krowka; Illyrici Krabak; Angli Beetle vel Bugg; Angli Boreales Clock; occidentales Starkenbeken; Arabes Canafis vel Canafes vocant.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 66-86. Scarabaeus; le Scarabé; p. 87-92. Copris; le Bousier.

de Geer Inf. Tom. IV. Mém. 6. p. 238-322. Scarabés de terre: des arbres (Hannetons); des fleurs. \*)

### I. Thorace cornuto, mit gehörntem Bruststück.

i. Sc. Hercules, der Herkuleskäfer. \*\*)

Müllers Linn. Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 49. No. 1.  
t. 1. f. 1. das grosse fliegende Einhorn.

Fermius Beschr. der Kolon. Surinam 2. Th. S. 285.  
die grosse gehörnte Fliege.

Röfels Insectenbelust. 2. B. Vorb. S. 10. t. A. f. 1.  
der sehr grosse indianische glänzende, schwarzbraune Nashorukäfer, mit zweyen übereinander stehenden langen Hörnern. \*\*\*)

A 2

Neuer

\*) Die illuminirten Exemplare von Käfern und andern Insekten hat Müller hinten in seiner ausführlichen Erklärung des Linn. Natursyst. angeführt, wobey ich nur erinnere, dass hier Frisch wohl hätte wegbleiben müssen, weil meines Wissens von ihm keine illuminirte Figuren da sind.

\*\*) Dieser, nebst den folgenden vier Arten, hiesse sonst überhaupt: fliegende Stiere; fliegende Nashörner; fliegende Elephanten; holländ. Vliegend Eenhoorn.

\*\*\*) Der Röfelsche 4 B. t. 5. f. 3. ist von diesem unterschieden, und eigentlich des Marggraves l. c. Enena s. Taurus volans. S. Kleemans Ann. in Röfels 2 B. Vorber. S. 12.

*Neuer Schauplatz der Natur* 2. B. S. 523. der *Einhornkäfer*.

*Aubenton Miscell.* t. 41. f. 2. *Rhinoceros americanus cinereus*.

*Petiv. Gazophyl.* t. 70. f. 1. *Rhinoceros americanus cinereus, rostro nigro-nitente; The Toddi-Fly, die Toddy-Fliege.*

*Voet Scarab.* ord. 1. gen. 1. *Terricolae* p. 23. No. 98. t. 12. f. 98. *Hercules; Haneton terrestre Hercules; Aardkever Hercules.*

*Drury Inf.* Tom. I. t. 30. f. 1. *the Beetle Hercules; f. 2. femina.*

*de Geer Inf.* Tom. 4. p. 304. No. 2. t. 18. f. 9. *Scarabé-Hercule. \*)*

*Sc. scutellatus niger, elytris griseis nigro-maculatis, thorace incurvo cornu maximo, subtus bidentato, capitis recurvato multidentato.*

*Marg. Bras.* 247. f. 3. *Taurus volans f. Eruca.*

*Fabrit. Syst. Ent.* p. 3. *Scar. 1.*

*Onomatal. hist. nat.* P. 6. p. 919. *das grosse fliegende Einhorn.*

## 2. *Gideon*, der *Gideon*.

*Müllers L. N. S.* 5. Th. 1. B. S. 51. No. 2. t. 1. f. 2. *das kleine fliegende Einhorn.*

*Neuer Schauplatz der Natur* 2. B. S. 524. *der zweete Einhornkäfer.*

*Röfels Infectenb.* 2. B. Vorb. S. 19. t. A. f. 5. *der etwas kleinere indianische Nashornkäfer, mit zween über einander stehenden gabelförmigen Hörnern. \*\*)*

*Swam-*

\*) Der Herr von Geer hält den kastanienbraunen *Röfelschen* 2. B. Erdk. 1. Kl. t. A. für eine Varietät, und hat zu dem Linneischen *Röfels* 4. B. t. 5. f. 3. angeführt.

\*\*) Herr Kleemann sagt daselbst in der Anm. es sey vielleicht Linnei *Simpson* no. 4. allein in der 12ten Ausgabe hat der Ritter ausdrücklich den *Röfelschen* bey diesem seinem Gideon citirt.

*Swammerd.* B. der N. S. 143. t. 30. f. 2. die *erste Art ausländischer Nashörnukäfer.*

*Seligmanns* ausl. Vög. Tom. 2. t. 79.

*Fabric.* Syst. entom. p. 4. *Scar.* 2.

*Aubent.* Miscell. t. 40. f. 3.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 917. das *kleine fliegende Einhorn.*

*Drury* Ins. I. p. 80. t. 36. f. 1.

*Voet.* Scar. ord. 1. gen. *Terric.* p. 24. No. 100. t. 12. f. 100. *Simson.* Thoracis et capitis cornu bifido.

3. *Actaeon*, der *fliegende Stier*.

*Müller* l. c. S. 51. No. 3. t. 1. f. 3.

*Röfels* 2. B. Vorb. S. 16. t. A. f. 2. der sehr grosse und mit drey Hörnern versehene *Nashornkäfer*, welcher sonst auch *Taurus volans*, oder der *fliegende Stier* genannt wird.

*Swammerd.* B. d. N. S. 143. t. 30. f. 4. die *dritte Art ausländischer Nashornkäfer.*

*Neuer Schauplatz der Natur* 1. B. S. 91. der *fliegende Stier*, *Taurus volans*; *Scarabaeus Buceros*, der *grosse Nashornkäfer mit drey Hörnern*; der *grösse Schröter*.

*Neue Berlin. Mannigf.* 3. Jahrg. S. 345. der *fliegende Stier*; der *dreyhörnige Nashornkäfer*.

*Aubent.* Miscell. t. 15. fig. infer.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 78. No. 17.

*Fonston* hist. nat. Ins. p. m. 100. t. 16. f. 2. *Taurus volans Brasilienis*; *Enena*; *Scarabaeus Platyceros*.

*Charlet.* Onom. The *Bull-Chafer*, der *Stierkäfer*.

*Bomar.* Dict. II. p. 469. XI. p. 186.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 902. der *grosse Nashornkäfer mit drey Hörnern*.

*Catholic.* E. p. 221. *L'escarbot elephant.*

*Fabric.* S. E. p. 7. *Scar.* 14.

*Seba Mus.* Tom. IV. t. 90. f. 3. 4. t. 91. f. 3.

*Voet.* Scarab. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 26. No. III.  
t. 16. f. III. *Actaeon,* *Mas.* f. II2. *Aetazona.* \*)

4. *Simson*, der *Simsonkäfer*.

*Müller* l. c. S. 52. No. 4.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 941. der *kleine fliegende Stier.*

*Sloan* Iamaic. Tom. II. t. 237. f. 4. 5. *Scar. major niger tricornis.*

*Brown* Iam. p. 428, t. 43. f. 6. *The great brown Sawyer.*

*Drury* Inf. I. t. 36. f. 3. 4.

*Fabric.* S. E. p. 7. *Scar.* 15.

*Scutellatus, thorace bicorni, capitis cornu apice bifido, labio denticulato.* \*\*)

5. *Tityus*, der *kleine Herkules*.

*Müller* l. c. S. 53. No. 5. der *Einhornzwerg.*

*Aubent.* miscell. I. t. 40. f. 2.

*Onomat.*

\*) Obgleich Herr *Kleemann* in der Anm. in *Röfels* 2. B. Vorb. S. 16. sagt: er habe noch zur Zeit im *Voetischen* Werk keine Abbildung von ihm gesehen; so kommt doch dieser sein *Actaeon* mit dem *Röfelschen* Exemplar, die Farbe ausgenommen, sehr genau überein.

\*\*) *Fabric.* macht hierbey die begründete Anmerkung: *Synonyma a Linnaeo citata nullo modo huc pertinent*, und obgleich *Drury* l. c. bey seinem Exemplare den *Sloan* und *Brown*, selbst *Linn. Simson* angeführt hat; so scheinen erstere beyden Citata ebenfalls unrichtig zu seyn, und auf eine grössere Art von Käfer zu zielen, wie denn *Fabricius* aus diesem *Drury'schen* p. 10. no. 27. eine neue Art gemacht hat, die er *Sc. Titanus* nennt. S. hinten unter den *neuen* Käfern erster Klasse No. 28.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 945. der Einhornzwerg.

*Fabric.* S. E. p. 8. *Scar.* 18. *Scutellatus glaucus, thorace tricorni,* lateralibus brevissimis subulatis, medio subtus barbato, capitis cornu recurvo.

*Voet.* Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 24. No. 99. t. 12. f. 99. *Hercules minor;* le petit Hercule; de kleine Hercules.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 306. No. 3. t. 18. f. 10. *Scarabé petit Hercule.* Scar. *scutellatus,* griseus, nigro-maculatus, capite vnicorni recurvato, *thorace tricorni* bicurvato.

6. *Atlas,* der dreyhörnige Brustschildkäfer.

*Müller* l. c. p. 53. No. 6. t. 1. f. 4. der fliegende Elephant.

*Swammerd.* B. d. N. S. 143. t. 30. f. 3. die zweite Art ausländischer Nashornkäfer.

*Neuer Schauplatz der Natur* 1. B. S. 427. fliegender Elephant.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 906. der fliegende Elephant.

*Catholicon* A. p. 583. der Käfer mit einem dreyhörnigen Bruststück.

*Fabric.* S. E. p. 8. *Scar.* 20. *Scutellatus, thorace tricorni,* intermedio brevissimo, capitis cornu recurvo.

7. *Aloëus,* der amerikanische Riese.

*Müller* l. c. S. 54. No. 7. der Riesenkäfer.

*Neuer Schaupl. der Nat.* 1. B. S. 209. der Aloëus.

*Röfels* 2. B. Vorb. S. 20. t. A. f. 6. der dreyfach gehörnte Käfer ohne Nashorn.

*Fabric.* S. E. p. 9. *Scar.* 22.

*Petiv.* Gazoph. t. 24. f. 10. *Nasicornis Tauroterus Marianus* splendens castanei coloris.

*Aubent.* miscell. t. 15. f. 1.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 904. der grosse Käfer mit drey Hörnern auf der Brust ohne Nashorn.

*Voet.* Scar. ord. I. gen. I. Terric. p. 29. No. 122. t. 18. f. 122. *Aloë*; l' *Aloë*; de *Aloë*. \*)

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 302. No. I. *Scarabe Aloë*.

*Scar. scutellatus niger, thorace tricorni, intermedio longiore recurvato.*

8. *Moloffus*, der *Dickkopf*.

*Müller* l. c. S. 54. No. 8. t. 2. f. 2. der *Doggenkäfer*.

*Schröters* Abhandl. über versch. Gegenst. der Naturgesch. I. Th. S. 356. t. 3. f. 3. *femina*. \*\*)

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 931. der *Doggenkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 24. *Scar. 94.*

*Drury* Inf. I. t. 32. f. 2. *Mas.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 307. No. 4. t. 18. f. II. *Scarabe Molosse*.

*Scar. exscutellatus, capitis clypeo lunato vnicorni, thorace retuso bidentato vtrinque impresso, elytris laevibus.*

9. *Typhoeus*, der *Dreyzack des Neptuns*. \*\*\*)

*Müller* l. c. S. 55. No. 9. t. I. f. 5. der *kleine Stier*.

*Frisch*

\*) Davon nach *Voets* Zeugniß viele Varietäten.

\*\*) Nach allen von dem Herrn Diak. *Schröter* angegebenen Merkmalen l. c. S. 358. hat das *Drury'sche* Männchen keinen sägeförmigen Kopf, und auf dem Kopfe ein Horn, folglich wäre sein abgezeichneter Käfer mit sägeförmigem Kopfe ohne Horn das *Weibchen* vom Linnäischen *Scarabaeus Moloffus*.

\*\*\*) Auch in der *Schweiz*. S. *Bernerisches Magazin* I. Th. I. St. S. 84.

Frisch Inf. 4. Th. S. 16. t. 8. der Mistkäfer mit Schulterhörnern; Kothkäfer mit Schulterspitzen.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 1. No. 1. der Ochs.

Neues hamb. Magaz. 37. St. S. 22. der dreyzackige Buttelnhornkäfer.

Mouffet Theatr. Inf. p. 152. f. 2. *Buceros*; *Taurōceros*.

Raj. Inf. p. 103. *Scarabaeus ovinus* 2. Willughby.

Charlet. Onomast. p. 46. *Capricornus*; the goad-Chafer.

Schaeff. Icon. t. 26. f. 4.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 945. das Stierlein.

Fabric. S. E. p. 10. *Scar.* 26.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 29. No. 124. t. 19. f. 124. *Mas*, f. 125. fem. *Typhon*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 72. *Scar.* 4. t. 1. f. 3. Le Phalangiste.

Niger, elytris striatis, thorace antrorsum *tricorni*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 262. No. 6. t. 10. f. 5. *Scarabé Phalangiste*.

*Scar.* scutellatus niger, elytris sulcatis, thorace *cornibus tribus* incuinbentibus.

10. *Lunaris*, der Mondschild; holländ. *Kronime Hoorn* Torr.

Müller l. c. S. 56. No. 10. der Zirkelkopf.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 1. No. 2. das Einhorn.

Frisch Inf. 4. Th. S. 15. t. 7. der Nashornkäfer der mittlern Art unter den schwarzen Mistküfern.

Schaeffer von Zwief. und Käfern mit Hörnern 1758.

S. 21. t. 3. f. 1. 2. 3. das fliegende schwarze Nashorn.

— Icon. t. 62. f. 2. 3.

Schaeffer Elem. t. 3. f. 2. t. 49. f. 3. t. 63. f. 2. 3.  
*Copris*, Aftermaulwurfskäfer.

Pontoppid. Naturgesch. von Dännem. S. 197.  
 No. 2.

Röfels 2. B. Vorb. S. 24. t. B. f. 2. der kleine dunkelbraune Nashornkäfer mit zwei kleinen Schulterspitzen.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 480. *Copris*.  
*Niger*, thorace antice truncato, medio tuberculato,  
 vtrinque cornuto, cornu acuto, vel lunato, elytris sulcatis.

Pontopp. Atl. Dan. I. 2.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 924. der Käfer mit mond-förmigem Kopfe.

Petiv. Gazoph. Nat. et art. Decad. I. t. 8. f. 4. *Rhinoceros Lusitanus*, niger splendens, vaginis striatis.

Poda Mus. graecens. p. 18. t. 1. f. 1. *Bifidus*.

Voet. Scar. ord. I. gen. 2. *Copris* p. 39. No. 6. t. 23.  
 f. 6. *Spinifer nigro colore; de zwarte Piekdraenger*.

Fabric. S. E. p. 22. *Scarab.* 86.

Raj. Inf. p. 103. *Scarabaeus ovinus* 3. f. capite operculato Willugby.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 88. *Copris* I. Le Bouvier capucin.

Capitis clypeo lunulato, margine elevato, cornicu-lo denticulato.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 257. No. 2. Scarabé lunaire.

Exscutellatus, fusco-castaneus, thorace gibbo, elytris fulcatis, capitis clypeo lunato, cornu erecto.

II. *Cylindricus*, der Walzenkäfer.

Müller l. c. S. 56. No. II. der Rundbauch.

Füesslini Verz. schweiz. Inf. S. I. No. 3.

Onomatol.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 912. der *cylindrische Käfer*.

*Fabric.* S. E. p. 12. *Scar.* 33.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 258. No. 3. t. 10. f. 2. *Scarabé cylindrique*.

*Scutellatus cylindricus niger, capite cornu incurvato, thorace antice truncato quinque dentato.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 448. *Scar. cylindricus*.

## II. *Thorace inermii, capite cornuto.*

mit glattem oder unbewaffnetem Bruststück, aber gehörntem Kopfe.

12. *Bilobus*, der getheilte Brustschild. \*)

*Müller* l. c. S. 56. No. 12. der *Lappenkäfer*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 908. der gehörnte Käfer mit einer gedoppelten Hervorragung an der Brust.

*Aubent.* Miscell. t. 15. f. 3.

*Schaeff.* Icon. t. 63. f. 2. 3.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 79. No. 18.

*Thorax bifidus, aut bicornis, spatio inter cornua semicirculari.*

*Fabric.* S. E. p. 6. *Scarab.* 9.

*Scutellatus, thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris sulcatis.*

13. *Lancifer*, der *Pikenträger*.

*Müller* l. c. S. 57. No. 13. der *Spiessträger*.

Schrö-

\*) *Linné* und *Scopoli* haben hierbey *Swammerd.* B. d. N. t. 30. f. 5. vierte Sorte des *Nashorns* angeführt; *Fabricius* aber hat daraus p. 6. No. 10. eine eigene Art gemacht, die er *Jason* nennt. S. hinten unter den *neuen Käfern der ersten Klasse* N. 18.

*Schröters* Abhandl. 1. Th. S. 359. t. 3. f. 4. \*)  
*Marggr.* Brasil. p. 247. *Tauris.*  
*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 922. der *Spiessträger.*  
*Fabric.* S. E. p. 24. *Scar.* 95.  
*Exscutellatus violaceus, capite cornu angulato, thorace dentato, elytris sulcatis.*

*Voet.* Scar. ord. 1. gen. 2. *Copris* p. 36. No. 1. t. 23. f. 1. \*\*)

*Lancifer violaceus;* le *Bousier phalangiste violet;*  
*Violette Piekdraager.*

14. *Rhinoceros*, das *indianische Nashorn.*

*Müller* l. c. S. 57. No. 14. der *indianische Rhinoceroskäfer.*

*Fermins* Beschr. der Kol. Surin. 2. Th. S. 265. der *Nashornkäfer.*

*Röfels* 2. B. Vorb. S. 22. t. A. f. 7. Eine ausländische Art von *Nashornkäfern* mit einem einzigen *Horn.*

*Bomar.* Dict. des Anim. Tom. IV. p. 283. X. 34. 329. *Scarabé-Rhinoceros.*

*Petiv.* Gazoph. t. 44. f. 9. t. 100. f. 3. *Rhinoceros Luconensis nigricans,* capite vaginisque punctulatis.

*Charlet.* Onom. p. 46. The *Horn-nased Chafer.*

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 938. der *indianische Nas-*  
*horukäfer.*

*Barril.* Icon. t. 163.

*Fabrit.* S. E. p. 12. *Scar.* 34.

*Voet.*

\*) Der vom Schäffer Elem. t. 49. wie Herr D. Schröter sagt, angeführte und *Copris* genannte ähnliche Käfer ist nicht dieser *Lancifer*; sondern f. 1. Linn. *Nuchicornis* No. 24. und f. 3. *Lu-*  
*naris* No. 10.

\*\*) Den Käfer t. 23. f. 2. nennt *Voet* *Copris violaceus major*, und hält ihn nicht mit dem ersten für einerley Art.

*Voet.* Scar. ord. I. gen. I. *Terric.* p. 28. No. 117.  
II8. t. 18. f. 117. II8.

*Rhinoceros orientalis mas et femina;* le *Rhinoceros* mâle et femelle des Indes orientales; de oostindische Neushoorn.

*Catholicon E.* p. 221. *Escarbot-mouche,* der *Fliegenkäfer.*

15. *Nasicornis*, das *europäische Nashorn.*

*Müller l. c. S. 58.* No. 15. der *europäische Nashornkäfer.*

*Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. I. No. 4.* das *Nashorn.*

*Röfels 2. B. S. 41. t. 6. 7.* der *Nashornkäfer.*

*Swammerd.* B. der N. S. 26. t. 27. f. 1. 2. *Nashornkäfer.*

*Pontoppid.* N. G. v. D. S. 197. No. 1. das *Nasenhorn.* Dan. *Nasehornet.*

*Frisch Inf. 3. Th. S. 6. t. 3. f. 1.* *Nasenhornkäfer.*

*Worm.* Mus. p. 242. *Monoceros.*

*Zonst.* hist. nat. Inf. p. 93. 96. t. 15. f. 1. *Buceros.*

*Imperat.* hist. nat. p. m. 902. 924. 925. f. 1. 2. 3.  
Scar. *Rhinoceros.*

*Poda Mus. graec.* p. 17.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 932. der *europäische*  
*Nashornkäfer.*

*Drury* Inf. Tom. I. t. 34. f. 7. 8.

*Müller's Faun. Fridr.* p. 1. No. 1. *Nasicornis.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 52. No. 447. *Nasicornis;*  
Dan. *Naebe-Hornet.*

*Fabric.* S. E. p. 11. *Scar.* 29. *Scutellatus,* thorace  
prominentia triplici, capitinis cornu recurvo, elytris  
laevibus.

*Forster* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 1. No. 1. *Scarab. excavatus.* \*)

Scutellatus, thorace inermi, retuso-excavato, capitis cornu incurvato compresso, elytris obsolete punctato-striatis.

*Voet* Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 28. 29. N. 120. 121. t. 18. f. 120. 121. *Rhinoceros vernaculus mas. et femina;* le *Rhinoceros male et femelle de Hollande;* de *Neerlandsche Neushoorn.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 68. *Scar. 1.* *Le Moine.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 255. No. 1. *Scarabé-Nasiforne.*

Scutellatus, fusco-castaneus, elytris laevibus, thorace gibbo, capite cornu incurvato.

*Catholicon* E. p. 221. *Escarbot-licorne.*

#### 16. *Carolinus*, das *Karolinische Nashorn.*

*Müller* l. c. S. 61. No. 16.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 911. der *Karolinische Nashornkäfer.*

*Voet.* Scar. ord. 1. gen. 2. *Copris* t. 24. f. 14. \*\*)

*Fabric.* S. E. p. 25. *Scar. 97.*

Exscutellatus, capitis cornu erecto brevissimo, clypeo integro, elytris sulcatis.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 35. f. 2.

de

\*) Ich zweifle aber, ob der *Forstersche excavatus* eben dieser Nasiforis fey, da *Forster* ihn selbst davon unterscheidet: *Magnitude et statura fere ad Nasifornem accedit.* Ferner sind die elytra nicht laevia, sondern punctato-striata; endlich habitat ad fretum Gaditanum. Indessen hat *Fabric.* den *Forster* hierbey Nasif. angeführt.

Auch in der *Schweiz.* S. *Bernerisches Magazin* I. Th. 1. St. S. 82.

\*\*) Dazu fehlt die Benennung und Beschreibung noch.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 309. No. 6. *Scarabé de la Caroline.* \*)

*Exscutellatus niger, capite ovali unituberculato, thorace retuso bituberculato vtrinque impresso, elytris sulcatis.*

17. *Mimas*, das *Kameel*.

Müller I. c. S. 62. No. 17. der *Buckelkäfer*.

Rösel's 2. B. Erdk. I. Kl. t. B. f. I. der grünglänzende höckrige Käfer.

Sulzers abgekürzte Gesch. der Inf. S. 17. t. I. f. 4. der *Buckelkäfer*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 930. der *Buckelkäfer*.

Fabric. S. E. p. 25. *Scar.* 99.

Houltin hist. nat. *Bochel-Torr.*

Voet. Scar. ord. I. gen. 2. *Copris* p. 38. No. 4. t. 23. f. 4. *Copris viridis splendens*; le *Bousier verd luisant*; groenglanzige *Mestkever*.

18. *Sacer*, der *heilige Käfer*.

Müller I. c. S. 62. No. 18.

Lepechins Tageb. I. Th. S. 249. der *sogenannte heilige Käfer*.

Sulzers Gesch. der Inf. S. 17. t. I. f. 3. der *heilige Käfer*. \*\*)

*Loeff.*

\*) Der Herr von Geer hat bey diesem Carolin. des Drury t. 34. f. I. 2. angeführt; allein dies ist eine ganz andere Art, und ein wahrer Nashornkäfer mit langem Horn, woraus auch Fabric. p. 13. No. 37. eine eigene Art macht, und *Jamaicensis* nennt. S. hinten die 2te Kl. *neuer Käfer* No. II. Hingegen hat Drury bey t. 35. f. 2. ausdrücklich diesen Linn. *Carolin.* angeführt, folglich ist das Geer'sche Citatum unrichtig.

\*\*) Daselbst steht S. 17. bey dem *Männchen* t. I. f. 2. und bey dem *Weibchen* f. 3. Ich finde aber nur von dem letzteren die Abbildung, weil f. 2. der Scar. *Goliathus* ist.

*Loefl.* It. 20. *Scarab. pilularius niger*, clypeo antice *serrato* etc.

*Osbeck* It. 51. *Scar. laevis*, thorace inermi, capite *ante sexdentato*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 939. der *heilige Käfer*.

*Fabric.* S. E. p. 28. *Scar.* 109.

19. *Didymus*, der *Zwilling*.

*Müller* l. c. S. 62. No. 19. der *Zwillingskäfer*.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 913. der *Zwillingskäfer*.

*Stop.* Ann. 5. hist. nat. p. 80. No. 20.

*Niger*, elytris striatis, caput parvum, *tribus corniculis*.

*Drury* Ins. Tom. I. t. 32. f. 3.

*Fabric.* S. E. p. 13. *Scar.* 40.

20. *Valgus*, das *Sperrbein*.

*Müller* l. c. S. 63. No. 20. *Krummbein*.

*Petiv.* Gazoph. t. 27. f. 8. *Scar. Marianus*.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 946. der *krummbeinige Käfer*.

*Fabric.* S. E. p. 24. No. 96. *Scar. Paniscus*. Exscutellatus, thorace retuso elevato, *capitis cornu recurvo*, clypeo fisso.

21. *Hispanus*, der *schwarzglänzende spanische Nas-hornkäfer*. \*)

*Müller* l. c. S. 63. No. 21.

*Petiv.* Gazoph. 13. t. 8. f. 4. *Rhinoceros Lusitanicus niger splendens*.

*Fabric.* S. E. p. 26. *Scar.* 103.

22. *Car-*

\*) *Simillimus Lunari*, sagt *Linné*, sed *maior*. Das ist vermutlich die Ursache, warum er bey *beyden Rüfels* 2. B. Erdk. 1. Kl. t. B. f. 2. angeführt hat.

22. *Carnifex*, der *Scharfrichter*.

Müller I. c. S. 63. No. 21. t. 2. f. 1. der *Ballenwälzer*.

Röfels 2. B. Erdk. 1. Kl. t. B. f. 8. der *gold- und rothglänzende dreyfach gehörnte Käfer*. (Mas.)

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 910. der *amerikanische Ballenwälzer*.

Drury Inf. Tom. I. t. 35. f. 3. 4. 5.

Fabric. S. E. p. 26. Scar. 102.

Exscutellatus, thorace inermi angulato, cap. itior-  
nu erecto, corpore aeneo.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 2. *Copris* p. 39. No. 5. 7.  
t. 23. f. 5. 7. *Refulgens Copris* (*vulgo verlakte*) *femina*; *Refulgens Copris* *Mas*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 315. No. 8. t. 18. f. 15. *Scarabé elegant.* (fem.) \*)

23. *Granarius*, das *Weizenkorn*. \*\*)

Müller I. c. S. 64. No. 23.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 918. das *Weizenkorn*.

Fabric. S. E. p. 16. Scar. 56.

24. *Nuchicornis*, das *kleine Nackenhorn*. \*\*\*)

Müll.

\*) Fabricius macht die Anmerkung: *Synonyma pleraque a Linnaeo numerata*, falsa. Der Herr von Geer I. c. beschreibt das *Weikchen*, wobey er Linn. Scar. *Festivus* No. 52. citirt. Mithin hat der Ritter aus beyden Geschlechtern *zwo Arten* gemacht. Carnifex ist das *Männchen* und Festivus das *Weibchen*.

\*\*) Nirgends abgebildet.

\*\*\*) Linné sagt von diesem Käfer: *Femina tantum a tergo cornuta, Mas muticus*; dieses haben Müller und Fabricius wiederholt; allein Herr Kleemann behauptet in seiner Anmerkung bey der *Röfelschen* Beschreibung dieses Käfers I. c. S. 17. 18. das Gegentheil;

Dieser



*Müller* l. c. S. 65. No. 24. das *Nackenhorn*.

*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 1. No. 5. das *Nackenhorn*.

*Röfels* 2. B. Vorb. S. 17. t. A. f. 4. der kleine ockerbraune *Mistkäfer* mit schwarz gesprengten Flügeln und kleinem *Kopfhorn*.

*Neues hamb. Magaz.* 37. St. S. 30. der *Hügelhornkäfer*.

*Pontoppid.* N.G. v. D. S. 197. No. 3. der *Frühjahrskäfer in Schweinsmist*.

*Schäffers* Zwief. und Käfer mit Hörnern 1758. t. 3. f. 9-14. das *fliegende Einhorn*.

— Elem. t. 49. f. 1. *Copris*, *Aftermaulwurfskäfer*.

— Icon. t. 73. f. 2-5. t. 96. f. 1.

*Onomat. hist. nat.* P. 6. p. 935. der *Käfer mit dem Horn im Nacken*.

*Raj.* Inf. 103. No. 2. *Scar. ovinus* 3. capite operto.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 1. No. 2.

— Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 479. Niger, thorace rotundato, vtrinque tuberculato, elytris obsoleto fulvis, striatis et maculatis.

*Fabric.* S. E. p. 26. *Scar.* 104.

*Geoffr.* Iqf. Tom. I. p. 89. *Copris* 3. (Mas.)

*Le petit bousier noir cornu.*

Fusco-niger, capite clypeato angulato, pone cornu-  
to, elytris ferrugineo-nebulosis, brevibus, striatis.

No. 4. *Le petit Bousier noir sans cornes* (femina.)

Fusco-

„Dieser gehörnte kleine Käfer ist männliches Geschlechts; denn „das Weibchen, so dickbäuchig und von hellerer Farbe ist, hat „kein Horn, sondern nur zwey zugeschräfte Erhebungen, die „queerüber um den Kopfschild laufen.“

Eine Erfahrung, die der Herr D. Schäffer l. c. S. 35. auch bestätigt hat.

Fusco-niger, capite clypeato angulato, non cornuto,  
elytris brevibus striatis.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 265. N°. 9. *Scarabé à nu-*  
*que épineuse.*

Exscutellatus ater, corpore ovato brevi, elytris gri-  
feis nigro-maculatis, *occipite maris spina armato.*

25. *Vacca*, das Kühlein.

Müller I. c. S. 65. N°. 25.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 1. No. 6. *Kühlein.*

Schröters Abhandl. 1. Th. S. 362. t. 3. f. 5. \*)

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 946. das *Kühlein.*

Fabric. S. E. p. 26. *Scar.* 101.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 90. *Copris* 5. *Le Boufier à*  
*deux cornes.*

Obscure aeneus; capite pone bicorni, thorace anti-  
ce prominente; elytris rufis nigro-maculatis.

26. *Taurus*, das Oechslein.

Müller I. c. S. 65. N°. 26.

Füesslins Verz. S. 1. No. 7. das *Oechslein.*

Sulzers Gesch. S. 17. t. 1. f. 5. das *Oechslein.*

Schäffers Zwief. und Käfer mit Hörnern. 1758. S. 21.

t. 3. f. 7. 8. der *fliegende Ochse.*

-- Icon. t. 63. f. 4.

Schreb. Inf. I. f. 6. 7. *Scar. Taurus.*

Raj. Inf. 103. *Scar. Ovinus* 3.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 944. das *Oechslein.*

Scop. Entom. carn. No. 25. *Scar. Illyricus.*

Fabric. S. E. p. 26. *Scar.* 100.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 92. *Copris* 10. *Le Boufier à*  
*cornes retroussées.*

B 2

Niger,

\*) Dass der vom Herrn D. Schröter angeführte Schäffersche Käfer  
Elem. t. 49, f. 1. *Nuchicornis* L. sey, bezeuget de Geer Tom. 4.  
p. 265. N°. 9. der Schrötersche ist übrigens aus Surinam.

Niger, capite pone *bicorni*, corniculis tenuibus arcuatis, longitudine thoracis, thorace vtrinque sinuato.

27. *Bison*, der *Bison*. \*)

Müller l. c. S. 66. No. 27.

Neuer Schapl. der N. I. B. S. 1032. der *Büffelkäfer*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 908. der *Büffelkäfer*.

Fabric. S. E. p. 23. Scar. 91.

28. *Subterraneus*, der *Minirer*.

Müller l. c. S. 66. No. 28. *Erdwühler*.

Füesslins Verz. S. 1. No. 8. der *Erdwühler*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 944. der *Erdwühler*.

Fabric. S. E. p. 14. Scar. 46.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 267. No. 12. *Scarabé souterrain*.

Exscutellatus oblongus niger totus, capite *tuberculis tribus*, elytris profunde fulcatis.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 54. *Copris*.

29. *Erraticus*, der *Schwärmer*.

Müller l. c. S. 66. No. 29. der *Streifer*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 914. der *herumziehende Käfer*.

Fabric. S. E. p. 16. Scar. 53.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 270. No. 15. *Scarabé errant*.

Scutellatus niger, elytris testaceis substriatis, *capite tuberculo unico*, antennis nigris.

Schaeff. Icon. t. 26. f. 9.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 452.

30. *Man*.

\*) Nirgends abgebildet.

30. *Maurus*, der afrikanische länglichste Käfer mit drey Kopff spitzen. \*)

Müller l. c. S. 67. No. 30. der Afrikaner.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 925. der afrikanische Käfer.

Fabric. S. E. p. 15. Scar. 49.

31. *Fosfor*, der Gräber.

Müller l. c. S. 67. No. 31.

Füesslins Verz. S. 1. No. 9. der Gräber.

Neues hamb. Magaz. 37. St. S. 32.

Schriften der Dronth. und Norw. Ges. 4. B. S. 266.

No. 2.

Pontopp. N. G. von D. S. 198. No. 6.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 961. der schwarze Dunggräber. P. 6. p. 917.

Müller's Faun. Fridr. p. 1. No. 3.

— Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 451. Niger, thorace convexo; capite tuberculis tribus; elytris striatis.

Fabric. S. E. p. 14. Scar. 47.

Geoffr. Inf. Tcm. I. p. 82. Scar. 20. La tête armée.

Totus niger, spinulis tribus capitum transversim positis.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 264. No. 8. t. 10. f. 7. Scarabe' fossoyeur.

Scutellatus oblongus ater, capite magno, tuberculis tribus.

32. *Fimetarius*, der Mistkäfer.

Müller l. c. S. 67. No. 32.

Füesslins Verz. S. 1. No. 10. Mistkolbenkäfer.

B. 3

Röfels

\*) Nicht abgebildet.

Rösel's 2. B. Vorb. S. 17. t. A. f. 3. der kleinere Mistkäfer mit den rothen Flügeldecken und blauglänzendem Bruststück.

*Neues hamb. Magaz.* 37. St. S. 33.

Schäffers Zwief. und Käfer mit Hörnern 1758. t. 3. f. 16. 19. das stumpfe Dreyhorn.

— Icon. t. 26. f. 9. t. 144. f. 6. 8.

Frisch Inf. 4 Th. S. 35. t. 19. f. 3. 4. der Mistkäfer der mittlern Grösse mit rothen Flügeln und schwarzem Halschild.

Olofss Reise durch Island I. Th. S. 320.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 916. der kleine rothe Mistkäfer mit schwarzem Kopfe und Brust.

Poda Mus. graecens, p. 18.

Raj. Inf. 106. No. 9. Scar. *pillularius* 9.

Fabric. S. E. p. 15. Scar. 51.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 87. Scar. 18. Le Scarabe bedeau.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 266, No. 10. t. 10. f. 8.  
Scarabé bedeau.

Scar. (*pedellus*) scutellatus oblongus niger; elytris sulcatis rubris; thorace antice maculis binis rufis.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 454. Niger, thorace inermi; capite tuberculo triplici, antennis elytrisque rubris.

B. Scar. *filmetarius griseus*, der Esel.

Raj. Inf. p. 106. Scar. *pillularis* 10.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 470. Scar. *tessellatus niger*, elytris lividis striatis nigro-tessulatis.

Schaeff. Icon. t. 26. f. 8.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 82. Scar. 19. Le Scarabé gris des bouzes.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 267. No. II. t. 10. f. 10.

II. *Scarabé gris du fumier.*

*Scutellatus oblongus niger; pedibus fuscis, capite laevi; elytris griseis, maculis linearibus nigris.*

33. *Haemorrhoidalis*, der *Rothafter.* \*)

Müller l. c. S. 68. No. 33. der *Rotharsch.*

Füesslin's Verz. S. 2. No. II. *Rotharsch.*

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 918. der *Rotharsch.*

Fabric. S. E. p. 16. Scar. *Granarius* B. 56.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 449.

Niger, thorace inermi, capite tuberculo triplici; elytris punctato-striatis, postice pedibusque rufis.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 271. No. 17. *Scarabé hemorrhoidal.*

*Scutellatus niger, elytris profunde sulcatis, apice rufis.*

34. *Conspurcatus*, der *Schmutzkäfer.*

Müller l. c. S. 68. No. 34. der *Dreckkäfer.*

Füesslin's Verz. S. 2. No. 12.

Pontopp. N. G. v. D. S. 198. No. 9. t. 16. f. 1. 2.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 912. der *bespritzte Käfer.*

Schaeff. Icon. t. 26. f. 8. \*\*)

Fabric. S. E. p. 16. Scar. 54.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 453.

Niger, capite tuberculo triplici obsoleto; elytris striatis lividis macula disci obscura; marginibus thoracis pedibusque pallidis.

B 4

Pon-

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Das Schäffersche Citatum, so Füesslin und Prof. Müller zu diesem *Conspurcatus* gesetzt haben, hat der Herr Staatsrath Müller, vielleicht richtiger, bey Linn. *simetar.* B., oder *tesulatus* angeführt.

*Pontopp. Atl. Dan.* I. t. 82,  
*de Geer Ins. Tom. IV.* p. 268. No. 13. *Scarabé bar-*  
*bouillé.*

*Scutellatus nigro-fuscus*, thoracis margine fulvo,  
 elytris striatis fulvis, maculis binis nigris, antennis  
 rufis.

35. *Marianus*, der *maryländische Grünschiller*. \*)  
*Müller l. c. S. 68.* No. 35. der *karolinische Käfer*.  
*Onomatol. hist. nat. P. 6.* p. 925. der *maryländische*  
*Käfer*.  
*Fabric. S. E.* p. 16. *Scar.* 57.

### III. *Mutici capite, et thorace inermi.*

*Ungehörnte Käfer.*

36. *Gigas*, der *ägyptische Riese*. \*\*)  
*Müller l. c. S. 69.* No. 36. der *Goliath*.  
*Onomatol. hist. nat. P. 6.* p. 918. der *Riesenkäfer*.  
 37. *Scaber*, der *Hökerschild*. \*\*\*)  
*Müller l. c. S. 69.* No. 37. der *Rauchschild*.  
*Onomatol. hist. nat. P. 6.* p. 940. der *rauhe Käfer*.  
*Fabric. S. E.* p. 17. *Scar.* 58. *Scutellatus, clypei cen-*  
*tro prominulo, elytris antice scabris.*

38. *Laticollis*, der *Breithals*. †)

*Müller*

\*) Nirgends abgebildet: es müste denn das *Weibchen* des *Hercules* seyn.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Müller l. c. S. 69. No. 38.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 922. der breitschultrichte Käfer.

Raj. Inf. 105. Scar. *pillularis* 4.

Fabric. S. E. p. 28. Scar. 110.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 89. *Copris* 2. Le Hottentot.

Niger, capite clypeato, margine ferrato; thorace lato laevi, elytris striatis.

39. *Longimanus*, das Langbein.

Müller l. c. S. 70. No. 39. t. 2. f. 3. der Langarm.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 923. der langarmige Käfer.

Aubent. Miscell. t. 41. f. 1.

Fabric. S. E. p. 17. Scar. 59.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. class. 2. Arboricolae: *Dendrocauthari* p. 23. No. 97. t. II. f. 97. *Longimanus*; le longue-main; de Langhand.

40. *Pilularius*, der Pillenkäfer. \*)

Müller l. c. S. 70. No. 40.

Fermins Beschr. der Kol. Sur. 2. Th. S. 267. der Ross- oder Mistkäfer.

Krünitz ökon. Encyklop. 1. Th. S. 645. Rosskäfer.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 936. der Ballenwälzer.

Fabric. S. E. p. 29. Scar. 118.

Plinii Hist. nat. Lib. XI. c. 34.

Drury Inf. Tom. I. t. 35. f. 7.

\*) Dieser Käfer wird oft mit dem bekannten Rosskäfer, der auch Mistpillen macht, No. 42. verwechselt, ohnerachtet jener ein gut Theil kleiner, und bey uns nicht einheimisch ist.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 311. No. 7. t. 18. f. 14. *Scarabé pilulaire*.

*Exscutellatus niger glaber, capite magno depresso, thorace postice rotundato.*

*Forsteri* Inf. nov. sp. Cent. I. p. 3. No. 3. *Hudsonias*.

*Exscutellatus muticus ater, thorace convexo lunato, clypeo rotundato, emarginato, elytris postice emarginatis, femoribus posticis elongatis.*

41. *Schaefferi*, der Schäfferkäfer.

Müller l. c. S. 71. No. 41.

Füesslins Verz. S. 2. No. 13. *Schäffers Kolbenkäfer*.

*Schäffers Zwief. und Käfer mit Hörnern* 1758. S. 36. t. 3. f. 20. das *Langbein*; der *Stelzenkäfer*.

— Icon. t. 3. f. 8.

Lepechins Tageb. 1. Th. S. 262. f.) der *Schäfferische Käfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 24. *Longipes*, der *Langfuss*.

*Onomat.* hist. nat. P. 6, p. 940. der *Schäfferische Käfer*.

*Fabric.* S. E. p. 29. *Scar.* 117.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 92. *Copris* 9. Le *Bousier araignée*, der *Spinnenförmige Mistkäfer*.

Niger, *pedibus longis, femorum posteriori basi denticulata, elytris postice gibbis.*

42. *Stercorarius*, der *deutsche stahlblaue Ross- oder Mistkäfer*. \*)

*Schweid.*

\*) Im Linneischen Citato: *Frisch* Inf. 4. t. 13. f. 6. ist eine Unrichtigkeit; und muss heißen: *Frisch* Inf. 4. p. 13. t. 16. f. 3.

Die Larve dieses Käfers nennen die Norweger *Muldøxe*, oder *Erdochse*.

*Schwed.* Torndyfwel; *holl.* Mest-Torr; *Smoland.* Torbagge; *Engl.* Dungbeetle; Scharnbugg. (Provinz. Pferdwurm.)

Müller l. c. S. 71. No. 42. der Stinkkäfer.

Füesslin Verz. S. 2. No. 15. der Dreckkolbenkäfer.

Pontoppid. N. G. v. D. S. 198. No. 10. *Torbisk,* *Skarnbasse:* Fütl. *Scanböddel.*

— Natürl. Hist. von Norw. 2. Th. S. 78.

Frisch Inf. IV. Th. S. 13. t. 6. f. 3. der große schwarze Mistkäfer, Rosskäfer.

Brefsl. Samml. 1718. Apr. Cl. 4. Art. 2. 1719. Novemb. Cl. 4. Art. 8. p. 591-593.

Taube N. G. von Zelle 2. Th. S. 262. der schwarze Rosskäfer.

Beckmanns Anfangsgr. der Naturhist. S. 90. der schwarze Mistkäfer.

Raj. Inf. p. 74. No. 1. Scar. magnus niger vulgarissimus.

Lister Scar. angl. p. 380. No. 4. Scar. magnus, e purpura niger, tibiis omnium pedum serratis (Sägefuss.)

Poda Mus. graecens. p. 18.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 942. der Dreckwälzer; Rosskäfer.

Schwenkfeld Theriotr. Siles. p. 553. Scar. pilularius; Κοπειῶν; Hippocr. Καρδαῖος; Aldrov. Scar. sterorum; Ηλιοκάρδαῖος, Scar. solaris (Sonnenkäfer, Pferdkäfer, Rosskäfer.)

Schaeff. Icon. t. 23. (33.) f. 9.

Fabric. S. E. p. 17. Scar. 60.

Merret pln. p. 201. Scar. finamus.

Müller

Er wird von vielen Schriftstellern Pilularius, der Pillen- oder gemeine Mistkäfer genannt.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. I. No. 5.

— Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 458. Ater, subtus violaceus, elytris fulcatis; capitum clypeo duplicato; vertice prominulo.

Dan. Torbist, Skarn-Basse; Skarn-Boddel. Norv. Tordival.

Catholicon E. p. 221. Escarbot commun.

Voet. Scar. ord. I. gen. I. Territ. p. 31. No. 134. t. 20. f. 134. Scar. fimosus costatus; le fouille-merde à stries; de geribde Drekkever.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 75. Scar. 9. Le grand pillulaire.

Charlet. Onomast. 46.

Drury Inf. Tom. I. pref. VIII. The common bleue Dung-Beetle; Scarabé bleu commun.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 259. No. 4. t. 9. f. 10. II. Scarabé fouille-merde.

Scutellatus supra niger, subtus violaceus, elytris fulcatis, antennis rufis, capite tuberculato.

43. *Vernalis*, der kleine blauliche Frühlings-Mistkäfer.

Müller I. c. S. 72. No. 43. der Frühkäfer.

Füesslins Verz. S. 2. No. 16.

Sulzers Gesch. S. 17. t. I. f. 6. der Frühlingskäfer.

Pontopp. N. G. v. D. S. 198. No. II. Fütl. Skäl-basse.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 947. der Frühlingskäfer.

Scop. Entom. carn. No. 27. Vernalis.

Caput pentagonum, plica media longitudinali; elytra laevia. Supra virens, nitens, subtus violaceus, femoribus virefcentibus.

Poda Mus. graecens. p. 19.

Fabric. S. E. p. 17. Scar. 61.

*Mülleri*

Müller Faun. Fridr. p. 1. No. 6.

— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 459.

Violaceus; elytris laevissimis; capitis clypeo duplicato; vertice prominulo. Dan. Skalle-Basse.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. Terric. p. 31. No. 135. t. 20. f. 135. Scarabaeus simosus glaber; fouille-merde-lisse; de gladde Drekkever.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 77. Scar. 10. Le petit pillulaire.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 262. No. 5. t. 10. f. 4.

Scarabé printanier.

Scutellatus violaceus totus; elytris glabris laevissimis; antennis nigris, capite tuberculato.

44. *Calcaratus*, der ägyptische Spornträger. \*)

Müller l. c. S. 73. No. 44.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 909. der Spornträger.

45. *Schreberi*, Schrebers Käfer.

Müller l. c. S. 73. No. 45.

Füsslins Verz. S. 2. No. 17. Schrebers Kolbenkäfer.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 940. der Schreberische Käfer.

Schaeff. Icon. t. 73. f. 6.

Fabric. S. E. p. 30. Scar. 120.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 91. Copris 7. Le Bouvier à points rouges. (der rothpunktirte Mistkäfer.)

Niger, nitidus; thorace antice gibbo dupli; elytra singulo macula dupli rubra.

46. *Ovatus*, der cylindrische Mistkäfer. \*\*)

Müll.

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

*Müller* l. c. S. 73. No. 46. der *Eyerkäfer*.

*Füesslins* Verz. S. 2. No. 18.

*Onomat. hist. nat.* P. 6. p. 935. der *eyförmige Käfer*.

*Fabric.* S. E. p. 30. *Scar.* 124.

47. *Amazonus*, der *Surinamische Mistkäfer*.

*Müller* l. c. S. 74. No. 47. der *Amazon*.

*Neuer Schauplatz der Nat.* I. B. S. 237. der *Amazonenkäfer*.

*Onomat. hist. nat.* P. 6. p. 905. der *Amazonenkäfer*.

*Drury* Ins. Tom. I. t. 36. f. 6. \*)

48. *Sabulosus*, der *Sandgräber*.

*Müller* l. c. S. 74. No. 48. der *Sandkäfer*.

*Füesslins* Verz. S. 2. No. 19. der *Sandwühler*.

*Onomatol. hist. nat.* P. 6. p. 939. der *Sandkäfer*.

*Scop.* Entom. carn. No. 23. *Scar. rugosus*, der *Rundkäfer*.

*Caput rugis duabus transversis; totus niger, subtus lucidior; capite antice rotundato; thorace laevi punctulato; elytris punctatis, striisque 7 punctatis.*

*Poda Mus. graecens.* p. 20.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 1. No. 7.

— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 461.

*Niger, thorace inaequali; elytris rugosis, striis quatuor elevatis.*

*Fabric.* S. E. p. 31. *Trox* I. Thorace, elytrisque rugosis, thorace integerrimo.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 269. No. 14. t. 10. f. 12.  
*Scarabaeus femoratus* (*der Hüftenkäfer*) *Scarabé à larges cuisses*.

Scutel-

\*) Eine Varietät von diesem.

*Scutellatus niger, corpore ovato, elytris rugosis suturis quatuor, femoribus anticis maximis.*

49. *Chrysis*, der westindische Goldkäfer.

Müller l. c. S. 74. No. 49.

Sulzers Gesch. S. 18. t. 1. f. 10. der *Chrysolith.*

Neue berlin. Mannigf. 3. Jahrg. S. 345. der goldene Maykäfer.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 912. der westindische Goldkäfer.

Fabric. S. E. p. 44. *Cetonia* 8.

*Scutello* elytris dimidio breviore, sterno porrecto, corpore viridi.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Dendric.* p. 17. No. 63. t. 8. f. 63. *Murrinus viridis*; la *Porcellaine verte*; de *greene Porcellaine*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 319. No. 12. t. 19. f. 4. Scarabé *Chrysis*.

*Scutello longissimo, corpore ovato convexo, supra viridi-nitente, infra viridi-aeneo, pettore porrecto.*

50. *Surinamus*, die Surinamische Gelblinie.\*)

Müller l. c. S. 75. No. 50. der *Surinamer.*

Schröters Abhandl. 1. Th. S. 337.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 944. der *Surinamische Käfer.*

51. *Ni-*

\*) Da Linné nicht gemeldet hat, ob es ein Mist- oder Baumkäfer sey, so vermuthe ich fast: es sey des Voets *Scarabaeus simosus Surinameus.*

Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 32. No. 140. t. 21. f. 140.

le fouille-merde de Surinam; de Surinaamse Drekkever.

Linné gedenkt zwar gelber Linien; aber Voet sagt: es gebe davon sehr viele Varietäten.

51. *Nitidus*, der ausländische grüne Glanzkäfer.

*Müller* l. c. S. 75. No. 51. der grüne Käfer.

*Röfels* 2. B. Vorb. S. 27. t. B. f. 4. der schöne matt-grüne Käfer mit einer orangen gelben Einfassung. \*)

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 934. der Sammetkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 44. *Cetonia* 7.

Thorace postice lobato, capite *spina* recumbente, sterno cornuto.

*Voet.* Scar. ord. I. gen. I. *Floric.* p. 8. No. 23. t. 3. f. 23. *Flagranticeps*; la tête luisante; de Glanskop. (Glanzkopf.)

*Drury* Inf. Tom. I. t. 33. f. 5. 6.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 322. No. 16. t. 19. f. 8. 9. *Scarabé luisant.*

Scutello minimo, viridis obscurus, thorace angulato elytrisque flavo-marginatis, capite *spina* recumbente.

52. *Festivus*, der Staatskäfer. \*\*)

*Müller* l. c. S. 75. No. 52.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 915. der zierliche Käfer.

*Fabric.* S. E. p. 28. *Scar.* III.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 315. No. 8. t. 18. f. 15. *Scarabé elegant.*

Exscutellatus, capite lunato nigro, thorace convexo rubro, maculis nigris, elytris rubro aeneis sulcatis.

*Voet.* Tab. 23. f. 5.

53. *Lineola*, der lineirte Käfer.

*Müller*

\*) Der *Drury'sche* f. 5. entspricht dem *Röfelschen* vollkommen; bey dem *Voetschen* aber finde ich die gelbe Randlinie nicht, ob ihn gleich der Herr von *Geer* bey diesem *Nitidus L.* angeführt hat.

\*\*) Das Weibchen zu Linn. *Carnifex* No. 22.

Müller I. c. S. 76. No. 53. der Strichkäfer.

Röfels 2. B. Vorb. S. 28. t. B. f. 7. der kleine schwarz-glänzende glatte braune Käfer mit okerbraunen Auszierungen.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 923. der schwarze Käfer mit gelben Rückenstrich.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 76. No. 13. *Lucanus sulcatus*, et p. 82. No. 24 *Scarab. lineola*.

Gronov. Gazoph. p. 145. No. 435.

Fabric. S. E. p. 46. *Cetonia* 17.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 320. No. 13. t. 19. f. 5. *Scarabé à ligne jaune. (Gelblinie.)*

*Scutellatus niger nitidus flavo-maculatus, capite thoraceque linea flava, thoracis margine flavo.*

#### 54. *Sticticus*, der Punktkäfer. \*)

Müller I. c. S. 76. No. 54.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 943. der weissgesprenkelte Käfer.

Raj. Ins. p. 104. No. 8.

Fabric. S. E. p. 51. *Cetonia* 37. *Clypeo emarginato, nigra albo-maculata, abdomine subtus punctis quatuor albis.*

#### 55. *Sepicola*, der indianische Zaunkäfer. \*\*)

Müller I. c. S. 77. No. 55. der Zaunkäfer.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 941. der Zaun- oder Heckenkäfer.

#### 56. Sy-

\*) Eine Varietät von *Variabilis* No. 79. wobey die übrigen Cittata des Geoffr. und de Geer anzutreffen sind.

\*\*) Nicht abgebildet.

56. *Syriacus*, der *Syrische Käfer mit grünlichem Haarkopf und Brustschild*.

Müller l. c. S. 77. No. 56. t. 2. f. 4.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 944. der *Syrische Käfer*.

57. *Fullo*, der *Walker*; *Müllerkäfer*; der *grosse Juliuskäfer*; der *marmorirte Maykäfer*. \*)

Müller l. c. S. 77. No. 57. t. 2. f. 6. das *Männchen*; f. 7. das *Weibchen*; *Juliuskäfer*.

Flüesslins Verz. S. 2. No. 20. der *Tiger*.

Röfels 4. B. S. 203. t. 30. der *scheckichte grosse Juliuskäfer*.

*Neue hamb. Magaz.* 37. St. S. 41. der *Weinkäfer*.

Frisch Inf. XI. Th. S. 22. t. 1. f. 1. der *weissprengliche grosse Juliuskäfer*.

Bresl. Samml. 1718. April. Class. 4. Art. 2. §. 1. der *Tannen- oder Donnerkäfer*.

Sulzers Gesch. S. 1. Vign. 1.

Pallas Reise durch Russl. I. 208. der *Dünenkäfer*.

Ephem. Nat. Curios. Dec. 1. Ann. 6. et 7. obsl. 239. p. 348. Scar. *pictus*, der *gemahlte Käfer*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 999. der *weissprengliche grosse Juliuskäfer*. P. 6. p. 917.

Schaeff. Icon. t. 23. f. 2.

Aubent. miscell. t. 16. f. med.

Zonst. hist. nat. Inf. t. 15. lin. 7.

Hoefn. Inf. 2. t. 7.

Bomar. Dict. IV. p. 535. *Foulon*.

Raj. Inf. p. 93. Scar. *Fullo Plinii*.

Plin.

\*) Auch in der *Schweiz um Genf und Luggaris*. S. Berner. Magaz. 1. Th. 1. St. S. 84.

*Plin.* hist. nat. Lib. 30. cap. II. *Fullo albis guttis.*

*Fabric.* S. E. p. 31. *Melolontha I.*

*Testacea, albo-maculata, scutello macula dupli-  
alba, antennis heptaphyllis.*

*Voet.* Scar. ord. I. gen. I. *Arboric.* p. 14. No. 48.  
49. t. 6. f. 48. 49. *Sabulosus niger mas, femina;* Le  
*Haneton noir des Dunes, mâle; rouge des Dunes fe-  
melle; de zwarte Duinkever, Man; de roode, Wyf.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 69. *Scar. 2. Le foulon.*

*Antennarum lamellis maximis, corpore nigro, squa-  
mis albis, varie maculato.*

*Charleton* Onomast. 46. *Fullo.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 272. No. 19. *Scarabé  
Foulon.*

*Scutellatus niger, s. rufus, maculis sparsis albidis  
squamosis, antennis heptaphyllis.*

### 58. *Agricola*, der Ackermann.

*Müller* l. c. S. 79. No. 58. der *Feldküfer.*

*Füesslins* Verz. S. 2. No. 21.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 904. der *Feldkäfer.*

*Poda* Mus. graec. p. 21.

*Scop.* Entom. carn. No. 6. *Cyathiger.*

Elytra paulo saturatiora quam in *Solstitiali*, margi-  
ne nigra, si vnta fuerint, maculam communem ge-  
runt *cyatho* similem, atram.

*Fabric.* S. E. p. 37. *Melolontha 29.*

*Capite, thoraceque coeruleo pilosis, elytris lividis,  
clypeo apice reflexo.*

*Schaeff.* Icon. t. 63. f. 1.

### 59. *Horticola*, der Gartenküfer.

*Müller* l. c. S. 80. No. 59. t. 2. f. 5. der *Johannis-  
küfer.*

- Füesslins* Verz. S. 2. No. 22. der *Nager*.  
*Gleditsch*. Einleit. in die Forstwiss. 2. Th. S. 791.  
 No. 23. der *Frischische-Obst-Apfelbaumkäfer*.  
*Pontopp.* N. G. v. D. S. 198. No. 13. *Fütl. Gaasflüe,*  
*Gaasebilde* (Gänsefliege.) \*)  
*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 921. der *Gartenkäfer,*  
*Johanniskäfer*.  
*Müller* Faun. Fridr. p. 1. No. 8.  
 — Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 460.  
*Niger*, *capite thoraceque violaceo*, piloso, elytris *rufis*. Dan. *Gaas-Flue*, *Gaasebilde*.  
*Schaeff.* Icon. t. 23. f. 4.  
*Lister* Scar. angl. 380. No. 3. Scar. ex nigro virescens, pennarum thecis *rufis*.  
*Fabric.* S. E. p. 37. *Melolontha* 28. \*\*)  
*Capite, thoraceque coeruleo pilosis, elytris testaceis,*  
 pedibus nigris.  
*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 75. *Scar.* 8. *Le petit haneton à corcelet vert*.  
*Capite, thoraceque coeruleo piloso, elytris rufis.*  
 de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 278. No. 24. t. 10. f. 18.  
*Scarabé à corcelet vert*.  
 Scar. (*viridicollis*) scutellatus, elytris obscure flavis; *capite thoraceque violaceis*, s. viridibus nitidis, pedibus nigris.

60. *Me-*\*) Den *Gänsen* tödtlich, wenn sie diesen Käfer verschlucken.\*\*) Linné hat zwar bey diesem Horticola *Frisch* IV. Th. S. 29. t. 14. der *Weinblatt- oder Juliuskäfer*, angeführt; allein *Fabric.* hat diesen mit Recht von dem Horticola unterschieden, und daraus eine eigene Art: *Melolontha Frischii* p. 37. No. 25. gemacht, die hinten in der dritten Klasse der neuen Käfer No. 171. vorkommen wird. Dieser *Frischkäfer* ist auch wohl zweymal so gross, als der *Horticola*.

60. *Melolontha*, der gemeine Maykäfer. \*)

Müller I. c. S. 80. No. 60. der Maykäfer.

*Altes hamb. Magaz.* 4. B. S. 231.

Engl. The brown tree-beetle; the blind-beetle; the Chaser; the Cock-chafer; the Jack-horner; the Jeffry-Cock; the May-bug; the Dor; Hedge-chafer.

Bey den *Holl. Baumkäfer*; *Raubkäfer*; *Kornwürmer*; *Heckenkäfer*.

Seel. *Molenaers* (Müller) *Mehl-Senfmüller*.

Französ. *Hanetons*.

Lat. *Scarab. stridulus*.

Füesslins Verz. S. 2. No. 24. *Maykolbenkäfer*, *Laubkäfer*.

Fermins Beschr. der Kol. Surin. 2. Th. S. 268.

Pontopp. N. G. v. D. S. 198. No. 14. *Oldenborer*.

Kleemanns Preisfchr. in den Bemerkungen der Kührpfälz. physikal. ökon. Gesellsch. Mannh. 1771. 8. S. 299. m. K.

Bonnets und anderer &c. Abhandl. aus der Infektol. S. 536.

Gleditsch. Einl. in die Forstwiss. 1. Th. S. 601. No. 5.

Röfels 2. B. S. 1. t. 1. der *allenthalben bekannte Mayenkäfer*.

Eberhards Thiergesch. S. 202. der *Sägenblattkäfer*.

Beckmanns Anfangsgr. der Naturhist. S. 91. der *Maykäfer*.

Wittenb. Wochentbl. 70. St. S. 385.

Oekonom. Encycl. 1. Th. S. 324. *Ackerkrabbe*.

\*) Linné hat bey diesem sowohl, als bey dem vorigen Horticola den *Frisch* 4. Th. t. 14. citirt. Dies ist aber eine ganz besondere Art, wie vorher angemerkt ist, indem *Frisch* den eigentlichen Maykäfer gar nicht hat.

*Berlin. Samml.* 4. B. S. 488.

*Müller's Faun. Fr.* p. 2. No. 9.

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 54. No. 464.

Abdominis incisuris lateralibus *albis*; cauda inflexa, acuta.

Dan. *Oldenborre, Oldentorne.*

*Poda Mus. graec.* p. 19.

*List. Goed.* p. 265. f. III. *Molenaer.*

*Schaeff. Elem.* t. 8. f. 3. t. 109. f. 4. *Maulwurfs-käfer.*

— *Icon.* t. 93. f. 1. 2. t. 102. f. 3. 4.

*Leuwenhoek Arcan. Nat. det.* 1722. p. 17. f. 3. *Mole-naar, Molitor.*

*Mouffet Theatr.* p. 160. f. 2. *Scar. arboreus vulgaris.*

*List. loqu.* p. 379. No. 1. *Scar. maximus rufus*, ur-hopygio deorsum inflexo.

*Raj. Inf.* p. 104. No. 1. *Scar. arboreus vulgaris major.*

*Fonst. hist. nat. Inf.* t. 15. *Scar. arboreus.*

*Charlet. Onomast.* p. 46. *Scar. arboreus.*

*Ephemер. Nat. Curios.* decur. 2. anni. 1. p. 148. *Scar. majalis foliaceus.*

*Bomar. Dicht. T. 5.* p. 333. *Hanneton.*

*Onomat. hist. nat. P. 6.* p. 926. der *Mayenkäfer.*

*Schwenkf. Ther. Siles.* p. 554. *Scar. rutilus major*; *Scar. saligneus, rubeus, praegrandis, stridulus*; der *Mayenkäfer; Weidenkäfer; Kreuzkäfer.* \*)

*Fabric. S. E.* p. 32. *Melolonth. 2. vulgaris.* Testaceus, thorace villoso, cauda inflexa, incisuris abdominis *albis.*

*Petiv.*

\*) Schwenfeld hat schon bemerkt, dass einige einen schwarzen, andere einen rothen Halskragen haben: capite alias *nigro*, alias *rnbro:* die ersten aus *gutem fetten*, die letztern aus *steinigtem Lande.*

*Petiv.* Gazoph. p. 29. t. 19. f. 2.

*Speciale de la Nat.* Tom. I. p. 8. f. 2. 8. II.

*Scop.* Entom. carn. No. 16. Carn. Keber, \*)

*Voet.* Scar. ord. 1. gen. 1. Arboric. p. 13. No. 45. 46. t. 6. f. 45. 46. *Vernalis mas et femina; le Hanneton de May, male, femelle; Meikever.*

*Geoffr.* mat. med. Tom. 6. p. 529-549.

— Inf. Tom. I. p. 70. *Scar. 3. le Hanneton.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 273. No. 20. t. 10. f. 14.

### *Scarabé Hanneton.*

*Scutellatus rufo-fuscus, thorace villoso, abdominis lateribus albo maculatis, cauda acuta inflexa.*

61. *Solstitialis*, der kleine Laub- oder Maykäfer. \*\*)

Müller l. c. S. 83. No. 61. der Juniuskäfer.

Füesslins Verz. S. 2. No. 25. der kleine Laubkäfer.

Frisch Inf. IX. S. 30. t. 15. der Braach- oder Juniuskäfer.

C 4

Gleditsch.

\*) Scopoli hat drey artige Anmerkungen gemacht:

1. Dass die Fledermäuse diesen Käfern gewaltig nachstellen;
2. Dass die häufigere Anzahl derselben im Frühjahre Herbstkrankheiten vorher verkündigten.
3. In Oel eingemacht sollen sie die Wanzen vertreiben.

Bey den Alten hieß die Larve *Spondylis*, σπονδύλη, Verticilla. S. Schwenkf. l. c. p. 557. Jonst. l. c. p. 135. de Spondyle. Bressl. Samml. 1719. Nov. Cl. 4. Art. 8. p. 592. 593. 1721. Cl. 4. Art. 5. Bey den Holländern Koren-worm; Robworm. In Deutschland an einigen Orten Enderlein, Engerlein, Engerling, Wirtelmaide, weisse Erdglimen. Bressl. Samml. 1718. April Cl. 4. Art. 4. p. 968. Im Naumburgischen und Mecklenburgischen Ackerkrabben.

\*\*) Dieser Käfer soll das Mutterkorn verursachen, indem er sich an das Korn hängt, wenn es in der Milch steht, und die Aehren aussaugt. S. Lentins Beob. einiger Krankheiten. Gött. 8. 1774. S. 2. 3.

Gleditsch. Forstwiss. 2. Th. S. 790. No. 22. der andere grosse Frühlingskäfer.

Pontopp. N. G. v. D. S. 198. No. 15. Brandenborre; St. Hans Oldenborre (Johanniskäfer.)

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 393. Suec. Allenborre. Scan. Pingborre.

Schwenkf. Theriotr. Siles. p. 555. *Scarabaeus rutilus minor*; Braachkäfer.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. Arboric. p. 15. No. 51. 52. t. 6. f. 51. 52. Junius; Germano-Junius; le Haneton de Juin; — d'Allemagne; de Junykever; de Duitsche Junykever.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 942. der Juniuskäfer.

Petiv. Gazoph. p. 36. t. 22. f. 9. Scar. pechinatus minor villosus.

Poda Mus. graec. p. 21.

Schaeff. Icon. t. 93. f. 3.

Müller Faun. Fridr. p. 2. No. 10.

— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 465.

Testaceus, thorace *villoso*, abdominis incisuris albis, cauda obtusa.

Fabric. S. E. p. 33. Melol. 5. Testacea, thorace *villoso*, elytris luteo-pallidis, lineis tribus pallidioribus.

Mouff. Theatr. Inf. p. 160. f. 3. Scar. *lanuginosus arboreus*.

Lift. Scar. angl. p. 301. No. 2. Scar. alter ex *flavo subcinereus*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 74. Scar. 7. Le petit Haneton d'Automne.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 276. No. 21. t. 10. f. 15. Scarabé solstiel.

Scutellatus, *villosus*, griseo-testaceus, capite nigro, pedibus fulvis, abdominis lateribus albo-maculatis.

62. *Occidentalis*, der westindische Laubkäfer.

Müller

Müller l. c. S. 83. No. 62. der *westindische Juniuskäfer*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 935. der *westindische Käfer*.

Fabric. S. E. p. 32. *Melolontha* 3.

Testacea, *thorace pubescente, elytris lineis quatuor niveis*.

Drury Inf. Tom. II. t. 32. f. 2.

63. *Hemipterus*, der *Käfer mit halben Flügeldecken*. \*)

Müller l. c. S. 83. No. 63. der *Halbdecker*.

Füesslins Verz. S. 2. No. 26. der *Stachelkolbenkäfer*.

Neues hamb. Magaz. 37. St. S. 36.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 918. der *Käfer mit sehr kurzen Flügeldecken*.

Fabric. S. E. p. 41. *Trichiis* 4.

*Thorace tomentoso, rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreviatis*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 78. *Scar. 12. Le Scarabé à tarrière. (Bohrkäfer)*

Ater, depresso et squamosus, *maculis albis variegatus, elytris abdomine brevioribus, femina aculeo ani*.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 472.

*Scar. squamulatus*.

Niger, thorace inaequali; *lineola dupli abrupta, elytris abdomine brevioribus*.

64. *Farinosus*, der *Staubkäfer*.

Müller l. c. S. 84, No. 64.

C 5

Füesslins

\*) Viel ähnliches mit *Scop. Scar. variegato. Ent. carn. No. 28.*  
aber nicht derselbe.

Nirgends abgebildet.

*Füesslins* Verz. S. 3. No. 27. der *Puderkolbenkäfer*.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 914. der *staubichte Käfer*.

*Scop. Entom. carn.* No. 9. *Scar. argenteus*.

*Poda Mus. graec.* p. 20. *Scar. argenteus*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 32. f. 4. *Scar. coeruleus*.

*Fabric.* S. E. p. 38. *Melolontha* 31. \*)

Supra coeruleo, subtus argenteo-nitens, clypeo integrō.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 79. *Scar. 13.* *L'écaillieux violet*.

*Violaceus et squamosus*, squamis subtus argenteis.

*de Geer Inf.* Tom. IV. p. 302. No. 30. t. 10. f. 23.

*Scarabé à écailles vertes* (Grünschuppe.)

*Scutellatus niger, squamulis griseo viridibus*, corpore depresso.

65. *Aulicus*, der *afrikanische Hofjunker*. \*\*)

*Müller* l. c. S. 84. No. 65. der *Hofjunker*.

*Schröters Abhandl.* 1. Th. S. 337.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 906. der *Hofjunker*.

66. *Longipes*, der *kapensische Stelzenkäfer*. \*\*\*)

*Müller* l. c. S. 84. No. 66. der *Langfuss*.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 924. der *langfüssige Käfer*.

67. *Lanigerus*, der *Wollträger*.

*Müller*

\*) Diesen hält *Fabric.* mit *Scop. argenteo* nicht für einerley, weil dessen Flügel weder schwarz, noch mit grünlichem Staube besprengt sind. Er hat daraus eine eigene Art gemacht S. E. p. 38. *Melol. 32. argentea*. S. hinten in der dritten Klasse der neuen No. 172.

\*\*) Nirgends abgebildet.

\*\*\*) Nirgends abgebildet.

*Müller* l. c. S. 85. No. 67.

*Onomat. hist. nat.* P. 6. p. 922. der *Wollenträger*.

*Fabric.* S. E. p. 33. *Melol.* 7.

Subtus *lanata*, capite thoraceque aureis, *elytris* lu-

teis.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 34. f. 6.

68. *Squalidus*, der *Schmutzkäfer*. \*)

*Müller* l. c. S. 85. No. 68.

*Onomat. hist. nat.* P. 6. p. 942. der *schmutzige Kä-*

*fer*.

*Fabric.* S. E. p. 50. *Cetonia* 36. *hirta* B.

69. *Hirtellus*, das *Rauchkäferchen*.

*Müller* l. c. S. 85. No. 69.

*Füesslins Verz.* S. 3. No. 29. das *Bärlein*.

*Ononiat. hist. nat.* P. 6. p. 920. der *haarige Käfer*.

*Fabric.* S. E. p. 50. *Cetonia* 36. *hirta*. *Nigricans*,

*elytris pallido maculatis, thorace carinato*.

*Voet.* Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 10. No. 34. t.

4. f. 34. *Hirtidorsum*; le *Dos velu*; de *Ruirug*. (*Rauh-*

*rücken*.)

70. *Fastiatus*, die *Bandstreife*.

*Müller* l. c. S. 86. No. 70. t. 2. f. 8. der *bandirte*

*Blumenkäfer*.

*Füesslins Verz.* S. 3. No. 30. der *Libereyträger*.

*Neues hamb. Magaz.* 37. St. S. 37.

*Schriften* der Dronth. und Norw. Gesellsch. 4. B.

S. 276. t. 16. f. 2.

*Onomat. hist. nat.* P. 6. p. 914. der *Käfer mit den*

*Queerbändern auf den Fliigeldecken*.

*Poda*

\*) Nirgends abgebildet.

*Poda* Mus. graec. p. 20.

*Bomar.* Dict. P. 6. p. 541.

*Schaeff.* Icon. t. 1. f. 4.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 36. f. 2.

*Fabric.* S. E. p. 40. *Trichius* 1.

Niger, tomentoso-flavus, elytris *fasciis tribus nigris* abbreviatis.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 466. Niger, tomentoso-flavus, elytris *fasciatis*.

*Voet.* Scar. ord. 1. gen. 1. *Floricol.* p. 12. No. 43. t. 5. f. 43. *Rosaceus*; le *Scarabé des Roses*; de *Rosenkever*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 80. *Scar.* 16. La *livrée d'ancre*.

Niger, hirsutie flavus, elytris luteis, *fasciis tribus nigris* interruptis.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 299. No. 27. t. 10. f. 19. *Scarabé à bandes*.

*Scutellatus niger*, tomentoso-flavus, elytris *fasciis duabus transversis luteis* coadunatis.

71. *Indus*, der *indianische bleyfarbige braunpunktirte Käfer*.<sup>(\*)</sup>

*Müller* l. c. S. 86. No. 71. der *Indianer*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 921. der *indianische Käfer*.

*Fabric.* S. E. p. 40. *Trichius* 2.

72. *Brunneus*, der *punktirte Brustschild*.

*Müller* l. c. S. 86. No. 72. der *Europäer*.

*Schriften* der Dronth. und Norw. Gesellsch. 4. B. S. 267.

*Onomat.*

<sup>(\*)</sup>) Nirgends abgebildet.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 909. der braune Käfer.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 81. No. 22. *Brunnus. Major stercorario*, totus rufo-testaceus; elytra obsolete admodum striata, crura compressa, postica maxima.

*Gronov.* Gazoph. p. 147. No. 442.

*Fabric.* S. E. p. 36. *Melol.* 20. Glabra, testacea, elytris striatis, thorace vtrinque puncto notato.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 473.

*Voet.* Scar. ord. 1. gen. 1. *Arboric.* p. 15. No. 53. 54. t. 7. f. 53. 54. *Tenuicrusta rubeus*; mas et femina; le *Haneton rouge à étoiles minces*; de roode *Dunschaal*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 83. *Scar.* 22. Le *Scarabé fauve aux yeux noirs*. *Fulvus*, oculis nigris, thorace glabro.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 277. No. 23. t. 10. f. 17. *Scarabé fauve*.

*Scar.* (*fulvus*) *scutellatus* flavo-rufus, oculis nigris, thorace *punctis binis* nigris, pedibus longissimis.

73. *Capensis*, der rothbraune weisspunktirte Kap-käfer.

*Müller* l. c. S. 87. No. 73. der Afrikaner.

*Röfels* 2. B. Vorb. S. 28. t. B. f. 6. der rothbraune mit weisslichen Punkten besprengte und rothgelben Haaren bewachsene Käfer.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 909. der Käfer von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.

*Voet.* Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 4. No. II. t. 2. f. II. *Capensis*; l'éscarbot du Cap; de Kapenaar.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 33. f. 3.

*Fabric.* S. E. p. 46. *Cetonia* 14. *Hirta rufa*, albo-punctata.

74. *Eremita*, der Einsiedler.

*Müller* l. c. p. 87. No. 74. der Eremit.

Füesslins Verz. S. 3. No. 31. *Eremit.*

Börners Samml. I. Th. S. 462. der *faule Holzedenkäfer.*

Röfels 2. B. Erdk. I. Kl. t. 3. f. 6. der *Schusterkäfer;*  
*Fuchtenkäfer;* der *grosse schwarzbraune Käfer.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 913. der *Einsiedler.*

Schaeff. Icon. t. 26. f. 1.

Fabric. S. E. p. 45. *Cetonia* 12. *Aeneo-atra, thorace inaequali,* scutello fulco longitudinali.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 457. *Fusco-ater,* thorace scutelloque fusco longitudinali, elytris complanatis, rugoso punctatis.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 300. No. 28. t. 10. f. 22.  
*Scarabé de cuir noir.* \*)

Scar. (*coriarius*) scutellatus aeneo-niger nitidus,  
corpore planiusculo glabro, thorace suturis binis totidemque tuberculis.

### 75. *Fascicularis*, der *Bündelkäfer.*

Müller l. c. S. 87. No. 75.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 915. der *Büschelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 45. *Cetonia* 13.

Drury Ins. Tom. I. t. 33. f. 2.

Voet. Scar. ord. I. gen. I. Floric. p. 7. No. 17. t. 3.  
f. 17. *Setaceus viridis*, seu *Setiger viridis*; le *Brossard vert*; de *groene Borsteldrager.*

### 76. *Punctatus*, der *gestippelte Käfer.*

Müller l. c. S. 87. No. 76. der *Punktkäfer.*

Onomat.

\*) Geer sagt: es habe Linné seiner gar nicht gedacht: gleichwohl hat er eben das Röfelsche Citatum, das Linné bey diesem *Eremita* hat, angeführt, mithin hat solches der grosse Mann in der 12ten Ausgabe des L. bey *Eremita* übersehen.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 937. der *punktirte Käfer*.

*Fabric.* S. E. p. 33. *Melol.* 8.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 34. f. 5.

*Voet.* Scar. ord. I. gen. I. *Arboric.* p. 17. No. 65.  
t. 8. f. 65. *Nov-eboraceus luteus*; le *Haneton jaune de la nouvelle York*; de *geele Nieuwjorker*.

77. *Lanius*, der *Blutkäfer*.

*Müller* I. c. S. 88. No. 77. der *Amerikaner*.

*Röfels* 2. B. Vorb. S. 26. t. B. f. 3. der *dunkelrothe schwarzgefleckte und punktirte Käfer*.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 922. der *Blutkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 44. *Cetonia* 9. *Exscutellata lucida nigro-maculata*, *sterno antice cornuto*.

*Voet.* Scar. ord. I. gen. I. *Floric.* p. 7. No. 16. t. 2.  
f. 16. *Lanius*; le *Boucher*; de *Vleeshouwer*.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 33. f. 8. \*)

78. *Auratus*, der *Goldkäfer*.

*Müller* I. c. S. 88. No. 78.

*Füesslins* Verz. S. 3. No. 32. der *Gold-Kolbenkäfer*.

*Gleditsch.* Forstwiss. 2. Th. S. 979. No. 27. der *Goldkäfer*.

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 198. No. 16.

*Frisch* Inf. XII. Th. S. 25. No. 19. 3. Platte. t. I. f. 2.  
der *grüne Baum- oder sogenannte Goldkäfer*.

*Schrötters* Abhandl. I. Th. S. 14.

*Beckmanns* Anfangsgr. S. 91. No. C. der *Goldkäfer*.

*Röfels*

\*) Das *Drury'sche* Exemplar ist fallobraun, das *Röfels'sche* aber dunkelroth. Vielleicht eine Varietät des Geschlechts. Der *Voetsche Pullus maculosus* t. 5. f. 44. kommt mit dem *Drury'schen* fast gänzlich überein, wie er denn auch *Jamaika* zum Vaterlande hat. S. hinten in der dritten Klasse der neuen Käfer No. 65.

*Röjets* 2. B. Erdk. I. Kl. S. 9. t. 2. f. 6. 7. der bekannte grüne Goldkäfer.

*Schriften der Dronth. u. Norw. Ges.* 4. B. S. 265.

*Physikal. Belust.* 3. B. S. 1082. der Braachwurm; Scar. *chlorochryseus*.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 906. der Goldkäfer.

*Mouffet Theatr. Inf.* p. 158. *Smaragdus, viridulus*.

*Graeci Comicique* μελολόνθην;

*Altici* μελόνθην; χρυσάλλιδα;

*Rustici Lombardi* Gallerucam;

*Itali* Mariola;

*Poloni* Zielonakroroka;

*Angli* Greene-Chafer.

*Schwenkfeld Ther. Silef.* p. 555. Melolontha Arist.

*Quib.* χρυσίτρωσα, *Dialect.* Chrysocantharus; *Galeruca*; Scar. *viridis* Vl. Aldrov. Ein Krötenkäfer; Goldgrünkäfer.

*Bomar.* Dict. P. IV. p. 234. *Emeraudine*.

*Strömer Act. Ac. Suec.* Vol. 2. p. 47.

*Poda Mus.* graecens. p. 19.

*Wormii Mus.* p. 342. Scar. *chlorochryfos*.

*Merr. Pin.* 201. *Viridulus*; *Smaragdulus*.

*Schaeff. Icon.* t. 26. f. 2. 3. 7. t. 50. f. 8. 9.

*Müller's Faun.* Fridr. p. 2. No. 12.

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 54. No. 462.

Supra *viridis*, subtus aeneus, thorace postice vtrinque appendiculato. *Dan. Spansk-Flue.* *Norv. Guld-Basse*.

*Fabric.* S. E. p. 43. *Cetonia* 4. Aurata, segmento ab dominis primo lateribus unidentatis, elytris albo-maculatis.

*Voet.* Scar. ord. I. gen. I. *Floric.* p. 4. No. 2. t. I. f. 2. *Viridis germanus*; *Verd allemand*; *de greene Duitscher*.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 33. f. 1. \*)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 73. Scar. 5. L' *Emeraudine*.  
Viridi-aeneus, thoracis parte prona antice prominente.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 279. No. 25. t. II. f. 1.  
*Scarabé emeraudine*. (*Suec.* Guldschmed; *Holl.* Goude-torre.)

Scar. (*Smaragdus*) scutellatus viridi-aureus, elytris glabris, lineis transversis albidis, pectore porrecto, lateribus vnidentato.

### 79. *Variabilis*, der *Unbestand*.

*Müller* l. c. S. 89. No. 79.

*Füesslins* Verz. S. 3. No. 33.

*Gleditsch.* Forstwiss. I. Th. S. 657. der dunkle glatte, punktirte Käfer.

*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 219. k.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 946. der veränderliche Käfer.

*Röfels* 2. B. Erdk. I. Kl. t. 2. f. 8. *Mas.* f. 9. *fem.*

*Scop.* Entom. carn. No. 7. *funebris*. An *variabilis* L.?

*Poda* Mus. graecens. p. 20.

*Schaeff.* Icon. t. 198. f. 8.

*Geoffr.*

\*) Der *Drury'sche* scheint eine Varietät zu seyn, indem er den Goldglanz des Röfelschen nicht hat.

Die drey *Voetschen* Käfer t. I. f. 1. 2. 3. *Viridi-corniscus*; *Viridis germanus*; *Metallicus* f. *aeneus*, möchten wohl eben keine drey verschiedene Arten seyn.

*Linné* hat blos *Röfels* t. 2. f. 9. 8. angeführt; es muß aber heißen f. 1-7.

Ist nicht das Insekt, welches die *Hottentotten* verehren, S. *Catholicon* p. 174.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 79. Scar. 14. \*) Le drap mortuaire,*

*Nigro-coerulescens, maculis albis sparsis, ordine macularum abdominalium longitudinali.*

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 301. No. 29. t. 10. f. 22. Scarabé à points blancs.*

*Scar. (albo-punctatus) scutellatus niger, corpore depresso.*

*Millieri Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 471. Ater, elytris albo-punctatis.*

80. *Aeruginosus*, der *Kupferschmidt.*

*Müller l. c. S. 90. No. 80.*

*Onomat. hist. nat. P. 6. p. 904. der spangrüne Käfer.*

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 83. No. 26. Aeruginosus; maior stercorario, supra viridis; abdominis mucro longus inter crura media.*

*Drury Inf. Tom. I. t. 33. f. 4.*

81. *Nobilis*, der *edle Goldkäfer.*

*Müller l. c. S. 90. No. 81. der Edelmann.*

*Füesslin's Verz. S. 3. No. 34. der Edelkolbenkäfer.*

*Gleditsch Forstwisl. 2. Th. S. 979. der glatte grünliche Goldkäfer mit rauhen Flügeldecken, und tief gestreiftem Bruststück.*

*Rösel's 2. B. Erdk. 1. Kl. S. 19. t. 3. f. 1-5. die zweyte Art der Goldkäfer.*

*Onomat.*

\*) Fabricius hat diesen Variabilis gar nicht, dagegen das Geoffr. Citatum bey Sticticus, No. 54. der Herr von Geer aber bey Variabilis angeführt, woraus ich schließe, dass des Linn. *Sticticus* und *Variabilis* einerley Art sey. Rösel's t. 2. f. 3. ist das Männchen, wovon Linné sagt: *Quintuplo minor femina, variat colore aureo et rubro.*

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 934. der *Edelkäfer*.

*Schaeff.* Icon. t. 66. f. 5.

*Scopol.* Ann. 5. hist. nat. p. 85. No. 28. \*)

*Fabric.* S. E. p. 43. *Cetonia* 5. *Aurata*, abdomine postice albo-punctato, elytris rugosis.

*Müller* Faun. Fridr. p. 2. No. 13.

— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 463. *Viridi-aeneus*, elytris anoque albo-punctatis.

*Geoffr.* Ins. Tom. I. p. 73. *Scar.* 6. le *Verdet*. *Viridis nitens*, thorace infra aequali, non prominente.

*de Geer* Ins. Tom. IV. p. 297. No. 26. *Scarabé verdet*.

*Scar.* (*viridulus*) scutellatus aureo-viridis nitidus, elytris rugosis, abdomine postice albedine maculato, pectore mutico.

82. *Aeneus*, der blaulichte Goldkäfer. \*\*)

*Müller* l. c. S. 90. No. 82. der *Fremdling*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 903. der *kupferartige Käfer*.

83. *Quisquilius*, der *Kehrichkäfer*. \*\*\*)

*Müller* l. c. S. 90. No. 83.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 938. der *kleinste Käfer*.

*Scop.* Entom. carn. No. 29. *Scar. minimus*.

*Müller* Faun. Fridr. p. 2. No. 11.

*Fabric.* S. E. p. 20. *Scar.* 74.

*Scutellatus* muticus ater, elytris lividis.

*de Geer* Ins. Tom. IV. p. 271. No. 18. *Scarabé des immondices*.

## D 2 Exscu-

\*) *Scopol* berichtet, dass man diese schöne Käfer in den *Ameisenhaufen* gefunden habe, wo sie von den Ameisen begraben, und gleichsam eingewickelt gewesen wären.

\*\*) Nirgends abgebildet.      \*\*\*) Nirgends abgebildet.

*Exscutellatus niger nitidus, elytris striatis livido-te-staceis.*

84. *Quadrivittatus*, der *Vierfleck.* \*)

*Müller* l. c. S. 91. No. 84.

*Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 937.* der Käfer mit vier rothen Flecken auf den Flügeldecken.

*Fabric.* S. E. p. 19. *Scar.* 70.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 55. No. 474.

85. *Plagiatus*, der *Purpurfleck.* \*\*)

*Müller* l. c. S. 91. No. 85.

*Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 936.* der Käfer mit einem Purpurfleck auf dem Rücken.

*Fabric.* S. E. p. 19. *Scar.* 71.

86. *Rufipes*, der *Rothfuß.*

*Müller* l. c. S. 91. No. 86.

*Füesslins Verz.* S. 3. No. 36. der Rothfuß.

*Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 938.* der Rothfuß.

*Fabric.* S. E. p. 19. *Scar.* 68. *Scutellatus muticus ater, thorace glabro nitido, elytris striatis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 83. *Scar.* 21. le *Scarabe' jayet.*

*Totus niger, capite inermi.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 263. No. 7. t. 10. f. 6.

*Scarabé à tête large.*

*Scar. (capitatus) scutellatus nigro-fuscus, corpore oblongo, elytris striatis capite magno laevi.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 55. No. 476. *Scar. gagates niger, elytris striatis punctatisque.* \*\*\*)

87. Ce-

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

\*\*\*) Diesen hat der Herr Staatsrath für einen neuen ausgegeben; von *Geer* hat aber bey dem Linnéischen *Rufipes* eben das Citarum des *Geoffr.* *Scar. gagates* angeführt, das ich hier finde.

87. *Ceratoniae*, der ägyptische Johannisbrodkäfer. \*)

Müller l. c. S. 91. No. 87.

Ouomat. hist. nat. P. 6. p. 911. der Johannisbrodkäfer.

Folgende Linnéische Käfer sind meines Wissens noch nicht abgebildet.

### II. Klasse.

1. No. 23. *Granarius*.
2. No. 27. *Bison*.
3. No. 30. *Maurus*.
4. No. 33. *Haemorrhoidalis*.
5. No. 35. *Marianus*.

### III. Klasse.

1. No. 36. *Gigas*.
2. No. 37. *Scaber*.
3. No. 38. *Laticollis*.
4. No. 44. *Calcaratus*.
5. No. 46. *Ovatus*.
6. No. 55. *Sepicola*.
7. No. 65. *Aulicus*.
8. No. 66. *Longipes*.
9. No. 68. *Squalidus*.
10. No. 71. *Indus*.
11. No. 82. *Aeneus*.
12. No. 83. *Quisquilius*.
13. No. 84. *Quadrivittatus*.
14. No. 85. *Plagiatus*.
15. No. 87. *Ceratonius*.

D 3

I. Neue

\*) Nicht abgebildet.

## I. Neue Käferarten mit gehörntem Bruststück.

1. *Dichotomus*, der braunrothe indianische Käfer mit gespaltenen Hörnern. \*)

*Linn.* Mantiss. p. 529. *Thorace cornu bidentato, capite cornu dichotomo.*

*Aubent.* Miscell. t. 40. f. 5.

*Fabric.* S. E. p. 5. *Scar.* 6.

*Voet.* Scar. ord. I. gen. I. *Terric.* p. 26. No. 107. t. 14. f. 107. *Cervus volans*; le Cerf-volant; het vliegend Hart.

Müllers Supplementsband S. 213. das Doppelhorn.

Sulzers Gesch. S. 16. t. I. f. I. der Zergliederer.

2. *Claviger*, der indianische Keulenträger.

*Linn.* Mantiss. p. 529. *Thorace cornu clavato, capite cornu subulato.*

*Aubent.* Miscell. I. t. 40. f. I.

*Voet.* Scar. ord. I. gen. I. *Terric.* p. 26. No. 108. t. 14. f. 108. *Subgrundator*; le Porte-Auvent; de Luifeldrager.

Müllers Suppl. B. S. 214. der Schlüsselträger.

3. *Nimrod*, der purpur schwärzliche Nimrod.

*Voet.* Scar. ord. I. gen. I. *Terric.* p. 24. No. 101. t. 13. f. 101. *Nimrod.*

*Thorace admodum prominente cornuto bifido, capitis cornu ex dimidia parte dentato, et bifido.*

4. *Furtiger*, der Gabelträger.

*Voet.* Scar. *Terric.* p. 24. No. 102. t. 13. f. 102. *Furciger*; le Porte-fourche; de Vorkendrager.

*Spadicei*

\*) Vielleicht eine bloße Spielart von *Scar.* *Gideon* L. No. 2.

Spadicei coloris; thoracis capitisque cornu furcato.

5. *Elephas*, der Guineische fliegende Elephant.

Voet. Scar. Terric. p. 25. No. 103. t. 13. f. 103. Mas. f. 104 femina; le Trompette; de Trompetter.

Olear. Mus. t. 16. f. 2.

Fabric. S. E. p. 7. Scar. 16. Scutellatus, villosum, thorace gibbo bicorni, capitis cornu videntato, apice que bifido.

6. *Vectarius*, die Surinamische Wagenwinde.

Voet. Scar. Terric. p. 25. No. 105. t. 14. f. 105. le Cric; de Dommekracht.

Thorace multum extante, duabus Epiphysibus crassioribus; capitis cornu denso incurvo retuso; tibiis setosis.

7. *Javanus*, der Javanische Hornkäfer.

Voet. Scar. Terric. p. 25. No. 106. t. 14. f. 106. Thorace duabus latis obtusis Epiphysibus, super caput prominentibus; capite ingenti cornu acuto et valde adunco.

8. *Taurus volans*, der ostindianische fliegende Stier.

Voet. Scar. Terric. p. 26. No. 109. t. 15. f. 109.

Insignis magnitudinis, totus niger, nitidus; capitis ingens cornu aduncum; thoracis duo cornua taurinis haud absimilia.

9. *Taurus volans toruscans*, der kupferfarbige ostindianische fliegende Stier.

Voet. l. c. t. 15. f. 110. le Taureau volant et luisant; de blinkende vliegende Stier.

Priori simillimus; adeo resplendens, ut colorem referat aeris rutilantis.

10. *Repandirostrum*, der *ostindianische Krummschnabel*.

*Voet. Scar. Terric.* p. 27. No. 113. t. 17. f. 113. *Le Bec crochu*; de *Krommeus*.

Thorace duobus, vtrinque brevibus, et in medio uno longiori cornu obtuso, capitis rostro admodum repando; antennis insolitis, Cervorum volantium (Schröter) simillimis.

11. *Goliath*, der *amerikanische gelbe Bär*.

*Voet. Scar. Terric.* p. 27. No. 114. t. 17. f. 114.

Totus hirsutus; thorace duabus cuspidibus acutis, capitis rostro bidente.

12. *Trifurca*, die *ostindianische Dreygabel*. \*)

*Voet. Scar. Terric.* p. 27. No. 115. t. 18. f. 115. *Le Trident*; de *Driegaffel*.

Thorace trifurcato, capite non cornuto, tenuissimo.

13. *Tridens hispidus*, die *gelbhaariche ostindianische Dreygabel*.

*Voet. Scar. Terric.* p. 28. No. 116. t. 18. f. 116. *Le Trident velu*; de *Ruige Driegaffel*.

Totus spadiceus, subtus *hispidus*. Thorace pone caput cornu incurvo, vtrinque duobus densioribus et obtusioribus; capite plano et non cornuto.

14. *Oromedon*, der *Oromedon*.

*Fabric.*

\*) V. No. 25.

*Fabric.* S. E. p. 4. *Scar.* 3. *Scutellatus, thoracis cornu brevi emarginato, capitis recurvo bifido.*

*Aubent.* miscell. I. t. 40. f. 4.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 36. f. 5.

15. *Aegaeon*, das rothe indianische Kurzhorn.

*Fabric.* S. E. p. 4. *Scar.* 4. *Scutellatus rufus; thoracis cornu brevi incurvo; subtus barbato, capitis recurvo subulato.*

*Drury* Inf. Tom. II. t. 30. f. 5.

16. *Chorinaeus*, das Brasilianische Langhorn.

*Fabric.* S. E. p. 5. *Scar.* 5. *Scutellatus, thoracis cornu incurvo, basi crassissima, apice bifido, capitis longiori recurvo bifido.*

17. *Pan*, der indianische Pan. \*)

*Fabric.* S. E. p. 5. *Scar.* 8. *Scutellatus, thoracis cornu incurvo, basi crassissima, apice bifido, capitis recurvo vndentato.*

18. *Fafon*, der chinesische Fafon. \*\*)

*Swammerd.* B. der N. t. 30. f. 5. vierte Sorte des Nashorns.

*Fabric.* S. E. p. 6. *Scar.* 10. *Scutellatus, thoracis cornu crassissimo, apice emarginato, capitis vndentato bifido.*

19. *Validus'*, der Brasilianische Held.

D 5

*Fabric.*

\*) Dem vorigen sehr ähnlich, und vielleicht nur eine Varietät desselben.

\*\*) Dem *Bilobo* L. No. 12. sehr ähnlich, nur ist bey diesem das Kopfhorn nicht gespalten.

*Fabric. S. E. p. 6. Scar. II. Scutellatus, thorace ante reto, cornu conico brevissimo, capite bituberculato.*

20. *Truncatus*, der *neuseeländische Stumpfkopf*.

*Fabric. S. E. p. 6. Scar. 12. Scutellatus, thorace retuso, cornu brevi truncato, capite mutico.*

Mus. Dom. *Banks.*

21. *Eurytus*, das *amerikanische Flachhorn*.

*Fabric. S. E. p. 7. Scar. 13. Scutellatus, thorace ante retuso, cornu brevi incumbente emarginato, capite mutico.*

22. *Boas*, die *afrikanische Punktlinie*.

*Fabric. S. E. p. 8. Scar. 17. Scutellatus, thorace retuso excavato bidentato, capitatis cornu recurvo simplici. Elytra picea linea punctata vnicula ad futuram.*

23. *Centaurus*, der *ostindianische Zentaur*.

*Fabric. S. E. p. 8. Scar. 19. Scutellatus niger, thorace tricorni lateralibus brevissimis subulatis, capitatis recurvo vnidentato.*

24. *Geryon*, der *indianische Hohlschild*.

*Fabric. S. E. p. 9. Scar. 21. Scutellatus, thorace excavato tricorni, lateralibus compressis vnidentatis, capitatis recurvo simplici.*

*Drury Inf. Tom. II. t. 30. f. 6.*

25. *Antaeus*, die *amerikanische Dreygabel*. \*)

*Fabric.*

\*) Viel ähnliches mit Voets *Trifurca*, No. 12.

*Fabric.* S. E. p. 9. *Scar.* 23. *Scutellatus, thorate tricorni,* intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris laevissimis.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 34. f. 3. 4.

26. *Syphax*, der amerikanische Punktflügel.

*Fabric.* S. E. p. 9. *Scar.* 24. *Scutellatus, thorace tricorni,* intermedio longiori simplici, capite mutico, *elytris punctatis.*

Müf. Dom. *Banks.*

27. *Maimon*, das amerikanische Gleichhorn.

*Fabric.* S. E. p. 10. *Scar.* 25. *Scutellatus, thorace tricorni,* cornubus aequalibus brevissimis, elytris laevibus.

Müf. Dom. *Banks.*

28. *Titanus*, der Drury'sche Simson. \*)

*Drury* Inf. Tom. I. t. 36. f. 3. 4. *Scar. Simson.*

*Sloan.* Iam. II. p. 205. t. 237. f. 4. 5. *Scar. major niger tricornis.*

*Fabric.* S. E. p. 10. *Scar.* 27. *Scutellatus, thorace tricorni,* intermedio longiori, apice bifido, lateralibus subarcuatis acutis, capite mutico.

29. *Aenobarbus*, der amerikanische Rothbart.

*Fabric.* S. E. p. 10. *Scar.* 28. *Scutellatus, thorace tricorni,* medio longiori emarginato, lateralibus obtusis, capite bituberculato.

30. *Sylvanus*, der brasiliianische Silvan.

*Fabric.*

\*) S. No. 4. *Simson* L.

*Fabric. S. E. p. II. Scar. 30. Scutellatus, thorace retuso, prominentia triplici, intermedia obsoleta, capitis cornū recurvo.*

Mus. Dom. Banks.

31. *Lazarus*, der *neuyorkische Lazarus*.

*Fabric. S. E. p. II. Scar. 31. Scutellatus, thorace trituberculato, capitis cornū brevi emarginato.*

32. *Mobilicornis*, das *englische Wackelhorn*.

*Fabric. S. E. p. II. Scar. 32. Scutellatus, thorace quadridentato, capitis cornu recurvo mobili.*

33. *Jacchus*, die *kapensische Randalinie*.

*Fabric. S. E. p. 20. Scar. 79. Exscutellatus, thorace prominente bilobo, capitis cornū recurvo simplici. Linneolae duae elevatae vtrinque ad marginem.*

*Femina* capitis cornū brevissimo truncato, thoracisque tuberculo antico transverso elevato.

34. *Oedipus*, das *kapensische Flachhorn*.

*Fabric. S. E. p. 21. Scar. 80. Exscutellatus, thorace cornū plano, subtus dentato, capitis truncato bidentato.*

35. *Pithecius*, die *indianische Schusterale*.

*Fabric. S. E. p. 21. Scar. 81. Exscutellatus, thorace bicorni, cornubus brevissimis, capitis cornu erecto subulato.*

36. *Rosalius*, das *amerikanische Sägehorn*.

*Fabric. S. E. p. 21. Scar. 82. Exscutellatus, thorace antice bicorni, postice elevato, tricorni, capitis cornu compresso ferrato.*

37. Si-

37. *Sileneus*, der amerikanische Silen.

Fabric. S. E. p. 21. Scar. 83. Exscutellatus, thorace tridendato, capitibus cornu recurvo, elytris striatis.

Mus. Dom. Banks.

38. *Midas*, der amerikanische Grubenschild.

Fabric. S. E. p. 21. Scar. 84. Exscutellatus, thorace tricorni, clypeo sinuato bicorni.

Mus. Dom. Banks.

39. *Hannadryas*, der kapensische Grubenschild.

Fabric. S. E. p. 22. Scar. 85. Exscutellatus, thorace tricorni, intermedio plano, acuto bidentato, clypeo reflexo bicorni.

Mus. Dom. Banks.

40. *Rhadamistus*, der kleine Tranquebarische breitgrubichte Hornkäfer.

Fabric. S. E. p. 22. Scar. 87. Exscutellatus, thorace late foveolato, antice cornu recurvo, capite inermi, elytris rufis, futura punctisque duobus nigris.

41. *Belzebul*, der amerikanische Belzebul.

Fabric. S. E. p. 23. Scar. 88. Exscutellatus, thorace prominentia triplici, capite tricorni intermedio majori.

42. *Faunus*, der Kayennische Faun.

Fabric. S. E. p. 23. Scar. 89. Exscutellatus, thorace quadricorni, intermediis brevissimis, capitibus cornu recurvo.

43. *Coryphaeus*, der kapensische General.

Fabric.

*Fabric. S. E. App. p. 817. Scutellatus, thorace bicorni, corpore ferrugineo.*

44. *Copris niger maximus*, der größte schwarze Mistkäfer.

*Voet. Scar. Terric. p. 38. No. 3. t. 23. f. 3.  
Thorace bicorni, capitis cornu in altum sublato.*

45. *Cylindrus*, der ostindianische Walzenküfer.

*Voet. Scar. Terric. p. 31. No. 131. t. 20. f. 131. le Cylindre; de Cylinder.*

In Thorace vtrinque duae acutae Apophyses; capitis cornu minutulum.

46. *Tuberosum*, der Buckelküfer.

*Voet. Scar. Terric. p. 31. No. 132. t. 20. f. 132. le Boissu; de Knobbelrug.*

Thoracis ingens crassumque tuber, capitis cornu minutulo.

47. *Algerinus*, der Algierer.

*Voet. Scar. Terric. p. 31. No. 133. t. 20. f. 133. l'Algérien; de Algerijn.*

In Thorace millia occurunt minutulae claviculae.

48. *Strigocephalus*, der Eulenkopf.

*Drury Inf. Tom. I. t. 35. f. 1. Totus griseo-niger; profunde sulcatus, subtus albo-lanuginosus; thorace antice trituberculato, capite cornutulo brevi recurvo, versus dorsum reclinato, vt faciem Strigis referat.*

Die folgenden haben alle etwas besonderes an dem *Brustschild und Kopf* zugleich, und könnten

*Thorace et capite tuberculato, spinoso, cornuto,*  
heissen.

49. *Fissidorsum*, der *indianische Rückenspalt*.

*Voet. Scar. Terric.* p. 30. No. 126. t. 19. f. 126. *le Dos fendu*; *de Spleetrug*.

*Thorace admodum sublimi, concavitatem in medio, piri instar, forinante, cuius cuspis retro inclinatur; capite in rostrum acuminatum desinente.*

50. *Ereditidorsum*, der *ostindianische Hochrücken*.

*Voet. Scar. Terric.* p. 30. No. 127. t. 19. f. 127. *le Dos roide*; *de Styrlrug*.

*Dorso pone caput recte in altum extenso, in cuius margine quatuor prostant minutissimi aculei.*

51. *Aloëus*, der *Voetische Surinamische Aloëus*.

*Voet. Scar. Terric.* p. 30. No. 128. t. 19. f. 128. In anteriore thoracis parte *obtusa spina*; in capitinis parte postica duo *parva tubercula*.

52. *Muhamedanus*, der *Muhamedaner*.

*Voet. Scar. Terric.* p. 30. No. 129. t. 19. f. 129. *Thorace depresso, in acutum et sublimem marginem exente.*

53. *Scrobifer*, der *westindische Grubenträger*.

*Voet. Scar. Terric.* p. 30. No. 130. t. 19. f. 130. *Le Porte-fossette*; *de Dukdrager*.

*Pone caput thoraci inserta est minuta et acuta Apophysis.*

54. *Gibbosus*, der *Pensylvanische Buckelkäfer*.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 322. No. 15. t. 19. f. 7. *Scarabé boissu*.

Scutellatus fusco-caestaneus, corpore oblongo, subtus villoso rufo, thorace tuberculato, elytris striato punctatis.

55. *Armiger*, der *Krainsche Waffenträger*.

Stop. Ann. 5. hist. nat. p. 78. No. 16.

Thorax spinas quatuor, caput e medio spinam se longiorem educit.

56. *Violaceus*, der *Russische violette Käfer*.

Lepechins Tageb. 2; Th. S. 208.

Scar. parvus, totus violaceus, maxillis prominentibus, fronte declivi, thorace 6. spinoso.

57. *Dubius*, *Scopolis Kolbenkäfer*.

Scop. Entomol. carn. No. 4. Thorax cum elytris striatis glabris punctatus. Corpus subtus faltem atrocoeruleum.

Scar. bilobo similis, sed duplo minor. Thorax tuberculis duobus approximatis; cornu capitidis individualium.

Füesslins Verz. S. 2. No. 23.

Sulzers Gesch. S. 18. t. 1. f. II. \*)

II. Neue Käferarten mit ungehörnitem Bruststück und gehörnitem Kopf.

I. *Goliathus*, der *indianische Prinz*.

Müllers

\*) Sulzer rechnet zwar diesen Käfer unter die Muticos; nach der Beschreibung aber hat er sowohl am Brustsilde als am Kopfe Höcker und ein Horn.

Müllers Suppl. B. S. 216. No. 89. der *Goliathskäfer*.

Sulzers Gesch. S. 16. t. 1. f. 2. *Goliath*.

Linn. Mantiss. p. 530. *Scutellatus*, thorace inermi,  
*capite rostro bifurco*.

Drury Ins. Tom. I. t. 31.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. p. 34. No. 151. t. 22. f. 151.  
*Cacicus ingens*; le grand *Cacique*; de groode *Cacique*. \*)

Fabric. S. E. p. 13. Scar. 41. *Scutellatus*, thorace  
inerimi, clypeo bifurco.

2. *Rhinoceros minor*, das kleine *indianische Nashorn*.

Voet. Scar. Terric. p. 28. No. 119. t. 18. f. 119. Le petit *Rhinoceros*; de kleine *Nashoorn*.

Violaceo - ruber, margine thoracis elytrorumque  
nigro, capitis cornu peracute.

3. *Rhinoceros occidentalis*, das schwarze *westindische Nashorn*.

Voet. Scar. Terric. p. 29. No. 123. t. 19. f. 123. Le *Rhinoceros noir*; de *Renoster*.

### *Thorax*

\*) Voet hat ihn in der Ordnung der *Erdkäfer* folgen lassen, erinnert aber selbst, dass er unter die *Blumenkäfer* gehöre; doch konnte er ihm, da diese schon abgestochen waren, keinen andern Platz geben. Er nennt ihn den großen *Kaziker*, weil die Indianer ihre Prinzen so zu nennen pflegen. Bey seinem etwas kleineren Exemplar sind die Flügeldecken perlmuttfarbig; bey dem grössern Drury'schen aber, davon das Sulzer'sche eine Kopie ist, dunkel rothbraun, aus dem mitternächtlichen Afrika, das Voetsche aus Amerika.

*Thorace eleganter variegato; capitis cornu breviusculum, paullulum resupinatum in tergum.*

4. *Spinifer hispidus minor*, der öftindianische kleine Dornträger.

*Voet. Scar. Terric. p. 32. No. 138, t. 20. f. 138. Le petit porte-épine velu; de ruige kleine Doorndrager.*

*In capite spinula minuta. Totus livido-niger; elytra leviter costata.*

5. *Spinipes Noveboracensis*, der Neuyorkische Dornträger.

*Drury Inf. Tom. I. t. 35. f. 6. Totus niger, thorace marginato elevato, tuberofo, capite lato obtuso, cornutulo recurvo; cruribus admodum spinosis.*

6. *Pensylvanicus*, der Geerische Pensylvanier.

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 308. No. 5. t. 18. f. 12. Scarabé de Pensylvanie.*

*Scutellatus, capite nigro tuberculo unico, thorace elytrisque laevibus olivaceis, maculis punctisque nigris.*

7. *Ebenus*, der surinanische Ebenholzfarbige Käfer:

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 317. No. 9. t. 19. f. 1. Scarabé d'ebene.*

*Scutellatus, ater, oblongus, convexus, laevis, thorace antice cavitate impresso, capite bituberculato.*

8. *Oculatus, Skropolis Rothauge.*

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 81. No. 21.*

*Niger; caput antice bidentatum, tuberculo medio parvo. Oculi rufi.*

Gronov.

*Gronov.* Gazoph. p. 143. No. 422. t. 15. f. 9. 10.  
Ater, opacus, thorace mutico, elytris rugosis, capite  
clypeato, emarginato, cornu minimo.

9. *Barbarossa*, der neu-holländische Rothbart.

*Fabric.* S. E. p. 12. *Scar.* 35. Scutellatus thorace in-  
erimi, antice scabro, capitinis cornu recurvo brevi.

Mus. Dom. Banks.

10. *Satyrus*, der nordlich amerikanische Satyr.

*Fabric.* S. E. p. 12. *Scar.* 36. Scutellatus, thorace  
inerimi, antice truncato, capitinis cornu recurvo.

Major *Nasicorni*.

Mus. Dom. Banks.

11. *Jamaicensis*, das Jamaische Nashorn.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 34. f. 1. 2. \*)

*Fabric.* S. E. p. 13. *Scar.* 37. Scutellatus, thorace  
inerimi, antice retuso, capitinis cornu recurvo, elytris  
substriatis.

12. *Silenus*, der pechschwarze Silen.

*Fabric.* S. E. p. 13. *Scar.* 38.

Scutellatus, thorace inerimi, antice excavato, capitinis  
cornu recurvo, elytris laevissimis.

13. *Syrichtus*, der amerikanische Rundschild.

*Fabric.* S. E. p. 13. *Scar.* 39. Scutellatus, thorace  
inerimi rotundato, capitinis cornu recurvo.

14. *Hircus*, der Tranquebarische Bock.

E 2

*Fabric.*

\*) S. meine Anmerk. bey *Carolinus Linn.* No. 16.

*Fabric. S. E. p. 13. Scar. 42. Scutellatus, thorace inermi scabro, capite linea transversa carinata, clypeo bidentato.*

15. *Farctus*, der *Pensylvanische Wurstkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 14. Scar. 43. Scutellatus brunneus, capite subbicorni, elytris punctato-striatis, apice nigris.*

*Capitis clypeus ferrugineus quasi e squamis tribus imbricatis compositus.*

16. *Piceus*, der *indianische Pechkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 14. Scar. 44. Scutellatus, piceus, thoraci inermi glabro, capite subbicorni, elytris striatis.*

17. *Sphinx*, der *afrikanische Sphinx*.

*Fabric. S. E. p. 14. Scar. 45. Scutellatus, thorace inermi quadripunctato, capite tuberculato, tarsis anticus nullis.*

18. *Terrestris*, der *englische kleine Erdwühler*.

*Fabric. S. E. p. 15. Scar. 48. Scutellatus, thorace inermi, capite tuberculis tribus aequalibus, elytris substriatis.*

19. *Testaceus*, der *muschelbraune englische Käfer*.

*Fabric. S. E. p. 15. Scar. 50. Scutellatus, testaceus, capite bituberculato, elytris punctato-striatis.*

20. *Bicolor*, der *deutsche Rothafter*.

*Fabric. S. E. p. 15. Scar. 51. Scutellatus, thorace subinermi, capite tuberculo unico, elytris nigris, ab domine rufo.*

21. *Sor-*

21. *Sordidus*, der *englische graue Schmutzkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 16. *Scar.* 55. *Exscutellatus, capite tuberculato, thorace nigro, margine pallido, puncto nigro, elytris griseis.*

22. *Bonafus*, der *Tranquebarische dreygehörnte Kopf*.

*Fabric.* S. E. p. 23. *Scar.* 90. *Exscutellatus, thorace prominentia dupli, capite tricorni, lateralibus majoribus arcuatis.*

23. *Sagittarius*, der *kopenfische Pfeilträger*.

*Fabric.* S. E. p. 24. *Scar.* 92. *Exscutellatus, thorace antice mucronato, capitis cornu solitario erecto.*

24. *Bucephalus*, der *indianische Ochsenkopf*.

*Fabric.* S. E. p. 24. *Scar.* 93. *Exscutellatus, thorace retuso, quadridentato, capitis clypeo angulato unicorui.*

25. *Sphinx*, der *amerikanische Dornfuß*.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 35. f. 8. *Scar. spinipes.*

*Fabric.* S. E. p. 25. *Scar.* 98. *Exscutellatus, thorace inerini, punctis quatuor impressis, capitis cornu recurvo bidentato.*

26. *Sulcator*, der *Kayennische Höckerkopf*.

*Fabric.* S. E. p. 27. *Scar.* 106. *Exscutellatus, ater, capitis tuberculo unico, elytris striatis.*

27. *4-pustulatus*, die *neuholländische Vierblätter*.

*Fabric.* S. E. p. 27. *Scar.* 107. *Exscutellatus, ater, thorace inerini, capite bituberculato, elytris maculis duabus rubris.*

28. *Verticicornis*, das englische Scheitelhorn.

*Fabric.* S. E. p. 27. *Scar.* 105. *Exscutellatus, thorace inermi griseo nigro-punctato, capitinis cornu erecto brevissimo.*

29. *Cristatus*, der ägyptische Buschschild.

*Fabric.* S. E. p. 27. *Scar.* 108. *Exscutellatus, niger, thorace inermi crenato, clypeo tuberculato quadridentato.*

30. *Hylax*, der afrikanische Hylax.

*Fabric.* S. E. App. p. 817. *Scutellatus, thorace inermi, capitinis cornu emarginato, tibiis posticis brevissimis, apice spinosis.*

31. *Bidens*, der asiatische Zweyzack.

*Pallas Reis. durch Russl. I. Th. Anh. No. 24. Ausz.*  
*I. Th. Anh. S. 9.*

*Magnitudo stercorarii.* Thorax inermis punctulatus; mas galea antice bidentata, verticis centro gemino subcornuto.

32. *Humerosus*, der asiatische Schulterkäfer.

*Pallas Reisen I. Th. Anh. No. 25. Ausz. Anh. S. 10.*

*Magnitudo Lunaris, coprideus, Thorax inermis. Galea lineis eminentibus, in qua centrum cornutum.*

*Müllers Suppl. B. S. 215. der Schulterkäfer.*

33. *Ater*, der Geerische schwarze Käfer.

*de Geer Ins. Tom. IV. p. 270. No. 16.*

*Scutellatus niger totus, corpore abbreviato, capite tuberculis tribus, elytris laeviter striatis.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 450. Niger,  
nitidus, capite tuberculo triplici, elytris striato-punctatis,  
pedibusque piceis.

34. *Subarator*, der *Pflüger*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 455. Niger,  
thorace subconvexo, capite tuberculis tribus, elytris  
striatis punctatisque.

35. *Distinctus*, der *schwarze Punktfleck*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 456. Niger,  
capite tuberculo triplici, elytris striatis lividis, nigro-  
maculatis.

III. *Ungehörnte Käfer*.

1. *Tetradactylus*, der *Jamaische Vierfinger*.

*Linn.* Mantiss. p. 530. *Scutellatus niger*, muticus,  
*pedibus triunguiculatis*, pollice fixo.

*Drury* Ins. Tom. I. t. 33. f. 7.

*Sloane* Jam. Tom. II. t. 237. f. 2. *Scar. major niger*.

*Fabric.* S. E. p. 49. *Cetonia* 29.

Atra, scutello elytris diuidio breviore, pedibus tri-  
unguiculatis.

*Müllers Suppl.* B. S. 216. der vierfingrige Kä-  
fer.

2. *Scorticorium*, der *Chagrinrücken*.

*Voet.* Scar. Territ. p. 32. No. 136. t. 20. f. 136. Le  
*Dos chagriné*; de Segrynnrug.

Totus obscure spadiceus, fulgore quodam livido.  
Scutellum dorsuale instar *corii crudii* sive *scorti*.

3. *Digitalia*, der westindische Fingerhuth.

*Voet. Scar. Terric. p. 32. No. 137. t. 20. f. 137. Le Dé à coudre; de Vingerhoed.*

*Coprism obscure spadiceus. Scutellum dorsuale multis Scrobulis, in formam Digitalium interstinctum.*

4. *Chamaeleon*, der westindische Chämäleon.

*Voet. Scar. Terric. p. 32. No. 139. t. 21. f. 139. Le Chamaeleon.*

Tantopere inter se differunt colore, vt alii vulgarem viridem; alii, vti noster, igneum fulgorem referant; antennis et cruribus splendore viridi-nigro.

5. *Vagabundus ruber*, der holländische rothe Husar.

*Voet. Scar. Terric. p. 32. No. 141. t. 21. f. 141. Le Vagabond rouge; de rode Dwaaler.*

Elytra badio colore et tenuiter costata, cetera nigra; in obsoleta vel recenti fino bovino aut equino.

6. *Errabundus niger*, der holländische schwarze Husar.

*Voet. Scar. Terric. p. 33. No. 142. t. 21. f. 142. Le vagabond noir; de zwarte Dwaaler.*

Totus nigro-splendens; dorso laevigato, elytris tenuiter costatis.

7. *Errabundus lividus*, der gelbe Husar.

*Voet. Scar. Terric. p. 33. No. 143. t. 21. f. 143. Le Vagabond pourpré; de Paarsche Dwaaler.*

Elytra sordide livida; ceterum ex nigro splendens.

8. *Errabundus interpunctatus*, der holländische punktirte Husar.

*Voet.*

*Voet. Scar. Terric. p. 33. No. 144. t. 21. f. 144.* Le *Vagabond pointillé*; de gespikkeld Dwaaler.

*Elytra cinerea tenuiter costata, punctis nigris interstincta.*

9. *Errabundus canus*, der graue Husar.

*Voet. Scar. Terric. p. 33. No. 145. t. 21. f. 145.* Le *Vagabond gris*; de gryze Dwaaler.

*Capite et dorso scutello nigro-coruscans; elytris cruribusque sordide luteus.*

10. *Errabundus matulosus*, der bunte Husar.

*Voet. Scar. Terric. p. 33. No. 146. t. 21. f. 146.* Le *Vagabond tacheté*; de gevlekte Dwaaler.

*Capite dorsoque nigro-coruscis, elytris non adeo sordide-luteis; postica elytrorum parte fusci coloris.*

11. *Nasospurcus*, die Drecknase.

*Voet. Scar. Terric. p. 33. No. 147. t. 21. f. 147.* Le *Museau sale*; de Vuilneus.

*Capite, dorso, elytrisque durissimis, prioribus nigro-coruscis, posterioribus fulvis; in fimo equino.*

12. *Nanus*, der Zwerp.

*Voet. Scar. Terric. p. 33. No. 148. t. 21. f. 148.* Le *Nain*; het Dwerkje.

*Totus niger; Scarabaeorum minutissimus.*

13. *Vaginosus*, die Spitzscheide.

*Voet. Scar. Terric. p. 23. No. 149. t. 21. f. 149.* Le *Letui pointu*; de Spitskoker.

*Capite tergoque ex nigro splendente; crura obscure - cinerea; elytra in fine insigniter acuminata, in vtroque bina puncta.*

14. *Fulvus*, der braunrothe Mistkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 90. *Copris 6. Le Bousier fauve.*

*Fulvus, capite aeneo, thoracis vtrinque cavitate laterali fusca.*

15. *Geoffroae*, Geoffrois-Kolbenkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 91. *Copris 8. Le Bousier à couture.*

*Niger, capite clypeato, elytris margine exteriore sinuatis.*

Füesslins Verz. S. 2. No. 14.

Sulzers Gesch. S. 18. t. 1. f. 7. *Geoffrois Käfer.*

16. *Perlatus*, der geperlte Käfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 78. *Scar. II. le Scarabé perlé.*

*Ater, punctis elevatis, per strias digestis.*

17. *Ruricola*, der Feldkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 80. *Scar. 15. Le Scarabé à bordure.*

*Niger, elytris croceis margine nigro.*

Fabric. S. E. p. 38. *Melolontha 30.*

*Atra sericea, elytris rufis, margine nigro.*

Füesslins Verz. S. 3. No. 37. der Schwarzrand.

18. *Villosus*, der gescheckte rauche Harlekin.

Geoffr.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 81. Scar. 17. L'Arlequin velu.

Villosus, albo, nigro flavoque irregulariter variegatus.

19. *Niger hirsutus*, das schwarze Rauchkäferchen.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 84. Scar. 23. Le Velours noir.

20. *Ferruginosus*, der Russfarbige Käfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 84. Scar. 24. Le Scarabé couleur de Suie.

Ater, thorace subvilloso, elytris fuscis striatis.

21. *Cinerascens*, der braune Chagrinkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 84. Scar. 25. Le Scarabé brun chagriné.

Atro-fuscus, supra veluti cinerascens, antennis pedibusque fuscis lamellis antennarum longis, elytris striatis.

22. *Sulcatus*, der gefurchte Käfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 86. Scar. 29. Le petit Scarabé noir strié.

Niger, pedibus rufis, elytris profunde striatis.

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 467. Sulcatus, subater, elytris striatis, pedibus ferrugineis.

23. *Philanthus*, der Blumenfreund.

Füesslins Verz. S. 3. No. 28.

Sulzers Gesch. S. 18. t. 1. f. 8.

Cervino-fuscus, argenteo-pulverulentus; pedibus posticis longissimis vniunguiculatis.

24. Pel-

24. *Pellucidulus*, der graubündtische Durchsichtige.

*Sulzers* Gesch. S. 18. t. 1. f. 9.

*Füesslins* Verz. S. 3. No. 35. *Sulzers* Kolbenküfer.

Rubescens; sericeus; tenuiter scutellatus; *elytris* striatis; *corpore* ovato, pedibusque filiformibus.

25. *Cordiger*, der Herzträger.

*Füesslins* Verz. S. 3. No. 38.

Niger; *elytris* fulvis, in medio macula nigra cor-diformi.

26. *Aeneus*, der holländische grüne Heukäfer.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 277. No. 22. t. 10. f. 16. *Scarabé cuivreux*.

Scutellatus viridis nitidus, *elytris* sulcatis.

*Voet.* Scar. ord. 1. gen. 1. Arboric. p. 16. No. 58. t. 7. f. 58. *Fenisex viridis vernacula*; le Haneton vert du Foin Hollandais; de groene inlandsche Hooike-ver.

27. *Tuberculatus*, der Pensylvanische Höckerflügel.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 317. No. 10. *Scarabé à tubercules*.

Scutellatus oblongus griseo-cinereus, *elytris* tuber-culis pilosis, femoribus anticis maximis, capite recon-dito.

28. *Nanus*, der Surinamische Zwerg.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 318. No. 11. t. 19. f. 3. *Scarabé Nain*.

Scutellatus oblongus nigro-fuscus capite lato, *ely-tris* striatis, antennis rafis.

29. *Ni-*

29. *Nigrocephalus*, der Surinamische Schwarzkopf.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 321. No. 14. t. 19. f. 6. Scarabé à tête noire.

Scutellatus rufo-lividus, capite rufo, postice nigro, corpore oblongo, subtus fusco.

30. *Marginatus*, der ostindianische bordirte Käfer.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 324. No. 17. t. 19. f. 10. Scarabé à bordure.

Scutellatus niger, thorace elytrisque fascia marginali flavo-fulva.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. Floric. p. 5. No. 4. t. 1. f. 4. *Orphanus*; l'Orphelin; de Weesjonge.

31. *Carbonarius*; der Köhler.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 324. No. 24. Scarabé charbonné.

Scutellatus totus niger nitidus, corpore depresso, elytris glaberrimis, areis excavatis.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. Floric. p. 7. No. 20. t. 3. f. 20. *Coracinus hirtipes*; le Noir-luisant à pattes velues; de zwart blinkende Ruigpoot.

32. *Orphanulus*, das ostindianische Waysenkindlein. \*)

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. Floric. p. 5. No. 5. t. 1. f. 5. Le petit orphelin; het Weeskind.

Similis marginato No. 31. sed minor, magisque glaber. Elytris dimidia parte nigris, dimidia aureis.

33. *Au-*

\*) v. No. 111.

33. *Auratus*, der ostindianische Goldkäfer.

*Voet. Scar. Floric.* p. 5. No. 6. t. 1. f. 6. *l' Orange;*  
de *Oranje*.

*Tergo, elytrisque solide auriacis, non tamen fulgentibus; capite, cruribus et abdome nigris ac fulgentibus.*

34. *Rubra Tigris*, der ostindische rothe Tiger.

*Voet. Scar. Floric.* p. 5. No. 7. t. 1. f. 7. *Te Tigre rouge;* de *roode Tyger*.  
*Totus auriacus, nigro-maculatus.*

35. *Antheus*, der ostindische schwarz und weiss geblümte Blumenkäfer.

*Voet. Scar. Floric.* p. 5. No. 8. t. 1. f. 8. *Le Fleuronne;* de *Gebloemte*.

*Rarus Floricola, eximie coruscans, nigro-albus.  
Maculae albae instar Marcasitae.*

36. *Cinctatus*, der ostindische Gürtelkäfer.

*Voet. Scar. Floric.* p. 5. No. 9. t. 2. f. 9. *le Bandé;*  
de *gebande*.

*Rarus, aeneus seu metallicus, oblique per elytra cingulo quodam amplo, splendide aureo.*

37. *Holofericus*, der ostindianische Sammetkäfer.

*Voet. Scar. Floric.* p. 6. No. 10. t. 2. f. 10. *le Velouté;* de *Fluwelen*.

*Inter pulcherrimos referendus, niger et luteus, refert holofericum nigrum, et flavens sericum densius bombycinum.*

38. *Fusco-ruber*, der braunrothe Blumenkäfer.

*Voet.*

*Voet. Scar. Floric. p. 6. No. 12. t. 2. f. 12.* Le *Rouge-brun*; de *Bruinroode*.

Totus coloris obtuse et obscure *fusco-rubei*.

39. *Folium mortuum*, der *faulbraune Blumenkäfer*.

*Voet. Scar. Floric. p. 6. No. 13. t. 2. f. 13.* la *Feuille morte*; de *Feuljemorte*.

*Antennis capiteque nigro; oculis nitide fuscis; dorso integro fulgente; disco spadiceo, vtrinque nigro.*

*Rarissimus.*

40. *Lugubris*, der *deutsche Trauerkäfer*.

*Voet. Scar. Floric. p. 6. No. 14. t. 2. f. 14.* Le *Lugubre*; de *Rowdrager*.

Totus niger, et sine splendore.

41. *Refulgens lugubris*, der *Schwarzglanz*.

*Voet. Scar. Floric. p. 7. No. 15. t. 2. f. 15.* Le *Lugubre luisant*; de *blinkende Rouwdrager*.

Supra et infra nitide ater, *refulgens*.

42. *Setiger viridis*, der *surinamische grüne Borstenträger*.

*Voet. Scar. Floric. p. 7. No. 17. t. 3. f. 17.* Le *Brosfard vert*; de *groene Borsteldrager*.

*Elytris nitide-virentibus, ad latera pilis luteis setaceis, per fasces dispositis.*

43. *Histrio fulvus*, der *amerikanische gelbe Harlekin*.

*Voet. Scar. Floric. p. 7. No. 18. t. 3. f. 18.* L' *Arlequin jaune*; de *geele Harlequyn*.

*Totus*

*Totus luteo-ater, discolor, exceptis antennis, cruribusque nigris.*

44. *Histrion ruber*, der rothe Harlekin.

*Voet. Scar. Floric. p. 7. No. 19. t. 3. f. 19. L'Arlequin rouge; de rode Harlequyn.*

*Antennis, cruribus, et toto subtus corpore fulgido-atro. Superius totus aureo-ruber, subtiliter nigromarmoratus.*

45. *Lugubris crassus*, der deutsche dicke Trauer-käfer.

*Voet. Scar. Floric. p. 8. No. 21. t. 3. f. 21. Le gros lugubre; de dikke Rouwdrager.*

*Totus niger, in dorso striatus, pro magnitudine longe crassior.*

46. *Maculosus Isiquebensis*, der Isiqueebische Bunt-fleck.

*Voet. Scar. Floric. p. 8. No. 22. t. 3. f. 22. Le marqueté d'Isqueebó; de gespikkeld Isqueebse.*

*Colore flavo, maculis adspersis nigris.*

47. *Turcicus*, der Türkiskäfer.

*Voet. Scar. Floric. p. 8. No. 24. t. 3. f. 24. La Turquoise; de Turkooische.*

*Egregii hujus Scarabaei color vix describendo est, aut depingendo.*

48. *Smaragdinus minor*, der kleinere Smaragdkäfer. \*)

*Voet.*

\*) v. No. 62.

*Voet. Scarab. Floric.* p. 9. No. 25. t. 4. f. 25. La petite Emeraudine; de kleine Smaragdynen.

49. *Aerugineus*, der Jamaische Kupferkönig.

*Voet. Scar. Floric.* p. 9. No. 26. t. 4. f. 26. La Fleur de cuivre; de Koperbloem.

Refert colore in florum aeris, seu viridis montani.

50. *Pyropus*, der Jamaische Feuerkäfer.

*Voet. Scar. Floric.* p. 9. No. 27. t. 4. f. 27. Le Scarabé ardent; de Gloejende.

Frustra laborares in depingendo igneo flamasque imitante rubore; scintillat etiam.

51. *Igneus*, die glürende Kohle.

*Voet. Scar. Floric.* p. 9. No. 28. t. 4. f. 28. Le Braise; de Vuurige.

Depascit Rosas, et adeo coruscat, vt radiis solis expositus ruborem cendentium carbonum referat.

52. *Tonkaeus*, der Tonkakäfer.

*Voet. Scar. Floric.* p. 9. No. 29. t. 4. f. 29. Le Tonka.

Totus fuscus, adspersis nigris maculis; elytris ad imum ex nigro marginatis.

53. *Tonkaeus maculosus*, der gefleckte Tonkakäfer.

*Voet. Scar. Floric.* p. 9. No. 30. t. 4. f. 30. Le Tonka tacheté; de gevlekste Tonka.

Priori convenit, exceptis duabus praecutis cuspibus seu spinis ad ima elytra. Forsan prioris femina.

54. *Lanugithorax*, die deutsche *Wollbrust*.

*Voet. Scar. Floric. p. 10. No. 31. t. 4. f. 31. Le Poitrine du Duvet; de Donsborst.*

*Totus niger; pectore et lateribus ventris denis pilis albis, lanuginem referentibus.*

55. *Maculosus germanicus*, der deutsche *Fleckkäfer*.

*Voet. Scar. Floric. p. 10. No. 32. t. 4. f. 32. Le Mandré d'Allemagne; de Duitsche gespikkeld.*

*Perobscure viridis; tergo et elytris adspersis multis maculis; supra et infra albo-pilosus.*

56. *Hispidosus*, der deutsche *Fuchs*.

*Voet. Scar. Floric. p. 10. No. 33. t. 4. f. 33. La Robe velue; de Ruigrock.*

*Totus fuscо-niger, vbique fere tam dense pilis rufis stipatus, vt rufus appareat.*

57. *Talpa*, der *kapensische Maulwurf*.

*Voet. Scar. Floric. p. 10. No. 35. t. 5. f. 35. La Taupe; de Mol.*

*Totus hispidus, rarissimus; adeoque pilis lividis obsitus, vt caput a dorso vix discernas.*

58. *Barbatulus*, der *ostindische Flachbart*.

*Voet. Scar. Floric. p. 10. No. 36. t. 5. f. 36. La Barbe de Lin; de Vlasbaard.*

*Lino subtilissimo vestitus.*

59. *Pennicrusta*, die *Flügelzange*.

*Voet. Scar. Floric. p. 10. No. 37. t. 5. f. 37. L'Etuis piquant; de Penschaal.*

Elytris

Elytris tuberculatis; colore laevigati Sinsi, vel pyritae politi.

60. *Hispido-lugubris*, der schwarze Chagrinkäfer.

*Voet. Scar. Floric. p. II. No. 38. t. 5. f. 38. Le deuil fourré; de ruige Rouwdrager.*

Elytra quadrota; Totus superne coloris anthracii, et tanquam corii crudi ruditatem imitatur.

Rarissimus.

61. *Dorso-discolor*, der ostindische Buntrücken.

*Voet. Scar. Floric. p. II. No. 39. t. 5. f. 39. Le dos bigarré; de Bontrug.*

Copite et dorso spadiceo et subflavo colore. Thoracis et abdominalis infra annuli discolores.

62. *Smaragdinus major*, der grosse indianische Smaragdkäfer. \*)

*Voet. Scar. Floric. p. II. No. 40. t. 5. f. 40. La grande Enraudine; de groote Smaragdynen.*

Floricolarum maximus; splendor et pulchritudo depingi non potest.

63. *Cursor niger*, der deutsche schwarze Läufer.

*Voet. Scar. Floric. p. II. No. 41. t. 5. f. 41. Le Courreur noir; de zwarte Looper.*

Totus ex atro fulget, elytris subtiliter crenulatis.

64. *Cursor maculatus*, der deutsche gefleckte Läufer.

F 2

Voet

\*) v. No. 48.

*Voet. Scar. Floric.* p. II. No. 42. t. 5. f. 42. *Le Coureur à points blancs*; *de gespikkelfte Looper.*

*Elytris albo-maculatis*; *fortasse Mas prioris.*

65. *Pullus maculosus*, der *Jamaische schwarzgefleckte braune Blumenkäfer.* \*)

*Voet. Scar. Floric.* p. 12. No. 44. t. 5. f. 44. *Le Grison à points noirs*; *de gespikkeld Grauwe.*

*Elytra cana* *passim et dense punctata.*

66. *Vernalis americanus*, der *amerikanische grünlche Laubkäfer.*

*Voet. Scar. Arboric.* p. 14. No. 47. t. 6. f. 47. *Le Haneton de Indes Occidentales*; *de westindische Meikever.*

*Capite, dorso et toto infra corpore viridi-splendente; magnitudine et forma nostrae Melolonthae.*

*Foemina.*

67. *Hispido-vernalis*, der *Franckfurthische rauche Maykäfer.*

*Voet. Scar. Arboric.* p. 14. No. 50. t. 6. f. 50. *Le Haneton velu*; *de ruige Meikever.*

*Spissior longiorque nostrate, colore obscure-fulvo; scutello lumbari magis hirsuto, pilisque seu setis albis vestito; antennae trinis tantum foliatis articulis.*

68. *Tenuicrusta lividus*, der *holländische violette dünnshaaliche Maykäfer.*

*Voet. Scar. Arboric.* p. 15. No. 54. b. t. 7. f. 54. b. *Le Haneton pourpre à etuis minces*; *de Paarsche Dünshaal.*

*Rarus,*

\*) v. No. 77. *Lanius Linn.*

*Rarus*, colore furvo-ianthino, elytris tenuibus rubeo-lividis.

69. *Fenisex fuscus*, der holländische braune Heukäfer.

*Voet. Scar. Arboric. p. 15. No. 55. t. 7. f. 55. Le Haneton brun du Foin; de bruine Hooikever.*

In *Feniseio*, ardente sole, in *Belgio* frequens, tarde volans, et venatui facilis, capite dorsoque obscure-viridis, elytris eleganter fuscis.

70. *Fenisex americanus*, der Surinamische Heukäfer.

*Voet. Scar. Arboric. p. 16. No. 56. t. 7. f. 56. Le Haneton du foin americain; de westindische Hooikever.*

Viridi-Splendens; elytris subtiliter crenulatis.

71. *Fenisex americanus coeruleus*, der westindische blaue Heukäfer.

*Voet. Scar. Arboric. p. 16. No. 57. t. 7. f. 57. Le Haneton bleu du Foin americain; de blaauwe westindische Hooikever.*

*Rarus*; elytris obscure-coeruleis.

72. *Fenisex viridis vernacula*, der grüne holländische Heukäfer.

*Voet. Scar. Arboric. p. 16. No. 58. t. 7. f. 58. Le Haneton vert du Foin hollandais; de groene inlandische Hooikever.*

Totus viridis; cruribus antennisque instar cupri infuscata.

73. *Auricolor*, der neuwörkische Goldkäfer.

*Vöet.* Scar. Arboric. p. 16. No. 59. t. 7. f. 59. Le Haneton doré; de Gulde Kever.

Adverso sole aureum refert colorem cum fulgore ex viridi.

74. *Junius americanus*, der amerikanische Junius-käfer.

*Voet.* Scar. Arboric. p. 16. No. 60. t. 7. f. 60. Le Haneton de Juin américain; de westindische Juny-kever.

*Capite dorsoque obscure-viridi-fulgentibus; elytris eleganter subfuscis, binis lineolis nigricantibus. Totus canis pilis hispidus.*

75. *Gracilipes*, der neuylorckische Dünnfuß,

*Voet.* Scar. Arboric. p. 16. No. 61. t. 7. f. 61. Le Haneton à pattes grêles; de Dunpoot.

*Capite dorsoque fulgido-atris; elytris fulgido-spadiceis; cruribus pro corpore mirabiliter exilibus.*

76. *Murrinus discolor*, der westindische buntsche-ckige Porzellankäfer.

*Voet.* Scar. Arboric. p. 16. No. 62. t. 8. f. 62. La Porcellaine bigarrée; de bonte Porceleine.

Elegantissimus, capite fulgido-viridi; antennis fu-scis; elytris leviter fuscis ex viridi micantibus;

77. *Pannipes*, der Surinamische Lappenfuss.

*Voet.* Scar. Arboric. p. 17. No. 64. t. 8. f. 64. Le Patte-Lame; de Lappoot.

Totus fulgido-viridis; pannis ad vngues pedum sex singulorum, quos maribus, femellas, instar vasorum murrinorum glabras, confidentibus, vt horum ope-

ra

ra iis firmius adhaerescant, prodesse verosimilium.

78. *Nov-eboracus viridis*, der prächtig grüne neu-yorkische Laubkäfer.

*Voet. Scar. Arboric.* p. 17. No. 66. t. 8. f. 66. Le Haneton vert de la nouvelle Tork; de groene Nieuw-jorker.

Superne hilare *viridis*; antennis oculisque spadiceis; abdomine cruribusque tanquam ex fulrido chalcorubris.

79. *Betulicola germanicus*, der deutsche Birkenkäfer.

*Voet. Scar. Arboric.* p. 17. No. 67. t. 8. f. 67. Le Haneton allemand du Bouleau; de Duitsche Berkenkever.

Capite dorsoque obscure-viridi nigricantibus; elytris superne luteis, marginibus maculisque nigris, cruribus obscure-viridibus.

80. *Quercicola germanicus*, der deutsche Eichenkäfer.

*Voet. Scar. Arboric.* p. 18. No. 68. t. 8. f. 68. Le Haneton allemand du Chêne; de Duitsche Eikenkever.

Superius colore subfuscō, inferius ex pilis cinerreo.

81. *Betulicola hispidus*, der holländische rauchende Birkenkäfer.

*Voet. Scar. Arboric.* p. 18. No. 69. t. 8. f. 69. Le Haneton velu du Bouleau; de ruige Berkenkever.

*Colore subfuscō elegantiōre priore, capite dorsoque et toto infra corpore pilis cinereis hirsutus.*

82. *Betulicola gallicus*, der franzöſſche Birkenkäfer.

*Voet. Scar. Arboric. p. 18. No. 70. t. 9. f. 70. Le Haneton françois du Bouleau; de franſche Berkenkever.*

*Nostrati Junio persimilis, corpore tenuior ac glabrior.*

83. *Venator*, der deutsche Jäger.

*Voet. Scar. Arboric. p. 18. No. 71. t. 9. f. 71. Le Chasseur; de Jager.*

*Crura oblonga ac procera, in cursitando velox, antennis cruribusque subfuscī coloris, ceterum viridis.*

84. *Venator discolor*, der deutsche buntscheckige Jäger.

*Voet. Scar. Arboric. p. 18. No. 72. t. 9. f. 72. Le Chasseur bigarré; de bonté Jager.*

*Fortasse antecedentis femella; colore magis prafino, elegantissime variegatus spadiceis maculis; infra tenuissimis pilis obsitus.*

85. *Venator coeruleus*, der franzöſſische blaue Jäger.

*Voet. Scar. Arboric. p. 18. No. 73. t. 9. f. 73. Le Chasseur bleu; de Blauwe Jager.*

*Totus coeruleus, ceteroquin priori similis.*

86. *Mus niger*, die schwarze Maus.

*Voet. Scar. Arboric. p. 18. No. 74. t. 9. f. 74. La Souris noire; de zwarte Muis.*

*Rarissi-*

*Rarissimus; supra et infra hispidus, vt murem conspicere videaris.*

87. *Mus cinereus*, die *aschfahle Maus*.

*Voet. Scar. Arboric. p. 18. No. 75. t. 9. f. 75. La Souris grise; de grauwe Muis.*

88. *Mus fuscus*, die *braunie Maus*.

*Voet. Scar. Arboric. p. 18. No. 76. t. 9. f. 76. La Souris brune; de Bruine Muis.*

89. *Omber discolor*, der *Isequebische bunte Omberkäfer*.

*Voet. Scar. Arboric. p. 19. No. 77. t. 9. f. 77. Le Scarabé de couleur d'ombre, bigarre; de bonte Omberkever.*

*Totus laevis, non-splendens; pedes anteriores crassis robustisque vngulis instructi.*

90. *Baccicolor*, der *westindische Beergelbe Käfer*.

*Voet. Scar. Arboric. p. 19. No. 78. t. 9. f. 78. Le Haneton des Bayes; de Bessenkever.*

*Totus colore ravidō, haud absimilis aquatico, qui exprimitur e germanicis baccis luteis.*

91. *Tetricus*, der *Braunschatten*.

*Voet. Scar. Arboric. p. 19. No. 79. t. 9. f. 79. Le Sombre.*

*Capite subfuscō, scutello dorsuali furvo; elytris analogice discoloribus; glaber et aliquantulum refulgens.*

92. *Tuberoculus*, das *Isequebische Hökerauge*.

*Voet. Scar. Arboric. p. 19. No. 80. t. 9. f. 80. L'oeil saillant; de Pui/oog.*

*Lutei oculi vehementer extuberantes; capite atro; dorso fulgente, tanquam ex rubro aere; elytris luteis.*

93. *Aurilinea*, die Surinamische Goldlinie.

*Voet. Scar. Arboric. p. 20. No. 81. t. 9. f. 81. Le Rayé; het Streepje.*

*Refulgens ex fulvo maculis subluteo rubris; linea aurea supra cranium et dorsum insignitus.*

94. *Albiventer*, der deutsche Weissbauch.

*Voet. Scar. Arboric. p. 20. No. 82. t. 9. f. 82. Le Ventre blanc; de Witbuik.*

*Forma quadrata; totus niger; thorace et ventre lana alba, seu molliculis pilis obsitus.*

95. *Insignifer*, der französische Livreträger.

*Voet. Scar. Arboric. p. 20. No. 83. t. 10. f. 83. Le Haneton en Livrée; de Livereidraager.*

*Capite et scutello dorsuali nigris, elytris fuscis, ad eorumque latera taeniola subviridis, ex pilis luteis exhibitis, docente microscopio, composita.*

96. *Trigonus*, der Issequebische Triangel.

*Voet. Scar. Arboric. p. 20. No. 84. t. 10. f. 84. Le Triangle; de Driehoek.*

*Totus obscure-viridis; in margine triangularis parvi scutelli dorsualis trigonum habet coloris auriaci.*

97. *Niger unungulus ex India occidentali*, die schwarze ostindische Einklaue.

*Voet.*

Voet. Scar. Arboric. p. 20. No. 85. t. 10. f. 85. Le Haneton noir americain à un onglet; de westindische zwarte Eennagel.

Totus supra colore coracino; singula crura una duntaxat vngula,

98. *Vnugulus*, die holländische Einklaue.

Voet. Scar. Arboric. p. 21. No. 86. t. 10. f. 86. Le Haneton à un onglet; de Eennagel.

Capite et doruali scutello obscurissime viridibus glabrisque; elytris crenulatis et eleganter fuscis.

99. *Vnugulus longipes*, der holländische einklauege Langfuss.

Voet. Scar. Arboric. p. 21. No. 87. t. 10. f. 87. Le longue Patte à un onglet; de Langpootte Eennagel.

Capite ac scutello dorsuali obscure viridibus; elytris magis subviridibus; cruribus fuscis. Figura crurum posticorum nova et rara, insigniter longa.

100. *Semicrusta*, die holländische Halbschaale.

Voet. Scar. Arboric. p. 21. No. 88. t. 10. f. 88. Le Demi-etui; de Halfschaal.

Totus e nigro alboque discolor; elytris tres modo quartas partes corporis tegentibus,

101. *Caudiger major*, der grosse Schwanzträger.

Voet. Scar. Arboric. p. 21. No. 89. t. 10. f. 89. Le grand Haneton à queue; de grootte Staartkever;

Abdomine spiculo corneo acuto.

102. *Caudiger minor*, der kleine Schwanzträger.

Voet. Scar. Arboric. p. 21. No. 90. t. 10. f. 90. Le petit Haneton à queue; de kleene Staartkever.

Eadem

Eadem cum priore forma, modo tenuior et minus *discolor*.

103. *Spilophthalmus*, das *Buntauge*.

*Voet. Scar. Arboric.* p. 22. No. 91. t. 10. f. 91. *L'oeil bigarré*; de *Bontoog*.

Totus colore perluteo, maculis *fusco-nigris*. *Oculi sphaeroidei* discolores. *Rarissimus*.

104. *Antennodensus*, das *Issequebische dicke Fühlhorn*.

*Voet. Scar. Arboric.* p. 22. No. 92. t. 10. f. 92. *Le Haneton à grosses antennes*; de *Dikspriet*.

Totus egregie aureus, maculis nigris conspersus. *Antennarum clavis crassioribus rotundis*.

*Rarissimus*.

105. *Monachus cinereus*, der *ostindianische graue Mönch*.

*Voet. Scar. Arboric.* p. 22. No. 93. t. 10. f. 93. *Le Moine gris*; de *grauwe Moenik*.

Totus *cinerous*, infra fuscus; capite, dorso, elytrisque tuberculorum plenis; antennae insolitae figurae; prope caput antrorsum *crista* ex longis pilis constans.  
*Rarissimus*.

106. *Maurus*, der *Mohr*.

*Voet. Scar. Arboric.* p. 22. No. 94. t. 11. f. 94. *Le More*; de *Moor*.

*Elytris tam arcte connexis*, vt duobus praeditum esse vix affirmares.

107. *Scarabaeoides crissans*, der *gestreifte Buprestesartige Baumkäfer*.

*Voet.*

*Voet. Scar. Arboric. p. 23. No. 95. t. II. f. 95.* Le Haneton-Bupreste strié; de gestreepte Schaarbyter Kever.

Totus niger, antennis foliatis, ceterum Bupresti similimus.

108. *Scarabaeoides*, der Dermestesartige Käfer.

*Voet. Scar. Arboric. p. 23. No. 96. t. II. f. 96.* Le Haneton Dermeste; de Schaarbyter Kever.

Totus glaber et fulgens; non dissimilis Coleoptero aquatico.

109. *Berolinensis*, der Berliner.\*)

*Voet. Scar. Floric. p. 33. No. 150. t. 21. f. 150.* Le Berlinois; de Berlyner.

Totus spadiceo colore; elytris subtiliter costatis.

110. *Flos Chalci striatus*, die gestreifte Kupferblume.

*Voet. Scar. Floric. p. 34. No. 152. t. 22. f. 152.* Le Fleur de Cuivre rayée; de gestreepte Koperbloem.

Pulcherrimus; lineae albae cum interpunctionibus inter colorem viride splendentem.

111. *Orphanus maculosus*, das gefleckte Waisenkind.

*Voet. Scar. Floric. p. 34. No. 153. t. 22. f. 153.* L'orphelin tacheté; het geplekte Weeskind. \*\*)

Fortasse

\*) Er steht zwar unter den Terricolis, Voet hat aber selbst erinnert, dass er unter die Arboricos gehöre.

\*\*) Mit diesen beyden Käfern No. 110. III. verhält sichs eben so, wie mit No. 109. Sie gehören unter die Blumenkäfer; Voet hat sie aber zu spät erhalten, und also nicht unter die ersten setzen können.

*Fortasse mas vel femella* No. 33. *Orphanulus.*

112. *Adiaphorus*, das *Kraintsche Faulthier.*

*Scop.* Entom. carn. No. 10. *Tardus valde; totus pilosus;* caput thoraxque coeruleo-viridis. *Elytra dia- phana saturatius colorata ac in Melolontha.*

*Poda* Mus. graecens. p. 20.

113. *Sylvestris*, *Skopolis Waldkäfer.*

*Scop.* Entom. carn. No. 11.

*Elytrum striis elevatis 10, areis interiectis, transver- sim rugosis, octava tuberculis binis; caput leniter emarginatum; thorax punctatus.*

114. *Oblongus*, der *Menschenfreund.*

*Scop.* Entom. carn. No. 19.

Facies *Tenebrionis molitoris*; caput antice rotunda- tum; *elytrum* striis 9. Circa oppida et pagos.

115. *Alpinus*, der *Alpenkäfer.*

*Scop.* Entom. carn. No. 21.

*Capitulum* antenn. bipartitum; *statura* Coccinellae 10-punctatae; *Thorax* punctatus. In *Alpibus Vochinenibus.*

116. *Variegatus*, der *buntscheckige Käfer.* \*)

*Scop.* Entom. carn. No. 28.

Albo-nigroque varius. *Ani regio cinerea punctis binis atris. Caput nigrum; antennae nigrae; thorax albidus villosulus.*

117. *Canicularis*, der *ungarische Hundstagskäfer.*

*Scop.*

\*) Viel ähnliches mit *Scar. Hemiptero L.* No 63. aber nicht der- selbe.

Scop. annus 5. hist. nat. p. 77. No. 14.

Simillimus *Solstitialis*, sed duplo minor; tibiae antice tridentatae, *elytra* non plicata.

Vespere et interdiu volat.

118. *Holosericus*, der Krainische Sammetkäfer.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 77. No. 15. Minor Scar. *Vacca* L. No. 25; major *finitario* No. 32. *Elytra* fuscō-rubra, striata, albo tenui villo pubescentia.

119. *Gronovii*, der Gronovskäfer.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 82. No. 23.

Statura *Melolonthae* No. 60. Color obscure testaceus; thorax in medio sulco dimidiato; *elytra* non striata. Totus glaber.

Gronov. Gazoph. p. 145. No. 429. Scar. *muticus*, obscure testaceus, capite antice emarginato; thorace sulco longitudinali.

120. *Maculatus*, der Gelbfleck.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 83. No. 25.

Vix major *Lunari* No. 10. fuliginoso-niger; thorax punctis duobus flavis; *elytra* apice flava; et ad marginem flavo-maculata.

Gronov. Gazophyl. p. 150. No. 456. Scar. *muticus*, ater, opacus, flavo-maculatus, scutello nullo, segmento abdominis primo vtrinque vnidentato.

121. *Buprestoides*, Skopolis Buprestenkäfer.

Scop. Ann. 2. hist. nat. p. 8.

Corpus ovatum, fuscum; thorax in medio macula parva nigra; *elytra* striata, alas tenues.

122. *Crucifer*, der Kreuzträger. \*)*Lepechins* Tageb. 1. Th. p. 240. t. 16. f. 14.*Muticus*, thorace subvilloso viridescente, *elytris* luteis corpore brevioribus, *cruce nigra*, trabe dupli.123. *Cyaneus*, der blaue Steppenkäfer.*Lepechins* Tageb. 1. Th. S. 313. t. 19. f. 10.*Muticus oblongus*, totus *cyaneus*.124. *Nigricans*, der Schwärzling.*Lepechins* Tageb. 1. Th. S. 313. t. 19. f. 7.*Muticus supra nigricaus*, infra lanugine alba obsitus; *elytris* corpore brevioribus, scutello triangulari villoso albo.125. *Acuminatus*, der Spitzflügel.*Lepechins* Tageb. 1. Th. p. 313.*Muticus*, corpore viridi, *elytris* flavis corpore brevioribus, apice *acuminatis*.126. *Bipunctatus*, der Zweypunkt.*Lepechins* Tageb. 2. Th. S. 201. t. 10. f. 7.*Muticus*, thorace nigro rubro-marginato; *elytris* rubris, punctulis duobus nigris magnis.127. *Mucronatus*, das zweyzackichte Käferchen.*Lepechins* Tageb. 2. Th. S. 202. t. 11. f. 22.*Mutico* thorace, *elytris* apice excavatis, *mucronibus* 4.128. *Hispis-*

\*) Diese Käfer hattent einen ganzen Eichenwald kahl gefressen, und blos das Mark aus den Blättern genagt, dass die übrigen Geäder der Blätter vollkommen Skelette vorstellten.

128. *Hispidus*, der dänische kleine Bär.

Pontopp. N. G. v. D. S. 199. No. 19. t. 16.

Magnitudine *finetarii*; haec tenus ignotus; descriptus vero in Prodr. Insectol. Siae. p. 26. No. 1.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 477. *Tomentosus* piceus opacus, capite thoraceque nigro; *elytris* striatis pubescentibus. An *hispidus*? Pontopp. Atl. Dan.

129. *Flexilis*, der spanische Käfer mit beweglichen Flügeldecken.

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 4. No. 4.

*Scutellatus muticus*, apterus, capite thorace *elytris*-que fusco-lividis, laevissimis; *elytris flexibilibus* co-riaceis obtusis ciliatis.

130. *Piceus*, der amerikanische Pechkäfer.

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 5. No. 5.

*Scutellatus muticus*, totus *piceus*, pectore piloso; *elytris* striatis punctis impressis. *Corpus* magnitudine inferius *Stercorario*.

131. *Juvencus*, der amerikanische junge Stier.

Fabric. S. E. p. 18. Scar. 62. *Scutellatus muticus*, thorace impresso antice *nucronato*.

Mus. Dom. Banks.

132. *Splendidus*, der amerikanische Grünling.

Fabric. S. E. p. 18. Scar. 63.

*Scutellatus muticus* viridi-nitens; *elytris* striatis.

Mus. Dom. Drury.

133. *Cephus*, der schwarzbärdige Fuchs.

G

Fabric.

*Fabric. S. E. p. 18. Scar. 64.*

*Scutellatus rufus, elytrorum futura, apicibusque nigris.*

Mus. Dom. Banks.

134. *Laborator*, der *brasiliische schwarzpunktirte Mistkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 18. Scar. 65.*

*Scutellatus muticus ater, thorace punctato, elytris striatis, clypeo emarginato.*

Mus. Dom. Banks.

135. *Arator*, der *kapensische Pflüger*.

*Fabric. S. E. p. 18. Scar. 66.*

*Scutellatus muticus niger; thorace laevi; elytris punctato-striatis.*

136. *Barbatus*, der *indianische Bartafter*.

*Fabric. S. E. p. 19. Scar. 67.*

*Scutellatus muticus laevis niger, ano barbato.*

137. *Luridus*, der *englische Zebra*.

*Fabric. S. E. p. 19. Scar. 69.*

*Scutellatus muticus ater, elytris griseis nigro-striatis.*

Mus. Dom. Banks.

138. *Testudinarius*, der *englische Schildkrötenkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 19. Scar. 72.*

*Scutellatus muticus niger, elytris sulcatis piceis, ferrugineo-punctatis.*

Mus. D. Solander.

139. *Mer-*

139. *Merdarius*, der europäische schwarznäthige Mistküfer.

*Fabric. S. E. p. 19. Scar. 73.*

*Scutellatus muticus ater, elytris testaceis, futura nigra.*

140. *Porcatus*, der Leipziger tief gefurchte Mistkäfer.

*Fabric. S. E. p. 20. Scar. 75.*

*Scutellatus muticus fuscus, elytris porcatis, seu profunde sulcatis.*

141. *Stercorator*, der Brasilianische Mistfink.

*Fabric. S. E. p. 20. Scar. 76.*

*Scutellatus muticus ater laevis, elytris striato-crenatis, clypeo emarginato.*

142. *Asper*, der europäische gefurchte Pflanzenkäfer.

*Fabric. S. E. p. 20. Scar. 77.*

*Scutellatus muticus capite thoraceque transversim sulcatis; elytris striatis.*

143. *Gibbosus*, der amerikanische Hökerflügel.

*Fabric. S. E. p. 28. Scar. 112.*

*Exscutellatus muticus; clypeo quadridentato, elytris basi gibbere notatis.*

144. *Novaehollandiae*, der neuholändische Käfer mit vier gezähneltem Schild.

*Fabric. S. E. p. 29. Scar. 113.*

*Exscutellatus muticus*, clypeo quadridentato, *elytris* fulcatis.

Mus. Dom. Banks.

145. *Koenigii*, der *Tranquebarische Königskäfer*.

*Fabric. S. E. p. 29. Scar. 114.*

*Exscutellatus muticus*, clypeo bidentato, thorace scabro, *elytris* variolosis.

146. *Cupreus*, der *afrikanische Kupferkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 29. Scar. 115.*

*Exscutellatus muticus nigro-cupreus*, clypeo emarginato, thorace gibbo.

147. *Flagellatus*, der *kapensische Striemenkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 29. Scar. 116.*

*Exscutellatus muticus niger opacus*, clypeo emarginato, *elytris* scabris.

148. *Squalidus*, der *schwarze Brasilianische Mistkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 30. Scar. 119.*

*Exscutellatus muticus ater*, clypeo emarginato, *elytris* striatis.

Mus. Dom. Banks.

149. *2-pustulatus*, die *neuholländische Zweyblätter*.

*Fabric. S. E. p. 30. Scar. 121.*

*Exscutellatus muticus ater*, *elytrorum* basi macula rufa.

150. *Triangularis*, der *Surinamische Triangel*.

*Drury Ins. Tom. I. t. 36. f. 7.*

*Fabric. S. E. p. 30. Scar. 122.*

Exscu-

*Exscutellatus muticus niger, thorace margine femoribusque pallidis, clypeo emarginato.*

151. *Cinctus*, der *chinesische Gürtelkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 30. Scar. 123.*

*Exscutellatus muticus niger, elytrorum margine pallido, clypeo emarginato.*

152. *Suberosus*, der *Brazilianische Zahnschild*.

*Fabric. S. E. p. 31. Trox 2.*

*Griseus, thorace marginato, margine postice dentato, elytris striatis.*

*Mus. Dom. Banks.*

153. *Spinicornis*, der *Dornfühler*.

*Fabric. S. E. p. 31. Trox 3.*

*Nigricans, thorace postice vtrinque emarginato, antennis spinosis.*

154. *Fervidus*, der *glatte amerikanische Laubkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 32. Melolontha 4.*

*Glabra testacea, clypeo emarginato.*

155. *Glabratus*, der *indianische Porzellankäfer*.

*Fabric. S. E. p. 34. Melolontha 9.*

*Testacea nitida, sterno antice porrecto obtuso.*

156. *Viridis*, der *kapensische goldgrüne Laubkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 34. Melol. 10.*

*Glabra, supra viridis, subtus aurea.*

*Mus. Dom. Banks.*

157. *Aeneus*, der *neuholländische Kupferkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 34. Melolontha 11.*

*Glabra aenea, abdominis lateribus albis, elytris acuminatis.*

Mus. Dom. Banks.

158. *Suturalis*, der grüne neuseeländische Laubkäfer mit der gelblichen Nath.

*Fabric. S. E. p. 34. Melolontha 12.*

*Viridis, elytrorum futura flavescente.*

Mus. Dom. Banks.

159. *Bicolor*, der kapensische zweifarbig Laubkäfer.

*Fabric. S. E. p. 34. Melolontha 13.*

*Glabra, supra viridis, subtus testacea, pedibus apice aureis.*

160. *Dorsalis*, die Tranquebarische schwarze Rückenlinie.

*Fabric. S. E. p. 35. Melolontha 14.*

*Glabra testacea, capite, thoracis elytrorumque dorso nigris.*

161. *Glacialis*, der Feuerländische glatte Laubkäfer.

*Fabric. S. E. p. 35. Melolontha 15.*

*Glabra picea, antennis pedibusque testaceis.*

Mus. Dom. Banks.

162. *Luridus*, der vielfarbige Laubkäfer.

*Fabric. S. E. p. 35. Melolontha 16.*

*Thorace nigro, margine pallido, elytris griseis nigro-punctatis.*

163. *Stria-*

163. *Striatus*, der *Feuerländische gestreifte Laubkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 35. Melolontha 17.*

*Glabra aenea; elytris striatis, futura lineisque quatuor cupreis.*

Mus. Dom. Banks.

164. *Testaceus*, der *Feuerländische muschelbraune Laubkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 35. Melolontha 18.*

*Glabra testacea, capite obscuriore; elytris striatis.*

Mus. Dom. Banks.

165. *Pallidus*, der *kapensische blassgelbe Laubkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 35. Melolontha 19.*

*Glabra, testacea, capite elytrorumque futura nigris.*

Mus. Dom. Banks.

166. *Melanocephalus*, der *Brazilianische Schwarzkopf*.

*Fabric. S. E. p. 36. Melolontha 24.*

*Glabra, rufescens, capite nigro; elytris pallidis.*

Mus. Dom. Banks.

167. *Rufus*, der *kapensische Fuchs*.

*Fabric. S. E. p. 36. Melolontha 22.*

*Glabra rufescens, elytris testaceis, clypeo quinque dentato.*

Mus. Dom. Banks.

168. *Festivus*, der *Neuseeländische Staatskäfer*.

*Fabric. S. E. p. 36. Melolontha 23.*

Supra glabra viridis, thorace linea dorsali, elytris futura nigris.

Mus. Dom. Banks.

169. *Laetus*, der *Neuseeländische Prachtkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 36. *Melolontha* 24.

Supra glabra aurea, thoracis linea dorsali, scutelloque sanguineis.

Mus. Dom. Banks.

170. *Vitis*, der *grüne Weinkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 37. *Melol.* 26.

*Viridis, thoracis lateribus flavis.*

171. *Frischii*, *Frischens Weinblatt- oder Juliuskäfer*.

*Frisch* Inf. 4. Th. S. 29. t. 14.

*Fabric.* S. E. p. 37. *Melolontha* 25.

*Nigro-aenea, elytris testaceis.*

*Simillima horticolae Linn. No. 59. at duplo major.*

172. *Argenteus*, der *Silberkäfer*. \*)

*Scop.* Entom. carn. No. 9.

*Poda* Inf. p. 20.

*Fabric.* S. E. p. 38. *Melolontha* 32.

*Clypeo marginato niger subtus argenteo-nitens,*  
*elytris testaceis.*

173. *Errans*, der *irrende Ritter*.

*Fabric.* S. E. p. 37. *Melol.* 27.

*Testacea, thorace maculis duabus nigris, pedibus rufis.*

174. *Pul-*  
\*) S. No. 64. Linn. Scar. *farinosus*.

174. *Pulverulentus*, der *Straßburgische Staubkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 39. *Melol.* 33.

*Corpore polline virescenti-argenteo; elytris pedibusque testaceis.*

175. *Sylvicola*, der *neuholländische Waldmann*.

*Fabric.* S. E. p. 39. *Melol.* 34.

*Clypeo reflexo integro; corpore nigro glabro.*

*Mus. Dom. Banks.*

176. *Subspinifus*, der *Jamaische Stachelkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 39. *Melol.* 35.

*Flavescens; pedibus rufis, thorace subspinoso.*

177. *Mutabilis*, der *Tranquebarische Changeantkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 39. *Melol.* 36.

*Atra tomento cinereo villosa, quo certo situ resplendet.*

178. *Vericolor*, der *afrikanische buntscheckige Laubkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 39. *Melol.* 37.

*Obscure-aenea, elytris tomento cinereo nitidulis.*

*Mus. Dom. Banks.*

179. *Monticola*, der *neuholländische Bergkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 39. *Melol.* 38.

*Clypeo integro reflexo, testacea glabra, capite nigro.*

*Mus. Dom. Banks.*

180. *Humeralis*, der *europäische Erdwandkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 40. Melol. 39.*  
*Atra, elytris basi punctoque medio pallidis.*

181. *Vittatus*, der *indianische bandirte Laubkäfer*

*Fabric. S. E. p. 40. Melol. 40.*  
*Cyanea pilosa, elytris testaceis, lineis tribus albi-*  
*cantibus.*

*Petiv. Gazophyl. t. II. f. 12.*

182. *Ceratoniae*, der *Hasselquistische Ceratonien-*  
*käfer.*

*Hasselqu. It. Palaest. p. 448.*

*Magnitudo Coccinellae minimae; capite antennis*  
*pedibusque ferrugineis, elytris glabris, apice deflexis.*

183. *Bibens*, der *amerikanische Säufer.*

*Fabric. S. E. p. 40. Trichius 3.*

*Capite thoraceque viridi-aeneis pilosis; elytris te-*  
*staceis viridi-nitentibus.*

184. *Lunulatus*, der *karolinische Weissmond.*

*Fabric. S. E. p. 41. Trichius 5.*

*Glaber cyaneus; elytris lunulis duabus albis.*

185. *Piger*, der *maryländische Faullenizer.*

*Fabric. S. E. p. 41. Trichius 6.*

*Capite thoraceque aeneis villosis, elytris testaceis*  
*albo-maculatis.*

186. *Delta*, das *amerikanische Delta.*

*Drury Ins. Tom. II. t. 30. f. 1. 2.*

*Forsteri nov. spec. Ins. Cent. I. p. 7. No. 7.*

*Scutellatus muticus* flavus; *thorace* atro; *triangulo* flavo; *elytris* testaceo-flavis nigro-trimaculatis.

*Fabric.* S. E. p. 41. *Trichius* 7.

*Thorace* nigro *triangulo* albo; *elytris* testaceis albo-maculatis.

187. *Micans*, der afrikanische grüne Glanzkäfer.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 32. f. 3.

*Fabric.* S. E. p. 42. *Cetonia* 1.

*Viridis nitens*; *clypeo* porrecto recurvo *bifido*; *tibiis* anticis *serratis*.

188. *Chinenis*, der chinesische Spitzflügel.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 2. No. 2.

*Scutellatus muticus*, viridi-sericeus, glaber, subtus viridi-inauratus; *elytris* obtusis, submucronatis.

*Fabric.* S. E. p. 42. *Cetonia* 2.

*Aenea*, *clypeo* emarginato subspinoso; *thorace* postice lobato; *elytris* acuminatis.

189. *Nigrita*, der Ceylonische Mohr.

*Fabric.* S. E. p. 43. *Cetonia* 3.

Glabra, atra, *clypeo* emarginato subspinoso, *thorace* postice lobato.

*Hermann* Mus. p. 17. No. 257.

*Petiv.* Gazoph. t. 28. f. 3.

190. *8-punctatus*, der deutsche Achtpunkt.

*Fabric.* S. E. p. 44. *Cetonia* 6.

Nigra, *thorace* vtrinque puncto baseos; *elytris* que duobus flavis.

Statura Scar. *Nobilis* Linn. No. 81.

191. *Tristis*, der amerikanische Trauerkäfer.

*Fabric.*

*Fabric. S. E.* p. 45. *Cetonia* 10.

*Picea, abdominis segmentis margine albis; clypeo emarginato, sterno tornuto.*

192. *Smaragdula*, der amerikanische Smaragdkäfer.

*Fabric. S. E.* p. 45. *Cetonia* II.

*Ferrugineo-flavescens; elytris virescentibus; sternio tornuto.*

193. *Marginatus*, der indianische Rothrand,

*Drury Ins. Tom. II. t. 32. f. 1.*

*Fabric. S. E.* p. 46. *Cetonia* 15.

*Glabra atra; thoracis elytrorumque marginibus rufis.*

194. *Marginella*, das afrikanische Rosträndchen.

*Fabric. S. E.* p. 46. *Cetonia* 16.

*Viridis, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.*

195. *Fasciatus*, der alexandrinische Bandkäfer.

*Fabric. S. E.* p. 46. *Cetonia* 18.

*Nigra, thoracis margine elytrisque testaceis; elytris furura fasciaque dentata nigris.*

196. *Thoracicu*s, der alexandrinische Purpurflügel.

*Fabric. S. E.* p. 47. *Cetonia* 19.

*Nigra, thorace ferrugineo; elytris nigris subpurpurascens.*

197. *Olivaceus*, der afrikanische Olivenkäfer.

*Fabric. S. E.* p. 47. *Cetonia* 20.

Testacea; thorace lineis punctisque duobus; elytris maculis transversis quatuor nigris; subtus olivacea.

198. *Pictus*, der ostindische Buntflügel.

*Fabric. S. E. p. 47. Cetonia 21.*

Nigra; thorace quinquelincato; elytris albo-maculatis acuminatis.

199. *Limbatus*, der ägyptische Rostrand.

*Fabric. S. E. p. 47. Cetonia 22.*

Nigra, thoracis margine ferrugineo.

200. *Splendidus*, der indianische Putzkäfer.

*Fabric. S. E. p. 47. Cetonia 23.*

Cyanea; thoracis margine, elytrisque testaceis.

201. *Cupreus*, der glänzende Kupferkäfer.

*Fabric. S. E. p. 48. Cetonia 24.*

Cuprea nitida; thorace scutello elytrisque viridis.

202. *Africanus*, der afrikanische Erzkäfer.

*Fabric. S. E. p. 48. Cetonia 25.*

Aenea nitens; capitis spina incumbente, sterno porrecto.

*Drury Inf. Tom. II. t. 30. f. 4.*

203. *Suturalis*, die afrikanische Schwarznath.

*Fabric. S. E. p. 48. Cetonia 26.*

Thorace nigro; margine rufo; elytris aeneo-nitidis; sutura nigra.

204. *Fulgidus*, der vierpunktirte Aster.

*Fabric.*

*Fabric.* S. E. p. 48. *Cetonia* 27.

Aenea nitidissima; *abdominis* ultimo segmento prominente quadripunctato.

205. *Gagates*, der afrikanische Achatkäfer.

*Forsteri* nov. sp. *Ins. Centur.* I. p. 6. No. 6.

*Scutellatus muticus*, totus ater, glaber, nitens, *alis fuscis*.

*Fabric.* S. E. p. 29. *Cetonia* 28.

Atra, nitida, *clypeo* truncato, reflexo, *sterno* obtuso.

Mus. Dom. Banks.

206. *Luridus*, der Brasilianische Scheckflügel.

*Fabric.* S. E. p. 49. *Cetonia* 30.

Nigro-aenea; *elytris* *lineis* duabus elevatis, albo-que maculatis.

Mus. Dom. Banks.

207. *Aurichalceus*, der indianische Messingglanz.

*Fabric.* S. E. p. 49. *Cetonia* 31.

Aenea, opaca; *elytris* acuminatis albo-maculatis.

208. *Philippensis*, die Philippinische Schecke.

*Fabric.* S. E. p. 49. *Cetonia* 32.

Aenea, nitida; *thorace* margine punctisque duobus albis; *elytris* maculatis, acuminatis.

*Petiv.* *Gazoph.* t. 26. f. 7.

209. *Fasciatus*, der neuholändische bandirte Weissfleck.

*Fabric.* S. E. p. 50. *Cetonia* 33.

Viridi-

Viridi-fusca, obscura, thorace margine punctisque; elytris fascia media, maculisque niveis, postice acuminatis.

Mus. Dom. Banks.

210. *Acuminatus*, der kapensische Spitzflügel.

Fabric. S. E. p. 50. *Cetonia* 34.

Obscure-aenea, pallido-maculata, elytris acuminatis.

Mus. Dom. Banks.

211. *Areatus*, der virginische Rothringel.

Fabric. S. E. p. 50. *Cetonia* 35.

Nigra pubescens, elytris disco rufo.

212. *Vericolor*, der ägyptische Rothrücken.

Fabric. S. E. p. 51. *Cetonia* 38.

Nigra, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris albo-punctatis, dorso rufo.

213. *Histrio*, der ägyptische Harlekin.

Fabric. S. E. p. 51. *Cetonia* 39.

Testacea capite, thoracis lineis duabus; elytris sutura maculisque tribus nigris.

214. *Variegatus*, die Tranquebarische Schecke.

Fabric. S. E. p. 51. *Cetonia* 40.

Atra, thorace margine elytrisque maculis sparsis albis.

215. *Hottentotta*, der kapensische Hottentottenküfer.

Fabric. S. E. p. 52. *Cetonia* 41.

Atra

Atra glabra; *elytris* postice punctis duobus albis.

216. *Miliaris*, der *indianische sechsgezähnte Kopfschild*.

*Fabric.* S. E. App. p. 818. *Melolontha*, clypeo porrecto, subreflexo, nigra, hirta; *elytris* testaceis, margine nigro.

217. *Crassipes*, der *kapensische Dickfuß*.

*Fabric.* S. E. App. p. 818. *Melolontha*, atra, albo-maculata, pedibus posticis elongatis, *crassissimis*.

218. *Rupicola*, der *kapensische Klippenkäfer*.

*Fabric.* S. E. App. p. 818. *Melolontha*, villosa, viscens, capite nigro.

219. *Vrsus*, der *kapensische Schwarze Bär*.

*Fabric.* S. E. App. p. 818. *Melolontha*, atra, hirsutissima, pedibus quatuor anticis testaceis.

220. *Signatus*, der *kapensische Zeichenkäfer*.

*Fabric.* S. E. App. p. 818. *Cetonia*, thorace nigro; margine albo; *elytris* testaceis, futura margineque nigris.

221. *Sinuatus*, der *kapensische Winkelflügel*.

*Fabric.* S. E. App. p. 819. *Cetonia*, fusco-viridis; thorace elytrisque margine punctisque duobus flavis; *elytra* obscure viridia, margine sinuato.

222. *Vittatus*, der *kapensische Bindenkäfer*.

*Fabric.* S. E. App. p. 819. *Cetonia*, viridi-aenea, hirta, *elytris* testaceis; *vitta* media nigra, futuraque aenea.

223. *Hæ-*

223. *Haemorrhoidalis*, der *kapensische Rothafters*.

*Fabric.* S. E. App. p. 819. *Cetonia*, nigra; *elytris viridibus*, nitidis, *thoracis* margine, *anque rufis*.

224. *Lugubris*, der *kapensische Trauerkäfer*.

*Fabric.* S. E. App. p. 819. *Cetonia*, glabra, atra; *elytris macula laterali anque albis*.

225. *Viridulus*, das *indianische grüne Rauchkäferchen*.

*Fabric.* S. E. App. p. 820. *Trichius*.

*Viridis*, pubescens, *an* albo bimaculato.

226. *Lineatus*, die *kapensische Schwarzlinie*.

*Fabric.* S. E. App. p. 820. *Trichius*.

*Pubescens*, thorace fulvo, nigro lineato; *elytris testaceis*, futura fulva.

227. *Triangulatus*, der *chinesische Triangelfuß*.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 36. f. 8. 9.

*Totus niger*; *capite lato*; *elytris sulcatis thorace longioribus*; *crurum articulis ex meris Triangulis compositis*.

228. *Virens*, der *chinesische Grünling*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 30. f. 3.

*Scutellatus muticus*; *capite, thoraceque luteo nigro-striato*; *elytris viridibus*, *lineis longitudinalibus nigro-punctatis*.

229. *Cordatus*, der *afrikanische Herzkufer*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 32. f. 5.

*Fusco-testaceus; thorace duabus longitudinalibus maculis nigris; elytris pluribus maculis atris cordiformibus.*

230. *Oxypterus*, der *Schnellflügel*.

*Pallas Reisen 1. Th. Anh. No. 26. Ausz. Anh. S. 10. No. 26.*

*Major Scar. hortulano; abdomine violaceo viridi-que; elytra grisea, abdomine angustiora, apice acumi-nata; tibiis profunde pectinatis.*

*Müllers Suppl. B. S. 217. No. 91. der Kurzfuss.*

231. *Abellus*, der *Weissling*.

*Pallas Reisen 1. Th. Anh. No. 27. Ausz. S. 10. No. 27.*

*Corpus atrum; clypei latera longitudinaliter late alba; elytra maculis sparsis transversis albis.*

*Müllers Suppl. B. S. 217. No. 92. der Weissling-käfer.*

232. *Vertumnus*, der *Samarische gelbbraune Früh-lingskäfer*.

*Pallas Reisen 1. Th. S. 177. Anh. No. 28. Ausz. Anh. S. 10. No. 28.*

*Magnitudo et facies Solstitialis; corpus fulvo-testaceum; thorax lana fulva.*

*B. Varietas. Simillimus, sed subtus totus et artus pallidi coloris.*

*Müllers Suppl. B. S. 217. No. 93. der Frühlings-käfer.*

233. *Albus*, der *weiße Nachtschwärmer*.

*Pallas Reisen 2. Th. Anh. No. 41.*

*Magnitu-*

Magnitudo media inter *Fullonem* et *Melolontham*; corpus totum *squamulis* minimis albis farinosum atque candidum.

*Nobilivagus*, post medium Junii apparet.

Müllers Suppl. B. S. 218. No. 94. der *weisse Käfer*.

234. *Spireae*, der *Sibirische Spierstaudenkäfer*.

Pallas Reisen 2. Th. Anh. No. 42.

Inter arboreos *minimus*; *corpore et thorace nigro cano-pubescente*; *elytris griseis pedibusque piceis*.

Müllers Suppl. B. S. 219. No. 95. der *Spierlingskäfer*.

235. *Orichalcus*, der *ostindianische Kupferkäfer*. \*)

Müllers Suppl. B. S. 216. No. 88.

*Totus glaber supra cupro-aeneus, infra ferrugineo-fuscus*.

236. *Atro-rubens*, der *Schwarzröhling*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 468.

*Rufo-piceus, nitidus, elytris striatis; tibiis anticis basin versus denticulatis*.

Akt. Nidr. IV. p. 2.

237. *Bipunctatus*, der *Zweypunkt*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 475.

*Niger muticus, thoracis angulo antico rubro; elytris striatis flavis*.

238. *Lineatus*, der *Linienkäfer*.

H 2

Mülleri

\*) Linné, sagt Herr Müller; ich kann aber nicht sagen: wo im Linné.

*Müller's Zool. Dan. Prodr.* p. 55. No. 478.

*Niger, muticus, elytris striatis punctatisque; lineolis lividis.*

*Schröters PRÄCHTKÄFER:* S. dessen Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte 1. Th. S. 335. t. 2. f. 3. ist kein *Scarabaeus*; sondern offenbar, nach seiner ganzen Stellung und übrigen Merkmalen ein *Buprestis*.

Eine *Mittelklasse* zwischen den *Scarabaeis* und *Lucanis*.

1. *Polyceros*, das *Vielhorn*.

*Pallas Reisen* 1. Th. Anh. No. 22. Ausz. 1. Th. Anh. S. 9. No. 22.

Magnitudo et facies *Stercorarii*; piceus; elytris substriatis; forcipes lati, tricuspidati, exserti ut in *Lucanis*; galea tridentata; thorax retusus, convexus, ad nucham cornuto-bidentatus. Lectus in latu falso Indierienſt.

*Müllers Suppl. B.* S. 214. das *Vielhorn*.

2. *Cephalotes*, der *Ohrenkäfer*.

*Pallas Reisen* 1. Th. Anh. No. 23. Ausz. 1. Th. Anh. S. 9. No. 23.

Magnitudo paulo supra *Chrysomelas* maxima, totus ater, glaberrimus, abdomen brevissimum, ut in *Scar. coprideis*; elytra ut abdomen brevissima; thorax convexus, antice excisus; caput maximum; forcipes exserti maximi, triquetri, supra hiulci, obtusissimi; pedes magni priores maxime dentati.

*Cum praecedente LVCANOS SCARABAEIS ad-  
nefit.*

Müllers Suppl. B. S. 214. der Ohrenkäfer.

190. GESCHLECHT. *Lucanus.*

*Feuerkäfer; Feuerschröter; Feuerwürmer; Baum-  
schröter; Kneipwürmer; Kneipschröter; Kammkäfer;  
Waldkäfer.*

Börners Samml. 1. Th. S. 458. 462: *Holzschröter;*  
*Feuerschröter.*

Beckmanns Anfangsgr. der Naturhist. S. 91. *Feuer-  
schröter; Feuerkäfer.*

Eberhards Thiergech. S. 196. *Kammkäfer.* (Pla-  
tycerus.)

Füesslins Verzeichn. schweiz. Inf. S. 3. *Kamm-  
käfer.*

Sulzers abgekürzte Gesch. der Inf. S. 18. *Kamm-  
käfer.*

Müllers Linn. Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 93. *Feuer-  
schröter.*

Lessers Theol. der Inf. S. 70. l.) 178. *Kneipwürmer;*  
*Baumschröter; Kneipschröter.*

Sicamerdamus Bibel der Nat. S. 119. *Fliegende  
Hirsch oder Stier; Feuerwurm; Schröder.*

Lyonet sur Lesser Tom. I. p. 285. les *Cerf-volans;*  
les *Vers serrans.*

Wotton de differ. animal. fol. 192. *Lucanus.*

Jonston hist. nat. Inf. p. 94. c. 3. t. 14. *Scarabaeus  
cornutus; Lucanus; Taurus.*

Mouffet Theatr. Inf. p. 148.

Platycerus; *Lucanus; Taurus; Cervus volans;*  
*Anaxθος; Ἰπποκανθάρος; Σκαραβέλαφος; Κάραβος.*

*Italis Cereti*, vulgo Potapeso;

*Gall.* Cerf-volant.

*Angl.* Stag-flie.

*Belg.* Vlieghende Hert.

*Illyr.* Gelin.

*Polon. et Slavon.* Krowka; Wielka.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 59. *Platycerus*; le Cerf-volant.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 326. *Cerf-volant*.

*Schwenkfeld* Theriotr. Siles. p. 552. *Kägæbos*; *Scarabaeus bicornis*; *Scarabaeus Lucanus*; *Scarabaeus cervus*; *Scarabelaphus*; *Taurus Fullo*; *Cervus volans*; ein gehörnter Käfer; vulgo Schröter.

1. *Cervus*, der *Hirschschröter*.

*Müllers Linn.* Naturf. 5. Th. 1. B. S. 94. No. 1.

*Füesslin* Verz. schweiz. Inf. S. 3. No. 39. der *Hirsch*; *Schröter*; *Schrötel*; *Holzschröter*.

*Fermins* Beschr. der Kolon. Surinam 2. Th. S. 266. der *Hirschkäfer*.

*Röfels* 2. B. S. 25. t. 4. 5. der *Hirschkäfer* oder *Schröter*.

*Pontoppid.* Naturg. v. D. S. 199. No. 2. *Scarab. Cervus*; *Seel.* Eegehiort; Süderjütl. Flyvehiort; Nor-derjütl. Bibelhiort; *Fühn.* Träehiort; Träefkrubbe.

*Catholicon* C. p. 174. *Cerf-volant*; der *Hirschkäfer*; *Feuerkäfer*; *Schröter*; *Hornschröter*; *Baumschröter*; *Feuerwurm*; *Kneipewurm*; *fliegende Hirsch*; *gehörnte Käfer*; *gehörnte Rosskäfer*; *Taurus volans*.\*)

*Onomatol.*

\*) Nach dem Catholicon ist das Insekt, welches die *Hottentotten* verehren, und denen Personen und Bäumen, auf welche es sich niederlässt, eine besondere Ehrfurcht bezeigten, der *Cerf-volant du Cap*, oder der *Hirschkäfer des Vorgebirgs*, dessen Kopf und Flügel goldfarbig, die Beine grau, Bauch und Rücken aber grün,

*Onomastol.* hist. nat. P. 2. p. 797.

*Cervus volans platyceros; Taurus volans; Lucanus; Scarabaeus cervinus; Scarabaeus cornutus; Scarabaeus bicornis; Cantharis cornutus; Scarabelaphus.*

Ein Schröter; Baumschröter; Hornschröter; Kneipwurm; fliegender Hirsch; Hirschläufer; gehörnter Käfer; gehörnter Rossläufer; Feuerwurm.

*Plinii* hist. nat. Lib. 2. c. 28.

*Fonston* hist. nat. Inf. t. 14. f. 1. 2.

*Imperat.* hist. nat. p. 924. f. 3. *Cervus volans.*

*Wagn.* helvet. p. 236. *Scarabelaphus.*

*Charlet.* Onomast. p. 46. *Cervus volans Platyceros.*

*Dal.* Pharmacop. p. 398. *Scarabaeus cornutus.*

*Merret.* Pin. p. 201. *Cervus volans.*

*Olear.* Mus. p. 27. t. 16. f. 5. *Taurus volans.*

*Raj.* Inf. p. 74. No. 2. *Scarabaeus maximus platyceros; Taurus nonnullis;* aliis *Cervus volans.*

*Poda* Mus. graecenf. p. 31.

*Scop.* Entom. carn. No. 1. *Lucanus cervus. Carniol.*

Rogatsch.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 405. *Scar.* *Cervus.*

*Suec.* Ekoxe; Hornoxe; Blecking. Horntroll.

*Worm.* Mus. p. 242. *Scarabaeus cornutus.*

*Schaeff.* Icon. t. 133. f. 1.

*Albrecht* Act. Acad. Curios. Vol. 6. obs. 120. p. 404. t. 5. f. 2. 3.

*Brückmanni* epist. itin. 78. de *Cervo volante*, ejusque hibernaculo.

*Schluga* prim. lin. cognit. Insect. t. 1. f. 1.

*Bomar.* Dict. P. II. p. 468.

H 4

Müller i

grün, mit Roth und Weiss gefleckt sind. Ein mehreres davon bey *Mantis Linn. precaria* No. 8.

S. hinten unter den neuen Schrötern No. 9.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 2. No. 14. *Scarabaeus Cervus.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 443. *Niger, thorace depresso, maxillis exsertis longis, apice bifurcatis, latere dentatis.*

*Fabric.* S. E. p. 1. *Lucanus 2.*

*Maxillis exsertis vnidentatis, apice bifurcatis, labio deflexo, ruga transversali elevata.*

*Geoffr.* mat. med. P. 6. p. 521-529.

— Inf. Tom. I. p. 61. *Platycerus 1. Le grand Cerf-volant.* t. 1. f. 1.

*Fuscus, cornubus duobus mobilibus, apice bifurcatis, intus ranno denticulisque instructus.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 327. No. 1. t. 12. f. 1. *Grand Cerf-volant.*

*Fusco-castaneus, maxillis maximis corniformibus rumosis, apice bifurcatis, latere vnidentatis.*

### B. *Fennina.* \*)

*Raj.* Inf. p. 75. No. 3. *Platyceros totus niger, cornubus brevibus, vnicum tantum ramum emittentibus, corpore oblongo, et velut parallelogrammo.*

*Schaeff.* Icon. t. 133. f. 2.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 62. *Platyc. 2. La grande biche.*

*Fuscus, elytris laevibus, capite laevi.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 331. t. 12. f. 7.

*Fabric.* S. E. p. 2. B.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 444. *Dorcas.*

*Niger,*

\*) Rösel hält diesen für das *Weibchen* des *Cervus*; Geoffroi aber für eine besondere Art, welches der Staatsrath Müller durch die Erfahrung bestätigt.

*Copula Dorcadum, differensque a L. Cervo structura veram species demonstrat.*

Niger, thorace convexo; maxillis exsertis brevibus, apice simplici, latere bidentatis.

2. *Capreolus*, der *Rehschröter*.

Müller l. c. S. 96. No. 2. \*)

Füesslins Verz. S. 3. No. 40. das *Rehböcklein*.

Sulzers Gesch. S. 19. t. 2. f. 1. das *Rehböcklein*. \*\*)

Jonston hist. nat. Inf. t. 14. t. 2. 2.

Fabric. S. E. p. 2. *Lucanus* 4.

Maxillis exsertis, apice tantum bifurcatis, labio ruga transversa elevata interrupto.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 336. No. 1. t. 19. f. II. 12. le *Chevrenit brun*.

Fusco-castaneus, femoribus flavis, maxillis maximis corniformibus, apice simplicibus, latere vnidentatis.

3. *Tridentatus*, der *Dreyzack*. \*\*\*)

Müller l. c. S. 97. No. 3.

It. Oeland. p. 152. Scarabaeus maxillis lunulatis prominentibus dentatis, thorace vtrinque tridentato.

4. *Interruptus*, der *Doppelschild*.

Müller l. c. S. 97. No. 4. †)

H 5

Sulzers

\*) Müller sagt: in Frankreich nenne man diesen la *Chevrette brune*; Geoffroi gedenkt auch Tom. I. p. 64. Platyc. 5. einer *Chevrette brune*, die aber nur vierthalb Linie lang ist, und hinten unter den *neuen* vorkommen wird: No. 8.

\*\*) Der Sulzersche ist wohl eher seiner Gestalt nach eine Abweichung, als Luc. *Capreolus* L. selbst.

\*\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Unmöglich kann die Angabe des Herrn Prof. Müllers von der Länge eines Achtelzolls richtig seyn, und eben so wenig glaube ich,

*Sulzers* Gesch. S. 20. t. 2. f. 2. der *Zertrennte*.

*Fabric.* S. E. p. 3. *Lucanus* 7.

*Brown* Jamaic. p. 429. t. 44. f. 7. *Dermestes*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 338. No. 2. t. 19. f. 13.

*Cerf-volant interrompu.*

Oblongus niger depresso, antennis arcuatis, capite tridentato, elytris sulcatis, thorace abdomineque remotis.

5. *Carinatus*, der *Kielträger*. \*)

*Müller* I. c. S. 97. No. 5.

6. *Parallelopipedus*, der *Balkenschröter*.

*Müller* I. c. S. 98. No. 6.

*Füesslins* Verz. S. 4. No. 41. der *Schwarze*.

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 199. No. 21. t. 16. \*\*)

*Lepechinis* Tageb. I. Th. S. 219. der *parallelepipedalische Käfer in den hohen Bäumen*.

*Schaeff.* Icon. t. 63. f. 7.

— Elem. t. 101 f. 1. *Platycerus*, *Kammkäfer*.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 76. No. 12. *Totus niger*, vnciali longitudine. *Tibiae anticae toto latere extero-dentatae*.

*Pontopp.* Atlas Dan. I. p. 666. t. 29. f. 1.

*Fabric.* S. E. p. 2. *Lucanus* 6.

*Geoffr.*

ich, dass der *Brown'sche Dermestes* der gegenwärtige *Interrupthus* sey, da der Herr von *Geer* einige von *ein-* und *dreyviertel*- andere von *ein-* und *ein Viertelzoll* lang gehabt hat, welche letztere er für die *Männchen* hält. Eben dieser Zweifel ist auch *Sulzern* aufgestossen, dessen Exemplar *zween Pariser Zoll* lang ist.

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Des *Pontoppidans Punctatus* No. 22. t. 16. ist das *Weibchen* des vorigen nach *Fabricii* Beschreibung: Alter *sexus maxillis minoribus punctoque duplii capitis prominentie*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 62. Platyc. 3. La petite biche.*

Niger; *elytris laevibus, capitis puncto duplice prominente.*

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 334. No. 2. t. 12. f. 9. Cerf-volant parallelepipedus.*

Niger, *corpore depresso, capite tuberculis duobus laevibus.*

*Müller Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 446. Dama.*

Ater, *thorace depresso; maxillis exsertis brevibus, apice bifurcatis.*

7. *Caraboides*, der *Laufkäferartige Schröter.*

*Müller l.c. S. 98. No. 7. der Käferschröter.*

*Füesslins Verz. S. 4. No. 42. der Blaue.*

*Vadmann. Diff. 40. Carabus coerulescens.*

*Schaeff. Icon. t. 6. f. 8. t. 75. f. 7.*

*Fabric. S. E. p. 3. Lucanus 8.*

*Scop. Entom. carn. No. 2. Totus punctatus, Carabiformis; maxillae porrectae, lunatae; apice truncato, 5-dentato, ut in Formicis plerisque.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 63. Platyc. 4. la Chevrette bleue. \*)*

*Violaceo-coeruleus, elytris laevibus.*

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 334. No. 3. t. 12. f. 11. Chevrette bleue.*

*Lucanus (Caprea) viridi-coeruleus nitidus depresso, maxillis magnis exsertis.*

### *Unabgebildete.*

1. No. 3. *Tridentatus.*

2. No. 5. *Carinatus.*

*Neue*

\*) Hiervon hat Geoffroi eine Varietät, die er *la Chevrette verte* nennt.

*Neue Schröterarten.*

1. *Lucanus fuscus maximus*, der größte braune Jämaische Schröter. \*)

*Drury Ins. Tom. I. t. 38. f. 1.*

2. *Tenebrioides*, der Krainische Mehlkäferartige Schröter.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 75. No. 10.*

*Thorax* antice tridentatus; *caput* antice marginatum; terminatum cornu simplici erecto curvo. Totus niger, nitens, punctatus, statura et crassitie *Tenebrioides molitoris*.

3. *Scaraboides*, der Idrische Kolbenkäferartige Schröter.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 75. No. 11.*

Statura prioris, sed fuscus; *elytra* striata non punctata; *tibiae* antice tridentatae. *Rarus.*

4. *Alces*, der grosse asiatische Schröter.

*Fabric. S. E. p. 1. Lucanus 1.*

*Maxillis exsertis, apice quadridentatis.*

*Petiv. Gazoph. t. 47. f. 15.*

5. *Elaphus*, der kleinere Virginische Schröter.

*Fabric. S. E. p. 2. Lucanus 3.*

*Maxillis exsertis vndentatis apice bifurcatis; labio deflexo conico.*

6. *Dama*,

\*) Dieses prächtige Insekt ist gleichsam eine Mittel sorte zwischen den *Lucanis* und *Cerambycibus*. Der Ritter hat es in seiner Mantissa p. 532. unter die letztern gebracht, wo wir die dazu gehörigen Schriften anführen werden.

6. *Dama*, der *virginische Pechschwarze Schröter*.

*Fabric.* S. E. p. 2. *Lucanus* 5.

*Maxillis exsertis intus bidentatis, longitudine capitis.*

Pro *femina Capreoli* habet Linn. Mus. L. V. an rechte? \*)

7. *Virescens*, der *amerikanische grüne Schröter*.

*Fabric.* S. E. App. p. 817.

*Viridi-aeneus, maxillis tridentatis.*

8. *Fuscus*, das *kleine braune Schröterchen*. \*\*)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 64. *Platyc.* 5. *la Chevrette brune*; long  $3\frac{1}{2}$  lin. lat.  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Fuscus, elytris striatis.*

9. *Capensis*, der *Hirschkäfer des Vorgebirgs*.

*Catholicon C.* p. 174. *le Cerf-volant du Cap, Hottentottengötze.* \*\*\*)

#### 191. GESCHLECHT. *Dermestes*.

*Speckkäfer; Hautkäfer; Hautfresser; Schabkäfer;* holl. *Torretjes*.

*Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 1508. Rinden-Samen- und Speckkäfer.*

*Millers Linn. Naturs. 5. Th. 1. B. S. 99. Klein-käfer.*

*Füesslin schweiz. Inf. S. 4. Schabkäfer.*

*Sulzers Gesch. S. 20. Schabkäfer.*

*Börners*

\*) Das Weibchen des *Capreoli* hat der Herr von Geer Tom. IV. p. 637. beschrieben.

\*\*) S. No. 2.

\*\*\*) S. No. 1.

Börners Samml. I. Th. S. 462. *Speckkäfer*.

Beckmauns Anfangsgr. der N. H. S. 91. *Speckkäfer*.

Eberhards Thiergeesch. S. 195. *Speckkäfer*.

Berlin. Samml. 7. B. S. 383. *Bücherfeinde*.

Fränkische Samml. I. B. S. 277.

Bomar. Dict. P. IV. p. 64.

Catholicon D. p. 188. das *Hautkäferchen*; der *Hautfresser*; der *Speckkäfer*; der *Fettkäfer*; der *nagende Käfer*; der *Fettwurm*; *Scarabé disqueur*.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 601. der *Hautfresser*.

Scop. Entomol. carn. p. 13.

Commentar. Lips. Dec. I. P. IV. p. 658. V. p. 605.

Schwenkfeld Theriotr. Siles. p. 513. *Blattae carnivoreæ; Barbegiae; Carpæ; Fleischschaben; Fleischwürmer*.

In *carnibus* nascuntur *salsis inveteratis*; primo vermes albi, dein toti *hirsuti* evadunt.

Fabric. S. E. p. 54-68. \*)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 96-108. *Dermestes*; p. 109-112. *Byrrhus*; p. 306-309. *Anthribus*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 188. *Dermestes*; p. 190. *Ips*.

### I. Lar-

\*) Fabricius hat sechs besondere Geschlechter, zu welchen er die *Dermest. Linn.* rechnet. *Apate* p. 54; *Dermestes* p. 55-58; *Bostrichus* p. 59. 60; *Byrrhus* p. 60; *Anthrenus* p. 61. *Anobium* p. 62. *Sphaeridium* p. 66-68.

Es herrscht übrigens in diesem Fach noch eine grosse Verwirrung, indem viele Schriftsteller bald dieses, bald jenes Geschlecht darunter verstehen. Was der eine *Dermestes* nennt, nennt der andere *Silpha*, *Cistela*, *Anthribus*, *Ips*, *Byrrhus*, *Ptinus*, *Eruchus*, *Bostrichus* u. s. w. Daher sagt Förster nov. spec. Inf. Cent. I. p. 10. mit Recht:

*Dermestis* genus plane confiteor esse maxime intricatum.

i. *Lardarius*, der eigentliche Speckkäfer.

Müllers Linn. Natursl. 5. Th. 1. B. S. 100. No. 1. t. 3.

f. i. das Speckkäferchen.

Füesslins Verz. S. 4. No. 43. der *Vielfrass*.

Krämer ökonom. Encyklop. 7. Th. S. 345 *Bücherfeind*.

Fränkische Samml. 1. B. S. 277. Derm. *fasciatus*, der bandirte Speckkäfer.

Naturforscher 3. St. S. 58. 61.

Preussische Sammler 1. Th. S. 492.

Pontopp. N. G. v. D. S. 199. No. 1.

Dan. Klammer. Germ. Glanner; holl. Klander; franz. Calandre. \*)

— Frisch Inf. 5. Th. S. 25. t. 9. der kleine Speckkäfer mit dem weissen Queerstrich auf den schwarzbraunen Flügeln.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 603. der kleine Speckkäfer.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 408. Suec. Aenger.

Schaeff. Elem. t. 57. f. 1. 2. *Dermestes*, Speckkäfer.

— Icon. t. 42. f. 3.

Poda Mus. graecens. p. 22.

Petr. Borellus obsl. microsc. obs. 45. p. 26. *Larva*.

Müller's Faun. Fridr. p. 2. No. 15.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 485. Dan. Klanner.

Fabric. S. E. p. 55. *Dermestes* I. \*\*)

Raj. Inf. p. 107. No. 1. *Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divisis*.

Catholi-

\*) Eigentlith bezeichnet der Franzosen ihr Calandre den *Circulio granivorus*.

\*\*) Scybala inter vorandum ex ano protrudit, concatenata pendula.

*Catholicon* D. p. 189.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 101. *Derm. 5.* *Le Dermeste du lard.*

*de Geer Inf.* Tom. IV. p. 192. No. 1. t. 7. f. 15. *Dermeste du lard.*

*Niger, elytris antice cinereis, nigro-punctatis.*

2. *Elongatus*, das *Fadenkäferchen*. \*)

*Müller* I. c. S. 100. No. 2. das *Drathkäferchen*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 409.

3. *Vundatus*, das *Wellenkäferchen*.

*Müller* I. c. S. 101. No. 3.

*Füesslins Verz.* S. 4. No. 44.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 612. der *gewässerte Hautfresser*.

*Schaeff.* Icon. t. 157. f. 7. a, 7. b.

*Catholicon* D. p. 189. das *Wellenkäferchen*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 410. D. *vndulatus*.

*Fabric.* S. E. p. 56. *Derm. 5.*

*de Geer Inf.* Tom. IV. p. 199. No. 5. *Dermeste onde*.

*Oblongus niger; elytris fastia alba dupli transversa vndulata.*

4. *Pellio*, der *schwarze weissgefleckte Speckkäfer*.

*Müller* I. c. S. 101. No. 4. der *Kirschner*; (der *Wurm, Motte* t. 3. f. 2.)

*Füesslins Verz.* S. 4. No. 45. der *Kirschner, Brodkäfer*.

*Naturforscher* 3. St. S. 58. 63.

*Frisch*

\*) Nicht abgebildet.

*Frisch* Inf. 5. Th. S. 22. t. 8. der braune Mottenwurm mit dem langhaarichten Schwanz.

*Catholicon* D. S. 189. der Kirschner.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 606. der Hautfresser mit zween weissen Punkten auf den Flügeldecken.

*Poda Mus.* graec. p. 22.

*List. Goed.* p. 276. f. 114.

*Raj.* Inf. p. 85. No. 35. *Scarabaeus parvus*, corpore brevi fusco; elytris puncto albo notatis.

*Schaeff.* Icon. t. 42. f. 4.

*Fabric.* S. E. p. 55. *Derm. 4.* Niger, elytris puncto albo.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 411. *Suec.* Mahl.

*Müller* Faun. Fridr. p. 2. No. 16.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 486.

Niger, elytris punctis albis binis, variat elytris fuscis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 100. *Derm. 4.* Le Dermeste à deux points blancs.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 197. No. 3. *Dermeste à deux points blancs.*

*D. bipunctatus*, ovatus niger, elytris singulis puncto albo.

### 5. *Capucinus*, der Zopfkäfer.

*Müller* l. c. S. 102. No. 5. der Kapuziner.

*Füesslins* Verz. S. 4. No. 47. der Kapuziner.

*Sulzers* Gesch. S. 21. t. 2. f. 5. b. c. das Kapuzkäferchen.

*Handbuch der Natur* 4. Th. S. 403.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 602. der Kapuziner.

*Schaeff.* Elem. t. 28. *Bostrichus*, Kapuzkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 59. *Bostr.* 1.

Niger, elytris abdomineque rubris, thorace emarginato retuso.

*Geoffr. Ins. Tom. I. p. 302. Bostr. I. t. 5. f. 1. Le Bostriche.*

*Niger, elytris rubris.*

6. *Muricatus*, das afrikanische Stachelkäferchen.\*)

*Müller l. c. S. 100. No. 6.*

*Beckmanns phys. oek. Bibl. 5. Th. S. 286.*

*Pallas Spicil. zool. fasc. 9. p. 6.*

*Fabric. S. E. p. 54. Apate 1.*

*Elytris reticulatis, postice retusis dentatis, thorace muricato gibbo.*

7. *Typographus*, der Borkenkäfer.

*Müller l. c. S. 100. No. 7. der Buchdrucker.*

*Füesslins Verz. S. 4. No. 48. der Buchdrucker.*

*Sulzers Gesch. S. 21. t. 2. f. 4. a. der Buchdrucker.*

*Lepechins Tageb. 2. Th. S. 202. t. II. f. 21. der Käfer mit vierzehn gezähnten Einschnitten auf den Flügeldecken,*

*Scarabaeus thorace mutico, elytris apice excavatis 14 mucronibus instructis.*

*Berlin. Samml. 8. B. S. 17.*

*Schriften der Dronth. u. Norw. Ges. 3. B. S. 345.*

*Linné Reise durch Oel. S. 31.*

*Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 611. der Bubstabenmachende Hautfresser.*

*Catholicon D. p. 189. der Buchdrucker; der Buchstabenmachende Hautfresser; der Borkenkäfer, der fliegende Wurm; der schwarze Wurm.*

*Raj. Ins. p. 100. No. 10. Scarabaeus antennis clavatis 10.*

*Act. Vpsal. 1736. p. 17. No. 6. Dermestes pubescens, elytris apice erosis.*

*Acta*

\*). Nicht abgebildet.

*Acta Acad. Scient. Suec.* 1752. p. 156. t. 3. f. II. 12.

*Fabric.* S. E. p. 59. *Bostrichus* 2.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 488.

*Fuscus*, pilosus, *elytris* striatis, postice retusis.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 193. *Ips* 1. t. 6. f. 1. 2. *Ips typographus*.

Pilosus fuscus; *elytris* postice oblique truncatis dentatis.

8. *Chalcographus*, der *Kupferstecher*.\*)

*Müller* l. c. S. 103. No. 8.

*Füesslins* Verz. S. 4. No. 49. der *Kupferstecher*.

*Catholicon* D. p. 189. der *Kupferstecher*.

*Fabric.* S. E. p. 59. *Bostrichus* 3.

9. *Micrographus*, der *Kleinschreiber*.\*\*) )

*Müller* l. c. S. 104. No. 9.

*Füesslins* Verz. S. 4. N. 50. der *Kleinschreiber*.

*Catholicon* D. p. 189. der *Kleinschreiber*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 605. der *Hautfresser mit haarichten Flügeldecken*.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 195. *Ips* 4. *Ips micrographus*.

Ferrugineus, pedibus flavis, *elytris* postice oblique truncatis dentatis.

10. *Polygraphus*, der *Vielschreiber*.†)

*Müller* l. c. S. 104. No. 10. der *Zeichner*.

*Füesslins* Verz. S. 4. No. 51. der *Geschwindschreiber*.

*Gleditsch* Forstwiss. I. Th. S. 581. der *haarige schimmelgraue Rindenküfer*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 610. der *Hautfresser mit schimmelfarbenen Flügeldecken*.

I 2

de

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nirgends abgebildet.

de Geer Ins. Tom. V. pag. 196. *Ips* 5. *Ips Polygraphe*.

Rufo-fuscus; *elytris* postice rotundatis.

II. *Piniperda*, der *Fichtenzerstörer*.

Müller I. c. S. 104. No. II. der *Waldgärtner*.

Füesslin's Verz. S. 4. No. 52. der *Kienbohrer*.

Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 505. der *fliegende schwarze Wurm*; der *haarige schwarze Fichten- und Tannenewurm*.

Catholicon D. p. 189. das *zottige Fichtenkäferchen*; der *Fichtenzerstörer*; der *Waldgärtner*; *Dermeste en deuil* \*), das *Trauerkäferchen*.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 607. der die *Fichten zerstörende Hautfresser*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 421. *Naturae hortulanus*.

Fabric. S. E. p. 60. *Bostrichus* 5.

de Geer Ins. Tom. V. p. 194. t. 6. f. 8. 9. *Ips* 2. *Destruteur du Pin*.

*Subvillosum niger nitidus*; *elytris* punctis excavatis, *antennis plantisque rufis*.

Diese von No. 5. bis No. 11. u. s. w. will Pallas Spicil. zool. fasc. 9. p. 6. nicht zu den *Dermesten* gerechnet wissen, sondern sagt: istas omnes *Ligniperdas* a victu constante appellari posse.

Ich werde einige dieses *neuen* Geschlechts gleich hinter die *Dermesten* setzen.

12, Do-

\*) Geoffroi Tom. I. p. 107. *Derm.* 19. heist auch *Dermeste en deuil*; solcher ist aber nach Fabric. S. E. p. 67. No. 3. *Silpha atomaria* Linn. No. 35.

12. *Domesticus*, das *Hauskäferchen*; das *Klopfkäferchen*; der *Tischbohrer*.

Müller l. c. S. 105. No. 12. das *Hauskäferchen*.

Fieſſlius Verz. S. 4. No. 53. der *Hauschabkäfer*.

Swammerd. B. der N. S. 120. das *Kopfklopferchen*; *Hoofdklopperkens*; *Sonicephalus*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 603. der in den *Häusern* befindliche *Hautfresser*.

Catholicon D. p. 189. der *Hautfresser in den Häusern*; das *Hauskäferchen*; la *Vrillette des Tables*, *Tischbohrer*; holl. *Kloptorretje*, *Klopfkäferchen*.

Aetia Vpsal. 1736. p. 17. No. 17. *Dermeſtes cylindraceus*; collari crasso subhirsuto; *elytris testaceis*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 20.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 489.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. III. t. 1. f. 6. \*) *Byrrhus* 1. La *Vrillette des Tables*; *Pediculus pulsatorius*; *Horloge de la mort*; *Horologium mortis*.

*Testaceo-niger*; *thorace subhirsuto*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 196. *Ips* 6. *Ips domestique*.

Niger, *elytris griseis*, *margine nigris*; *thorace villoſo*.

Thom. Brown *effai sur les erreurs populaires* T. I. chap. 7. p. 219.

L'animal, qui fait ce bruit, est un petit Inſecte gris, qui a des ailes doublées ou envelopées, et qu'on trouve pendant l'été dans les *Lambris*, ou autres ouvrages de *Menuiserie*. J'en ai pris un grand nombre, et les ayant enfermés en des boîtes très minces, je les ai vu heurtrer avec leur petite *trompe* les cotés de la boîte, à peu près comme l'*Apicus martius* ou le *Grimpereau*

\*) Nach dem Linné ist die sogenannte *Todtenuhr* *Termes pulsatorium* p. 1015. gen. 263. No. 2.

contre un arbre. Il est plus actif pendant les chaleurs, et frappe d'ordinaire *neuf ou onze* coups de suite.

13. *Violaceus*, der *Violetblaue Hautfresser*.

*Müller* l. c. S. 105. No. 13. der *Todtenfreund*.

*Fließlins* schweiz. Inf. S. 4. No. 54. der *blaue*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 612. der *violette Hautfresser*.

*Rajus* Inf. 100. No. 12. *Scarabaeus antennis clavatis* 12.

*Scopol.* Entom. carn. No. 51. *Violaceus*; thorace elytrisque villofisi. An idem?

*Fabrit.* S. E. p. 57. *Dermestes* 10.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 487. *Coeruleus*, thorace villoso; elytris striatis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 304. *Clerus* 2. *Le Clairon bleu*. *Clerus nigro-coeruleus*.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 163. No. 4. t. 5. f. 13. *Clairon bleu*.

*Clerus* \*) *coeruleus*, oblongus nigro-coeruleus nitidus; elytris punctis excavatis.

14. *Hirtus*, das *Rauchkäferchen*.\*\*)

*Müller* l. c. S. 106. No. 14. das *Bärenkäferchen*.

*Catholicon* D. p. 189. das *Bärenkäferchen*.

*Fabrit.* S. E. p. 70. *Hispa* 4. Antennis serratis, atra, hirta.

15. Fe-

\*) Aus einigen Käfern, welche *Linné Altelabos*, (Bienenkäfer, Afterrüsselkäfer) nennt, hat der Herr von Geer mit *Geoffroi* ein eigenes Geschlecht gemacht, und solche *les Clairons*; *Cleros* genannt.

\*\*) Nicht abgebildet.

15. *Fenestralis*, der *Fenstergucker*.\*)

Müller l. c. S. 106. No. 15.

Eüesslins Verz. S. 4. No. 55. der *Fenstergucker*.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 443. *Chrysomela fusca*; capite nigricante.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 19.

— Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 505. *Byrrhus fenestratus*, castaneus, elytris punctato-striatis, oculis nigris.

Fabric. S. E. p. 58. *Dermest*. 19.

de Geer Inf. Tom. V. p. 197. *Ips* 7. *Ips epineux*.

*Ips spinosus* fusco-castaneus, pedibus rufis, elytris postice sex-spinosis.

16. *Melanocephalus*, der *Schwarzkopf*.\*\*)

Müller l. c. S. 106. No. 16.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 605. der *Hautfresser mit einem schwarzen Kopf*.

Fabric. S. E. p. 67. *Sphaeridium* 4.

Atrum glabrum; elytris griseis: macula communis baseos nigra.

17. *Scarabaeoides*, der *Erdkolbenkäferartige Hautfresser*.

Müller l. c. S. 106. No. 17. der *Distelfuß*.

Catholicon. D. p. 189. das *scharrkäferähnliche Fleischkäferchen*.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 611. der *einem Skarabaeus gleichende Hautfresser*.

Scop. Entom. carn. No. 36. das *Cervellatwurftkäferchen*.

Fabric. S. E. p. 66. *Sphaeridium* 1.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 494. Ovatus, niger, glaber, elytris maculis duabus rubris.

I 4 Geoffr.

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 106. Dermest. 17. Le Dermeste à quatre points rouges sans stries.*

*Niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris laevibus, subrotundus.*

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 345. t. 12. f. 17. Escarbot d'ecaille.\*)*

*HISTEK (testudinarius) ovatus niger, glaber, pedibus fuscis; elytris antice macula rubra postice fulva.*

### 18. *Murinus*, das *Mauskäferchen*.

*Müller I. c. S. 107. No. 18.*

*Frisch Inf. 4. Th. S. 34. t. 18. der schwarze glatte Fettewurm.*

*Catholicon D. p. 189. das wollichte braun- und aschgraugewölkte Speckkäferchen.*

*Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 605. der mausfarbene Fettewurm.*

*Pontopp. N. G. v. D. S. 199. No. 8.*

*Acta Vpsal. 1736. p. 17. No. 9. Dermestes oblongus; elytris murinis vix striatis.*

*Schaeff. Icon. t. 42. f. 1. 2.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 21.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 495. Ovato-oblongus, niger, tomentosus, *abdomine piceo*.

*Fabric. S. E. p. 56. Dermestes 7.*

Oblongus, tomentosus, nigro-alboque *nebulosus*; *abdomine niveo*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 102. Derm. 7. Dermeste à écuissone chaune.*

*Laevis, niger, *cinereo-nebulosus*, scutello luteo.*

*de Geer Inf. T. IV. p. 197. Derm. 2. Dermeste nebuleux.*

D. (*nebulosus*) niger, *cinereo-nebulosus*, corpore subtus albido cinerascente, scutello hirsuto rufo.

19. Pa-

\* Der *Hister* Linn. ist des *Geoffroi Attelabus*; *Escarbot*.

19. *Paniceus*, der *Brodfresser*.

Müller I. c. S. 107. No. 19.

Füesslins Verz. S. 4. No. 56. *Brodfresser*.

Berlin. Samml. 7. B. S. 387. 391. der *braungelbe Brodkäfer*.

Krünitz oekon. Encyklop. 7. Th. S. 336. der *eigentliche Bücherfeind*; der *Kleisterfresser*.

Frisch Inf. 2. Th. S. 36. t. 8. der *kleine gelbe Brodkäfer*.

Catholicon D. p. 189. der *Kleisterkäfer*; der *Papierkäfer*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 606. der *sich vom Brod nährende Fettkäfer*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 23.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 490. *Ferrugineus*, *oculis rufis*.

Fabric. S. E. p. 57. *Derm.* 14.

20. *Eustadius*, das *Schwammkäferchen*.

Müller I. c. S. 107. No. 20.

Onomiatol. hist. nat. P. 3. p. 603. der *Hautfresser von der Insel Eustat in Amerika*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 197. t. 15. f. 20. 21. *Ips exot. 1. Ips d'Eustache*.

— Niger nitidus, punctis minimis excavatis, *pedibus rufo-fuscis*, *capite sub thorace recondito*.

21. *Ferrugineus*, das *Rostkäferchen*.\*)

Müller I. c. S. 107. No. 21.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 25.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 498. *Ferrugineus*, *semicylindricus*, *elytris abbreviatis*.

\*) Nirgends abgebildet.

*Fabric. S. E. p. 77. Nitidula 3.*

*Ovata, thorace marginato, ferruginea, capite fusco.*

22. *Fumatus*, das *Rauchkäferchen*.\*)

*Müller l. c. S. 108. No. 22.*

*Füesslins Verz. S. 4. No. 57. der Mistschabkäfer.*

*Pontopp. N. G. v. D. S. 199. No. 11. Stercoreus.*

*Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 611. der sich in Koth aufhaltende Hautfresser.*

*Scop. Entom. carn. No. 39. Dermestes Rosae. Ovatus, ferrugineus, villosus, oculis nigris.*

*Fabric. S. E. p. 57. Dermestes 12.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 24. Derm. stercoreus.*

*Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 432. Derm. stercoreus.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 104. Derm. 12. Dermeste du fumier.*

*de Geer Inf. Tom. T. p. 195. Ips 3. Ips du fumier.*

*Testaceo-flavus, oculis nigris elytris punctis excavatis.*

23. *Pedicularius*, das *Laufkäferchen*.\*\*) )

*Müller l. c. S. 108. No. 23.*

*Füesslins Verz. S. 4. No. 58. der Stutzschabkäfer.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 26.*

*— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 497.*

*Flavus, oblongus; elytris abdomine acuto brevioribus.*

*Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 411. Chrysomela dilute testacea, hemiptera.*

24. *Pis.*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

24. *Pulicarius*, das Flohkäferchen.\*)

Müller l. c. S. 108. No. 24.

Füesslin Verz. S. 4. No. 59. der Springer.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 793. No. 30. der kleinste schwarze Blumenfloh.

Acta Vpsal. 1736. p. 16. No. 7. *Scarabaeus minimus ater florilegus*.

Raj. Inf. p. 108. No. 29. *Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divisis.*

Catholicon D. p. 189. der Blumennager.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 611. der gleich einem Floh hüpfende Hautfresser.

Pontopp. N. G. v. D. S. 200. No. 12.

Fabric. S. E. p. 68. *Sphaeridium 9.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 27.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 496.

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 308. No. 4. *Antribe des fleurs.*

Niger; *elytris abdomine brevioribus.*

25. *Psyllius*, der Flohsaame.\*\*)

Müller l. c. S. 108. No. 25.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 610. der Blumenhautfresser.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 28.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 492.

Ovatus, niger, *abdomine obtuso; thorace elytrisque marginatis.*

26. *Scanicus*, der Hautfresser mit dem braunen Brustschild.†)

Müller

\*.) Nirgends abgebildet.

Einerley mit Linn. *Silpha pulicaria* No. 33.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

*Müller* l. c. S. 109. No. 26. der *Schwede*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 611. der *Hautfresser aus Skanien*.

*Fabric.* S. E. p. 58. *Dermestes* 18.

*Ater, thorace puncto que elytrorum testaceis.*

*Müller* Faun. Fridr. p. 4. No. 29.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 491.

*Fuscus; thorace testaceo.*

27. *Colon*, das *Kolonkäferchen*.\*)

*Müller* l. c. S. 109. No. 27.

Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 192. das *Kolonkäferchen*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 602. der *Hautfresser mit gelben Seiten an dem Brustschild*.

28. *Niger*, das *Mohrkäferchen*.\*\*)

*Müller* l. c. S. 109. No. 28.

*Fabric.* S. E. p. 62. *Anobium* 4.

*Scop.* Entom. carn. No. 131. *Cantharis pilosa*.

*Nigra, longis pilis ubique pubescens, antennis extrorsum crassioribus.*

29. *Surinamensis*, der *Surinamische gestreifte Speckkäfer*.†)

*Müller* l. c. S. 109. No. 29. der *Surinamer*.

*Lepechins* Tageb. 1. Th. S. 262. der *Surinamische Speckkäfer*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 611. der *Surinamische Hautfresser*.

30. *He-*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

20. *Hemipterus*, die halbe Flügeldecke.

Müller l. c. S. 110. No. 30. der *Halbdecker*.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 603. der *Hautfresser*.  
mit halbharten Flügeldecken.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 224. No. 3. t. 18. f. 8. *Dermeste à équis courts*.

Nigro-fuscus; elytris abbreviatis pallide griseis,  
*fascia transversa vndulata nigra*, pedibus rufis.

*Unabgebildete Speckkäfer.*

1. No. 2. *Derm. Elongatus*.
2. No. 6. *Muricatus*.
3. No. 8. *Chalcographus*.
4. No. 9. *Micrographus*.
5. No. 10. *Polygraphus*.
6. No. 14. *Hirtus*.
7. No. 15. *Fenestralis*.
8. No. 16. *Melanocephalus*.
9. No. 21. *Ferrugineus*.
10. No. 22. *Fumatus*.
11. No. 23. *Pedicularius*.
12. No. 24. *Pulicarius*.
13. No. 25. *Psyllius*.
14. No. 26. *Scanicus*.
15. No. 27. *Colon*.
16. No. 28. *Niger*.
17. No. 29. *Surinamenensis*.

*Neue Dermestesarten.*

1. *Carnivorus*, der *neuseeländische Fleischfresser*.

Fabric. S. E. p. 55. *Dermest. 2.*

*Niger*, elytris antice testaceis *abdomine albo*.

2. *Cadaverinus*, das *Aaskäferchen von der Insel Helena*.

*Fabric.* S. E. p. 55. *Dermest.* 3.

*Niger*, ore ferrugineo.

3. *20-guttata*, der *hallische Zwanzigtropfen*.

*Fabric.* S. E. p. 56. *Dermest.* 6.

*Oblongus*, ater, punctis viginti albis.

4. *Tessellatus*, das *englische gewürfelte Speckkäferchen*.

*Fabric.* S. E. p. 56. *Derm.* 8.

*Oblongus*, tomentosus, fusco-cinereoque nebulosus, abdomine fusco.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 102. *Dermest.* 8. Le *Velours jaune Flavesiens*, pilosus, oculis nigris.

5. *Navalis*, der *neuseeländische Schiffss-Speckkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 56. *Dermest.* 9.

*Elongatus*, ferrugineo-fuscus, oculis atris.

6. *Ruficollis*, der *ostindische Rothhats*.

*Fabric.* S. E. p. 57. *Dermest.* 11.

*Violaceus*, thorace elytrorumque basi rufis.

7. *Tomentosus*, das *englische Muffkäferchen*.

*Fabric.* S. E. p. 57. *Dermest.* 13.

*Oblongus*, villosus, griseus, capite punctis duobus fuscis.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 199. No. 4. t. 7. f. 18. *Dermeste velu*.

*Tomentosus oblongus*, villosus, griseo-murinus, oculis nigris pedibus fulvis.

8. *Testa-*

8. *Testaceus*, das holländische muschelbraune Speckkäferchen.

*Fabric.* S. E. p. 57. *Dermest.* 15.

*Oblongus*, *testaceus*, *oculis abdominalisque basi nigris.*

9. *Scaber*, der naseeländische Hökerflügel.

*Fabric.* S. E. p. 57. *Dermest.* 16.

*Gryseus*, *thorace elytrisque scabris.*

10. *Chinenis*, der Chinesische Saamenkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 58. *Dermest.* 17.

*Oblongus*, *ferrugineus*; *elytris striatis.*

11. *Scolytus*, das Kolbenkäferchen.

*Sulzers Gesch.* S. 21. t. 2. f. 13. k.

*Schaeff.* Icon. t. 112.

12. *Scolytus Geoffroi*, Geoffrois Kolbenkäferchen.

*Fabric.* S. E. p. 59. *Bostrichus* 4.

*Glaber*, *elytris truncatis integris, abdomine retuso.*

*Geoffr.* Ins. Tom. I. pag. 310. No. 1. t. 5. f. 5. le  
Scolite.

*Müller's Zool. Dan. Prodr.* p. 57. No. 503. *SCOLYTUS punctatus* niger, thorace fossulato; *elytris lineis quatuor elevatis, intervallo punctorum duplice serie.*

13. 4-punctatus, Sulzers vierpunktirter Speckkäfer.

*Sulzers Gesch.* S. 21. t. 2. f. 3.

*Füesslins Verz.* S. 4. No. 46. der Vierpunkt.

14. *Fasciatus*, der gelbgestreifte Speckkäfer.<sup>\*)</sup>

Mülleri Faun. Fridr. p. 4. No. 29.

Niger, elytris *fascia* longitudinali flava.

15. *Carbonarius*, der Köhler.

Scop. Entom. carn. p. 15. No. 38. *Totus niger, clavae articulus quilibet pilum ex latere proferens.*

16. *Variegatus*, der buntgescheckte Speckkäfer.

Scop. Entom. carn. No. 41. *Nigro-albo-rubroque varius, in floribus Chaerophylli.*

17. *Cellaris*, der Kellerspeckkäfer.

Scop. Entom. carn. No. 42. *Rufus, oculis fuscis; thorace dentato.*

In cellis vinariis ad *cavos cylindros*, vnde vinum educitur, non rarus.

18. *Boleti*, der Speckkäfer auf dem Löcherschwamm.

Scop. Entom. carn. No. 44. *Niger, villosulus, punctulatus, oblongus; maxillis exsertis, incurvis, apice bidentatis.*

19. *Brassicae*, das Kohlspeckkäferchen.

Scop. Entom. carn. No. 45. *Atro-coeruleus, lucidus, punctatus; pedibus subrufis, in floribus Brassicae oleraceae.*

20. *Ciliatus*, das Speckkäferchen mit einem Augenhaar.

Scop. Entom. carn. No. 46. *Fuscus, thorace basi deflexo; oculis unico pilo ciliatis.*

21. *Leptu-*

<sup>\*)</sup> S. No. 31.

21. *Lepturoïdes*, das *Lepturenartige Speckkäferchen*.

*Scop. Entom. carn. No. 47. Elytris truncatis; tibiis posticis ciliatis.*

22. *Lepturoïdes rufus*, das *ungarische röthliche Speckkäferchen*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 87. No. 35.*

*Rufus, thoracis lateribus parallelis marginatis; elytra rufa, striata.*

23. *Lycoperdi*, das *Staubschwammspeckkäferchen*.

*Scop. Entom. carn. No. 48. Villosus, thorace fusco; elytris castaneis.*

24. *Calthae*, das *Schmalzblumen-Speckkäferchen*.

*Scop. Entom. carn. No. 49. Fuscus, punctatus nitens; abdominis apice pedibusque ferrugineis.*

25. *Coerulescens*, das *himmelblaue Speckkäferchen*.

*Scop. Entom. carn. No. 50. Atro-coeruleus; thorace laevi, pedibus rufis.*

26. *Plicatus*, das *Falten-Speckkäferchen*.

*Scop. Entom. carn. No. 52. Fuscus, elytris obiter striatis; plica frontali transversa bifida, inter antenas collocata.*

27. *Punctatus*, das *punktirte Speckkäferchen*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 87. No. 32. Niger, elytro singulo punctis octo albis.*

28. *Spinipes*, der *Dornfuss*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 87. No. 33. Niger, ovatus, femoribus rufis, spinosus.*

29. *Pulvinatus*, das *Speckkäferchen mit einem runden polsterförmigen Brustsilde*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 87. No. 34.*

*Thorax subrotundus, pulvinatus, elytrum rufum, marginibus lineaque media longitudinali nigris.*

30. *Rufipes*, der *Rothfuß*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 88. No. 36.*

*Oblongus, niger, nitens; antennarum clavae, palpi, pedes, rufo colore tincti.*

31. *Fasciatus*, das *Idrische schwarz bandirte Speckkäferchen.\**

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 88. No. 37.*

*Oblongus, niger; elytris castaneis, fascia nigra.*

32. *Silphoides*, das *silphenähnliche Speckkäferchen*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 89. No. 38.*

*Oblongus niger; elytris plicatostriatis, seriebus binis punctorum impressorum intra singulas lineas.*

33. *Bifasciatus*, der *Speckkäfer mit zwei Banden*.

*Lepechin Tageb. 2. Th. S. 206. t. 10. f. 3.*

*Ater; elytris flavis; fasciis duabus nigro-coerule-scentibus denticulatis.*

34. *Capucinus*, der *schwarzbäuchige Kapuziner*.

*Lepechin Tageb. 2. Th. S. 207. t. 11. f. 31.*

*Dermestes exacte Capucinum Linnei referens, ex-cepto abdome in nostro nigro.*

35. *Leptu-*

\*<sup>)</sup> S. No. 14.

35. *Leptularius*, der *Federwurm*.\*)

von *Gleichen* Neuestes im Reiche der Pflanzen. Anh.

S. 21. t. 9.

*Neue Berlin. Mannichfalt.* 3. Jahrg. S. 640. f. 1-7.

*Nigricans, pilosus, coleopteris maculis albis binis;*  
*in plumis detritis.*

36. *Boleti versicoloris*, der *Fettkäfer an dem bunten Löcherschwamm*.

Franz von Paula Schranck Beytr. zur Naturgesch.

S. 49. t. 2. f. 21. t. 3. f. 1.

*D. thorace marginato.*

37. *Bipunctatus*, der *Fettkäfer mit zween Brandpunkten*.

Paula Schranck Beytr. S. 61. §. 1.

*Oblongus niger; thoratis apicibus ferrugineis; statuta D. Linn. violacei.*

38. *Glaber*, der *ganz glatte Speckkäfer*.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 493. *Ovatus niger, elytris apice, pedibusque brunneis.*

39. *Iesuita*, der *Iesuit*.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 494.

*Oblongus niger, segmentis abdominis, ciliis albis.*

40. *Vernalis*, der *Frühlings-Speckkäfer*.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 500.

*Oblongus, glaber, fuscus, antennis tarisque flavis.*

K 2

41. *Sali-*

\*) vergl. Frisch 1. Th. S. 36. t. 10. der *raue Fleisch- oder Speckwurm*.

41. *Salicinus*, der *Weiden-Speckkäfer*.

*Müller* Zool. Dan. Prod. p. 57. No. 501. *Cylindraceus niger*, *pedibus brunneis*.

42. *Nebulosus*, der *ausgeblasste Speckkäfer*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 101. No. 6. le *Dermeste effacé*.

*Nigro-fuscus*, *elytris* autice pallidioribus *nebulosis*.

43. *Linearis*, das *schmale gestreifte Speckkäferchen*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 103. No. 9. le *Dermeste levrier à stries*.

*Oblongus fuscus*; *elytris striatis*.

44. *Punctato-striatus*, das *schmale punctirtgestreifte Speckkäferchen*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 103. No. 10. le *Dermeste levrier pondué et strié*.

*Oblongus ferrugineus*, *elytris punctato-striatis*.

45. *Auritus*, der *geöhrte Speckkäfer*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 103. No. 11. le *Dermeste à oreilles*.

*Tentaculis ante oculos antenniformibus mobilibus*.

46. *Cristatus*, der *Federbusch-Speckkäfer*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 104. No. 13. le *Dermeste panaché*.

*Nigro-fuscoque nebulosus*; *elytris vix striatis*.

47. *Costatus*, das *Rippenförmig gestreifte Speckkäferchen*.

*Geoffr.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 105. No. 14. le Dermeste à côtes.*

Nigro-fuscoque nebulosus; thorax elytrisque profunde striatis punctatisque.

48. *Gagates*, das schwarze achatfarbige Speckkäferchen.

*Geoffr. Inf. T. I. p. 106. No. 18. le Dermeste jayet.*

Niger, subrotundus, elytris laevibus.

49. *Antennulatus*, das langhörnige Speckkäferchen.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 107. No. 20. le Dermeste noir à longues antennes.*

Niger, subrotundus; elytris laevibus; antennis thorace longioribus.

50. *Fulvipes*, der Gelbfuß.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 108. No. 21. le Dermeste à pattes fauves.*

Niger, oblongus; elytris punctatis, pedibus fulvis.

51. *Pellucidus*, das durchsichtige Speckkäferchen.

*Geoffr. Inf. p. 108. No. 22. le Dermeste à étuis transparents.*

Elytris corneis pellucidis; thorace obscuriore.

52. *Fornicatus*, der gewölbte Speckkäfer.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 216. No. 9. t. 8. f. 15. *Dermeste vouté.*

Fuscus obscurus; corpore ovato laevi fornicato; antennis longissimis; clava subulata.

53. *Atomarius*, das *Atomen-Speckkäferchen*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 218. No. 10. t. 8. f. 16-19.

*Dermeste atome*.

Ovatus, *minutissimus* nigro fuscus; antennis corporis dimidio longitudine; apice hirsutissimis.

54. *Armadillus*, der *gepanzerte Speckkäfer*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 220. No. 11. t. 8. f. 21. 23.  
*Dermeste armadille*.

Minutissimus ovatus niger nitidus; *thoracis* marginibus pedibusque rufo-fuscis pallidis.

*Naturforscher* 8. St. S. 68. der *Panzerkäfer*.

55. *Ater*, der *schwarze Surinamische Speckkäfer*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 223. No. 1. t. 18. f. 7. *Dermeste noir*.

Ovatus nigro-fuscus; antennis rufis.

56. *Maculatus*, der *Surinamische gefleckte Speckkäfer*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 223. No. 2. *Dermeste ta-cheté*.

Ovatus fuscus; *thoracis* lateribus cinereis, abdome subtus albo nigroque *maculato*; antennis rufis.

*Neues*, den *Dermesten* ähnliches *Geschlecht*.

*Ligniperda*; *Perce-bois*, *Holzverderber*; *Holzbohrer*.\*)

I. *Tere-*

\*.) Mehrere zu diesem Geschlecht gehörige Arten hat de Geer Tom. V. p. 191. unter dem Namen *Ips*. Was die Alten unter *Ips*, *Thrips*, *Cis*, *Midas*, *Trox* verstanden haben: davon siehe Schwenckfeld Theriotr. Siles. p. 560.

1. *Terebrans*, der *antiguaische Holzbohrer*.

*Pallas* Spicil. Zool. fasc. 9. p. 6. 7. t. 1. f. 3.

*Cylindricus*; *thorace* subgloboſo, *capite* ſcabro; *antennis* brevibus; *palpis* exiguis; *maxillis* acutis; *elytris* marginatis integris; *pectus* ferrugineo-hirſtum; *pedes* parvi, postici breviores.

2. *Cornutus*, der *gehörnte Holzbohrer*.

*Pallas* Spicil. Zool. fasc. 9. p. 8. t. 1. f. 4.

*Magnitudo Capucini*; *caput* ore hirſtuto; *antennae* filiformes; *thorax* globosus, dentatus, mucronatus, *elytra* ſubpurpuradentia.

*Dermestoides*, das *afrikanische dermefesartige neue Inſekt*.

*Erxleb.* physikal. Bibl. 2. B. S. 220.

In Nucibus arboris *Cocos*. Coleoptera Dermestidi proxima.

CISTELA, *Fugenkäfer*.\*)

*Eberhard's Thiergesch.* S. 195. *Kegelkäfer*.

*Sulzers Gesch.* S. 26. *Fugenkäfer*.

*Füeſſlins Verz.* S. 5. *Fugenkäferchen*.

*Schaeff. Elem.* t. 45. f. 1. *Kegelkäfer*.

*Fabric.* S. 1. p. 116.

*Forſteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 12.\*\*)

:*Geoffr.* Inf. I. p. 115. la *Cistela*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 189.†)

K 4

I. Or.

\*) Zu diesem Geschlecht gehören viele *Linnéische Chrysomelen*.

\*\*) In *Cistelis* mortuis aut taotis pedes intra foveolam abdominalis plicati, adpressique, et tarsi in fossulam tibiarum recipiuntur.

†) Die *Cistelas* des *Geoffroi* rechnet der Herr von *Geer* zu seinen *Dermesten*.

1. *Ornata*, das gezierte Fugenkäferchen.*Füesslins Verz.* S. 5. No. 65.*Sulzers Gesch.* S. 27. t. 2. f. 12.*Ovata, obscure-fusca, multisque hilare-testaceis  
striis maculisque variegata.*2. *Fasciata*, der bandirte Fugenkäfer.\*)*Füesslins Verz.* S. 5. No. 66. *Forsters Fugenkäferchen.*\*\*)*Forsteri nov. sp.* Inf. Cent. I. p. 12. No. 12. *Fasciata.**Subvillosa fusca; fasciis longitudinalibus nigrican-*  
*tibus interruptis.**Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 116. No. 1. t. 1. f. 8. *la Cistela  
satinée.**Subvillosa viridescens, fasciis longitudinalibus fu-*  
*scis interruptis.**Schaeff.* Icon. t. 95. f. 3.*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 58. No. 513. *Cistela  
Pilula*, ovata, nigra, subtomentosa. *Ist.* Guldvorta.*Fabric.* S. E. p. 116. *Cistela* 1. †)*Cervina*, livida, pedibus fuscis.3. *Pustulata*, das blatterichte Fugenkäferchen.*Füesslins Verz.* S. 5. No. 67. *Geoffrois Fugenkäf-*  
*erchen.* ††)*Forsteri*\*) Dieses Käferchen ist des *Linnei* *Byrrhus Pilula* p. 568. No. 4.  
wie der Herr von *Geer* Tom. 4. pag. 213. *Dermest.* 8. gezeigt,  
und dabey eben diese Citata des *Geoffroi* und *Schaeffer* ange-  
führt hat.\*\*) *Forster* hat noch mehrere *Cistelas*, warum sollte ich diesen  
vorzüglich *Forsters Fugenkäfer* nennen.†) Diese *Geoffroische Cistela satinée* führt *Fabric.* 1. c. bey seiner  
*Cistela cervina* an, und behauptet, es sey des Linn. *Chrysomela  
cervina* p. 602. No. 115. Welche *Verwirrung!*††) Warum *Geoffrois Fugenkäferchen*, da derselbe drey Arten be-  
schreibt?

*Forsteri* nov. spec. Inf. Cent. I. p. 13. No. 13. Ovata nigra, macula *elytrorum* rufa, vndata.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 116. No. 2. *Cistele à bande.*

Subvillosa atra, *fascia* *elytrorum* transversa aurato-fusca.

4. *Nigro-nitida*, das *schwarzglänzende Fugenkäferchen*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 117. No. 3. la *Cistele noire lisse.*

Nigra, nitens, glabra.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 14. No. 14. *C. nigra.*

Ovata, nigra, nitens glabra.

5. *Striata*, das *gestreifte englische Fugenkäferchen*.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 15. No. 15.

Obovata nigra, *elytris* *striatis*.

6. *Sericata*, das *englische Seidenfugenkäferchen*.

*Forsteri* Inf. nov. sp. Cent. I. p. 16. No. 16.

Ovata, fusco-viridis, *elytrorum* *fasciis* longitudinalibus interruptis.

7. *Stoica*, das *Fugenkäferchen mit rothem After*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 514.

Ovata, nigra, *abdomine ferrugineo*.

8. *Nitens*, das *messingglänzende Fugenkäferchen*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 515.

Ovata, *oricalica*; *abdomine pallido*.

9. *Livida*, das *grüngelbliche feuerländische Fugenkäferchen*.

*Fabric.* S. E. p. 116. *Cistela* 2.

*Livida, antennis fuscis.*

10. *Testacea*, das *muschelbraune nördliche europäische Fugenkäferchen*.

*Fabric.* S. E. p. 116. *Cistela* 4.

*Nigra, thorace, elytris abdomineque testaceis.*

11. *Analis*, der *Tranquebarische Schwarzafter*.

*Fabric.* S. E. p. 117. *Cistela* 6.

*Rufescens, antennis macula elytrorum, anoque nigris.*

12. *Pallida*, das *bläsfahle englische Fugenkäferchen*.

*Fabric.* S. E. p. 117. *Cistela* 8.

*Pallida, capite elytrorumque apicibus fuscis.*

13. *Aeruginea*, das *afrikanische roßfärige Fugenkäferchen*.

*Fabric.* S. E. p. 117. *Cistela* 9.

*Flava, capite pectoreque nigris, elytris viridibus.*

14. *Innuba*, das *amerikanische bandirte Fugenkäferchen*.

*Fabric.* S. E. p. 117. *Cystela* 10.

*Nigra, thorace rufo, elytris nigris margine vitta que luteis.*

15. *Melanocephala*, der *amerikanische Schwarzkopf*.

*Fabric.* S. E. p. 118. *Cistela* 11.

*Thorace flavo, elytris pallidis vitta media nigra.*

16. *Quin-*

16. *Quinquevittata*, das karolinische fünfbandirte Fugenkäferchen.

Fabric. S. E. p. 118. *Cistela* 12.

*Testacea, elytrorum marginibus vittaque media nigris.*

192. GESCHLECHT. *Ptinus. Bohrkäfer.\*)*

Müllers Linn. Naturf. 5 Th. I. B. S. III. *Bohrkäfer.*

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 4. *Bohrkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 21. *Bohrkäfer.*

Neuer Schauplatz der Natur I. B. S. 902. *Bohrkäfer.*

Naturforscher 8. St. S. 62.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 700. *Bohrkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 64. *Ptilinus; la Panache;*  
p. 108. *Byrrhus; la Vrillette.*

de Geer Inf. Tom. IV. p. 224. *Vrillette*

I. *Pectinicornis*, der *Federkamm*:\*\*)

Müller I. c. p. III. No. 1. t. 3. f. 3.

Füesslins Verz. S. 4. No. 60. *Federkamm.*

Sulzers Gesch. S. 22. t. 2. f. 6. *Federkamm.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 412.

*Dermestes pectinicornis.*

*Ono.*

\*) Dieses Geschlecht ist lange genug mit den *Dermestibus*, *Cassidis* (Schildkäfern) und *Cerambycibus* (Holzböcken) verwechselt worden, bis ihm Geoffroi sein Recht gegeben, und daraus ein eigenes Geschlecht gemacht hat, so er *Byrrhus* nennt. Linné ist ihm darin gefolgt, nur mit dem Unterschiede, dass er es *Ptinus* nennt.

\*\*) Linn. Citat. Geoffr. I. *Ptinus* 2. ist falsch, und muss heißen *Ptilinus* 1. denn der *Ptilinus* 2. des Geoffr. p. 66. *la Panache jaune* mögte wohl des Linn. *Cantharis pectinicornis* p. 650. No. 20. seyn.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 606. der *strahlförmige Fettkäfer*.

*Müller* Faun. Fridr. p. 3. No. 17.

— Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 874.

*P T I L I N V S cylindricus*, niger, *antennis pedibus rufis, abdome elytrisque fuscis.*

*Fabric.* S. E. p. 70. *Hispa* 3. *Antennis pectinatis, fusca, pedibus luteis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 65. *Ptilinus* 1. la *Panache brune.* Atro-fuscus, thorace convexo, *pedibus antennisque pallidis.*

## 2. *Pertinax*, der *Trotzkopf*.

*Müller* I. c. S. 112. No. 2. t. 3. f. 4. der *Holzbohrer*.

*Füesslins* Verz. S. 4. No. 61.

*Beckmanns* Anfangsgr. S. 91. der *halsstarrige Speckkäfer*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 2. p. 666. P. 3. p. 607. P. 6. p. 700. *Cassida nigra* etc. der *schwarze Schildkäfer mit borstenähnlichen Fühlhörnern*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 384.

*Cassida nigra*, *antennis setaceis.*

— — — ed. 2. No. 414. *Dermestes fuscus*, *antennis filiformibus.*

*Fabrit.* S. E. p. 62. *Anobium* 1.

*Fuscum* *immaculatum.*

*Acta Upsal.* 1736. p. 17. No. 5. *Dermestes* *corporē oblongo; elytris striatis; capite clypeato.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 504.

*Byrrhus pertinax*, niger, *elytris striato-punctatis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 112. *Byrrhus* 4. la *Vrillette Savoyarde.*

*Totus nigro-fuscus.*

de Geer Inf. Tom. IV. p. 227. No. 1. t. 8. f. 24. 25.  
*Vrillette opiniâtre.*

Nigro-fuscus; *elytris striatis, thorace ad angulos macula fulva.*

3. *Mollis*, der *Weichschild*.

Müller I. c. S. 112. No. 3.

Füesslins Verz. S. 4. No. 62. *Weichschild*.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 605. P. 6. p. 700. der *weiche Hautfresser*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 18. *Dermestes mollis*.

Fabric. S. E. p. 62. *Anobium 2.*\*)

*Testaceum, oculis nigris.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. III. *Byrrhus 2. la Vrillette de la farine.*

*Testaceus glaber, oculis nigris.*

de Geer Inf. Tom. IV. p. 230. No. 4. t. 8. f. 29. *Vrillette molle.*

Rufo-fuscus, oculis nigris; *elytrorum apice rufo.*

4. *Imperialis*, der *Adler*.

Müller I. c. S. 112. No. 4.

Füesslins Verz. S. 4. No. 63. *Kayserlicher.*

Sulzers Gesch. S. 22. t. 2. f. 7. der *Kayserliche.*

Fabric. S. E. p. 63. *Ptinus 3.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 507.

B R V C H V S *imperialis* subovatus cinereus, *elytris fuscis, macula suturae alba, pinnata.*

5. *Fur,*

\*) Nach dem Geer ist es des Geoffroi *Vrillette de la farine*; nach dem Fabric. aber dessen *Byrrhus 3.* p. 112. La *Vrillette fanve. Fulvus obscurus, oculis nigris.* Es scheint, als habe letzterer nur die Beschreibung verwechselt, weil die richtige No. 2. dastehet.

5. *Fur*, der *Inspektendieb*.\*)*Müller* l. c. S. 113. No. 5. der *Kräuterdieb*.*Füesslins Verz.* S. 5. No. 64. der *Dieb*.*Sulzers Gesch.* S. 22. t. 2. f. 8. der *Dieb*.*Berlin. Magazin* 4. B. S. 413.— — *Samml.* 7. B. S. 383.*Strals. Magaz.* 1. B. 3. St. S. 247. *Ceramb. fur*, der  
kleine schädliche Holzbock.*Bonnets Inspektol.* S. 342.*Fränkische Samml.* 1. B. S. 277.Der *Naturforscher* 3. St. S. 58-61. 8. St. S. 62. t. 2.*Verwüster, Verderber*.*Pontopp.* N. G. v. D. S. 206. t. 16. *Ceramb. fur*.*Frisch Inf.* 13. Th. S. 22. t. 15. Ein schwarzer brauner Holzkäfer von den kleinsten.*Goed. Inf.* Tom. II. t. 41.*List. Goed.* p. 276. No. 114. f. 114.*Mas gracilis, femina rotundior, duabus fasciis albis.**Onomatol.* hist. nat. P. 2. p. 761. P. 6. p. 700. der  
muschelfarbige Holzbock mit einem geäppelten weissen  
Strich auf den Flügeldecken, und Dornen an der  
Brust.*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 487.*Cerambyx testaceus, elytrorum fascia dupli alba,  
thorace spinoso.*

— — — ed. 2. No. 657.

*Cerambyx fur, thorace spinoso gibboſo, coleoptris  
ovatis; fascia dupli albida, antennis filiformibus  
mediocribus.**Schaeff.* Elém. t. 30. *Bruchus, Buckelkäfer*.*Scop.* Entom. Carn. No. 210. *Ruprestis fur. Thorax latere unidentatus, tuberculis posticis binis.* Variat

1. colore

\*) Merkwürdig, dass die Weibchen keine Flügel haben.

1. colore ferrugineo absque fasciis et tuberculis  
thoracinis obscurioribus.

2. fasciis elytri 2: albis.

*Fabric.* S. E. p. 63. *Ptinus* 2.

*Müller* Faun. Fridr. p. 13. No. 127.

*Cerambyx fur.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 509.

*B R V C H V S fur*, ovatus testaceus subapterus, tho-  
race trisulcato; elytris rufis fasciis duabus albis.

*Bog-Möll.*

Variat elytris pilis hirtis punctisque quatuor albis.

*Aëta Nidr.* P. 3. p. 12.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 164. *Bruchus* 1. t. 2. f. 6. la  
*Bruche à bandes.*

Testaceus, elytrorum fascia duplii alba.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 231. No. 5. t. 9. f. 5. 6.

*Vrillette carnacièrē.*

Rapax, ovatus rufo-fuscus, albedine maculatus,  
thorace angulato, villis flavis, antennis longitudine  
corporis.

#### 6. *Germanus*, der *Runzelbohrer*.\*)

*Müller* l. c. p. 113. No. 6.

der *Naturforscher* 8. St. S. 87. t. 2. f. 10. II.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 508.

*B R V C H V S furunculus*, oblongus testaceus, alatus,-  
thorace trisulcato, elytris concoloribus immaculatis.

*Mas furis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 112. *Byrrhus* 5. la *Vrillette*  
*brune à bandes grises.*

Fuscus, fasciis elytrorum transversis cinereis.

*Neue*

\*) Das Männchen hat lange *Flohrflügel*, und variiert auch zuweilen mit einigen *aschgrauen* *Querstreifen* auf den Flügeldecken.

## Neue Ptinusarten.

1. *Gigas*, der *neuholländische* grösste Bohrkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 63. *Ptinus* 1. *Griseus*, *elytris postice* *cinereis*.

2. *Latro*, der *Strassburgische Räuber*.

*Fabric.* S. E. p. 63. *Ptinus* 4.

*Thorace bidentato*, *testaceus*, *immaculatus*.

3. *Pannonicus*, der *ungarische Bohrkäfer*.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 89. No. 39.

*Fusco-rufus*, *pedibus rufis*, *subpellucidis*, *nitidis*.

4. *Rufo-villosus*, der *Fuchs*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 230. No. 2. *Vrillette velue rousse*.

*Rubro-fuscus*, *villosum*, *oculis nigris*.

5. *Punctatus*, der *punktirte Bohrkäfer*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 230. No. 3. *Vrillette pointillée*.

*Griseo-fuscus*; *elytris striatis punctatisque excavatis*.

6. *Testaceo-villosus*, der *braune Bär*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 235. No. 6. t. 9. f. 8. *Vrillette fauve velue*.

*Oblongus griseo-testaceus villosus*; *antennis pedibusque rufis*.

193. GESCHLECHT. *Hister*, der *Harlekin*, der *Gaukler*; franzöf. *Escarbot*; holl. *Mestkeverties*.

*Müllers* Linn. Naturf. 5. Th. 1. B. S. 114. *Dungkäfer*.

*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 5. *Stutzkäfer*.

*Sulzers* Kennz. S. 50. *schwarzer Speckkäfer*.

— — *Gesch.* S. 23. *Stutzkäfer*; *Escarbot*.

*Börners* Samml. 1. Th. S. 460. *schwarzer Speckkäfer*.

*Beckmanns* Anfangsgr. S. 92. der *Gaukler*.

*Schriften* der Dronth. und Norw. Gesellsch. 4. B. S. 268.

*Pontoppidans* N. G. v. D. S. 200. der *Harlekin*.

*Onomat.* hist. nat. P. 4. p. 252. der *Gaukler*.

*Schaeff.* Elem. t. 24. *Altelabus*, *Schildkrötenkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 52.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 93. *Altelabus*, *Escarbot*.

*de Geer* Inf. Tom. 4. Prael. VII. No. 49. pag. 340. *Escarbot*.

1. *Maximus*, der *gröste einfarbige indianische Stutzkäfer*.\*)

*Müller* l. c. S. 114. No. 1. der *Indianer*.

*Onomat.* hist. nat. P. 4. p. 253. der *gröste Gaukler*.

2. *Maior*, der *grosse afrikanische Stutzkäfer*.\*\*)

*Müller* l. c. S. 115. No. 2. der *Afrikaner*.

*Onomat.* hist. nat. P. 4. p. 253. der *grosse Gaukler*.

*Fabric.* S. E. p. 52. No. 1.

3. *Vnicolor*, der *ganz schwarze europäische Stutzkäfer*.

*Müller*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Müller* l. c. S. 115. No. 3. t. 3. f. 7. der Europäer.

*Füesslins* Verz. S. 5. No. 69. *Einfarbigter.*

*Fabric.* S. E. p. 52. No. 2.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 410.

*Coccinella* atra glabra; *elytris* abdomine brevioribus, margine inflexis.

*Acta Vpsal.* 1736. No. 10. *Dermestes* subrotundus ater nitidus; *elytris* brevibus.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 27. die schwarze kahle *Coccinelle*, mit kurzen am Rande eingebogenen Fügeldecken.

— — P. 4. p. 254. der gleichfarbene Gaukler.

*Scop.* Entom. carn. No. 30.\*)

Niger, lucidus, glaber; *elytro* striis 5 exterioribus obsoletis; *tibiis* anticus multidentatis.

*Raj.* Inf. p. 91. No. 7. *Scarabaeus* antennis globulosis.

*Schaeff.* Icon. t. 42. f. 10.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 4. No. 31.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 482.

*Act.* Nidr. Tom. 4. p. 5. t. 16. f. 4.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 94. *Altelab.* 4. t. 1. f. 4.

*L'Escarbot noir.*

Totus niger, *elytris* laevibus nonnihil striatis.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 342. No. 1. t. 12. f. 12.

*Escarbot noir.*

Niger nitidus, *elytris* striatis.

#### 4. *Pygmaeus*, das schwedische Zerglein.

*Müller* l. c. S. 116. No. 4. t. 3. f. 8. der Zerg.

*Füesslins* Verz. S. 5. No. 70. das Zerglein.

*Onomat.* hist. nat. P. 4. p. 253. der Zerg.

*Fabric.*

\*) Neglectis Antennis a Scarabaeo nemo distinguet, *Acaris Co-leoptr.* infestatur.

*Fabric.* S. E. p. 53. No. 5.

*Schaeff.* Icon. t. 42. f. 10.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 56. N. 484.

*Ater*, *punctulatus*, pedibus piceis.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 344. No. 4. *Escarbot nain*.

*Nigro-fuscus*; *elytris* dimidio striatis.

### 5. *Bimaculatus*, der *rothe Zweyfleck*.

*Müller* l. c. S. 116. No. 5. der *Zweyfleck*.

*Füesslins* Verz. S. 5. No. 71. der *Zweyfleck*.

*Onomat. hist. nat.* P. 4. pag. 253. der *Gaukler mit zweien rothen Flecken*.

*Fabric.* S. E. p. 53. No. 7.

*Scop. Entom. carn.* No. 31. *Hister fimetarius*. *Niger*, *elytris* apice rufis.

*Vddm.* Diss. 20. *Coccinella atra glabra - maculis duabus rubris*.

*Schaeff.* Elem. t. 24. f. 1.

— — Icon. t. 3. f. 9.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 483. *Ater*, *elytris* striatis; *macula media rubra*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 95. *Altelabus* 2. *L'Escarbot à taches rouges*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 343. No. 2. *Escarbot à deux taches rouges*.

*Niger nitidus*, *elytris* singulis *macula obscura rubra*.

### 6. *4-maculatus*, der *rothe Vierfleck*.

*Müller* l. c. S. 116. No. 6. der *Vierfleck*.

*Füesslins* Verz. S. 5. No. 72. der *Vierfleck*.

*Onomatol. hist. nat.* P. 4. p. 253. der *Schiltkröten-käfer*.

*Schaeff.* Elem. t. 24. f. 2.

*Fabric.* S. E. p. 53. No. 8.

*Müller* Faun. Fridr. p. 4. No. 32.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 86. No. 30.

*Niger*, elytro singulo maculis binis rubris, superiore lunata.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 344. No. 3. *Escarbot à quatre taches rouges.*

*Niger nitidus*; elytris singulis maculis binis obscurae nitidis.

### *Unabgebildete.*

1. No. 1. *Maximus.*

2. No. 2. *Major.*

### *Neue Stutzkäferarten.*

1. *Planus*, der *platte Gaukler*.

Füesslins Verz. S. 5. No. 68. der *Platte*.

Sulzers Gesch. S. 23. t. 2. f. 9. das *Blättchen*.

2. *Cyaneus*, der *neuholländische himmelblaue Stutzkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 52. No. 3. *Thorace aeneo, elytris coerulecentibus.*

3. *Brunneus*, der *schwedische ganz braune Stutzkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 52. No. 4. *Ferrugineus; elytris substriatis.*

4. *Abbreviatus*, der *nordamerikanische Kurzstrich*.

*Fabric.* S. E. p. 53. No. 6. *Ater; elytris crenato-striatis, striis interioribus abbreviatis.*

5. *Aeneus*,

5. *Aeneus*, der englische kupferfarbige Stutzkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 53. No. 9. *Elytris basi striatis, apice punctatis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 95. *Altelabus* 3.

*Nigro-cupreus, capite nonnihil prominulo.*

6. *Detritus*, der neuholländische verblasste Stutzkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 53. No. 10. *Ater, nitens, elytris piliculis, apice obscuris-punctatis et quasi detritis.*

7. *Apterus*, der Skopolische ungeflügelte Stutzkäfer.

*Scop.* Entom. carn. No. 32. *Fulvus, alisque destitutus.*

8. *Striatus*, der englische gestreifte Stutzkäfer.

*Forster.* nov. sp. Inf. Cent. I. p. II. No. II. *Ater, thorace elytrisque striatis.*

194. GESCHLECHT. *Gyrinus*; *Drehkäfer*;  
*Taumelkäfer*; *Wasserfloh*; *Wasserläufer*.

Müllers Linn. Naturs. 5. Th. I. B. S. 117. *Drehkäfer*.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 5. *Taumelkäfer*.

Sulzers Gesch. S. 24. *Taumelkäfer*.

Eberhards Thiergesch. S. 194. *Taumelkäfer*.

Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 400. *Drehkäfer*.

Onomat. hist. nat. P. 4. p. 115. 116. *Taumelkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 234. *Gyrinus*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 193. *Tourniquet*.

de Geer Inf. Tom. IV. prael. VIII. No. 51. p. 354  
*Tournequet*.

1. *Natator*, der *Schwimmer*.

*Müller* l. c. S. 117. No. 1.

*Füesslins Verz.* S. 5. No. 73. der *Schwimmer*.

*Sulzers Gesch.* S. 25. t. 2. f. 10. der *Schwimmer*.

— *Kennz.* S. 42. t. 6. f. 43. *Dytiscus natator*, der *glatte eyrunde Wässerkäfer*.

*Abhandl.* der schwed. Akad. der W. 32. B. S. 321. *Gyrinus natator*.

*Röfels Insektenbel.* 3. B. S. 194. t. 31. der *kleine glänzende schwarze und stinkende Wässerkäfer*.

*Neuer Schauplatz der Natur* 2. Band, S. 400. der *Schwimmer; Wässerfloh*.

*Trembley* Gesch. der Polypen. *Uebers.* S. 180. der *kleine eyförmige Wässerkäfer mit stahlblauen Flügeldecken.* \*)

*Beckmanns physik. oekon. Bibl.* 5. B. S. 259.

*Onomatol. hist. nat.* P. 3. p. 696. der *kleine glänzende schwarze und stinkende Wässerkäfer; Dytiscus natator*.

— P. 4. p. 115. *Gyrinus natator*, der *Taumelkäfer*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 779. *Dytiscus natator ovatus glaber.* *Smol.* Walten-bagge.

*Merret* pin. 203. *Pulex aquaticus*.

*Stop.* Entom. carn. No. 299. *Dytiscus natator*.

*Fabric.* S. E. p. 234. No. 1.

*Schaeff.* Elem. t. 67. *Taumelkäfer*.

— *Icon.* t. 134. f. 5. a. b.

*Müller* Faun. Fridr. p. 19. No. 193.

— Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 651.

*Niger*, *elytris striatis; pectore anoque rufis; pedibus luteis*.

*Vand-Loppe*; *Lille Vand-Torbift*.

*Act. Nidr.* IV. p. 27. t. 16. f. 13.

*Geoffr.*

\*) In *Trembley* l. c. hab' ich den *Dytiscus carabooides* L. p. 664 No. 2. statt dieses unrichtig angegeben.

*Geoffr.* Ins. Tom. I. p. 194. No. 1. t. 3. f. 3. le *Tour-niquet*.

*de Geer* Ins. Tom. IV. p. 355. No. I. t. 13. f. 4. *Tour-niquet nageur*.

*Coeruleo-ater* nitidus, pedibus rufis.

2. *Americanus*, der *ungestreifte amerikanische Taumelkäfer*.\*)

*Müller* L. c. S. 118. No. 2. der *ungestreifte*.

*Neuer Schauplatz* der N. 2. B. S. 400.

*Abhandl.* der schwed. Akad. der W. 32. B. S. 334.

*Onomat. hist. nat.* P. 4. pag. 118. der *amerikanische Taumelkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 235. No. 3.

#### *Neue Arten dieses Geschlechts.*

1. *Australis*, der *neuholländische grünliche Taumelkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 235. No. 2.

*Virescens*, *substriatus*, *elytris abbreviatis*, *vnidentatis*.

2. *Villosus*, der *zottige Taumelkäfer*.

*Mülleri Zool Dan. Prodr.* p. 68. No. 652. *Subtus luteus*, *supra cinereus*, *pubescens*.

195. GESCHLECHT. *Byrrhus*. *Nagende Wolkenkäfer*; *Kuollkäferchen*; *Blumenblüttenkäferchen*.\*<sup>\*\*</sup>)

L 4

*Müllers*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Zu diesen Linnéischen *Byrrbis* gehört das *Geoffroi Anthrenus*, und der Aeltern *Cistela*; der Herr von *Geer* hat sie zu den *Dermesten* gerechnet.

*Müllers* Linn. *Naturs*. 5. Th. 1. B. S. 119. *nagende Wollenkäfer*.

*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 5. *Knollkäferchen*.

*Sulzers* Gesch. S. 25. *Knollkäferchen*.

*Eberhards* Thiergech. S. 195. *Anthrenus*; *Blumenstaubkäfer*.

*Catholicon* B. p. 430.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 113. *Anthrenus*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. prael. VII. No. 46. p. 189.

1. *Scrophulariae*, das gesprenkelte *Knollkäferchen*.\*)

*Müller* I. c. S. 119. No. 1. t. 3. f. 5. der *Braunwurznager*.

*Füesslins* Verz. S. 5. No. 74. der *Braunwurznager*.

*Sulzers* Gesch. S. 26. t. 2. f. 11. der *Braunwurznager*.

*Naturforscher* 8. St. S. 68.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 412.

*Coccinella villosa*, coleopterorum margine infexo, futuris rubris.

— — ed. 2. No. 429. *Dermestes Scrophulariae*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 34. No. 5. *Coccinella villosa* etc. die zottige *Coccinell mit rothen Näthen*.

— — P. 3. p. 611. *Dermestes Scrophulariae*.

*Schaeff.* Elem. t. 17. *Anthrenus*, *Blumenstaubkäfer*.

— — Icon. t. 176. f. 4.

*Raj.*

\*) Auf allen *Birnblüten*. Es hat ordentliche *Federschuppen*, die mit kurzen Kielen in den Löchern der Flügeldecken stecken, wie die *Schmetterlinge*. Vermuthlich eben das Käferchen, von welchem *Needham* solches schon angemerkt hat. S. das alte *bamb. Magaz.* 1. B. S. 407. wie denn der Herr von *Geer* dergleichen auch von verschiedenen *Rüsselkäfern* versichert. Inf. Tom. 4. p. 204. Die prächtigsten hat der *Curculio argentatus*.

*Raj.* Inf. p. 85. No. 37. *Scarabaeus parvus*, corpore subrotundo, collo oblongo, alarum *elytris* nigris, binis punctis albicantibus notatis.

*Asta Vpsal.* 1736. p. 18. No. 3. *Gyrinus nigricans* maior.

*Fabric.* S. E. p. 61. *Anthrenus 2.*

Niger, *elytris* albo-maculatis *futura sanguinea*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 516. *Anthrenus Scrophulariae.*

Niger, *squamulis albis*, tibiis flavis. *Dan.* Skiael-Basle:

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 114. *Anthrenus 1. t. 1. f. 7.*  
*Anthrenus squamosus*; *l'Anthrene à broderie.*

*Squamosus niger*; fascia punctisque coleoptrorum albis, *futuris fuscis.\**)

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 200. *Dermestes 6. t. 7. f. 20.*  
*Dermeste de la Scrophulaire.*

Ovatus niger, maculis squamosis albis; *futura elytrorum rubra.*

## 2. *Musaeorum*, der Kabinetkäfer.

*Müller* l. c. S. 120. No. 2.

*Füesslins Verz.* S. 5. No. 75.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 411.

*Coccinella villosa*, coleopterorum margine infexo, thoracis macula baseos vtrinque alba.

— — ed. 2. No. 430. *Dermestes Musaeorum.*

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 35. die zottigste *Coccinell mit zwey weissen Brustflecken.*

*Fabric.* S. E. p. 61. *Anthrenus 3.*

*Nebulosus*, *elytris subnebulosis.*

\*.) Dieses Citatum hat *Fabricius* zu seinem *Anthren. 1. Pimpinellaæ* gesetzt.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 517. *Anthrenus Musaeorum.*

Nebulosus, *elytris striato-punctatis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 115. *Anthrenus* 2. L'Amourette. \*)

*Squamofus niger*, *elytris fuscis, fascia triplici undulata albâ.*

de Geer Inf. T. IV. p. 203. *Dermestes* 7.t.8. f. 11. 12.  
*Dermestes des Cabinets.*

*Ovatus*, *fusculus, obscurus, maculis squamosis grisefinis.*

### 3. *Verbasci*, der *Wollkrautfresser.* \*\*)

*Müller* l. c. S. 120. No. 3.

*Füesslins* Verz. S. 5. No. 76. der *Wollkrautnager.*

*Fabric.* S. E. p. 61. *Anthrenus* 4. †)

*Niger*, *elytris fasciis tribus vndatis albis.*

### 4. *Pillula*, die *Pillenkugel.* ††)

*Müller* l. c. S. 120. No. 4.

*Olaffs* Reise durch Isl. 1. Th. S. 319. *Guldvarse* (Goldwarze).

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 427. *Dermestes Pilula.*

— — — ed. 1. No. 536. *Mordella subrotunda* colore murino.

*Azia Vpsal.* 1736. p. 18. No. 2. *Mordella* colore murino.

*Müller* ||

\*) Dieses Citatum steht im *Geer* bey diesem B. *Musaeorum*; im *Fabricius* aber bey B. *Verbasci*, wozu es *Linné* auch gesetzt hat.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Zu diesem hat *Fabric.* das vorige Citatum des *Geoffroi* gesetzt.

††) v. *Cistela fasciata* No. 2.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 22. *Dermestes Pilula.*

Fabric. S. E. p. 60. *Byrrhus 1.*

de Geer Ins. Tom. IV. p. 213. No. 9. t. 7. f. 23. *Dermeste pilule.*

Ovatus, supra nigro-aeneus, subtus totus niger; elytris fasciis interruptis aeneis.

5. *Vagus*, der Schwärmer.\*)

Müller l. c. S. 121. No. 5.

*Unabgebildete.*

1. No. 3. *Verbaesi.*

2. No. 5. *Vagus.*

*Neue Byrrhusarten.*

1. *Varius*, die englische Buntschecke.

Fabric. S. E. p. 60. *Byrrhus 2.*

Niger, thorace aeneo, elytris fuscis, striis tribus abbreviatis viridibus nigro-maculatis.

2. *Aeneus*, das upsalische kupferfarbigte Knollkäferchen.

Fabric. S. E. p. 60. *Byrrhus 3.*

Totus aeneus.

3. *Pimpinellae*, der Pimpinellnager.

Fabric. S. E. p. 61. *Anthrenus 1.\*\**)

Niger, elytris fascia alba, apice ferrugineis, litura alba.

196. GE-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Hierbey hat Fabric. noch des Geoffroi *Anthrenus 1.* Tom. I. p. 114. angeführt, welches Citatum nach dem Geor bey B. Scrophulariae steht.

196. GESCHLECHT. *Silpha*. franz. Bouclier; Geiferkäfer; Aaskäfer; Bisamkäfer; Todtengräber; Maulwurfskäfer; Erdkäfer.

Müller L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 122. Todtengräber.  
Flüesslins schweiz. Inf. p. 5. Aaskäfer.

Beckmanns Anfangsgr. der Naturh. p. 93. Todtengräber.

Eberhards Versuch einer Thiergeesch. p. 195. Aaskäfer.

Sulzers Kennz. S. 51. Todtengräber.

Neuer Schauplatz der Natur 1. Th. S. Aaskäfer, Todtengräber.

Börner's Samml. aus der Naturgesch. etc. 1. Th. S. 464. Todtengräber; Maulwurfskäfer.\*)

Gleditsch vermischt physikalisch - botanisch - oekonomische Abhandl. 3. Th. S. 200. ff.

Sulzers Gesch. S. 27. Aaskäfer. le Bouclier, Fossoyeur.

Ionst. hist. nat. de Inf. p. m. 98. t. 14. Tab. Aldrov. 17. Scar. foetidus.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 147.

Mülleri Faun. Fridrichdal. p. 4.

### Mülleri

\*) Der Herr M. Börner hat davon eine besondere Unterabtheilung gemacht, welche der Ritter nicht hat.

1. mit Flügeldecken, die kürzer als der Hinterleib sind;

2. mit Flügeldecken, die länger als der Hinterleib sind.

Pallas fasc. 9. p. 6. will die *Silphas* lieber zu den *Dermesten* gerechnet wissen.

Des Linn. *Silph. ruficam* No. 10. rechnet de Geer Inf. T. 5. p. 283. zu dem eigenen Geschlecht, welches *Geoffroi Anthribus*, *Bürstenkäfer*, nennt.

In den ersten Ausgaben des Natursystems, und der Faun. Suec. nannte diese der Ritter *Cashidas*, oder *Schildkäfer*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 63. *Peltis*. p. 96. *Silpha*.

*Fabric.* S. E. p. 72. *Nicrophorus*, *Silpha*, *Opatrum*, *Nitidula*.

*Pontopp.* N. G. v. D. p. 200.

*de Geer* Inf. Tom. 4. prael. VI. No. 44. p. 164. des Boucliers.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 96. sq. *Dermestes*. *Peltis*. p. 117. et *Anthribus* p. 308.

*Commentar.* Lips. Dec. I. P. III. 679. Suppl. p. 276.

I. *Germanica*, der *gröste schwarze Todtengräber*.\*)

*Müller* l. c. p. 123. t. 3. f. 9. der *Trauergräber*.

*Füesslins* schweiz. Inf. p. 5. No. 77.

*Sulzers* Kennz. t. 2. f. 10.

*Berlin.* Samml. 8. B. p. 573.

*Gleditsch* vermischt Abhandl. 3. Th. p. 225. der *gröste Todtengräber*. t. 1. f. C.

*Pontopp.* N. G. v. D. p. 200. No. 1. t. 16.

— — *Atlas* Dan. I. t. 29.

*Berlin.* Samml. 8. B. S. 573. der *grosse schwarze Todtengräber*.

von *Geer* Inf. Uebers. 3. Qu. S. 83.

*Fabric.* S. E. p. 71. *Nicrophorus* 1. *Ater*, *clypeo obrotundo*, *inaequali*.

*Rajus* Inf. 107. 1. *Scarabaeus* *antennis clavatis*, *clavis in annulos divisitis*, *primus*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 99. No. 2. *Le grand Dermeste noir*. *Thorace marginato*, *elytris abscissis*, *totus niger*.

*de Geer* Inf. Tom. 4. p. 173. No. 2. t. 6. f. 4. *Grand Bouclier noir*.

*Silpha*

\*.) Das *Männchen* unter den *neuen* No. 1. *Speciosa*.

*Silpha (nigra maior) tota atra, elytris truncatis abdomine brevioribus.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1087.

*Nigra, clypeo subrotundo, gibbo; elytris truncatis; margine laterali obsolete ferrugineis.*

2. *Vespollo*, der *schwarz und roth gefleckte Todtengräber.* \*)

*Müller* I. c. p. 123. t. 3. f. 10. der *Bismarckäfer.*

*Füesslin* schweiz. Inf. p. 5. No. 78. der *Todtengräber.*

*Röfels* 4. B. S. 3. t. 1. der *mit Recht sogenannte Todtengräber.*

*Frisch* Inf. 12. Th. S. 28. 3. Platte t. 2. f. 2. der *Muskusäfer.*

*Pontoppidans* N. G. v. D. p. 200. No. 2. der *Gräber.*

*Gleditsch* vermischt Abhandlungen etc. 3. Th. S. 222. t. 1. f. A. der *kleinste Todtengräber, der gemeine Todtengräber.*

*Bonnets* Abhandlungen aus der Infektologie. S. 248.

— — und anderer Naturf. Abhandl. aus der Infektol. S. 157.

*Neue Berlin. Mannichfalt.* 3. Jahrg. S. 266.

*Lessers Theol.* der Inf. S. 310. der *Muskusäfer.*

*Linn.*

\*) Wenn diese Käfer nach der Begattung wieder aus der Erde hervorkommen, starren sie von *Milben* (*Acaris Coleoptratorum* Linn. p. 1026. No. 27.), welche die meisten Schriftsteller *Läuse* nennen; daher dieser Käfer auch der *Laufkäfer* heißen könnte. Bey der Beschreibung dieser Käfer in *Müllers* Erklär. §. B. 1. Th. S. 122. 124. hab' ich nur *zweyerley* zu berichtigen:

1. dass sie das begrabene Aas unter der Erde nicht *verspeisen*, sondern ihre Brut hineinlegen.

2. dass es keine *achtfüßige Läuse*, wohl aber *Milben* giebt, deren Hauptkarakter dieser ist: dass sie *acht Füsse* haben.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 444.

— Faun. Suec. ed. 1. No. 349. *Scarabaeus clypeo marginato, elytris nigris; fasciis duabus transversis rubris.*

*Mouffet* lat. p. 149. lin. 7. f. 3. ord. perpend. et app. t. ult. *Cantharis tertius.*

*Imperat.* alt. 692. t. 2. f. 2. *Cantharis fasciata.*

*Rajus* Hist. Inf. p. 106. *Scarabaeus foetidus primus Aldrovandi, der erste Aldrovandische Stinkkäfer.*

*Aldrovand.* Lib. 4. c. 3. p. 79. *Scar. Serpentarius,* der *Schlangenkäfer.*

*Jonston* hist. nat. Inf. p. m. 98. Tab. XIV. *Aldrov.* t. 6. f. 3. *Scar, Serpentarius.*

*Scopoli* Entom. carn. No. 33. *Dermestes Vespillo.*

*Müller* Faun. Fridr. p. 4. No. 33.

— Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1086. *Atra, clypeo quadrato; elytris truncatis; fasciis binis rufis.*

*Fabric.* S E. p. 72. *NICROPHORVS vulgaris* 2. *Ater, elytris fascia dupli ferruginea.*

*Lister* loqu. 381. 2. *Scarabaeus majusculus, niger, duabus luteis fasciis vndulatis transversim ductis supra alarum thecas.*

*Commentar.* Lips. Dec. I. Vol. III. 680.

*Schaeff.* Icon. t. 9. f. 4.

*de Geer* Inf. T. 4. p. 168. No. 1. t. 6. f. 1. *Bouclier fossoyeur.*

*S. nigra*, elytris truncatis abdomine *brevioribus:* fascia lata dupli *ferruginea transversa undata.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 98. No. 1. t. 1. f. 5. *Le Dermeste à point d' Hongrie (mit Steppwerk, das wellenförmig gemacht ist).*

*Dermestes thorace marginato, elytris abscissis nigris, fasciis duabus transversis undulatis luteis.*

3. *Bimaculata*, der *barbarische Zweyfleck.*\*)

*Müller* l. c. p. 125. No. 3.

4. *Bipustulata*, der *Doppelpunkt.*\*\*)

*Müller* l. c. p. 125. No. 4.

*Müller* Faun. Fridr. p. 4. No. 34. der *zweypunktirte Küchenkäfer.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 591. *Peltis bipust.*

*Nigra, elytrorum punctis binis pedibusque rufis.*

*Pontopp.* N. G. v. D. p. 201. No. 13. der *rothgesprengelte Glander.*

*Fabric.* S. E. p. 77. *Nitidula* 1.

*Ovata, nigra, elytris puncto rubro.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 363. *Dermestes niger* etc.

— — — ed. 2. No. 445.

*Acta Vpsal.* 1736. pag. 17. No. 12. *Dermestes niger* etc.

*de Geer* Inf. Tom. 4. p. 186. No. 13. t. 6. f. 22. 23.  
*Bouclier à deux points rouges.*

*Nigra, corpore obtuso, elytris singulis macula vnica rubra.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 100. No. 3. Le *Dermeste à deux point rouges.*

5. *4-pustulata*, der *viergefleckte Faulholzkäfer.*

*Müller* l. c. p. 125. No. 5. der *Vierfleck.*

*Frisch* Inf. 9. Th. p. 36. t. 19. der *gelbfleckigte kleine Käfer aus dem wollschwitzenden Wurm.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 364. *Dermestes niger* etc.

— — — ed. 2. No. 446. *Silpha quadripust.*  
*Fabric.*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Ist dem *Dermestes Pellio* sehr ähnlich.

*Fabric. S. E. p. 69. Tritoma 3.*

Oblonga, nigra, elytris punctis duobus ferrugineis.

*de Geer Inf. Tom. 4. p. 185. No. 12. t. 6. f. 20. 21.*

*Bouclier à quatre points rouges.*

*Silpha nigra oblonga depressa, elytris singulis maculis duabus rubris.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 106. No. 16. Le Dermeste à quatre points rouges, strié.\*)*

*Dermestes niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris striatis, oblongus.*

6. *Indica*, der *indianische zweygezähnte Brustschild.*\*\*)

*Müller l. c. p. 126. No. 6. der Indianer.*

*Fabric. S. E. p. 73. Silpha 3.*

7. *Americana*, der *amerikanische Todtengräber, mit dem gelben Silde.*

*Müller l. c. p. 126. No. 7. der Amerikaner.*

*Catesb. car. 3. p. 10. t. 10. f. 5. BLATTA americana, die amerikanische Schabe.*

*Seligm. ausländische und seltene Vögel Tom. 4. t. 108. f. 7. Scarabaeus peltatus, der Schildkäfer.*

*Fabric. S. E. p. 73. Silpha 4.*

*Depressa nigra, thorace flavo; centro nigro.*

8. *Semi-*

\*) Von diesem letztern Citato sagt der Herr Prof. Fabricius: de Synomino Geoffr. dubito; nam elytra in nostra laevissima.  
Sehr selten.

\*\*) Nirgends abgebildet.

8. *Seminulum*, das Saamenkorn.\*)*Müller* l. c. p. 126. No. 8.*Füesslins* schweiz. Inf. p. 5. No. 79.*Pontopp.* N. G. v. D. p. 201. No. 14.9. *Agaricina*, der Lerchenchwammkäfer.\*\*)*Müller* l. c. p. 126. No. 9. der Schwammkäfer.*Scopoli* Entom. carn. No. 43. *Dermestes agaricinus*.10. *Russica*, der rothe russische Todtengräber.*Müller* l. c. p. 126. No. 10. der Russ.*Vddmann* diff. 7. *Dermestes elytris nigris, capite, clypeo et abdomine rubro.**Fabric.* S. E. p. 73. *Silpha* 5.*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 283. No. 1. t. 8. f. 12. *Anthribus rouge à etuis noirs*, der rothe Bürstenkäfer mit schwarzen Flügeldecken.*Anthribus (ruber) ovato-oblongus ruber nitidus, antennis elytrisque nigris nitidis.* †)11. *Littoralis*, der Uferkäfer.*Müller* l. c. p. 127. No. 11.*Füesslins* schweiz. Inf. p. 6. No. 81. der Strandaaaskäfer.*Frisch* Inf. 6. Th. S. 12. t. 5. f. 1. die Feldschabe und ihr Käfer.*Pontoppid.* N. G. v. D. p. 200. No. 3.

Linn.

\*) Nirgends abgebildet. — S. unter den neuen No. 44.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Er rechnet ihn also zu den *Anthribis* des *Geoffroi*, und sagt, dass er mit den *Chrysometen* viel ähnliches habe; keinesweges aber zu den *Silphen* gehöre.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 380.

*Cassida atra*, clytris lineis tribus elevatis; antennis antice testaceis.

— — — ed. 2. No. 450.

Scop. Entom. carn. No. 55. *Silpha littoralis*.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 590. *Peltis littoralis*.

Atra, clypeo orbiculato, nitido; elytris abdomine brevioribus.

Fabric. S. E. p. 72. *Silpha 2.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 120. No. 3. Le Bouclier à bosses, der bucklichte Aaskäfer.

*Peltis nigra*, elytris tribus lineis elevatis, prima et secunda gibbositate connexis; thorace laevi.

de Geer Inf. Tom. 4. p. 176. No. 4. Bouclier à boutons roux, der rothknöpfige Aaskäfer.

*Silpha (rufo-clavata) oblonga nigra*, thorace orbiculato nitido, elytris lineis elevatis tribus, clava antennarum rufa.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 663. *Cassida atra* etc. der schwarze Schildkäfer mit drey erhabenen Strichen auf den Flügeldecken.

12. *Atrata*, der schwarzglänzende Aaskäfer mit punktirten Flügeldecken.

Müller l. c. pag. 127. No. 12. t. 3. f. II. die Seidentrauer. v. No. 18.

Pontopp. N. G. v. D. p. 200. No. 4.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 385. *Cassida nigra* etc.

— — — ed. 2. No. 451.

Poda Mus. graec. p. 23.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 667. der schwarze Schildkäfer mit dreyen erhöhten Strichen auf den Flügeldecken, und lauter Punkten dazwischen, und in einem ganzen vornen rund laufenden Schild.

M 2. ; Fabric.

*Fabric.* S. E. p. 73. *Silpha* 9.

*Schaeff.* Elem. t. 96. f. 1. *Peltis*, Geiferkäfer.

— — — Icon. t. 93. f. 5.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 118. No. 1. *Le Bouclier noir à trois rayes et corcelet lisse.* *Peltis nigra* etc.

*de Geer* Inf. Tom. 4. p. 177. No. 5. t. 6. f. 15. *Bouclier à points concaves.*

*Silpha (punctata)* nigra nitida, *elytris punctatis; lineis* elevatis tribus laevibus; *clava* antennarum nigra.\*)

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 587. *Peltis atrata.* Nigra, *clypeo* antice rotundato, nitido; *elytrorum* lineis tribus abbreviatis; spatio interjecto rugoso.

— — — Faun. Fridr. p. 4. No. 35.

13. *Thoracica*, der Rothschild.

*Müller* l. c. p. 128. No. 13. der Schildträger.

*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. p. 6. No. 83. die Rothbrust.

*Sulzers* Kennz. t. 2. f. 12. der Schildkäfer.

*Pontoppid.* N. G. v. D. p. 200. der rostfarbige Rückenschild.

*Poda* Mus. graec. p. 23.

*Onomatol.* hist. nat. P. 2. p. 667. *Cassida nigra, clypeo ferrugineo* etc. der schwarze Schildkäfer mit einem rostfarbigen Schild, und einem erhabenen Strich auf jeder Flügeldecke.

*Linn.*

\*.) Zu diesem Käfer hat der Herr von Geer das, vom Linné bey der vorigen Nummer angeführte Citatum des Frisch Inf. 6. Th. p. 12. t. 5. gesetzt.

Da das Bruststück dieser Käfer vorne her einen glatten Rand hat, und also einem Schild sehr ähnlich sieht; so wird diese Art besonders im Französischen *Bouclier* genannt.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 386. *Cassida nigra, clypeo ferrugineo.*

— — — ed. 2. No. 452.

*Fabric.* S. E. p. 73. *Silpha* 6.

*Schaeff.* Icon. t. 75. f. 4.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 121. No. 6. *Le Bouclier à corcelet jaune.*

*Peltis nigra, thorace ferrugineo, lineis tribus elevatis acutis.*

*de Geer* Inf. Tom. 4. p. 174. No. 3. t. 6. f. 7. *Bouclier à corcelet rouillé.*

*Silpha nigra, thorace ferrugineo, elytris lineis tribus longitudinalibus: unica elevata.*

*Müller* Faun. Fridr. p. 4. No. 36.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 583. *Peltis thoracica. Nigra; clypeo rufo, emarginato; elytrorum linea extima elevationi sinuata.*

*Abt.* Nidr. P. 3. p. 384. t. 6. f. 1.

14. *Quadripunctata*, der gelbe Aaskäfer mit vier schwarzen Punkten.

*Müller* l. c. p. 128. No. 14. der *Vierpunkt.*

*Füesslins* schweiz. Inf. p. 6. No. 84. der *Vierpunkt.*

*Pontoppid.* N. O. v. D. p. 200. No. 6.

*Prodr.* Insect. Siaeland.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 86. No. 31.

*Fabric.* S. E. p. 75. *Silpha* 14.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 122. No. 7. t. 2. f. 1. *Le Bouclier jaune à taches noires. Peltis nigra etc.*

*de Geer* Inf. Tom. 4. pag. 181. No. 6. *Bouclier à quatre points noirs.*

*Silpha corpore nigro, thorace testaceo: macula magna nigra; elytris flavo-testaceis, punctis duobus nigris.*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 63. *Peltis quadripunctata*. Dan. St. *Hans Orm*, *Glands-Flue*. *Nigra*, *thoracis lateribus elytrisque flavis*, *maculis 4 elytrorum nigris*.

15. *Opaca*, der *braune Aaskäfer*.

*Müller* l. c. p. 128. No. 15. der *braune Gräber*.

*Füesslins* schweiz. Inf. p. 6. No. 85. der *Braune*.

*Schaeff.* Icon. t. 93. f. 6.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 383. *Cassida nigra* etc.

— — — ed. 2. No. 454.

*Onomatol.* hist. nat. P. 2. p. 668. *Cassida nigra* etc.  
der *schwarze Schildkäfer mit fünf glatten Streifen auf den Flügeldecken, und einem Rand vorn an dem Brustschild*.

*Fabric.* S. E. p. 74. *Silpha* 12.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 585. *Peltis opaca*. *Nigra*, *supra murina*, *tomentosa*; *clypeo truncato*, *elytris lineis elevatis subternis*; *vnguibus rubris*.

16. *Rugosa*, der *runzlichte Aaskäfer*.

*Müller* l. c. p. 129. No. 16. der *Runzelkäfer*.

*Füesslins* schweiz. Inf. p. 6. No. 86. der *Runzlichte*.

*Lepechins* R. durch Russl. 1. Th. p. 262. der *runzlichte Todtenträger*, der *Kosszaken-* der *Lappländische Hüttenkäfer*.

*Müller* Faun. Fridr. p. 4. No. 37.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 379. *Cassida nigra* etc.

— — — ed. 2. No. 455.

*Aðta Vpſal.* 1736. No. 3. *Dermestes niger*, *punctis elevatis* etc.

*Raj.* Inf. p. 90. No. 9. *Scarabaeus inter cadavera frequens* etc.

*Onoma-*

*Onomatol.* hist. nat. P. 2. p. 663. *Cassida atra* etc.  
der schwarze Schildkäfer mit fünf erhabenen Strichen  
und Punkten auf den Flügeldecken.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 120. No. 4. *Bouclier noir chifonné*, à corcelet raboteux; *Peltis nigra* — thorace scabro.

de *Geer* Inf. Tom. 4. p. 182. No. 7. *Bouclier raboteux*. *Silpha nigra opaca*, elytris tuberculatis, lineis tribus elevatis inaequalibus.

— — Tom. 5. p. 43. No. 5. t. 2. f. 21. *Tenebrion chagriné*, die chagrinartige Hauschabe.\*)

*Tenebrio rugosus* alatus niger, corpore ovato, thorace rugoso; elytris tuberculis scabris.

17. *Sabulosa*, der Sandgräber.\*\*) )

*Müller* l. c. p. 129. No. 17.

*Füesslins* schweizer. Inf. p. 6. No. 87.

*Schriften* der Dronth. und Norw. Gesellsch. 3. B.  
pag. 347.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 382. *Cassida nigra* etc.

— — — ed. 2. No. 456.

*Acta Vpsal.* 1736. p. 17. *Cassida nigra* etc.

*Vddm.* diss. 5. *Dermestes niger* etc.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 350. No. 7. Le *Tenebrion à stries dentelées*. *Tenebrio atra*, elytris striis quinque vtrinque dentatis.

*Müller* Faun. Fridr. p. 5. No. 38.

M 4

*Müller*

\*) Der Herr von *Geer* rechnet dieses Insekt nachmals aus folgenden Gründen zu den Schaben (*Tenebrio*), und nicht mehr zu den *Silphis*, weil es keine durchblätterte Fühlhörner (perfoliatae), und die Fussblätter am letzten Paar Füsse nur vier, die andern aber fünf Gelenke haben.

\*\*) Nirgends abgebildet.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 589. *Peltis* fabulosa. Nigra, supra cinerea, *clypeo* emarginato; *elytris* lineis tribus vtrinque tuberculatis.

Fabric. S. E. p. 76. *Opatrium* I.

Fuscum, *elytris* lineis elevatis tribus dentatis, *thorace* emarginato.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 688. *Cassida nigra* etc. der schwarze Schildkäfer mit fünf auf den Seiten mit Zähnen versehenen Streifen auf den Flügeldecken, und einem Rand vorn an dem Schild.

18. *Obscura*, der ohnglänzige schwarze Aaskäfer.\*)

Müller l. c. p. 129. No. 18. die Tuchträuer. v. No. 12.

Füesslin schweiz. Inf. p. 6. No. 88.

Müller Faun. Fridr. p. 5. No. 39.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 584. *Peltis* obscura. Nigra, *clypeo* truncato, *elytrorum* lineis tribus elevatis, punctis inaequalibus.

Vddm. diss. 8. *Cassida* ovata nigra etc.

Poda Mus. gr. p. 23.

Fabric. S. E. p. 74. *Silpha* II.

19. *Ferruginea*, der rostfarbige Breitkopf.

Müller l. c. p. 130. No. 19. die Breitbrüst.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 665. *Cassida ferruginea* etc. der rostfarbige Schildkäfer mit vertieften Punkten und erhöhten Strichen auf den Flügeldecken.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 387. *Cassida ferruginea* etc.

— — — ed. 2. No. 458.

Schaeff. Icon. t. 40. f. 7.

Fabric. S. E. p. 75. *Silpha* 16.

Raj.

\*) Nirgends abgebildet.

Raj. Inf. 84. 33. *Scarabaeus minor e rufo sordide nigricans, elytris striatis.*

de Geer Inf. Tom. 4. p. 183. No. 9. *Bouclier pu-*  
*naise, der Wanzenähnliche Aaskäfer.*

Silpha *Cimicoides*, supra fusco-castanea rufo-margi-  
nata, subtus rufa, *elytris* lineis elevatis senis pun-  
ctisque excavatis.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 600. *Peltis*  
ferr. Rufa, *clypeo* emarginato, *elytris* striatis  
nigro-maculatis.

20. *Reticulata*, der netzförmige Aaskäfer.\*)

Müller l. c. p. 130. No. 20. der Breitkopf.

21. *Grossa*, der dickrunde Aaskäfer.

Müller l. c. p. 130. No. 21. der Dicksack.

— — Faun. Frid. p. 5. No. 40.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 588. *Peltis*  
*grossa*. Nigra, *clypeo* antice emarginato, postice li-  
neari; *elytris* punctatis; *lineis* elevatis tribus.

Schaeff. Icon. t. 75. f. 3.

22. *Oblonga*, der länglich schmale Aaskäfer.\*\*).

Müller l. c. p. 131. No. 22. der Smalhans.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 664. *Cassida atra*, *ely-*  
*tris* *striis decem* elevatis etc. der schwarze Schildkäfer  
mit zehn erhabenen Strichen und vertieften gestreiften  
Punkten auf den Flügeldecken.

M 5

Linn.

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet. Ist es aber nach Sulzers Gesch. S. 23.  
des Geoffr. Antribe noir strié Tom. I. p. 307. so nehme ich die-  
ses zurück, dass er nicht abgebildet sey. S. hinten unter den  
neuen No. 8. *Flavifrons*.

- Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 381. *Cassida atra* etc.  
 — — — ed. 2. No. 460.  
 Fabric. S. E. p. 75. *Silpha* 17.  
 de Geer Inf. Tom. 4. p. 185. No. 11. *Bouclier oblong.*  
*Silpha oblonga*, fusco-nigra, elytris lineis octo elevatis punctisque excavatis.

23. *Scabra*, der schwarze Aaskäfer mit höckrighcen Deckshilden.

- Müller l. c. p. 131. No. 23. der *Rauhpelz*.  
 Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 586. *Peltis scabra*. Nigra, fronte pube rufa; thorace antice emarginato, elytrisque tuberculis depresso nitidis.  
 Schaeff. Icon. t. 93. f. 4.

24. *Rufipes*, der Rothfuss.\*)

- Müller l. c. p. 131. No. 24.  
 Fabric. S. E. p. 78. *Nitidula* 8.  
*Nigra*, nitida, pedibus pallidis.

25. *Aquatica*, der Wasseraaskäfer.

- Müller l. c. p. 131. No. 25. der *Wasserpatzher*.  
*Füesslins* schweiz. Inf. p. 6. No. 91. der *Schwimmer*.  
*Schriften der Dronth. und Norw. Ges.* 3. B. p. 348.  
 No. 4.

- Fabric. S. E. p. 66. *Elophorus* 1.  
 Geoffr. Inf. Tom. I. p. 105. No. 15. Le *Dermeste bronzé*, der kupferfarbige Hautfresser.  
*Dermestes viridi-aeneus*, thorace fasciis quatuor elevatis, elytris punctato-striatis.  
 de Geer Inf. Tom. 4. p. 379. No. 5. t. 15. f. 5. 6.  
*Hydrophile bronzé*. *Hydrophilus* (*aeneus*) *viridi-aeneus*,

\*) Nirgends abgebildet.

neus, *thorace* virescente sulcato, *elytris* punctato-striatis, antennis pedibusque rufis.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 606. *Peltis aquatica*. Viridi aenea; *thorace* longitudinaliter rugoso; *elytris* punctatis striatis; pedibus flavis.

26. *Succincta*, der *Gürtelträger*.\*)

*Müller* l. c. p. 131. No. 26.

*Füsslins* schweiz. Inf. p. 6. No. 92.

27. *Colon*, das *Kolon*.

*Müller* l. c. p. 132. No. 27.

*Neuer Schauplatz der Natur* 2. B. S. 192.

*Fabric.* S. E. p. 78. *Nitidula* 4.

Nigra, *elytris* ferrugineo variis, *thorace* emarginato.

de Geer Inf. Tom. 4. pag. 187. No. 14. t. 6. f. 24.  
*Bouclier Colon*.

Rufo-fusca nigro maculata, *thorace* dupliciti punto impresso, corpore subtus toto fusco.

28. *Fusca*, der *Pechbauch*.\*\*)

*Müller* l. c. p. 132. No. 28.

29. *Depressa*, der *Plattbauch*.†)

*Müller* l. c. p. 132. No. 29.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 601. *Peltis depressa*. Ferruginea, capite nigro; *elytris* maculis pallide luteis.

30. *Gri-*

\*) Nirgends abgebildet. S. unter den neuen No. 41.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Nirgends abgebildet.

30. *Grisea*, der *Greis*.\*)*Müller* l. c. p. 132. No. 30.de Geer Inf. Tom. 4. p. 184. No. 10. *Bouclier ta-*  
*cheté*, der *gefleckte Aaskäfer*.Supra rufo-fusca nigro-maculata; subtus rufa im-  
maculata.31. *Testacea*, der *muschelbraune Aaskäfer*.\*\*)*Müller* l. c. p. 133. No. 31. der *Ziegler*.32. *Aestiva*, der *Blumenkratzer*.†)*Müller* l. c. p. 133. No. 32.*Müller* Faun. Fridr. p. 5. No. 41.— — Zool. Dan. Prodr. pag. 64. No. 604. *Peltis*  
*aestiva*. *Testacea subtomentosa*; *thorace emarginato*,  
*oculis nigris*.*Fabric.* S. E. p. 77. *Nitidula* 2.*Testacea*, *subtomentosa*, *thorace emarginato*, *ocu-*  
*lis nigris*.33. *Pulicaria*, der *Blumenfloh*.††)*Müller* l. c. p. 133. No. 33.*Onomatol. hist. nat.* P. 3. p. 611. *Dermestes pulicarius*.*Catholicon* A. p. 364. *Anthribus*, *Flohkäferchen*.*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 308. No. 4. *Anthribus*.*Charlet. Onom.* p. 50. *Wingless-Hornet*.34. *Pedicularia*, die *Blumenlaus*.†††)*Müller* l. c. p. 133. No. 34.*Fabric.*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Nirgends abgebildet.

††) Eben dieses Insekt hat *Linné* bereits als *Dermestes pulicarius*  
No. 24. mit einerley Worten beschrieben.

Nirgends abgebildet.

†††) Nirgends abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 78. *Nitidula* 6.

*Nigra*, *elytris laevibus*, *thorace marginato*.

35. *Atomaria*, die *Blumenmilbe*.\*)

*Müller* l. c. p. 134. No. 35.

*Fabric.* S. E. p. 67. *Sphaeridium* 3.

*Laeve*, *atrum*, *elytris crenato-striatis*, *pedibus pallidis*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 107. No. 19. *Le Dermeste en deuil*, das *Trauerkäferchen*.\*\*) *Dermestes niger*, *subrotundus*, *elytris striatis*.

*Unabgebildete Linneische Silphae.*

1. No. 3. *Bimaculata*.
2. No. 6. *Indica*.
3. No. 8. *Seminulum*.
4. No. 9. *Agaricina*.
5. No. 17. *Sabulosa*.
6. No. 18. *Obscura*.
7. No. 20. *Reticulata*.
8. No. 22. *Oblonga*.
9. No. 24. *Rufipes*.
10. No. 26. *Succincta*.
11. No. 28. *Fusca*.
12. No. 29. *Depressa*.
13. No. 30. *Grisea*.
14. No. 31. *Testacea*.

15. No-

\*) Nirgends abgebildet. Vielleicht gehört er zu den Geerischen Dern. atomar. S. die neuen *Dermestesarten* No. 40.

\*\*) Die Benennung: *Dermeste en deuil*, sagt Herr Prof. Müller Erkl. s. B. 1. Th. S. 105. gäbe man in Frankreich einer gewissen Art kleiner Käferchen, woža vielleicht Dern. *Piniperda* No. 11. gehöre.

- 15. No. 32. *Aestiva.*
- 16. No. 33. *Pulicaria.*
- 17. No. 34. *Pedicularia.*
- 18. No. 35. *Atomaria.*

*Neue Aaskäfer- oder Silphenarten.*

1. *Speciosa*, der ansehnlichste und größte deutsche Todtenträger, mit vier orangefarbenen Flecken auf den Flügeldecken.

Der Naturforscher 6. St. p. 95. 96. t. 4. f. 3.

*Oblonga, atra, maculis 4 aurantiacis, superioribus didymis; in Germania prope agros fecalinos.\*)*

An sexu diversa a *Silpha germanica*?

2. *Humator*, der mittlere Todtenträger.\*\*)

*Gleditsch vermischt physikalisch-botanisch-oekonomische Abhandl.* 3. B. p. 224. No. 2. t. 1. f. B.

*Oblonga nigra, clypeo orbiculato inaequali, elytris nigris, antennarum lamellis ferrugineis; inter germanicum et vespillonem media; in Saxonia.*

Raj. Inf. p. 107. No. 1.

*List. loqu. 381. Scarabaeus majusculus ex toto niger.*

3. *Contusa*, der schwarze Todtenträger mit stumpfen Flügeldecken.

Müller

\*) Auch in unsren Gegenden bey Quedlinburg findet sich dieser ansehnliche Käfer, den ich, weil er sich seltener zeiget, für das Männchen von *Silpha germanica* halte. Die rothen Flecke aber vergehen mit der Zeit.

\*\*) Da der Ritter den Lister bey *Silph. germ.* angeführt hat; so erheilet, daß er diesen nicht gekannt, sondern mit jenem verwechselt habe;

*Müller* Faun. Fridr. p. 5. No. 42.

Nigra, elytris sulcatis, contusis; in *Semita*.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 593. *Peltis* contusa.

Nigra, clypeo tomentoso, antice et postice emarginato, elytris trilineatis pubescentibus.

#### 4. *Grisea*, der grauliche Todtengräber.

*Pontoppid.* N. G. von D. p. 201. No. 16. t. 16. a. b. \*)

*Thorace* pallide-fusco; *elytra* testacea, marginibus et fascia fuscis.

#### 5. *Clavipes*, der Keulschenkel. \*\*)

*Sulzers* Gesch. t. 2. f. 14. S. 28.

*Füesslins* schweiz. Inf. p. 6. No. 80.

Tota nigra; maxima in *Helvetia*, antennae antice ferrugineae; postica crura mirum crassa, inclinata, denteque instructa.

#### 6. *Appendiculata*, der Deckelschwanz.

*Füesslins* schweiz. Inf. p. 6. No. 89.

*Sulz.* Gesch. t. 2. f. 15. S. 28. der *Geschwänzte*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 120. *Peltis* 2. *Le Bouclier noir à corcelet raboteux.* *Peltis nigra*, elytris lineis tribus elevatis, spatio interjecto minutissime punctato, *thorace scabro*.

*Fabric.* S. E. p. 75. *Silpha* 13. *Sinuata.* *Thorace* emarginato rugosissimo, elytris lineis elevatis tribus apice *sinuatis*.

#### 7. *Polita*,

\*) Ausser diesem, sagt der *Bischof*, findet man noch sechs andere Arten von veränderter Größe, Linien, u. s. w. die aber nicht beschrieben sind.

\*\*) V. No. 35.

7. *Polita*, der glatte Todtengräber.

*Füesslins*, schweiz. Inf. p. 6. No. 90.

*Sulz.* Gesch. t. 2. f. 16. S. 28. der *Glatte*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 122. *Peltis* 8. La *gouttière*.  
*Peltis nigra tota, elytris laevibus, punctis minimis*  
*excavatis.*

*Fabric.* S. E. p. 74. *Silpha* 10. *laevigata*.

*Atra, elytris laevibus subpunctatis.*

8. *Flavifrons*, der *Gelbkopf*.

*Füesslins* schweiz. Inf. p. 6. No. 93.\*)

*Sulz.* Gesch. t. 2. f. 17. S. 28.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. t. 5. f. 2. p. 307. *Anthribus* 3.  
*Antribe noir strié.* Ater, *elytris apice cinerascen-*  
*tibus.*

*Schaeff.* Elem. t. 18. f. 1. *Anthribus*, *Bürstenkäfer*.

9. *Multistriata*, der *alexandrinische Vielfrich*.

*Forßkal* descript. Animal etc. in itin. orient. p. 77.

*Cinerea; elytris striis plurimis; thorace emargi-*  
*nato.*

Facies et magnitudo *Silphae fabulosa*e. Tota cine-  
 rea; *striis* in singulo elytro 8. excavatis; intersticiis,  
 microscopio visis, tuberculatis.

*Alexandriae sub herbis, rarius.*

10. Nov.

\*) Da ihn *Füesslin* nie auf den Blumen, sondern oft in hartem, schon lange gelegenen *Buchholz*, unter desselben Rinde ange-  
 troffen hat; so rechnet er ihn unter die *Silphen*. *Füesslin* hat  
 ihn mit einem Sternchen bezeichnet, weil ihn *Linné* nicht hat;  
*Sulzer* aber sagt l. c. es sey *Linnéi* No. 22. *S. oblonga*, welches  
 ich nicht entscheiden will.

10. *Noveboracensis*, der neuyorkische Rothrand.

*Forster* nov. spec. Inf. Cent. I. p. 17. No. 17.

*Nigra, elytris piceis; lineis elevatis subternis, clypeo retuso, disco atro, margine rubro.*

In Americae Septentrionalis provincia Noveboracensi.

11. *Scabra*, der hökrichte Aaskäfer.

*Scopoli* Entom. carn. No. 59.

*Thorax subcinereus, tuberculis atris seriatim scaber.*

*Elytris striis 3. elevatis ramosis.*

12. *Flavicans*, der russische Todtengräber mit gelben Flügeldecken, und vier schwarzen Punkten.

*Lepechin* Reise durch Russl. I. Th. S. 202. t. 16. f. 4.

*Elytris flavis, punctis quatuor nigris; thorace atro, marginie flavicante.*

13. *Cassidoidea*, der russische schildkäferartige Todtengräber.

*Lepechin* Reise durch Russl. I. Th. p. 312. t. 19. f. 3.

*Superne atra, inferne ferruginea, marginibus thoracis atque elytrorum rubicundis.*

14. *Tomentosa*, der rauche Aaskäfer.

*de Geer* Inf. Tom. 4. p. 183. No. 8. *Bouclier velu.*

*Villosa, supra nigro-fusca, subtus atra, capite tomentoso; elytris tribus elevatis.*

15. *Rufipes*, der Rothfuß.

*de Geer* Inf. Tom. 4. p. 188. No. 15. *Bouclier à pattes rousses.*

*Supra nigra, subtus fusca, pedibus rufis; elytris laevibus.*

16. *Carolina*, der karolinische Rothmond.

Linn. Mantiss. p. 530.

Oblonga atra, clypeo orbiculato aequali; elytris basi apiceque lunula ferruginea.

17. *Dytiscoïdes*, der wässerkäferartige Todtengräber von der Insel Helena.

Fabric. S. E. p. 67. *Sphaeridium* 2.

*Ferrugineum*, elytris atris; Statura et magnitudo Derm. *Scarabaeoides* Linn. No. 17.

Mus. Dom. Banks.

18. *Haemorrhoidalis*, der englische Todtengräber mit rothgespitzten Flügeldecken.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 308. No. 5. *L'Antriebe à deux points rouges au bout des etuis. Anthribus niger ovatus*, elytris apice punctis duobus rubris.

Fabric. S. E. p. 67. *Sphaeridium* 5.

Atrum, elytris apice rufis; in stercore bovino *Angliae*; Statura *Silphae atomariae*, at paulo minus.

Dom. Banks.

19. *4-pustulata*, der neuholländische Blutfleck.

Fabric. S. E. p. 67. *Sphaeridium* 6.

Atrum, nitidum, thoracis margine elytrorumque macula sanguineis.

Mus. Dom. Banks.

20. *Fimetaria*, der englische ganz schwarze, ungefleckte Aaskäfer.

Fabric. S. E. p. 68. *Sphaeridium* 7.

Atrum, immaculatum; elytris laevissimis.

Mus. Dom. Banks.

- 21. *Minuta*, das *englische ganz kleine Aaskäferchen*.

*Fabric. S. E. p. 68. Sphaeridium 8.*

*Atrum, elytris striatis, pedibus concoloribus.*

*Mus. Dom. Banks.*

22. *Collaris*, das *neuholländische rothe Halsband*.

*Fabric. S. E. p. 69. Tritoma 2.*

*Nigra, thoracis lateribus, abdomineque rufis.*

*Antennae filiformes, ideoque de genere haereo:  
forte potius Anthrenus.*

*Mus. Dom. Banks.*

23. *Crenata*, der *schwedische geriefte Rothfleck*.

*Fabric. S. E. p. 69. Tritoma 4.*

*Oblonga, nigra, thorace rugoso, elytris striatis;  
maculis duabus rubris.*

24. *Ruffrons*, die *englische Rothstirn*.

*Fabric. S. E. p. 69. Tritoma 5.*

*Oblonga, glabra, atra, fronte, pedibus, maculis-  
que duabus elytrorum ferrugineis.*

*Dom. Banks.*

25. *Surinamensis*, die *Surinamische Zahnhüfte*.

*Fabric. S. E. p. 72. Silpha 1.*

*Atra, elytris: fascia postica flava, femoribus posti-  
cis dentatis.*

*Mus. Dr. Hunter.*

26. *Laevicollis*, der *neuholländische Glatthals*.

*Fabric. S. E. p. 73. Silpha 7.*

*Gibba nigra; elytris rugosis lineis elevatis tribus;  
thorace laevi emarginato.*

*Mus. Dom. Banks.*

27. *Paedemontana*, der muschelbraune piemontefische Aaskäfer.

*Geoffr. Inf. T. I. p. 123. No. 9. Le Bouclier fauve.*  
*Peltis tota testacea.*

*Fabric. S. E. p. 75. Silpha 15.*

*Testacea*, antenais apice nigris.

Dr. Allioni.

28. *Gibba*, der schwedische Buckelaaskäfer.

*Fabric. S. E. p. 76. Opatrum 2.*

*Nigrum; elytris lineis elevatis plurimis obsoletis;*  
*in Sueciae collibus arenosis.*

29. *Arenaria*, der kapensische Sandgräber.

*Fabric. S. E. p. 76. Opatrum 3.*

*Griseum, elytris striatis.*

Mus. Dom. Banks.

30. *Orientalis*, der Forstkähliche orientalische Dreyeckchen.

*Fabric. S. E. p. 76. Opatrum 4.*

*Cinereum, thorace rugosique rugosis tibiis anticis dilatatis triangularibus. D. Forstkähl.*

31. *Cinereo-obscura*, das kleine dunkelasthfarbige schwedische Aaskäferchen.

*Fabric. S. E. p. 77. Opatrum 5.*

*Cinereum; thorace rugoso; elytris lineis elevatis quatuor laevibus.*

32. *Discoidea*, der schwarze englische Todtengräber mit röthlichem Mittelfleck auf den Flügeldecken.

*Fabric. S. E. p. 78. Nitidula 5.*

Thorace

Thorace marginato, nigra, elytrorum disco ferrugineo.

Domin. Banks.

33. *Aenea*, der englische kupferfarbige Todtengräber.

Fabric. S. E. p. 78. *Nitidula* 7.

Thorace marginato viridi, aenea, antennis pedibusque nigris.

34. *Cadaverina*, Müllers Aaskäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 592. *Peltis cadaver*.

Nigra, thorace ferrugineo, elytris flavidantibus, puncto et maculis rivularibus nigris.

35. *Femorata*, die Keilhüfte.\*)

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 594. *Peltis femor*.

Atra, clypeo orbiculato nitido, femoribus posticis clavatis, denticulatis.

36. *Vndata*, der gewässerte Aaskäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 595. *Peltis vnd*.

Nigra, thorace punctato, elytris lineis tribus abbreviatis, spatio interjecto undulato.

37. *Dermetina*, der dermetesartige Aaskäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 596. *Peltis dermet*.

Oblonga nigra, elytris testaceis, striis transversis flexuosis, nigris.

N 3

38. *Vil-*

\* ) Vermuthlich No. 5. *Clavipes*.

38. *Villosa*, der gelbwollichte Aaskäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 597. *Peltis villosa*.

*Nigricans, tomento subflavo, ore antennis pedibusque rufis.*

39. *Scutellata*, der schwärzliche Aaskäfer mit einem Schildchen.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 598. *Peltis scutellata*.

*Nigricans, elytris pedibusque testaceis.*

40. *Truncatella*, das glatte abgestumpfte Aaskäferchen.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 599. *Peltis truncata*.

*Rufa, glabra, thorace emarginato, oculis nigris.*

41. *Arborea*, der punktierte Aaskäfer an den Bäumen.\*)

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 602. *Peltis arborea*.

*Oblonga ferruginea, pilosa, punctata, elytris nigris basi flavicante.*

42. *Lineata*, der lineirte Aaskäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. pag. 64. No. 603. *Peltis lineata*.

*Subflava, thorace elytrisque lineis elevatis cinereis.*

43. *Padina*, das Schwarzauge.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 605. *Peltis padina*.

44. *Semi-*

\**) Affinis Silphae Succinctae L. No. 26.*

44. *Seminulum*, das Körnlein.\*)

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 606. *Peltis*  
femin.

*Nitidissima*, brunnea, *elytris haemisphaericis*.

Ausserdem hat *Geoffroi* noch zween *Silphas*, die ich bey keinem Schriftsteller angemerkt finde.

1. *Laevidorsa*, der Glattrücken.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 121. *Peltis* 5. *Le Bouclier noir chifonné à corcelet lisse.*

*Nigra*, *elytris lineis tribus elevatis acutis, spatio interjecto veluti complicato, thorace laevi.*

2. *Subvillosa*, das Rauchkäferchen.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 123. *Peltis* 10. *Le Bouclier brun velouté.*

*Niger*, *fusca subvillosa*.

Ein neues Geschlecht von Blumenkäfern, welches *Scopoli* gleich nach den Silphen gesetzt, und *Laria* genennet hat.

*Antennae extrorsum crassiores. Thorax pulvinatus. Fulcrum femorale nullum, aut obscurum.*

1. *Hyoseris*, der Hyoseriskäfer.

*Scopol.* Entom. carn. No. 61.

*Nigra, tibiis ferrugineis; in floribus *Lapsanae foetidae*, Fl. Carn. quae *Hyoser.* Linn.*

N 4

2. *Dul-*

\*) Vielleicht eine Abänderung von Linn. *Seminulum* No. 8.

Alle diese letzteren von No. 34. bis 44. sind allein von dem Herrn Staatsrath Müller entdeckt worden.

2. *Dulcamarae*, der *Bitterüßskäfer*.*Scopol.* Entom. carn. No. 62.*Thorax cum elytris punctatis, castanei fere coloris; in floribus Solani dulcamarae.*3. *Sileris*, das *Laserpitienkäferchen*.*Scop.* Entom. carn. No. 64.*Fusca; elytris abbreviatis, immaculatis, striatis; in floribus Laserpitii Sileris.*4. *Quadrivittata*, das *kraynsche Bergkäferchen*.*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 85. No. 29.*Nigricans, ovata; thorax maculis quatuor rufis; in montanis Carnioliae.*197. GESCHLECHT. *Cassida*, *Schildkäfer*; *holl.*  
*Schild-Torretjes*.*Müllers* Linn. Naturs. 5. Th. 1. B. S. 135. *Schildkäfer*.*Flüesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 6. *Schildkäfer*.*Sulzers* Kennz. S. 52. } *Schildkäfer*.*— —* Gesch. S. 29. } *Schildkäfer*.*Börners* Samml. 1. Th. S. 465. *Schildkäfer*.*Beckmanns* Anfangsgr. S. 94. } *Schildkäfer*.*Eberhards* Thiergesch. S. 199. } *Schildkäfer*.*Pontopp.* N. G. v. D. S. 201.*Ouomat*, hist. nat. P. 2. 663. *Schildkäfer*.*Fabric.* S. E. p. 88. *Cassida*.*Catholicon* C. p. 126. *Schildkäfer*.*Müller's* Faun. Fridr. p. 5.*— —* Zool. Dan. Prodr. p. 65.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 310. la *Casside*.*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 165. des *Cassides*.*Scop.* Entom. carn. p. 37.I. *Viri-*

1. *Viridis*, der grüne Distelschildkäfer.

Müller l. c. S. 135. No. 1. t. 3. f. 12. a, b, B. der Grünschild.

Füesslins Verz. S. 6. No. 94. der Grüne.

Röfels 2. B. Erdk. 3. Kl. S. 13. t. 6. der auf grossen Disteln sich aufhaltende Schildkäfer.

Frisch Inf. 4. Th. S. 30. t. 15. 13. Th. S. 35. t. 29. der grüne Schildmarienwurm; grüne Schildkäfer.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 668. der grüne ab lange glatte Schildkäfer.

Aota Vpsal. 1736. p. 17. No. 1. *Cassida viridis*, corpore nigro.

Raj. Inf. p. 107. No. 5. *Scarabaeus antennis clavatis*, clavis in annulos divisitis.

Lift. Goed. p. 286. t. 116. *Testudo viridis*.

Pontopp. N. G. v. D. p. 201. No. 1.

Fabric. S. E. p. 88. No. 1.

Mülleri Faun. Fridr. p. 5. No. 43.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 608.

Nigra, supra viridis, pedibus luteis.

Schaeff. Icon. t. 27. f. 5.

Reaumur Inf. Tom. 3. t. 18. f. 15-19. *Scarabé des Chardons*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 312. No. 1. *Casside verte*.

de Geer Inf. T. 5. p. 174. No. 2. *Casside du Chardon*.

*Cassida (cardui) viridis*; corpore nigro, pedibus flavescensibus.

2. *Murraea*, der Murrayische Schildkäfer.\*)

Müller l. c. S. 137. No. 2. der Alantküfer.

Martini Naturlex. (künftig) der Rothschild.

Fabric. S. E. p. 90. No. 10.

N 5

Geoffr.

\*) Nirgends abgebildet.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 314. No. 5. B. La Casside panachée.*

*Rubra, maculis nigris variegata.*

3. *Nebulosa*, der *Wolkenschild*.\*)

*Müller l. c. p. 137. No. 3.*

— — *Faun. Fridr. p. 5. No. 44.*

— — *Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 610.*

*Nigra, supra pallida, elytris striatis, punctis sparassis nigris.*

*Pontopp. N. G. v. D. p. 201. No. 2. der bleichgelbe schwarzgesprenkelt Schildkäfer.*

*Onomatol. hist. nat. P. 2. pag. 665. der eyförmige, blasse, neblichte Schildkäfer.*

*Fabric. S. E. p. 89. No. 5.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 313. No. 2. La Casside brune.*

*Cassida, nebula, pallida, corpore nigro.*

*Schaeff. Icon. t. 27. f. 4.*

4. *Nobilis*, der *Blaustrich*.

*Müller l. c. p. 137. No. 4. t. 3. f. 12. c.*

— — *Faun. Fridr. p. 5. No. 45.*

*Müller*

\*) Bey diesem Schildkäfer sowohl, als bey dem ersten *Viridis* hat *Linné* einerley *Rößelsche* Abbildung, nämlich 2. B. 3. Kl. der K. t. 6. angeführt; allein der Beschreibung und Anschen nach ist der *Rößelsche* Schildkäfer der *Viridis*, und nicht *Nebulosa*, welches auch der Herr von *Geer* bey seinen *Citatis* Tom. 5. p. 174. bestätigt. So gehöret auch das *Linneische* *Citatum* des *Frisch* 4. Th. p. 30. t. 15. nach dem von *Geer* zu der ersten Gattung, nämlich zu *Viridis*. Indessen scheint der Herr Prof. *Müller* Recht zu haben, der diesen nur für eine Verschiedenheit des ersten ausgiebt. Sichere Erfahrungen haben mich gelehrt, dass er einerley sey mit *Viridis*, weil dieser, wenn er todt ist, ausblaßt, und *Nebulosa* wird.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 609.

Nigra, supra grisea, linea punctoque elytrorum oricalcico.

Pontopp. N. G. v. D. p. 201. No. 3. \*)

Fabric. S. E. p. 90. No. II.

Raj. Inf. p. 107. No. 7.

Schaeff. Icon. t. 96. f. 6.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 313. No. 3. La Casside à bandes d'or. Cassida pallida, linea duplice longitudinali viridi deaurata.

5. *Vibex*, der schrebersche Schildkäfer. \*\*)

Müller l. c. p. 138. No. 5. der Striemenschild.

Fabric. S. E. p. 89. No. 4.

6. *Maculata*, der schrebersche Fleckenschild.

Müller l. c. p. 138. No. 6. der Fleckenschild.

Fabric. S. E. p. 88. No. 2.

Raj. Inf. p. 88. No. 13. *Scarabaeus minor*, sordide fulvus, punctis et maculis aliquot nigris temere sparsis notatus.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 314. No. 5. t. 5. f. 6. Viridis, maculis nigris variegata.

List. Goed. p. 287. No. 117. †)

de Geer Insect. Tom. 5. p. 175. No. 3. *Casside panachée*. ††) Cassida supra viridis, subtus nigra, elytris aliquot nigro-maculatis, pedibus nigris.

Raj.


\*) Sehr rar, und wird nur, wenn er lebendig ist, an einer grünen Linie erkannt, die im Tode vergehet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Eben dieses Citatum hat Linné zu *Nebulosa* No. 3. gesetzt, welches nach dem Herrn von Geer zu diesem Maculata gehört.


††) Diese Benennung gehört eigentlich zu der 2ten Gattung des *Geoffroi*, als einer Varietät, oder zu No. 2. *Murraea*.

*Raj.* Inf. p. 88. No. 13. *Scarabaeus minor* sordide fulvus, punctis et maculis aliquot nigris temere sparsis notatus.\*)

7. *Spinifex*, der *Stachelträger*.\*\*) 

*Müller* l. c. p. 138, No. 7.

*Fabric.* S. E. p. 92. No. 20.

8. *Bitornis*, der *zweyhörnige Schildkäfer mit abgeflutzen Flügeldornen*.†) 

*Müller* l. c. p. 139. No. 8. der *Flügeldorn*.


*Fabric.* S. E. p. 91. No. 18.

9. *Cruciata*, der *Kreuzträger*. 

*Müller* l. c. p. 139. No. 9.

*Fabric.* S. E. p. 90. No. 12. *Flavescens; coleopteris disco nigro; maculis quatuor flavescensibus*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. pag. 187. No. 12. t. 15. f. 15.  
*Casside en croix.* *Cassida hyalina pallide flava; elytris disco macula magna fusca cruciata.*

10. *Bifasciata*, das *Doppelband*. 

*Müller* l. c. p. 139. No. 10.

*de Geer* Inf. Tom. 5. pag. 189. No. 15. t. 15. f. 18.  
*Casside à quatre taches noires.*

*Nigro-maculata*, *pellucida albo-flavescens; elytris subtus maculis quatuor nigris, abdomine nigro maculato.*

11. *Flava*, 

\*) Dieses vom Herrn von Geer hierbey angeführte Citatum steht nach dem Linné bey No. 3. *Nebulosa*. Bey dieser Gelegenheit will ich den Fehler in Müllers Verzeichniß der illuminirten Figuren 6. B. 2. Th. 197. *Cassida* No. 3. berichtigen, da es statt Rößels 88. No. 13. *Rajus* heißen muß.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Nirgends abgebildet.

11. *Flava*, der *Gelbling*.

Müller l. c. p. 139. No. 11.

Fabric. S. E. p. 92. No. 21.

de Geer Inf. T. 5. p. 184. t. 15. f. 13. *Casside jaune*.

Pallide flava immaculata, corpore subtus pedibus-  
que rufis.

12. *Purpurea*, der *Purpurfleck*.

Müller l. c. p. 139. No. 12.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 190. No. 16. t. 15. f. 19. *Cas-  
sida à disque rouge*.

Flavo-cytrea; *elytrorum disco macula rotunda dor-  
fali rubro-purpurea*.

13. *Leucophaea*, der *Gelbpunkt*. \*)

Müller l. c. p. 140. No. 13.

Fabric. S. E. p. 92. No. 22.

14. *Marginata*, (*Cincta*) der *Gelbrand*. \*\*)

Müller l. c. p. 140. No. 14.

Fabric. S. E. p. 90. No. 13. *Tuberculata*.

Testacea, margine thoracis *elytrorumque* flavis;  
*coleoptris basi trituberculatis*.

de Geer Inf. T. 5. p. 186. No. 11. t. 15. f. 14. *Casside à  
bordure*.

*Cincta ferruginea*, *thorace aeneo elytrisque puncta-  
tis*, *margine flavo*.

15. *Reticularis*, der *gelbe himmelblau gescheckte*  
*Schildkäfer*.

Müller

\*) Nirgends abgebildet. Bey diesem muss es heissen Amoen.

Acar. Vol. 6. p. 393. No. 10.

\*\*) Da No. 23. auch *Marginata* heisst; so würde ich diesen lieber  
*Cincta*, den *Gürtelschildkäfer* nennen.

*Müller* l. c. p. 140. No. 15. das Scheckenschild.

*Fabric.* S. E. p. 92. No. 23.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 188. No. 14. t. 15. f. 17. *Casside à rezeau*.\*)

*Cassida pellucida* albo flavescens; *elytrorum* disco nigro-reticulato.

*Linn.* S. N. ed. 10. p. 363. No. 9.

Flava nigro-punctata reticulata.

16. *Variegata*, das Buntschild.

*Müller* l. c. p. 140. No. 16.

*Fabric.* S. E. p. 92. No. 24.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 178. No. 2. t. 15. f. 6. *Casside variée*.

Fusco-rubra; *elytris* scabris nigro variegatis; late-ribus bifasciatis; *thorace* angulato; *antennis* nigris.

17. *Grossa*, der grosse schwarzpunktirte amerika-nische Schildkäfer.

*Müller* l. c. p. 141. No. 17. t. 3. f. 12. d. der Schwarzpunkt.\*\*)

*Sulzers* Gesch. der Inf. S. 29. t. 3. f. 1. der Tieger.

*Naturforscher* 6. St. p. 89. t. 4. No. 1.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 176. No. 1. t. 15. f. 5. *Casside grosse*.

18. *Cl-*

\*) Vielleicht nur eine Varietät von dem Geerischen No. 13. *Quadrata*.

\*\*) Dass sich hier der sel. Herr Prof. Müller in der Abbildung geirret, und den Sulzerschen Schildkäfer: Kennz. t. 2. f. 12. welches eigentlich Linn. *Silpha thoracica* No. 13. der Schildträger ist, mit diesem Grossa des Ritters offenbar verwechselt habe, wird Jedermann eingestehen, denn es gefallen sollte, die angeführten Abbildungen im Naturforscher und in dem Geerischen Werke mit dem Sulzerschen, und nachgestochenen Müllerschen Exemplare zu vergleichen.

18. *Clatrata*, der *Gitterschild*.

Müller l. c. p. 141. No. 18.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 179. No. 3. t. 15. f. 7. *Casside treillée*.

19. *7-guttata*, der *Siebentropf*.\*)

Müller l. c. p. 141. No. 19.

Fabric. S. E. p. 92. No. 26.

20. *Exclamationis*, das *Verwunderungszeichen*.\*\*) )

Müller l. c. p. 141. No. 20.

Fabric. S. E. p. 92. No. 27.

21. *Jamaicensis*, das *Kupferschild*.†)

Müller l. c. p. 142. No. 21.

Fabric. S. E. p. 91. No. 17.

22. *Cyanea*, der *Blauschild*.

Müller l. c. p. 142. No. 22. t. 3. f. 13.

Fabric. S. E. p. 91. No. 19.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 181. No. 5. t. 15. f. 9. *Casside azurée*.

23. *Marginata*, der *Schwarzrand*.††)

Müller l. c. p. 142. No. 23.

Fabric. S. E. p. 91. No. 16.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 185. No. 10. *Casside marginée*.

*Thorace*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Nirgends abgebildet.

††) Nirgends abgebildet, aber No. 11. Flava vollkommen, außer der Farbe, ähnlich.

*Thorace violaceo-nigro; elytris testaceis; margine punctisque duobus nigris.*

24. *Inaequalis*, der Hökerschild.

Müller l. c. p. 142. No. 24.

Fabric. S. E. p. 93. No. 28.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 182. No. 6. t. 15. f. 10. *Casside à deux taches jaunes.*

*Bimaculata*, supra fusco-aenea, subtus viridis nitens; *elytrorum* disco macula magna flava.

25. *Supposita*, der Schildkäfer mit geringelten Flügeldecken.

Müller l. c. p. 143. No. 25. die *Ringeldecke*.

Ledermüller mikrosk. Gem. und Augenerg. t. 28. fig. f, ff, g. der *Cochenillekäfer*. t. 44. fig. f. b. c. d.

Sloane, Voy. to the Islands etc. t. 237.

26. *Lateralis*, der Seitenfleck.

Müller l. c. p. 143. No. 26.

Sulzers Gesch. S. 29. t. 3. f. 2. \*)

Fabric. S. E. p. 93. No. 29.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 184. No. 8. t. 15. f. 12. *Casside laterale.*

*Fusco-aenea, abdomine nigro nitido, elytrorum margine exteriore, macula magna flava.*

27. *Discoïdes*, der Mittelfleck.

Müller l. c. p. 143. No. 27.

Fabric. S. E. p. 93. No. 30.

de Geer

\*) Im Sulzer ist ein Druckfehler, da es statt Linn. 36! Linn. 26. heißen muss.

de Geer Ins. Tom. 5. p. 183. No. 7. t. 15. f. II. *Casside à quatre taches jaunes.*

4-maculata, viridi-aenea nitida, *abdomine nigro;*  
*elytrorum disco maculis binis magnis flavis.*

28. *Petiveriana*, der *petiverische Riesenschildkäfer*.

Müller l. c. p. 143. No. 28. der *Vierfleck*.

Fabric. S. E. p. 272. No. 11. *Blatta Petiveriana*, die *petiverische Schabe*.

*Petiv.* Gazoph. t. 71. f. 1.

Seba Thes. Vol. IV. p. 95. t. 95. No. 21. *Scarabaeus fuscus*, *maculis dilute flavis*.

Pallas Spicil. Zool. fasc. 9. pag. 9. t. 1. f. 5. *Blatta Heteroclita*.

Sulzers Gesch. S. 113. t. XI. lit. a.

Schröters Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte. I. Th. S. 323. t. 1. f. 7. 8.

29. *Bipunctata*, der *Zweypunkt*.\*)

Müller l. c. p. 143. No. 29.

Fabric. S. E. p. 93. No. 33.

30. *Bipustulata*, der *Blatterschild*.

Müller l. c. p. 144. No. 30.

Naturforscher 6. St. p. 91. t. 4. f. 4.

Fabric. S. E. p. 93. No. 31.

31. *Angustata*, die *Schmaldecke*.\*\*) )

Müller l. c. p. 144. No. 31.

*Unab-*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.



## Unabgebildete Linnéische Schildkäfer.

1.	No.	2.	<i>Murraea.</i>
2.	No.	5.	<i>Vibex.</i>
3.	No.	7.	<i>Spinifex.</i>
4.	No.	8.	<i>Bicornis.</i>
5.	No.	13.	<i>Leucophaea.</i>
6.	No.	19.	<i>7-guttata.</i>
7.	No.	20.	<i>Exclamationis.</i>
8.	No.	21.	<i>Jamaicensis.</i>
9.	No.	29.	<i>Bipunctata.</i>
10.	No.	31.	<i>Angustata.</i>

## Neue Schildkäferarten.

I. CASSIDA *Noctiluca*: Scopoli Entom. carn. No. 118. v. LINN. *Lampyris Noctiluca* p. 643. No. 1.

2. *Perforata*, der *surinamische durchbohrte Schildkäfer*.

Pallas Spicil. Zool. fascic. 9. p. 3. t. 1. f. 1.

Majuscula, fere tota testacea, subtus nitida, supra absque nitore. Longitudo 5". — *Elytron* singulum ad basin auriculae humeralis extenuatum, et *framine oblongo pervium*.

3. *Affinis*, der *deutsche grauliche schwarz gesprenkelte Schildkäfer*.

Fabric. S. E. p. 88. No. 3.

*Elytris griseis nigro punctatis; thorace flavescente, immaculato.* Nimis *affinis* S. maculatae Linn. No. 6.

4. *Marginella*, das *brasiliatische Gelbrändchen*.

Fabric. S. E. p. 89. No. 6.

*Viridis, thoracis elytrorumque marginibus flavis.*

Mus. Dom. Banks.

5. Inter-

5. *Interrupta*, die neuholändische breite unterbrochene Schwarzlinie.

*Fabric.* S. E. p. 89. No. 7.

*Flavescens, thorace immaculato elytris ante marginem punctisque nigris, flavescentibus, linea lata atra in medio interruptis.*

Mus. Dom. Banks.

6. *Deusta*, der neuholändische Schildkäfer mit rothen Flügeldecken, und neun grossen schwarzblaulichen Seitenpunkten.

*Fabric.* S. E. p. 89. No. 8.

*Rufescens, thorace punctis duobus; elytris numerosis cyaneo-nigris, clypeo integro — punctis circiter novem lateralibus majoribus nigro-cyaneis.*

Dom. Banks.

7. *Cibraria*, der amerikanische Siebschildkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 90. No. 9.

*Rufescens; thorace punctis quatuor; elytris numerosis, nigris, clypeo emarginato.*

Mus. Dom. Banks.

8. *Biguttata*, der kayennische Zweytropf.

*Fabric.* S. E. p. 91. No. 14.

*Thorace flavo; elytris rufescentibus; maculis duabus lateralibus flavis.*

9. *Miliaris*, der gelbe zehnpunktierte Schildkäfer von der Insel Helena.

*Fabric.* S. E. p. 91. No. 15.

*Flava, thorace immaculato; elytris nigro-punctatis; margine bifasciato.*

Mus. Dom. Banks.

10. *Decussata*, der *jamaische* *bekreuzte Schildkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 93. No. 32.

*Nigro-coerulescens; elytris flavo-maculatis; maculis dorsalibus reticulatis, lateralibus distinctis.*

*Mus. Brit.*

11. *Tigrina*, der *grüne getigerte Schildkäfer*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 168. No. 1. t. 15. f. 15. 16.  
*Casside tigrée.*

*Viridis, punctis nigris, corpore subtus nigro; thorace maculis binis albis.*

*Schaeff.* Icon. t. 27. f. 4. a, b.

12. *Punctata*, der *amerikanische punktierte Schildkäfer*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 180. No. 4. t. 15. f. 8. *Casside punctuée.*

*Flavo-testaceo-rufa, maculis inaequalibus nitidis viridi-aeneis, corpore subtus nigro.*

13. *Quadrata*, der *surinamische Schildkäfer mit dem Viereck*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 188. No. 13. t. 15. f. 16.

*Pellucida albo-flavescens; elytrorum disco griseofusco, margine nigro.*

14. *24-punctata*, der *österreichische Vierundzwanzigpunkt*.

*Scop.* Ann. 5, hist. nat. p. 92. No. 47.

*Rubra, elytro singulo punctis 12. et macula nigra; subtus nigra.*

15. *Sanguinolenta*, der rothgesäumte Schildkäfer.

Franz von Paula Schrank Beyträge zur Naturgesch.

S. 61. §. 2.

Nigra, thorace elytrisque margine sanguineis.

16. *Subferruginea*, der strohfarbene Schildkäfer.

Fr. v. P. Schrank Beytr. zur Naturgesch. S. 62. §. 3.

Nigra, thorace, elytris, pedibusque subferrugineis  
immaculatis.

17. *Sanguinolenta*, der Blutfleck.

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 611.

Nigra, supra viridis, scutelli regione coccinea.

18. *Rubiginosa*, der Rostfuß.

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 612. Sciold-Bille.

Nigra, supra viridis, tibiis tarfisque luteis.

19. *Ferrugineus*, der Rostschild.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 314. No. 4. La Casside verte  
à corcelet brun.

Viridis, thorace ferrugineo.

198. GESCHLECHT. *Coccinella*, Blattlauskäfer; Marienhühnchen.

Holl. Lieven-heers Haantjes, Engel-tiets.

Engl. Lady-Cow.

Französ. Bête à Dieu; Vache à Dieu; Cheval de  
Dieu; Bête de la Vierge.

In Deutschl. Herr Gotts Mückel; Marienkäfer;  
Gotteskübigen; Gotteskälbchen; Marienhühnchen;  
Marienwürmchen, u. s. w.

Frisch Inf. 4. Th. S. 1. 2. *Gottes Küchlein*- Schäflein.

Müllers Linn. Natursl. 5. Th. 1. B. S. 145. Sonnenkäfer.

Füesslins schweiz. Inf. p. 6. *Halbkugelkäferchen*.

Börners Sammlungen etc. 1. Th. p. 466. *Gotteskübigen*.

Sulzers Kennz. der Inf. S. 54. *Runde Blattkäferchen*.

— — Gesch. S. 30. *Halbkugelkäferchen*.

Rössels Insektenbel. 2. B. Erdk. dritte Kl. S. 8.

Beckmanns Anfangsgr. der Naturhist. p. 93. Sonnenkäfer.

Eberhards Versuch einer Thiergesch. p. 202. *Blattlauskäfer*.\*)

Swammerd. Bibel der N. S. 170. *Unsres lieben Herrn; unserer lieben Frauen Hähnen*.

Bonnets Infektol. Uebers. S. 17. *Halbrunde Käfer; Gotteskälbchen; Marienwürmchen*.

Lessers Theol. der Inf. p. 70. 283. *Runde Schildkäfer; Scarabaei testudinarii; Marienkäfer; Gotteskälbergen; Cantharides rubeae; Unser Frowen Hänken*.

Pontoppid. N. G. v. D. p. 201. VI. *Dänisch Jomfrue Mariähöne, Agerhöne; vor Herres Höne. (Marienhuhn, Rebhuhn, unsres Herrn Huhn)*.

Bom.

\*) Der Name, den der Herr Prof. Eberhard diesen Insekten belegt hat: *Blattlauskäfer*, ist der schicklichste, und ihrer ganzen Natur und Oekonomie angemessenste, der ihnen hat gegeben werden können. Denn ihre Larven leben unter den Blattläusen, und verzehren sie, als ihre eigentliche Speise. Man muss sie mit der eigentlich sogenannten *Cocchenille* (*Coccus*) nicht verwechseln.

Sulzer untersucht ihre Benennungen, und sagt: man könne sie auch

*Körnerkäferchen von Kokkos*;

*Schönkäferchen von coccineus oder purpureus nennen*.

Bom. Dicq. P. III. p. 221.

Catholicon. C. p. 377. 378. *Coccinella*, *Cocchenille*;  
*Sonnenkäfer*; *Färbeurwurm*; *Marienkäfer*.

Reaumur Inf. Tom. 3. P. 2. p. 151. *Scarabés hemisphériques*; *Vaches à Dieu*; *Bêtes à Dieu*; *Cheveaux de Dieu*; *Bêtes de la Vierge*.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 27. *Coccinella*.

Commentar. Lips. Dec. I. Vol. V. p. 606.

Lift. Goed. p. 721. *Bestiolae Domini*; *Mariae Animalcula*; *Onze Lieven Heerens beesties*; *Onze Lieve Vrouwevens beesties*.

Fabric. S. E. p. 79.

de Geer Inf. Tom. 4. Prael. XII. No. 68. Tom. 5.  
p. 359. *Scarabés hemisphériques*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 318. *La Coccinelle*.

Hill hist. Anim. *Hemisphaeria*.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 65.

I. *Rothe*, oder gelbe Flügeldecken, mit schwarzen Punkten.

1. *Marginata*, der Breitsaum. \*)

Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. p. 147. No. 1.

Fabric. S. E. p. 79. No. 1. *Coleoptris rubris*; marginē nigro; thorace vtrinque puncto marginali albo.

2. *Surinamensis*, das Schwarzschild. \*\*)

Müller l. c. p. 147. No. 2.

Fabric. S. E. p. 79. No. 2.

3. *Sanguinea*, der Blutflügel, †)

O 4

Müller

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Nirgends abgebildet.

*Müller* l. c. p. 147. No. 3.

*Fabric.* S. E. p. 79. No. 3.

4. *Impunctata*, der *Ungefleckte*.\*)

*Müller* l. c. p. 147. No. 4.

*Füesslins schweiz. Inf.* p. 6. No. 95. das *ungefleckte Halbkugelkäferchen*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 615. *Nigra*, supra pedibusque rubris; *elytris puncto nullo*.

*Fabric.* S. E. p. 79. No. 4.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 369. No. 1. *Coccinelle rouge sans taches*.

5. *Annulata*, Schrebers *Ringelfleck*.\*\*) )

*Müller* l. c. p. 148. No. 5.

6. *Vnipunctata*, der *Einfleck*.†)

*Müller* l. c. p. 148. No. 6.

*Schriften der Dronth. und Norweg. Gesellsch.* 3. Th. p. 348. No. 5.

*Fabric.* S. E. p. 20. *Scarab.* 78. *unipunctatus*.

*Scarab.* muticus, scutellatus, ater coleopteris fluorescentibus, puncto communi nigro.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 616.

7. *2-punctata*, der *Zweypunkt*.

*Müller* l. c. p. 148. No. 7.

*Füesslins schweiz. Inf.* p. 6. No. 96. ††)

*Sulz.* Geschi. f. 3. f. 3. S. 32.

*Schriften*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Nirgends abgebildet.

††) Im Füesslin muss es bey dem Citato des Frisch nicht t. 9. sondern t. 16. heißen.

Schriften der Dronth. und Norw. Ges. 3. Th. p. 349.  
No. 6. t. 6. f. 2.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. p. 759. der *rothe Marienkäfer mit zwey schwarzen Punkten*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 31. die *kleine rothe englische Coccinelle mit zwey schwarzen Punkten*.

Fabric. S. E. p. 79. No. 6.

Frisch. Inf. P. 9. p. 33. t. 16. f. 4. der *runde Plattoder Marienkäfer der zweyten Grösse mit zwey Flügelpunkten*.

List. loqu. f. Scar. Angl. 383. 8.

Scarabaeus alter, niger, exiguus, pennarum crucis miniatulis, in quibus duae tantum maculae nigrae.

Petiv. Gazoph. p. 34. t. 21. f. 4. *Coccinella anglica binaculata, seu minor rubra*.

Reaum. Inf. Tom. 3. P. 2. p. 153. t. 31. f. 16. le petit Scarabé hemisphérique.

Raj. Inf. 86. 2. *Scarabaeus haemisphaericus minor* etc.

Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 46.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 65. N. 617. *Nigra, thoracis lateribus albis; elytris flavis, punctis nigris duobus.*

Schaeff. Icon. t. 9. f. 9.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 369. No. 2. *Coccinelle rouge à deux points noirs.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 320. No. 1. *Coccinelle rouge à deux points noirs.*

8. 3-punctata, der *Dreypunkt.* \*)

Müller l. c. p. 149. No. 8.

Füesslins schweiz. Inf. p. 6. No. 97.

O 5

9. 4-pun-

\*) Nirgends abgebildet.

9. *4-punctata*, der *Vierpunkt.*\*)*Müller* l. c. p. 149. No. 9.*Fabric.* S. E. p. 80. No. 10.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 618. *Nigra*;  
*thoracis* lateribus albis; *elytris* rubris; *punctis nigris*  
*quatuor.*

10. *Hebraea*, der *Hebräer.*\*\*) .*Müller* l. c. p. 150. No. 10.11. *5-punctata*, der *Fünfpunkt.**Müller* l. c. p. 150. No. 11.*Füesslins schweiz. Inf.* p. 6. No. 98.*Fabric.* S. E. p. 80. No. 11.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 6. No. 47.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 620. *Nigra*;  
*thoracis* angulis anticis albis; *elytris* rubris, *punctis*  
*nigris* *quinque.*

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 32. die *rothe Coccinelle*  
*mit fünf schwarzen Punkten.*

*Schaeff.* Icon. t. 9. f. 8.*Merian.* Inf. t. 61.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 320. No. 2.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 370. No. 7. *Coccinelle rouge*  
*à 5 points noirs.* *Coleopteris* rubris; *punctis* *tribus*  
*magnis* *duobusque minimis.*

12. *6-punctata*, der *Sechspunkt.**Müller* l. c. p. 150. No. 12.*List. Goed.* p. 268. f. 112.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 622. *Nigra*,  
*thorace* *luteo*; *punctis* *quinque*; *elytris* *fulvis*; *punctis*  
*sex* *nigris*, in triangulum dispositis.

13. *Tri-*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

13. *Trifasciata*, der *Dreyband*.\*)

Müller l. c. p. 151. No. 13.

Fabric. S. E. p. 80. No. 9. In *Europae hortis*.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 30. die *rothe Coccinelle mit fünf querlaufenden schwarzen Linien*.

Raj. Inf. 87. No. 9. *Scarabaeus haemisphaericus minor*, elytris ex albo liventibus, lineolis nigris in medio dorso pictis.

14. *Hieroglyphica*, die *gelbliche Coccinelle mit hieroglyphischen Figuren auf den Flügeldecken*.

Müller l. c. p. 151. No. 14. der *Egyptier*.

Sulzers Gesch. S. 31. t. 3. f. 4. der *Hieroglyph*.\*\*)

Fabric. S. E. p. 80. No. 7.

Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 48.

— — Zool. Dan. p. 65. No. 621.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 382. No. 15. *Coccinelle hieroglyphique*.

*Coleopteris* flavo-rubris; *fasciis* irregularibus sinuatis nigris.

16. *Septempunctata*, der *Siebenpunkt*.

Müller l. c. p. 151. No. 15. t. 4. f. 1. der *Wurm oder die Larve*,

Füesslins schweiz. Inf. p. 6. No. 99.

Frisch Inf. 4. Th. S. 1. t. 1. f. 4. der *runde Blattkäfer der größern Art*.

Rösls Insektenbel. 2. B. Erdkäf. 3. Kl. S. 7. t. 2. f. 3. der *runde, hochrothe Marienkäfer mit schwarzen Punkten*.

Akt. Nidr. III. p. 388.

Fabric.

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Um Sulzer fehlt am Rande Fig. 4.

*Fabric.* S. E. p. 81. No. 13.

*List. loqu.* f. *Scarab.* angl. 382. 7. *Scarabaeus alter niger.*

*Raj.* Inf. 86. 1. *Scarabaeus subrotundus*, f. *haemisphaericus rubens*, *major vulgatissimus*.

*Müller* Faun. Fridr. p. 6. No. 49.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 623. *Nigra*; *thorace angulis anticis albis*; *elytris rubris*; *punctis nigris septem*.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 33. No. 2. die *grosse rothe Coccinelle*.

*Poda. Mus. graec.* p. 24. c. *metamorphosi*.

*Faun. Suec.* ed. 2. No. 477.

*Suecis Åkerhöns*, *Nyckelpiga*, *Jungfru Mariae Höna*.

*Schaeff. Icon.* t. 9. f. 7.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 321. No. 3. t. 6. f. 1.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 370. No. 4. t. 10. f. 14. *Coccinelle rouge à 7 points noirs*.

*Petiv.* Gazoph. p. 33. t. 21. f. 3. *Coccinella anglica vulgatissima*, f. *rubra*, *septem nigris maculis punctata*.

16. *9-punctata*, der *Neunpunkt*.\*)

*Müller* I. c. p. 152. No. 16.

*Füeslins schweiz.* Inf. p. 7. No. 100.

*Fabric.* S. E. p. 81. No. 16.\*\*)

*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 322. No. 4. La *Coccinelle rouge à neuf points noirs et corcelet noir*.

*Coccinella coleopteris rubris*; *punctis novem nigris*; *thorace nigro*, *lateribus albis*.

*de Geer*

\*). Nirgends abgebildet.

\*\*) In *Fabric.* S. E. ist sie vermutlich durch einen Druckfehler *10-punctata* genannt.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 373. No. 6. *Coccinelle rouge à neuf taches noires.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 625.

17. *10-punctata*, der *Zehnpunkt.* \*)

Müller l. c. p. 152. No. 17.

Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 101.

Fabric. S. E. p. 82. No. 17.

Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 51.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 626. *Nigra; thorace albo punctis septem; elytris rubris punctis nigris decem.*

de Geer Inf. Tom. 5. p. 374. No. 7. *Coccinelle rouge à 10 points noirs.*

*Coccinella coleoptris* flavo-rubris; punctis nigris decem in cruce directis.

18. *11-punctata*, der *Eilfpunkt.*

Müller l. c. p. 153. No. 18.

Füesslins schweiz. Inf. p. 6. No. 102.

Fabric. S. E. p. 82. No. 19.

Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 52.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 627.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 34. die *rothe Coccinelle mit elf schwarzen Punkten.*

Acta Vpsal. 1736. p. 18. No. 2.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 375. No. 8. *Coccinelle à 11 points noirs.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 325. No. 9. La *Coccinelle argus.*

*Coleoptris rubris; punctis undecim nigris; thorace rubro immaculato.*

Abt. Nidr. III. t. 6. f. 2.

19. *12-punctata*

\*) Nirgends abgebildet.

19. *12-punctata*, der Zwölfpunkt.\*)*Müller* l. c. p. 153. No. 19.*Fabric.* S. E. p. 82. No. 20.*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 628.\*\*)20. *13-punctata*, der Dreyzehnpunkt.*Müller* l. c. p. 582. No. 20.*Füesslins schweiz. Inf.* p. 7. No. 103.*Schriften der Dronth. und Norweg. Gesellschaft.*

4. B. p. 269.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 33. die rothe *Coccinell* mit dreyzehn schwarzen Punkten.*Acta Vpfal.* 1736. p. 18. No. 2.*Fabric.* S. E. p. 83. No. 25.*Schaeff.* Icon. t. 48. f. 6.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 323. No. 6. La *Coccinelle rouge à 13 points noirs et corcelet jaune varié.*de Geer Inf. Tom. I. p. 375. No. 9. *Coccinelle à 13 points noirs.**Coccinella coleoptris rubris, punctis nigris tredecim.**Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 629.

Nigra, thorace luteo; macula media, punctoque vtrinque nigro; elytris rubris; punctis nigris tredecim.

— — Faun. Fridr. p. 6. No. 53.

21. *14-punctata*, der Vierzehnpunkt.*Müller* l. c. p. 154. No. 21.*Füesslins schweiz. Inf.* p. 7. No. 104.

Frisch Inf. 9. Th. p. 34. t. 17. No. 4. 5. der gelb- und schwarzfleckige Marienkäfer.†)

*Gleditsch*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Vix 12-punct. L.

†) Eben dieses Citatum hat *Linné* auch bey No. 51.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. p. 759. No. 94. der rothe weisspunktirte Marienkäfer.

Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 54.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 630. Coccinella tessulata.

Lutea; thorace macula tetraloba, elytris quatuordecim tetragonis nigris, saepe contignis.

Fabric. S. E. p. 83. No. 26.

Scop. Entom. carn. No. 243. Coccinella tessulata, die Würfel-Coccinelle.

Schaeff. Icon. t. 62. f. 6.

Poda Mus. graec. p. 25.

22. 16-punctata, der Sechzehnpunkt.\*)

Müller I. c. p. 154. No. 22.

Füesslin's schweiz. Inf. p. 7. No. 105.

23. Ocellata, der Funfzehnpunkt.\*\*)

Müller I. c. p. 154. No. 23. t. 4. f. 2. der Argus.

Martini allgem. Gesch. der Nat. 3. B. 1. Abth. S. 215. Argussonnenkäfer; Argus unter den Halbkugelküfern.

Fabric. S. E. p. 83. No. 27.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 32. die rothe grosse Coccinelle mit funfzehn schwarzen Punkten.

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 638. Nigra; thorace albo maculato; elytris flavis aut rubris; punctis nigris annulatis.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 376. No. 10. t. 11. f. 1. Coccinelle rouge à 15 points noirs.

Coleo-

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Größer als die übrigen. Das Sulzer'sche Citatum im Linné muss heißen: t. 3. f. 14. und gehört zu No. 38. wobei es Füesslin angeführt hat. v. unter den Nenen No. 18.

*Coleoptris rubris; punctis quindecim nigris flavo-marginatis.*

24. *18-punctata*, der *Achtzehnpunkt.*\*)

*Müller* l. c. p. 155. No. 24.

*Neuer Schauplatz der Natur* 1. Th. S. 80.

*Fabric.* S. E. p. 83. No. 28.

25. *19-punctata*, der *Neunzehnpunkt.*\*\*) )

*Müller* l. c. p. 155. No. 25.

*Füesslin* schweiz. Inf. p. 7. No. 106.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 632.

Lutea; thorace punctis sex; elytris noveundecim, nigris.

*Fabric.* S. E. p. 83. N. 29.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 325. No. 10.

*Coleoptris rubris*, punctis 19 nigris.

La *Coccinelle rouge à dix-neuf points noirs.*

26. *22-punctata*, der *Zweyundzwanzigpunkt.*

*Müller* l. c. p. 155. No. 26.

*Füesslin* schweiz. Inf. p. 7. No. 107.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 633.

Lutea; thorace punctis quinque; elytris viginti duobus nigris.

*Fabric.* S. E. p. 84. No. 31.

*Raj.* Inf. p. 87. No. 6. *Scarabaeus hemisphaericus* flavus, maculis nigris rotundis crebris notatus.

*Schaeff.* Icon. Inf. Tab. 30. f. 10.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 329. No. 17. La *Coccinelle jaune sans suture.*

*Coleoptris flavis*, punctis viginti nigris.†)

de Geer

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Dieses von dem Herrn von Geer bey dieser 22-punctata gesetzte

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 379. No. 12. *Coccinelle jaune à 22 points noirs.*

*Coleoptris flavo-citreis: punctis viginti-duobus thoraceque quinque nigris.*

27. 23-punctata, der *Schrebersche Dreyundzwanzigpunkt.*\*)

Müller I. c. p. 156. No. 27.

Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 108.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 634.

Nigra, thorace maculato; elytrisque rubris; punctis viginti tribus nigris.

Fabric. S. E. p. 84. No. 32.

28. 24-punctata, der *Vierundzwanziger.*\*\*) )

Müller I. c. p. 156. No. 28.

Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 109.

Mülleri Faun. Fridr. p. 6. No. 55.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 635. Nigra; thorace maculato; elytrisque rubris, punctis 24 nigris.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 34. No. 2. die *rothe Coccinelle mit 24 schwarzen Punkten.*

Fabric. S. E. p. 84. No. 33.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 326. No. II.

*La Coccinelle rayée.*

de Geer Inf. Tom. 5. p. 381. No. 14. *Coccinello roussatre à 24 points noirs.*

*Coleoptris rufo-fuscis, maculis quatuordecim quibusdam connexis, punctisque decem nigris.*

29. 25-pun-

setzte Geoffroische Citatum hat Fabric. zu seiner neuen Art No. 30.

20-punctata gesetzt, wohin es auch zu gehören scheint.

S. neue Coccinellenarten No. 14.

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

29. *25-punctata*, der *Fünfundzwanziger.* \*)

*Müller* l. c. p. 156. No. 29.

*de Geer* Inf. Tom. 5. pag. 381. No. 13. *Coccinelle rouge-brune à 22 points noirs.*

*Coccinella (22-punctata obscura)* coleoptris obscure rubris, punctis viginti duobus nigris connexis.

30. *Conglobata*, die *Griesdecke.* \*\*)

*Müller* l. c. p. 157. No. 30.

*Füesslins* schweiz. Inf. p. 7. No. 110.

*Frisch* Inf. 9. Th. pag. 34. t. 17. f. 6. der *flachliche Wurm*, und *dessen gelb- und schwarzfleckige Marienkäfer.*

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. pag. 31. No. 2. die *rote schwarzbefrengte Coccinelle.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 326. No. 12. *La Coccinelle à bordure, diè bordirte.*

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 378. No. 11. *Coccinelle couleur de Rose*, die *rosinrothe Coccinelle.*

*Rosea*, coleoptris rubris roseis, punctis *sedecim* nigris quibusdam connexis; *thorace* flavo punctis nigris.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 636.

31. *Conglomerata*, die *Hirsendecke.* †)

*Müller* l. c. p. 157. No. 31.

*Füesslins* schweiz. Inf. p. 7. No. 111.

*Fabric.*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) In der 12ten Ausgabe des N. S. hat *Linné* bey dieser und der folgenden einerley Citatum des *Raji* Inf. 87. No. 5. Ich finde aber in der 2ten Ed. der Faun. Suec. und dem von *Geer*, dass es eigentlich zu der folgenden No. 31. gehöre.

†) Bey dieser und No. 21. hat *Linné* einerley Citatum des *Frisch* 9. t. 17. f. 4. 5. v. No. 21.

Fabric. S. E. p. 84. No. 35.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 637.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 28. die gelbliche Coccinelle mit vielen schwarzen Punkten.

Schaeff. Icon. t. 171. f. 1. a. b.

Raj. Inf. p. 87. No. 5. Scarabaeus hemisphaericus flavus, maculis nigris variae figurae depictus.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 328. No. 15. La Coccinelle à l'échiquier, das Schachbrett.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 383. No. 17. Tessellata, coleoptris pallide flavis, maculis plurimis quadratis nigris connexis.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 402.

Cocc. coleoptris flavescentibus, punctis plurimis nigris, omnibus connexis sutura longitudinali nigra.

II. Rothe oder gelbe Flügeldecken mit weissen Flecken.

32. Guttato-punctata, der Tropfpunkt.\*)

Müller l. c. p. 157. No. 32.

33. 10-guttata, der Zehntropf.\*\*)

Müller l. c. p. 157. No. 33.

Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 112.

Fabric. S. E. p. 85. No. 37.

34. 14-guttata, der Vierzehntropf.

Müller l. c. p. 158. No. 34.

Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 113.

Fabric. S. E. p. 85. No. 38.

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 32. No. 1. die *rothe Coccinelle mit vierzehn weissen Flecken*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 492. *Quatuordecimpunctata*, coleoptris rubris, punctis albis quatuordecim.

— — F. S. ed. 1. No. 397.

*Act. Vpsal.* 1736. pag. 18. No. 5. *Coccinella punctis 14.*

*Schaeff. Icon.* t. 9. f. II.

*Raj.* Inf. p. 86. No. 3. *Scarabaeus hemisphaericus*; *elytris fulvis*, *maculis albis pictus*.

*List. loqu. f.* Scar. angl. p. 383. No. 10. *Scarabaeus subrufus*, cui in humeris pinnae maculatae, inque singularis alarum thecis septem maculae albae sunt.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 327. No. 13. La *Coccinelle à quatorze points blancs*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 385. No. 20. *Coccinelle rouge à 14 points blancs*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 639.

*Rufa*; *thorace duobus*; *elytris punctis quatuordecim* albis.

— — Faun. Fridr. p. 7. No. 57.

35. 16-guttata, der *Sechzehnropf*.

*Müller* l. c. p. 158. No. 35.

*Fleisslins schweiz. Inf.* p. 7. No. 114.

*Sulzers Gesch.* t. 3. f. 5. b. S. 32.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 33. No. 1. die *rothe Coccinelle mit sechzehn weissen Punkten*.

*Fabric.* S. E. p. 85. No. 39.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 399. *Cocc. coleoptris rubris*; *punctis sedecim albis*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 385. No. 21. *Coccinelle jaune à 16 points blancs*.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 640.

Lutea; thorace punctis sex sulphureis; elytris punctis tredecim albis.

36. 18-guttata, der Achtzehntropf.\*).

Müller l. c. p. 159. No. 36.

Neuer Schauplatz der Natur 1. B. p. 80.

Schaeff. Icon. t. 9. f. 12.

Fabric. S. E. p. 85. No. 40. 18-guttata.\*\*)

37. 20-guttata, der Zwanzigtropf.†)

Müller l. c. p. 159. No. 37.

Fabric. S. E. p. 85. No. 41.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 34. No. 1. die rothe Coccinelle mit zwanzig weissen Punkten.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 386. No. 22. ††) Coccinelle à 20 points blancs.

Coccinella flavo-rubra, seu nigra, coleoptris maculis magnis albis viginti.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 495. et No. 505. Tigrina.

38. Oblongo-guttata, der Langtropf.

Müller l. c. p. 159. No. 38.

Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 115.

P 3 Sulzers

\*) Dafs im Linné ein Druckfehler sey, und statt octodecim sedecim sthe, wird kaum dürfen erinnert werden.

\*\*) Hierbey hat zwar Fabric. den Linné nicht citirt; der Beschreibung nach scheinet es aber doch dieselbe zu seyn.

Coleoptris rubris, punctis albis octodecim; habitat in Europa; parva, punctis novem in singulo elytro.

†) Nirgends abgebildet.

††) Diese und No. 49. Tigrina hält der Herr von Geer für eineley Art, obgleich die letztere schwarze Flügeldecken hat.

*Sulzers* Kennz. t. 3. f. 14.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 30. No. 3. die *rote Coccinelle mit weissen länglichen Punkten.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 389.

*Coleoptris rubris*; lineis punctisque albis longitudinalibus.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 496.

— — *It. Oeland.* 148. *Coccionella coleoptris rubris*: lineis quatuor albis longitudinalibus.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 384. No. 19. *Coccinelle rougeatre, à rayes blanches.*

*Coleoptris flavo-rufis*; lineis maculisque oblongis sordide albidis.

*Fabric.* S. E. p. 85. No. 42.

*Schaeff.* Icon. t. 9. f. 10. t. 3. f. 14.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 641. *Rufa, thorace ex albo virente medio livido; elytris fulvis, lineis lutescentibus.*

### 39. *Obliterata*, der *Wischtröpf.* \*)

*Müller* l. c. p. 159. No. 39.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 382. No. 16. *Coccinelle jaune à 6 points pâles.*

*Coleoptris flavis*: punctis sex nigris pallidis, thorace flavo-albicante, punctis nigris.

*Rajus* Inf. p. 87. No. 7. *Scarabaeus parvus hemisphaericus e luteo albicans, punctulis nigricantibus tribus in linea ad elytrum transversa, et uno singulare ad ejus exortum.*

### III. Die

\*) Nirgends abgebildet.

III. Die Flügeldecken schwarz mit rothen Flecken.

40. *Impustulata*, der *Ungefleckte*.\*)

Müller l. c. p. 160. No. 40.

Fabric. S. E. p. 85. No. 43.

41. *Cacti*, der *Melokakt*, die *wahre Cochenille*.

Müller l. c. p. 160. No. 41.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 900. die *amerikanische Coccinelle auf den indianischen Feigen*. v. P. 3. p. 29. eine bloße Verschiedenheit der *europeischen Cochenille*.

Catholicon C. p. 378. die *wahre Coccinelle* (vulg. Kutzenelle), oder der *Opuntien-Sonnenkäfer* (*Cactus Opuntia*) mit pechschwarzen Flügeldecken, worauf zween rothe Flecken sitzen: es scheint aber auch *Coccus cacti* eine wahre Cochenille zu geben.

Unzers kleine physikal. Schriften p. 347.

Fabric. S. E. p. 85. No. 44.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 107. No. 99.

Niger; *elytro singula macula magna, rotunda, rubra*.

42. *z-pustulata*, der *Zweyfleck*.

Müller l. c. p. 160. No. 42.

Füsslins schweiz. Inf. p. 7. No. 116.

Frisch Inf. 9. Th. p. 33. t. 16. f. 6. der *runde Blatt- oder Marienkäfer der zwoten Grösse mit zwey Flügel- punkten*.

Rösls Infektenbel. 2. B. Erdkäfer 3te Kl. p. 10. t. 3. f. 4. der *kleine schwarze Schildkäfer mit zwey rothen Flecken*.

P 4

Fabric.

\*) Nirgends abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 86. No. 45.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 334. No. 26.\* *La Coccinelle tortue à bande rouge.*

*Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, fastia transversa rubra.*

de Geer Inf. Tom. 5. p. 387. No. 23. t. 10. f. 25.

*Coccinelle à deux points rouges.*

*Coleoptris nigris: maculis duabus ovatis rubris, abdomine sanguineo.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 642.

43. 4-pustulata, der *Vierfleck*.

Müller l. c. p. 161. No. 43.

Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 117.

*Fabric.* S. E. p. 86. No. 46.

Schaeff. Icon. t. 30. f. 16. 17.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 333. No. 25. *La Coccinelle tortue à quatre points rouges.*

*Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, punctis quatuor rubris.*

de Geer Inf. Tom. 5. p. 389. No. 24. *Coccinelle à quatre points rouges.*

*Coleoptris nigris: maculis quatuor rubris, anterioribus lunatis, posterioribus rotundis.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 643.

44. 6-pustulata, der *Sechsfleck*.

Müller l. c. p. 161. No. 44.

Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 118.

Müller Faun. Fridr. p. 7. No. 58.

*Fabric.*

\*.) Diese hält Herr Staatsrath Müller für eine *neue* Art. S. Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 648. *fasciata*. Unter den neuen hinten No. 32. b.

Fabric. S. E. p. 86. No. 47.

Schaeff. Icon. t. 30. f. 12.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 30. No. 1. die schwarze Coccinelle mit sechs rothen Punkten.

Raj. Inf. p. 87. No. 4. *Scarabaeus hemisphaericus minor*; *elytris nigris rubris maculis pictis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 331. No. 20. La *Coccinelle noire à points rouges.*

de Geer Inf. Tom. 5. p. 390. No. 25. *Coccinelle à 6 points rouges.*

*Coleoptris nigris; maculis duabus magnis, quatuor minoribus rubris.*

45. 10-pustulata, der *Zehnfleck.*\*)

Müller l. c. p. 161. No. 45.

Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 120.

Fabric. S. E. p. 87. No. 49.

Schaeff. Icon. t. 30. f. 10. t. 171. f. 2. a. b.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 644.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 330. No. 19. La *Coccinelle noire à dix points jaunes.*

*Coleoptris nigris, punctis decem flavescentibus auct rubris.*

de Geer Inf. Tom. 5. p. 391. No. 26. *Coccinelle à 10 points rouges.*

*Coleoptris nigris; maculis decem fulvis, anterioribus saepe connexis.*

46. 14-pustulata, der *Vierzehnfleck.*

Müller l. c. p. 161. No. 46.

Poda Mus. graec. p. 26. 14-maculata.

P 5 Fabric.

\*) Hier finde ich wieder eben das Citatum Frisch 9. t. 17. f. 4. 5. als bey No. 31. und 21.

*Fabric.* S. E. p. 87. No. 50.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 330. No. 18. *La Coccinelle noire à quatorze points jaunes.*

*Coleoptris nigris; punctis quatuordecim flavescen-*  
*tibus.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 646.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 391. No. 27. *Coccinelle noire à 14 points jaunes.*

*Coleoptris nigris: maculis quatuordecim aequalibus*  
*flavis.*

*Schaeff.* Icon. t. 30. f. 10.

47. *16-pustulata*, der *Sechzehnfleck.* \*)

*Müller* l. c. p. 162. No. 47.

IV. Schwarze Flügeldecken mit weissen und gelben Flecken.

48. *Pantherina*, der *Panther.* \*\*)

*Müller* l. c. p. 162. No. 48.

*Müller* Faun. Fridr. p. 7. No. 59.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 650. *Ager-*  
*Höne*, *Mari-Höne.*

*Fabric.* S. E. p. 87. No. 53.

*de Geer* Inf. T. 5. p. 392. No. 28. *Coccinelle panthere.*

*Coleoptris nigro-fuscis: maculis decem albo-fla-*  
*vescentibus.*

49. *Tigrina*, der *Tiger.*

*Müller* l. c. p. 162. No. 49.

*Fabric.* S. E. p. 88. No. 55.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 386. No. 22. †)

*Schaeff.* Icon. t. 30. f. 9.

Nach

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) v. No. 37. 29-guttata.

Nach *Pontoppidanus* Naturgesch. von Dänemark S. 201. 202. sind folgende *Linneische Coccinellen* auch in Dänemark zu finden.

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1. 2-punctata.  | 10. Conglobata.   |
| 2. 5-punctata.  | 11. Conglomerata. |
| 3. 7-punctata.  | 12. 14-guttata.   |
| 4. 9-punctata.  | 13. 2-pustulata.  |
| 5. 10-punctata. | 14. 4-pustulata.  |
| 6. 11-punctata. | 15. 10-pustulata. |
| 7. 13-punctata. | 16. 14-pustulata. |
| 8. 14-punctata. | 17. Tigrina.      |
| 9. 22-punctata. |                   |

### *Unabgebildete Linneische Coccinellen.*

- |                                   |
|-----------------------------------|
| 1. No. 1. <i>Marginata.</i>       |
| 2. No. 2. <i>Surinamenensis.</i>  |
| 3. No. 3. <i>Sanguinea.</i>       |
| 4. No. 4. <i>Impunctata.</i>      |
| 5. No. 5. <i>Annulata.</i>        |
| 6. No. 6. <i>Vulpinipunctata.</i> |
| 7. No. 8. <i>3-punctata.</i>      |
| 8. No. 9. <i>4-punctata.</i>      |
| 9. No. 10. <i>Hebraea.</i>        |
| 10. No. 13. <i>Trifasciata.</i>   |
| 11. No. 16. <i>9-punctata.</i>    |
| 12. No. 17. <i>10-punctata.</i>   |
| 13. No. 19. <i>12-punctata.</i>   |
| 14. No. 22. <i>16-punctata.</i>   |
| 15. No. 24. <i>18-punctata.</i>   |
| 16. No. 25. <i>19-punctata.</i>   |
| 17. No. 27. <i>23-punctata.</i>   |
| 18. No. 28. <i>24-punctata.</i>   |
| 19. No. 29. <i>25-punctata.</i>   |

20. No.

20. No. 32. *Guttato-punctata.*
21. No. 33. *10-punctata.*
22. No. 37. *20-punctata.*
23. No. 39. *Oblitterata.*
24. No. 40. *Impustulata.*
25. No. 47. *16-pustulata.*
26. No. 48. *Pantherina.*

### *Neue Coccinellenarten.*

#### I. Rothe oder gelbe Flügeldecken mit schwarzen Punkten.

##### 1. *8-punctata*, der Achtpunkt.

*Fabric.* Syst. Ent. p. 81. No. 14.

*Coleoptris rubris*: punctis *nigris* octo; habitat in Germania: magnitudo 2-punctatae.

*Mulleri* Faun. Fridr. p. 6. No. 50. in *Nemore.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 624.

*Nigra*, thorace testaceo, elytris rubris, punctis *nigris* octo.

##### 2. *Tredecim-maculata*, der Dreizehnfleck.

*Forsteri* nov. spec. Insect. Cent. I. p. 18. No. 18.

*Coleoptris luteis*, punctis *nigris* tredecim; thorace albo nigro-punctato. In *Pinis*, *Corylis*, *Plantis*-que variis *Angliae.*

##### 3. *18-punctata*, der Achtzehnpunkt.\*)

*Stop.* Entom. carn. No. 241.

Puncta *nigra* (8) in quolibet elytro, pleraque cohaerentia.

##### 4. *20-pun-*

\*) Vielleicht eine Abänderung von No. 24. *Linn.*

4. *20-punctata*, der *Zwanzigpunkt*.

*Scop. Entom. carn.* No. 242.

*Elytrum flavum*, punctis oblongis *nigris*.

5. *Lineola*, die *neuholländische Schwarzlinie*.

*Fabric. Syst. entom.* p. 79. No. 5.

*Elytris rubris*: *lineola baseos apicisque nigra*.

Mus. Dom. Banks.

6. *Inaequalis*, die *neuholländische ungleich gestreifte Coccinelle*.

*Fabric. S. E.* p. 80. No. 8.

*Elytris flavis*: punctis anticis tribus futura fascia-que apicis (*inaequali*) *nigris*.

Mus. Dom. Banks.

7. *Glacialis*, der *amerikanische Sechspunkt*.

*Fabric. S. E.* p. 80. No. 12.

*Coleoptris rubris*; punctis *sex nigris*, intermediis majoribus sinuatis.

D. Drury.

8. *9-punctata*, der *neuholländische Neunpunkt*.

*Fabric. S. E.* p. 81. No. 15.

*Coleoptris rubris*: punctis *novem nigris*, postice communis, thorace bipunctato.

Mus. Dom. Banks.

9. *Dilatata*, der *amerikanische Breitrand*.

*Fabric. S. E.* p. 82. No. 18.

Subrotunda, coleoptris marginatis fulvis: punctis *nigris decem*; elytrorum margine dilatato nigro.

10. *Chry-*

10. *Chrysomelina*, die *chrysomelenartige zwölf-punktirte Coccinelle von der Insel Helena.*

*Fabric.* S. E. p. 82. No. 21.

*Coleoptris rufis*: punctis duodecim nigris, thorace immaculato.

Mus. Dom. *Banks.*

II. *Borealis*, der *nordamerikanische Zwölfpunkt.*

*Fabric.* S. E. p. 82. No. 22.

*Coleoptris flavis*, punctis duodecim nigris, duobus communibus, vltimis orbiculatis.

D. *Drury.*

12. *Cassidea*, die *maryländische schildkäferartige Coccinelle.*

*Fabric.* S. E. p. 82. No. 23.

*Oblonga rubra*: coleoptris punctis duodecim, thorace quatuor nigris.

Mus. *Brit.*

13. *13-maculata*, der *schwedische Dreyzehnfleck.*

*Fabric.* S. E. p. 83. No. 24.

*Rotunda*, coleoptris flavis, punctis nigris tredecim.

14. *20-punctata*, der *englische Zwanzigpunkt.*

*Fabric.* S. E. p. 84. No. 30.

*Coleoptris flavis*: punctis nigris viginti.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 329. No. 17.\*)

15. *28-punctata*, der *trankebarische Achtundzwanzigpunkt.*

*Fabric.*

\*) S. No. 26.

*Fabric. S. E.* p. 84. No. 34.

*Coleoptris rubris; punctis nigris viginti octo.*

16. *Livida*, die leberfarbige *Coccinelle*, mit zween braunen Flecken.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 383. No. 18. *Coccinelle grise à deux taches brunes.*

*Coccinella livida; coleoptris griseo-lividis, postice maculis binis oblongis fusis.*

Raj. Inf. p. 87. No. 8. *Scarabaeus hemisphaericus minor, elytris e luteo lividis.*

17. *Maculata*, die surinamische schwarzgefleckte *Coccinelle*.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 392. exot. No. 1. t. 16. f. 22. *Coccinelle mouchetée.*

*Coccinella maculata ovata; coleoptris rubris: maculis magnis novem nigris, intermediis tribus in suturam positis.*

18. *Ocellata*, der fibirische *Argus.\**)

Pallas Reisen 2. Th. Anh. No. 73.

*Maxima inter europaeas. Coleoptris rubris, nigro-punctatis.*

Müllers Supplementsband p. 221. No. 31. der *Argus.*

19. a. *Cimifugae*, die *Wanzenkraut-Coccinelle.*

Pallas Reisen 2. Th. Anh. No. 73.

*Coleoptris rubris, quatuor maculis transversis nigris.*

Müllers Supplementsband pag. 222. der *Wanzenkrautkäfer.*

19. b.

\*.) S. N. 23.

19. b. *4-punctata*, der *Vierpunkt*.

*Pontopp.* Nat. Gesch. v. D. p. 203. t. 16.

Thorace flavo multipunctato; coleoptris *rubris* margine luteo, punctis marginalibus 4 nigris.

20. *Marginella*, die *gerändelte Coccinelle*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 619. *Nigra*, thorace luteo, punctis quinque, elytris flavis margine luteo, punctis 4 nigris.

*Pontopp.* Atl. Dan. I. t. 29.

Cocc. *4 punctata*.

21. *6-punctata*, der *Sechspunkt*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 622. *Nigra*, thorace luteo, punctis quinque, elytris fulvis, punctis sex nigris in triangulum dispositis.

22. a. *14-punctata*, der *Vierzehnpunkt*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 631. *Nigra*, thorace flavo punctis quinque, elytris rubris, punctis nigris 14.

II. *Rothe oder gelbe Flügeldecken mit weissen Punkten*.

22. b. *Detrita*, die *neuholländische Coccinelle mit ungefleckten Flügeldecken, und zweien weissen Punkten am Kopfe*.

*Fabric.* S. E. p. 85. No. 36.

*Flava*, coleoptris immaculatis; thorace albo maculato; caput punctis duobus orbitaque oculorum *albis*.

*Mus. Dom. Banks.*

23. 18-guttata, der *Achtzehntropf*.

*Fabric.* S. E. p. 85. No. 40.

*Coleoptris rubris, punctis albis octodecim.*

III. Schwarze Flügeldecken mit rothen Flecken.

24. 8-guttata, der *Achtfleck*.

*Fließlins schweiz. Inf. p. 7. No. 119.\*)*

*Sulzers Gesch. t. 3. f. 6. S. 32.*

25. Lunata, der *Mondfleck von der Insul Helena*.

*Fabric.* S. E. p. 86. No. 48.

*Coleoptris nigris, maculis decem rubris, sex lunatis.*

Mus. Dom. Banks.

26. Guttato-pustulata, der *neuholländische Tropfenfleck*.

*Fabric.* S. E. p. 87. No. 51.

*Coleoptris nigris, punctis duobus flavis, quatuor rufis.*

Mus. Dom. Blanks.

27. 3-pustulata, der *pensylvanische Dreyfleck*.

*de Geer Inf. Tom. 5. p. 393. exot. No. 2. t. 16. f. 23.*  
*Coccinelle à 3 taches rouges.*

*Coccinella (3-pustulata) coleoptris nigris: maculis tribus oblongis rubris.*

28. *Syimbrii*, der *russische Wellsamen-Sonnenkäfer*.

*Lepe-*

\* Vielleicht nur eine Abänderung von No. 44. oder 45. *Linnei*.

Im Fließlin steht statt 8-guttata, 8-pustulata.



*Lépechins* Tageb. 1. Th. S. 10.

Atro capite, marginibus thoracis atque elytrorum vnde sanguineis.

29. *Axyridis*, die *sibirische Mengelkraut-Coccinelle*.

*Pallas Reisen* 2. Th. Anh. No. 71.

*Müllers Supplementsband* p. 222. No. 47. der *Mengelkäfer*.

30. *Austriaca*, der *österreichische Sonnenkäfer*.

Franz von Paula Schrank Beyträge zur Naturgesch. S. 62. §. 4. Nigra, elytris *fascia rosea* abrupta. *Coccinellæ* Linn. No. 41?

31. *12-pustulata*, die *Zwölfblätter*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 68. No. 645.

*Coleoptris nigris*, punctis duodecim flavis, ultimo in singulo elytro hamato.

*Pontopp.* Atl. Dan. I. t. 29.

32. a. *Cincta*, die *gegürtele*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 68. No. 647.

Nigra, elytrorum maculis quatuor summoque margine *rubris*.

*Schaeff. Icon.* t. 13. f. 16, 17.

32. b. *Fasciata*, die *Band-Coccinelle*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 68. No. 648.

Nigra, capite, abdomine elytrorumque serie transversali *rubra*.

S. No. 42. *Linn. 2-pustulata*.

IV. Schwarze Flügeldecken mit weissen und gelben Flecken.

33. 12-pustulata, der *Zweölffleck*.

*Pontoppid.* Nat. Gesch. v. D. p. 203. t. 16. a. b.

*Coleoptris nigris*; punctis 12 *flavis*, ultimo in singulo elytro hamato.

34. 2-maculata, der *Zweyfleck*.

*Pontopp.* N. G. v. D. p. 203. t. 16.

*Coleoptris nigris*, maculis 2 transversalibus *flavis*, margine exteriori adnatis, ante futuram versus basin elytrorum incurvatis. *Thorax niger*, margine flavescente.

35. 4-maculata, der *idrische Vierfleck*.

*Scop.* Entom. carn. No. 250.

*Elytrum fuscum*, maculis *fulvis*.

36. 10-maculata, der *Zehnfleck*.

*Scop.* Entom. carn. No. 251.

*Elytrum fusco-rufum*, maculis (5) *flavocantibus*.

37. *Felina*, die *nordamerikanische runde Coccinelle*.

*Fabric.* S. E. p. 87. No. 52.

*Globosa*, *coleoptris atris*, punctis sex *albis*.

D. Drury.

38. *Fimbriata*, das *Eingefasste*.

*Sulzers* Gesch. S. 32. t. 7. lit. C.

39. a. *Leonina*, die *neuholländische Coccinelle*.

*Fabric.* S. E. p. 87. No. 54.

*Coleoptris atris*, punctis *albis* sedecim.

39. b. *Didyma*, der *Zweyfleck*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 649. *Nigra, thorace vtrinque, margine maculaque elytrorum ac pedibus flavibus.*

*Pontopp.* Atl. Dan. I. t. 29.

V. Einige neue Scopolische Coccinellen, blos nach den Farben unterschieden.

1. *Ganz einfarbige.*40. *Riparia*, die *himmelblaue Ufer-Coccinelle*.

*Scopoli* Entom. Carn. No. 223.

*Oblonga, nitens, obscure coerulea tota, elytris punctatim striatis.*

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 8. No. 132. *Chrysomela riparia.*

41. *Erratica*, die *kupfergrüne herumschwärrende Coccinelle*.

*Scop.* Ent. carn. No. 226.

*Oblonga nitida viridi-aenea; elytris punctatim striatis.*

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 8. No. 133. *Chrysomela erratica.*

42. *Rufipes*, der *Rothfuss*.

*Scop.* Ent. carn. No. 227.

*Oblonga, nigra, nitida; antennis pedibusque rufis.*

2. *Zweyfarbige.*43. *Liturata*, die *goldgrüne, violetgestreifte Coccinelle*.

*Scop.* Ent. carn. No. 230.

*Aurato-*

*Aurato-virens*; thorace elytroque fasciis binis, longitudinalibus, violaceis.

44. *Speciosissima*, die schönste Coccinelle.\*)

Scop. Ent. carn. No. 231.

Ovata; elytris *auratis*; margine lineaque media *coerulei* coloris.

45. *Fastuosa*, die Pracht coccinelle.\*\*)

Scop. Ent. carn. No. 232.

Ovato-oblonga, fulgida, *aurato-virens*; elytris *aureis*; margine lineaque *viridibus*; alis *rubris*.

46. *Signata*, die roth und schwarz gezeichnete Coccinelle.†)

Scop. Ent. carn. No. 233.

Ovata, *rubra*; thorace punctis binis, capite, corpore subtus, pedibus *nigris*.

VI. Zwey ungewisse Coccinellen. ††)

47. *Dubia*, die zweifelhafte Coccinelle.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 107. No. 97.

Rotundata; elytris *striatis fuscis*, margine *rufescientibus*.

48. *Spuria*, die Aftercoccinelle.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 107. No. 98.

*Viridi nitens*; elytris *rubris*.

Q 3

Außer

\*) v. Linn. Chrysom. speciosa No. 19.

\*\*) Des Linn. Chrysom. fastuosa No. 18.

†) Linn. Chr. *Viminalis* No. 31. nach Fabric. S. E. p. 98. No. 22.

††) Ich finde des Scopoli Satz sehr gegründet: Ann. 5. hist. nat. p. 108. No. 100. *Coccinellas ex numero punctorum in species non bene distingui, didici deum, cum vidisset in copula varie punctatas.*

Ausser diesen hat Geoffroi noch zehn Arten angeführt, die ich in keinem Schriftsteller finde.

I. Zur ersten Classe: rothe oder gelbe Flügeldecken, schwarze Punkte.

1. *Variegata*, der Scheckrücken.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 322. No. 5. La Coccinelle rouge à neuf points noirs, et corcelet varié.

*Coleoptris rubris*, punctis novem nigris, thorace nigro, antice albo.

2. *Vittata*, der Bandrücken.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 324. No. 7. La Coccinelle rouge à treize points noirs, et corcelet rouge, à bande.

*Coleoptris rubris* punctis tredecim nigris; thorace rubro, medio nigro.

3. *Flava*, der Gelbschild.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 324. No. 8. La Coccinelle rouge, à onze points et corcelet jaune.

*Coleoptris rubris*, punctis undecim nigris, thorace luteo, nigro-punctato.

4. *Suturata*, die Schwarznath.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 329. No. 16. La Coccinelle jaune à suture.

*Coleoptris flavis*, punctis sexdecim nigris, plurimis connexis, sutura nigra.

II. Rothe oder gelbe Flügeldecken, weisse Punkte.

5. *Albo-marginata*, der *Weissrand*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 327. No. 14.* La *Coccinelle à points et bordure blanche*.

*Coleoptris rubris*, punctis quatuordecim limboque *albis*.

III. Schwarze Flügeldecken, rothe Flecke.

6. *Subvillosa*, das *Rauchhühnchen*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 332. No. 21.* La *Coccinelle velue à bandes*.

*Subvillosa nigra*, fasciis duabus transversis *rubris*.

7. *Interrupta*, die *Unterbrochene*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 333. No. 23.* La *Coccinelle velue à bande interrompue*.

*Subvillosa nigra*, coleoptrorum fascia transversa *rubra interrupta*.

*Reaum. Inf. Tom. 3. P. 2. p. 170. t. 31. f. 20. 28. 29.*  
Le *Barbet blanc*, der *weisse Pudel* (von der Larve).

8. *Rubro-maculata*, der *Rothfleck*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 333. No. 24.* La *Coccinelle velue à taches rouges au corcelet*.

*Subvillosa nigra*, thorace vtrimeque macula *rubra*.

IV. Schwarze Flügeldecken, gelbrothe, auch schwarze Flecke.

9. *Luteo-rubra*, die *rothgelbe*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 332. No. 22.* La *Coccinelle velue à points*.

*Subvillosa nigra*, punctis quatuor *luteo-rubris*.

10. *Nigro-maculata*, der Schwarzfleck.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 334. No. 27. La Coccinelle noire à points rouges au corcelet.*

*Rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, thorace utrinque macula nigra.*

Noch zwey neue Coccinellen.

1. *Minima*, die allerkleinste.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 613.*

*Tota atra.*

2. *Pusilla*, die kleine.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 614.*

*Thorace nigro; elytris flavescentibus, impunctatis.*

199. GESCHLECHT. *Chrysomela. Blattkäfer,*  
*Chrysomela, Goldhähnchen. Holl. Gout-haantjes;*  
*Friesl. Gouden-Engeltjes.\*)*

*Müllers Linn. Naturs. 5. Th. 1. B. S. 163. Goldhähnchen.*

*Füesslins schweiz. Inf. S. 7. Blattkäfer.*

*Sulzers Kennz. S. 56. Blattkäfer.*

*Sulzers Gesch. S. 32. Blattkäfer.*

*Börners*

\*) Zwischen diesen und den *Coccinellen* herrscht noch immer viel Verwirrung, und sie werden häufig verwechselt. *Geoffroi* hat fünf bis sechs besondere Geschlechter daraus gemacht.

1. *Cryptocephalus*, (*Gribouri*) und *Melolontha*, dazu verschiedene der 3ten Linnéischen Klasse.

2. *Crioceris*, dazu die vierte Linn. Klasse.

3. *Altica*, dazu des *Linnei Chr. saltatoria*, oder die aus der 2ten Klasse.

4. *Galeruca*, dazu die vierte Linn. Klasse.

5. die eigentliche *Chrysomela*, wozu die mehresten der ersten Linnéischen gerechnet werden müssen.

Börners Samml. 1. Th. S. 467. *Blattkäfer.*

Eberhards Thiergesch. S. 200. *Blattkäfer.\*)*

Beckmanns Anfangsgr. der Naturh. S. 94. *Blattkäfer.*

Onomatol. hist. natur. P. 2. p. 836. *Chrysomela*, das *Mayenkäfergeschlecht. \*\*)*

Schriften der Dronth. und Norw. Ges. 3. Th. S. 350.

Wochenblatt für Kinder. 6. B. S. 15.

Pontoppid. N. G. v. D. S. 203. *Goldfliege*, *Gold-schnmidt.*

Neuer Schauplatz der Natur. 1. B. S. 817. *Blatt-käfer.* S. *Goldhähnchen.*

Gleditsch Einl. in die Forstwiss. 2. Th. S. 1508.

Länglichrunde *Blattkäfer.*

Catholicon. C. p. 321. der *Blattkäfer*, *Marienkäfer.†)*

Fabric. S. E. p. 94-124. dazu 1. *Chrysomela*, 2. *Cry-p-tocephalus*, 3. *Altica*, 4. *Cistela*, 5. *Crioceris*, 6. *Erotylus*, 7. *Lagria*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 160.

Scop. Entom. carn. p. 68.

Commentar. Lips. Dec. I. Vol. V. p. 606.

Q 5

Geoffr.

\*) Der Herr D. Eberhard hat in seinem Versuch einer Thiergesch. S. 199. den Unterordnungen der Geoffroischen Chrysomelen geschickte Namen beygelegt.

1. *CRYPTOCEPHALUS*, *Falkkäfer.*

2. *CRYPTOCERIS*, *Lilienkäfer.*

3. *ALTICA*, *Hüpfkäfer.*

\*\*) Die Benennung in der ONOM. *Mayenkäfergeschlecht* richtet Verwirrung an, wodurch eigentlich Scarab. *Melolontha* verstanden wird.

†) Das Synom. *Marienkäfer* in dem Cathol. geht eigentlich auf die *Coccinellen*. Sonst merke ich noch an, dass zu der dritten Linnéischen Klasse: corpore cylindrico die *Melolonthae* des Geoffroi Inf. Tom. I. p. 195. gehören, wie denn auch einige von dessen *Tenebrions* und *Mordellis* Linnéische Chrysomelen sind, besonders von der letzten Klasse (*elongatae*).

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 231-266.

*de Geer* Inf. T. IV. praef. P. XII. T. V. p. 285-358.

*Bomar.* Dict. III. p. 157.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 74. 81. 58. 57. 84. 83.  
58. 83. 85.

### I. Mit eyrundem Körper.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 255-266.

*de Geer* Inf. Tom. 4. p. 290-329.

*Fabric.* S. E. p. 94-105.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 81.

#### 1. *Gigantea*, der *indianische Riese*.

*Müller* l. c. S. 164. No. 1. t. 4. f. 3. das *Riesenähnchen*.

*Sulzers Kennz.* pag. 6. t. 3. f. 15. a. der *Riese* unter diesem Geschlecht. Das *Mittel* zwischen den *Coccinellen* und *Chrysomelen*. *Coccinella gigantea*.

— — Gesch. der Inf. S. 33. t. 3. f. 8. der *Riese*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. pag. 349. exot. 1. t. 16. f. 8. *Chrysomela gigantesque*.

*Oblonga nigra, thorace depresso, abdomine gibbo,*  
*elytris maculis subrotundis rubris numerosissimis.*

*Fabric.* S. E. p. 123. *Erotylus* 1.

#### 2. *Gibbosa*, das *surinamische Buckelähnchen*.

*Müller* l. c. S. 165. No. 2. t. 4. f. 5. das *Buckelähnchen*.

*Fabric.* S. E. p. 95. *Chrysom. 5.*

*Ovata, nigra, elytris flavis, fasciis duabus punctis-*  
*que baseos nigris.*

3. *s-punctata*, das *fünfpunktirte Goldhähnchen*.

*Müller* l. c. S. 165. No. 3. t. 4. f. 4. der *Großpunkt*.

*Fabric.* S. E. p. 123. *Erotylus* 2.

4. *Göttingensis*, das *Schaafgarbenhähnchen*.

*Müller* l. c. p. 165. No. 4.

*Füesslin's schweiz. Inf.* S. 7. No. 121. bey der *Schaafgarbe*.

*Rösel's Insektenbel.* 2. B. Erdk. 3. Kl. S. 12. t. 5. der *mattschwarze Graskäfer*.\*)

*Mülleri Faun. Fridr.* p. 7. No. 60.

— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 81. No. 876.

*Ovata*, *violacea*, *tarsis ferrugineis*.

*Fabric.* S. E. p. 94. *Chrysom.* 2.

*de Geer Inf. Tom. 5. pag. 298. No. 8. Chrysomela noire violette.*

*Violaceo-nigra*, *ovata*, *thorace corporeque convexis*.

5. *Tanaceti*, das *Reinfarnhähnchen*.

*Müller* l. c. S. 166. No. 5.

*Füesslin's schweiz. Inf.* S. 7. No. 122. bey dem *Reinfarnkraut*.

*Schriften der Dronth. und Norweg. Gesellsch.* 3. Th. S. 350.

*Fabric.* S. E. p. 103. *Chrysom.* 51.

*Oblonga*, *nigra*, *punctata*, *elytris coryaceis*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* No. 83. *Galeruca* No. 906.

*Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 836. No. 5. der schwarze Mayenkäfer mit hohlen Punkten*.

*Merian. Inf.* t. 68.

*Schaeff. Icon.* t. 21. f. 14.

*Geoffr.*

\* ) Dieses Citatum hat der Herr von Geer zu der folgenden Nummer 5. *Tanaceti* gesetzt.

*Geoffr. Inf. Tom. I.* p. 252. No. 1. t. 4. f. 6. *La Galeruque brunette.*

*Galeruca atro-fusca*, elytris lineis tribus elevatis, punctis numerosis.

*de Geer Inf. Tom. 5.* p. 299. No. 4. t. 8. f. 27. *Chrysomela de la Tanéſie.*

*Ovata atra opaca punctata.* \*)

*Linn. Faun. Suec. ed. 1.* No. 413. *Chrysomela atra*, punctis excavatis contiguis.

6. *Haemorrhoidalis*, der *Rothafter*, (der *Erlenblattkäfer*. \*\*)

*Müller l. c. p. 166.* No. 6. der *Rothsteiss.*

*Gleditsch Forstwiss. 1. Th.* p. 558. No. 17. der *schwarze glatte Blattkäfer der Erle.*

*Fabric. S. E. p. 102.* *Chrysom. 47.*

*Scop. E. carn. No. 225.* *Coccinella haemorrhoidalis.*

*Linn. Faun. Suec. ed. 1.* No. 414. *Chrysomela nigra* glabra, antennarum basi subflava.

*Onomatol. hist. nat. P. 2.* p. 838. No. 1. der *schwarze glatte Mayenkäfer mit gelblichen Fühlhörnern an dem Grund.*

*de Geer Inf. Tom. 5.* p. 297. No. 6. *Chrysomela hemorrhoidale.*

*Ovata nigra*, seu *rufa*, thorace punctis duobus nigris, antennarum basi subflava. †)

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 81. No. 877. *Ovata*, *violacea*, *punctata*; *ano rubro.*

## 7. Gra-

\*) Hierbey hat von *Geer* das vorige Röſſche Citatum angeführt, von No. 4. Götting.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Diese und No. 31. *Viminalis* hat der Herr von *Geer* in der Begattung angetroffen, und hält sie also für einerley Art.

7. *Graminis*, das *Grashähnchen*.\*)

Müller l. c. p. 167. No. 7.

Füesslin schweiz. Inf. S. 7. No. 123. auf den Schmalgräsern.

Fabric. S. E. p. 96. *Chrysom.* 9.

Scop. Entom. carn. No. 220. *Coccinella graminis*.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 419. *Chrysomela viridi-coerulea*.

Aeta Vpsal. 1736. p. 17. No. 1. *Chrysomela viridi-coerulea nitida*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 61.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 892. Norv.

Guldsmed. *Ovata*, *viridi coerulea*, *nitida*, *alis rubellis*.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 844. No. 2. der grünblaue *Mayenkäfer*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 260. *Chrysom.* 10. *Le grand Vertubleu*.

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 304. No. 16. *Chrysomèle verte du Gramen*.

*Ovata viridi-coerulea aurata*, *antennis dimidio fuscis*, *pedibus viridibus*.

8. *Aenea*, das *Kupferhähnchen*, (der grünglänzende Blattkäfer).

Müller l. c. p. 167. No. 8. t. 4. f. 6.

Füesslin schweiz. Inf. S. 7. No. 124. der *kupfrichte Blattkäfer*.

Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 559. der *grüne glänzende eyförmige Blattkäfer der Erle*.

Schriften der Dronth. und Norw. Gesellsch. 3. B. S. 270.

Mülleri

\*) Nirgends abgebildet.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 9. No. 62.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 891.

*Onomatol.* hist. nat. P. 2. p. 844. No. 3. der grüne glänzende Mayenkäfer mit einer vornen ausgehöhlten Brust.

*Fabric.* S. E. p. 104. *Chrysom.* 57.

Oblonga, viridis, nitida, elytris aeneis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 261. No. 12. Le petit vertublou.

*Viridis nitida*, thorace antice excavato, fasciis elytrorum longitudinalibus coeruleis.

*de Geer* Inf. Tom. 5. pag. 305. No. 18. t. 9. f. 4.

*Chrysomele verte de l'Aune.*

Chr. (*viridis Alni*) ovata, viridi-aurata, nitida, thorace antice excavato, abdomine supra nigro apice testaceo, elytris punctis sparsis.

*Schaeff.* Icon. t. 21. f. 3. 4.

*du Bois* Tableau annuel. 1772. p. 121-123. Le Velours verd; Le Gribouri de la Vigne; Coupe-Bourgeons; Pique-brots des Paysans.

### 9. *Alni*, die violette Erlenchrysomele.

*Müller* l. c. p. 167. No. 9. der Erlenfresser.

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 7. No. 125. der Erlenblattkäfer.

*Frisch* Inf. 7. Th. S. 13. t. 8. der blaue und grüne Ellern- oder Elsenkäfer.

*Gleditsch* Forstwiss. 1. Th. S. 559. der violetblaue und eyrunde tiefpunktirte Blattkäfer der Erle.

*Sulzers* Gesch. S. 34. t. 3. f. 13. der Fallkäfer (Cryptocephalus).

*Schaeff.* Elem. t. 53. f. 1. 2. *Cryptocephalus*, Fallkäfer.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 9. No. 63.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 911. *Luperus.*

*Onomat.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 839. No. 2. der Erlenmeyenkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 232. *Cryptocephalus* 1. Le Gribouri bleu de l'Aune.

*Cryptoc.* violaceus, punctis inordinatis.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 314. No. 21. t. 9. f. 18. *Chrysomela violette de l'Aune*.

Chr. ovata, supra violacea subtus nigra, punctis excavatis sparsis, thorace minuto, antennis longis nigris.

Fabric. S. E. p. 103. *Chrysom.* 53.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 416. *Chrys.* nigro-purpurea, punctis excavatis adspersa.

10. *Betulae*, die Birkenchrysomelae.

Müller I. c. p. 168. No. 10. der Birkenmeyer.

Füesslins schweiz. Inf. S. 8. No. 126. der Birkenblattkäfer.

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 552. der violette eyrunde mit tiefen gestrichelten Punkten bezeichnete Blattkäfer der Birke.

Röfels Infektenbelust. 2. B. Erdk. 3. Kl. S. 5. t. 1. der blau und grün schillernde Blattkäfer. \*)

Fabric. S. E. p. 104. *Chrysom.* 54.

Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 66.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 893.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 839. No. 1. et p. 46. No. 1. *Attelabus coeruleus* etc. der blaue Birkenmeyenkäfer.

Aba Vpsal. 1736. p. 19. No. 3. *Attelabus coeruleus* nitidus oblongiusculus, subtus niger.

Linn.

\*) Dieses Röfelsche Citatum steht auch bey No. 23. *Vitellina*.

Der Herr von Geer hat es bey jener, nicht aber bey dieser, Füesslin aber und Müller bey *Vitellina* angeführt.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 415. *Chrysomela nigro-purpurea*, punctis excavatis striatis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 264.\* *Chrysom.* 17. La *Chrysomèle bleue du Saule*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 318. No. 24. t. 9. f. 24. a. b. *Chrysomèle ronde bleue du Saule*.

*Chrysomela (coerulea Salicis) subglobosa viridicoerulea nitida obscura*, punctis excavatis sparsis.

*Scop.* Ent. carn. No. 221. *Coccionella Betulae*.

## II. *Haemoptera*, der Rothflügel.

*Müller* l. c. p. 168. No. 11.

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 8. No. 127. das *Krause-münzenkäferchen*.

*Fabric.* S. E. p. 96. *Chrysom.* 11.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 9. No. 64.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 878.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 258. *Chrys.* 5. La *Chrysomèle violette*.

*Tota violacea*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 312. No. 20. t. 9. f. 13. *Chrysomèle violette du Millepertuis*.

*Chrysomela (Hyperici) ovata*, subglobosa violaceo-coerulea nitida seu viridiuscula, thorace amplio.

## 12. *Occidentalis*, das gelbfüssige amerikanische Goldhähnchen.

*Müller* l. c. p. 168. No. 12. der *Amerikaner*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 353. No. 7. t. 16. f. 14. *Chrysomèle occidentale*.

*Ovata viridi-aurea nitidissima*, punctis excavatis, antennis pedibusque flavis.

## 13. Ce-

\* Ein Druckfehler in dem Linnéischen Citato, da statt p. 264. steht:

13. *Cerasi*, das *Vogelkirschhähnchen*.

Müller l. c. p. 169. No. 13.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 823. No. 20. der längliche graue oder bleyfarbige und schwarzäugige Blattsauger.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 435. *Chrysomela* livida; oculis nigris.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 896.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 837. No. 4. der *blasse Mayenkäfer mit schwarzen Augen*.

de Geer Ins. Tom. 5. p. 301. No. 11. t. 9. f. 2. *Chrysomela du Bois de Ste Lucie*.

*Chrysomela* (Padi) ovata flavo-grisea pallida nitida, thorace magno, oculis nigris, antennis brevioribus fuscis.

14. *Padi*, das *schwarze Vogelkirschhähnchen*. \*)  
(*Vogelbeerblattkäfer*).

Müller l. c. p. 169. No. 14. das *Flohhähnchen*.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 823. No. 19. der *Pat-scherben-Blattsauger*.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 434.

*Chrysomela* elytris fuscis pone lividis.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 837. No. 2. der *braune Mayenkäfer mit hinten ganz blassen Flügeldecken*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 7. No. 64.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 897.

15. *Minutissima*, das *kleinste Blattkäferchen*. \*\*)

Müller l. c. pag. 169. No. 15. das *Milbenhähnchen* (viermal kleiner als ein Floh).

16. *Ar-*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

16. *Armoraciae*, das *Merrettichhähnchen*.\*)

*Müller* l. c. p. 169. No. 16. der *Merrettichnager*.

*Fabric.* S. E. p. 103. *Chrysom.* 50.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 7. No. 67.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 887.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 322. No. 25. *Chrysomela ronde violette du Plantain*.

*Chrysomela (Plantaginis) subglobosa supra violacea nitida subtus nigra, punctis excavatis striatis.*

17. *Cerealis*, der *Saatblattkäfer* (*gelber Blattkäfer*).

*Müller* l. c. p. 170. No. 17. der *Kornfresser*.

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 8. No. 128.

*Fabric.* S. E. p. 100. *Chrysom.* 33.

*Schaeff.* Icon. I. t. 3.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 262. *Chrysom.* 14.\*\*) *L'Arlequin doré*.

Aurea, fasciis coeruleis, cupreisque alternis, punctis inordinatis.

18. *Fastuosa*, der *Blaustrich*.

*Müller* l. c. p. 170. No. 18.

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 8. No. 129. der *Blaustrich*.

*Fabric.* S. E. p. 101. *Chrysom.* 36.

*Scop.* Ent. carn. No. 232. *Coccinella fastuosa*. †)

19. *Speciosa*, der *Goldstrich*. ††)

*Müller* l. c. p. 170. No. 19.

*Fabric.*

\* ) Nirgends abgebildet.

\*\*) Ein Druckfehler im *Linné*, wo No. 15. steht.

† ) Unter den *neuen Coccinellen* No. 39.

Nirgends abgebildet.

†† ) Nirgends abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 101. *Chrysom.* 37.

*Scop.* Entom. carn. No. 231. *Coccinella speciosissima.* \*)

20. *Halenfis*, das *hallische Blattkäferchen.* \*\*)

*Müller* l. c. p. 170. No. 20. der *Halor*.

21. *Hypochaeridis*, das *Habichts-* oder *Saukrautkähnchen.* †) (*Lungenblumenkäfer*).

*Müller* l. c. p. 171. No. 21.

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 8. No. 130.

*Scop.* Entom. carn. No. 193. *Buprestis Syngenesiae*.

22. *Vulgatissima*, die *gemeinste Chrysomel*. ††)

*Müller* l. c. p. 171. No. 22. der *Blauflügel*.

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 8. No. 131. der *gemeinste Blattkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 104. *Chrysom.* 56.

*Scop.* Entom. carn. No. 222. *Coccinella vulgatissima*.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 317. No. 23. *Chrysomel allongée bleue du Bouleau*.

*Chrysomela (coerulea Betulae)* oblongo-ovata supra coeruleo-violacea subtus virescens, punctis excavatis striatis, thorace ampio, antennis longioribus.

23. *Vitellinae*, die *kupferfarbige Sahlweiden-Chrysomel*.

*Müller* l. c. p. 171. No. 23. der *Eyerdotter*.

R 2

*Füesslins*

\*) Unter den neuen *Coccinellen* No. 38.

\*\*) Nicht abgebildet. †) Nirgends abgebildet.

††) Nirgends abgebildet.

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 8. No. 134. der *Weidenblattkäfer.\**)

*Gleditsch* Forstwiss. 1. Th. S. 684. No. 9. 757. No. 86. der *gelbe eyrunde Blattkäfer.*

*Fabric.* S. E. p. 104. *Chrysom.* 55.

*Oblonga*, *viridi aenea.*

*Scop.* Entom. carn. No. 224. *Coccinella vitellinae.*

*Müller* Faun. Fridr. p. 9. No. 84.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 888.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 836. No. 4. der *kupferfarbige Mayenkäfer.*

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 323. No. 27. *Chrysomela bronzée du Saule.*

*Chrysomela oblonga*-*ovata aenea nitida*, *abdomine supra nigro apice flavescente*, *elytris punctis striatis.*

24. *Polygoni*, das *Queckengrashähnchen.\*\**) (*Wegetrittblattkäfer*).

*Müller* l. c. p. 172. No. 24.

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 8. No. 135.

*Fabric.* S. E. p. 100. *Chrysom.* 32.

*Müller* Faun. Fridr. p. 8. No. 69.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 894.

*Reaum.* Inf. Tom. 3. P. I. p. 299. t. 17. f. 14. 15. *Le Scarabé de la teigne de l'avoine et de l'orge.*

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 47. No. 2. *Altelabus subrotundus* etc. der *blaulicht grüne Mayenkäfer.*

— — — et pag. 844. No. 4. der *grüne glänzende Mayenkäfer mit einer vornen gleichen Brust, und hinten neben einander stehenden Flügeldecken.* †)

*Acta*

\*) Hierbey steht eben das Röfelsche Citatum als bey N. 10. *Benthae.*

— *Nirgends abgebildet*, wenn solches zu No. 10. gehört.

\*\*) Das andere Geschlecht siehe unter den *neuen* No. 22. *Obtusa.*

†) Die Varierät zu *Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 520. B. S. *hinten die Nenen*, alte Kl. No. 7.

*Acta Vpsal.* 1736. pag. 19. *Altolabus subrotundus*  
*coeruleo nigricans, collari testaceo,*

*Reaum.* Inf. Tom. 3. P. 1. Mém. I. p. 43. t. 2. f. 18.  
*Le Scarabé d'un Ver mineur en grand des feuilles de Mauve.*

*Geoffr.* Inf. Tom. 1. p. 242. *Crioceris* 4. *Le Criocere bleu à corcelet rouge.*

*Coeruleo-viridis, thorace femoribusque rufis.\*)*

*Raj.* Inf. pag. 100. *Scarabaeus antennis clavatis quartus.*

*Schaeff.* Icon. t. 51. f. 5. t. 161. f. 4. a. b. t. 173. f. 4.  
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 322. No. 26. *Chrysomela de la Renouée.*

*Chrysomela ovata violacea, seu viridis nitida, thorace lato pedibusque rufo-flavis.*

25. *Pallida*, das *bläsigelbe Weidenhähnchen*.\*\*)

*Müller* l. c. p. 172. No. 25.

*Füesslins schweiz.* Inf. S. 8. No. 136.

*Fabric.* S. E. p. 99. *Chrysom. 26.*

*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 840. No. 3. der *blässgraue Weidenmayenkäfer.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 243. *Crioceris* 6. *Le Criocere aux yeux noirs.*

*Crioceris pallida, oculis nigris.*

26. *Staphylaea*, der *braune längliche Blattkäfer*.

*Müller* l. c. S. 172. No. 26. das *Pimpernüsschen*.

*Füesslins schweiz.* Inf. S. 8. No. 137.

R 3 Schriften

\*) Nach *Fabric.* l. c. ist es des *Geoffroi Chrysom.* verte à corcelet rouge. T. I. pag. 263. No. 16. Das Linnéische 'Citatum' des *Geoffroi* I. 242. 4. hat der Herr von *Geer* zu No. 105. *Melan.* gesetzt.

\*\*) Nirgends abgebildet.

*Schriften der Dronth. und Norw. Gesellsch.* 4. B.  
S. 270.

*Fabric.* S. E. p. 97. *Chrysom.* 14.

*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 840. No. 2. der dunkel-muschelfarbige Mayenkäfer.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 294. No. 3. t. 8. f. 24. *Chrysomela couleur de cuivre.*

*Chrysomela (cuprea) ovata rubro-cuprea nitida,*  
*oculis nigris.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 263. No. 15. *La Chrysomela briquetée.*

*Chrysomela supra rubro-cuprea, infra nigra ni-*  
*tens.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 881.

— — Faun. Fridr. p. 8. No. 68.

## 27. *Polita*, der Spiegelrücken.

*Müller* l. c. p. 172. No. 27.

*Fließlins* schweiz. Inf. S. 8. No. 138.

*Gleditsch* Forstwiss. I. Th. S. 684. No. 10. der ey-runde Blattkäfer mit röthlichen Flügeldecken, und ei-nem grünlichen ins Goldfarbene spielenden Brust-stücke.

*Müller* Faun. Fridr. p. 8. No. 70.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 882.

*Fabric.* S. E. p. 97. *Chrysom.* 16.

*Scop.* Entom. carn. No. 229. *Coccinella polita.*

*Onomatol. hist. nat.* P. 2. p. 844. No. 1. der grüne kupferglänzende Mayenkäfer mit röthlichen Flügel-decken.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 257. *Chrysom.* 2. *La Chrysomela rouge à corcelet doré.*

*Chrysomela viridi-aenea, elytris rubicundis, pun-*  
*ctis sparsis.*

de Geer Inf. Tom. 5. p. 294. No. 2. t. 8. f. 23. *Chrysomela polie.*

*Chrysomela ovata viridi-aurata nitida, elytris flavo-rubris.*

Schaeff. Icon. t. 65. f. 9.

28. *Lurida*, der *Braunflügel.*\*)

Müller l. c. p. 173. No. 28.

Füesslins schweiz. Inf. S. 8. No. 139.

Fabric. S. E. p. 97. *Chrysom.* 17.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 258. *Chrysom.* 3. La *Chrysomela rouge à corcelet noir.*)

*Chrysomela nigra, elytris rubris striatis, striis punctatis.*

29. *Clavicornis*, das *Keulhörnchen.*\*\*) )

Müller l. c. p. 173. No. 29.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 351. No. 4. t. 16. f. 11. *Chrysomela à antennes à bouton.*

30. *Populi*, das *Pappelnhähnchen.*

Müller l. c. p. 173. No. 30. der *Pappelnfresser.*

Füesslins schweiz. Inf. S. 8. No. 140. der *Pappelblattkäfer.*

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 685. No. 11. der *eyrunde Blattkäfer mit dem blaulichten Bruststück und rothen schwarzsitzigen Flügeldecken.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 428.

*Chrysomela nigro-coerulea, elytris rubris apice nigris.*

R 4

*It. Oe-*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Vielleicht Fabricii Chr. *crassi-cornis* No. 27. S. E. p. 99.

In Nova Hollandia.

*It. Oeland.* p. 38. *Chrysomela* thorace viridi coeruleo, elytris rubris, apice nigris.

*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 858. No. 4. der schwarze blaue Mayenkäfer mit rothen am Ende schwarzen Flügeldecken.

*Schaeff. Icon.* t. 47. f. 4. 5. t. 21. f. 9.

*Fabric. S. E.* p. 96. *Chrysom.* 13:

*Scop. Entom. carn.* No. 228. *Coccinella populi.*

*Lister Scarab. Anglic.* p. 381. No. 6. *Scarabaeus viridis*, alarum thecis miniatis.

*Geoffr. Inf. Tom. I.* p. 256. *Chrys.* 1. La grande *Chrysomèle rouge à corcelet bleu.*

*de Geer Inf. Tom. 5.* p. 290. No. 1. t. 8. f. 16. *Chrysomèle du Tremble.*

*Chrysomela ovata*, obscure coerulea nitida, elytris flavo-rubris, puncto terminali nigro.

*Müller Zool. Dan.* p. 82. No. 899.

### 31. *Viminalis*, der Weidenbinder. \*)

*Müller L. c.* p. 174. No. 31.

*Gleditsch Forstwiss.* 2. Th. S. 152. N. 90. der schwarze rothgefligelte eiförmige Weidenblattkäfer.

*Füssli* schweiz. Inf. S. 8. No. 141.

*Fabric. S. E.* p. 98. *Chrysom.* 22.

*Ovata nigra*, thorace rufo simaculato, elytris rufis.

*Scop. Entom. carn.* No. 233. *Coccinella Signata.* \*\*)

*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 842. No. 1. der Mayenkäfer mit der rothen Brust und Flügeldecken.

*Geoffr. Inf. Tom. I.* p. 265. *Chrysom.* 18. La *Chrysomèle à suture noire.*

Chrysom.

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Unter den neuen Coccinellen No. 49.

*Chrysomela rubra*, thorace punctis duobus nigris,  
*coleoptrorum* sutura nigra.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 297. No. 6.\*)

32. *10-punctata*, der Zehnpunkt.

Müller l. c. p. 174. No. 32. das *Punkthähnchen*.

Füesslin's schweiz. Inf. S. 8. No. 142. der *Zehnpunkt*.

Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 685. No. 12. der *eyrunde schwarzgedüpfelte Blattkäfer mit rothen Flügeldecken, und einem oberwärts rothen, unterwärts schwarzen Brustfläche*.

Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 841. No. 2. der *dunkelrothe Mayenkäfer mit schwarzen Flecken*.

Fabric. S. E. p. 99. *Chrysom. 25.*

Schaeff. Icon. t. 21. f. 13.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 295. No. 4. t. 8. f. 25. *Chrysomela rousse à pattes rousses*.

*Chrysomela (rufipes) ovata*, supra rufa, subtus nigra, elytris punctis subquinis nigris, pedibus rufis.

B. *Nigripes*, der Schwarzfüss.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 258. *Chrysf. 4.* La *Chrysomèle rouge à points noirs*.

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 296. No. 5. *Chrysomèle rousse à pattes noires*.

*Ovata*, supra rubra, subtus nigra, thorace macula magna nigra, elytris punctis subquinis, *pedibusque nigris*.

Schaeff. Icon. t. 21. f. 11.

\*) Das andere Geschlecht von No. 6. *Haemorrhoidalis*.

33. *Variolosa*, das *Blätterhähnchen*.\*)

*Müller* l. c. p. 175. No. 33.

*Fabric.* S. E. p. 99. *Chrysom.* 28.

34. *Lapponica*, der *Lappländer*.

*Müller* l. c. p. 175. No. 34.

*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 843. No. 1. der *Mayenkäfer mit grüner Brust, und rothen Flügeldecken mit einem blauen Kreuz*.

*Schaeff.* Icon. t. 44. f. 2.

*Acta Vpsal.* 1736. p. 17. No. 4. *Chrysomela viridimaura*, rubro variegata.

*Fabric.* S. E. p. 99. *Chrysom.* 29.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 302. No. 12. t. 9. f. 3. *Chrysomela à rayes courbes*.

*Chrysomela (curvilinea) ovata viridi-aenea nitida, elytris fasciis curvis testaceis.*

35. *Vndulata*, der *Javaner mit schwarzblauen wellenförmigen Bändern*.\*\*)

*Müller* l. c. p. 175. No. 35. der *Javaner*.

*Fabric.* S. E. p. 100. *Chrysom.* 30.

36. *Boleti*, das *Schwammhähnchen*.

*Müller* l. c. p. 175. No. 36.

*Füesslins* schweiz. Inf. S. 8. No. 143. der *Herzkäfer*.  
*Sulzers* Gesch. S. 33. t. 3. f. 9. der *Herzkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 97. *Chrysom.* 18.

*Stop.* Entom. carn. No. 247. *Coccinella fasciata*.

*Vddm.* Diff. 4. f. 3. *Dermestes ater nitens*, elytris nigris, fasciis duabus flavis vndulatis.

*Schaeff.*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

Schaeff. Elem. t. 58. *Diaperis*, *Herzkäfer*.

— — Icon. t. 77. f. 6.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 337. *Diaperis* I. t. 6. f. 3.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 49. *Tenebr. 9.* t. 3. f. 3. *Tenebrion de l'agaric.*

**TENEBRIO** (*Boleti*) alatus ovatis gibbus niger nitidus, elytris fasciis tribus transversis fulvis vndatis.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 791. *Diaperis.*

37. *Collaris*, der *Kragenträger*.\*)

Müller I. c. p. 176. No. 37.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 758. No. 89. der *eyrunde violette Blattkäfer mit einem am Rande gelbpunktirten Bruststück.*

Fabric. S. E. p. 98. *Chrysom.* 21.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 417.

*Chrysomela nigro-purpurea*, thorace vtrimeque laeteo, puncto nigro.

*Acta Vpsal.* 1736. p. 17. No. 5. *Chrysomela violaceo-nigra*, collari margine rubro.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 839. No. 3. der *Weiden-mayenkäfer.*

Schaeff. Icon. t. 52. f. 11. 12.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 879.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 302. No. 13. *Chrysomela à corcelet bordé.*

*Chrysomela ovata violacea*, seu *viridi-aenea nitida*, thorace marginibus rubro, puncto nigro.

38. *Sanguinolenta*, das *Bluthähnchen*.

Müller I. c. p. 176. t. 4. f. 7. No. 38.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 8. No. 144.

Fabric. S. E. p. 101. *Chrysom.* 40.

Scop.

\*) Das andere Geschlecht, S. unter den neuen No. 48. *Similis.*

*Scop.* Ent. carn. No. 203. *Buprestis sanguinolenta.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 259. No. 8. t. 4. f. 7. *La Chrysomèle noire à bordure rouge.*

*Nigro-coerulea, elytris atris punctatis, margine exteriore rubro.*

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 298. No. 7. t. 8. f. 26. *Chrysomèle noire à bordure rouge.*

*Rubro-marginata, ovata supra nigra subtus violacea nitida, elytris scabris rubro marginatis.*

*Schaeff.* Icon. t. 21. f. 15.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 883.*

— — Faun. Fridr. p. 8. No. 72.

39. *Marginata*, der Saumflügel.\*)

*Müller l. c. p. 176. No. 39.*

*Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 8. No. 145. der Ge-säumte.*

*Sulzers Geschr. S. 34. t. 3. f. 10. der Saumflügel.*

*Schriften der Dronth. und Norweg. Gesellschaft.*

3. B. S. 350.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 886.*

— — Faun. Fridr. p. 18. No. 182. *Buprestis marginata.*

*Fabric. S. E. p. 101. Chrysom. 41.*

*Schaeff.* Icon. t. 21. f. 19.

*de Geer* Inf. Tom. 5. pag. 303. No. 14. *Chrysomèle à etius bordés.*

*Ovata, supra viridi-aenea, obscura nitida, subtus nigra, elytris margine luteo-rubris.*

40. *Marginella*, der Gelbrand.\*\*)

*Müller l. c. p. 177. No. 40.*

*Schriften*

\*.) Im Linné bey *Faun. Suec.* 529. ist ein Druckfehler, muss heißen 530.

\*\*) Nirgends abgebildet.

Schriften der Dronth. und Norw. Gesellsch. 3. B.  
S. 351.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 841. No. 1. der schwarzkupferfarbige Meyenkäfer mit einem gelben Rand an den Flügeldecken.

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 902.

Raj. Inf. 99. Scarabaeus antennis clavatis tertius.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 437. -

Chrysomela supra nigro-aenea, margine coleopterum luteo.

— — — ed. 2. No. 531. \*)

Fabric. S. E. p. 102. Chrysom. 42.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 304. No. 15. Chrysomela à bordure jaune de la Renoncule.

Marginella Ranunculi, oblongo-ovata, viridi-aenea, obscura nitida, thorace elytrisque margine luteis.

41. Castanea, der surinamische Braunerand. \*\*)

Müller l. c. p. 177. No. 41.

Linn. Amoen. acad. Vol. 6. p. 394. No. 15.

42. Analis, der Rothafteter. †)

Müller l. c. p. 177. No. 42.

Fabric. S. E. p. 104. Chrysom. 58.

43. Coccinea, der Rothrückchen. ††)

Müller l. c. p. 177. No. 43.

Fabric. S. E. p. 105. Chrysom. 59.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 301. No. 10. t. 9. f. 1. Chrysomela rouge à quatre taches noires.

4-macul-

\*) Im Linné steht durch einen Druckfehler 331.

\*\*) Nirgends abgebildet. †), Nirgends abgebildet.

††) Vielleicht nur eine Verschiedenheit von No. 38. Sanguinolenta.

*4-maculata*, ovata, thorace quadrato rufo macula nigra, elytris rubris maculis duabus nigris, capite pedibus antennisque nigris.

44. *Philadelphica*, der grüne philadelphische Blattkäfer mit gelben grüngefleckten Flügeldecken.

*Müller* l. c. p. 178. No. 44.

*Fabric.* S. E. p. 103. *Chrysom.* 49.

Ovata, viridis, elytris flavis, viridi-maculatis, antennis pedibusque ferrugineis.

*Petiv.* Gazophyl. t. 26. f. 11.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 353. No. 6. t. 16. f. 13. *Chrysomela de Philadelphie.*

Ovata, viridi-aenea obscura, elytris flavis, punctis virescenti-aeneis oblongiusculis, antennis pedibusque rufis.

45. *3-maculata*, der amerikanische dreygefleckte Blattkäfer.\*)

*Müller* l. c. p. 178. No. 45. der Gelbflügel.

*Fabric.* S. E. p. 95. *Chrysom.* 6.

*Cyanea*, coleoptris flavis, fascia maculisque duabus nigris.

46. *Americana*, der amerikanische Rothstrich.

*Müller* l. c. p. 178. No. 46.

*Sulzers* Kennzeichen. S. 7. No. 7. t. 3. f. 16. \*\*)

*Fabric.* S. E. p. 100. *Chrysom.* 34.

47. Li-

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Die Verfälscher der Cochenille mischen von dieser die Flügel und Beine darunter.

47. *Lineola*, die amerikanische Tintenlinie.\*)

Müller l. c. p. 179. No. 47.

Fabric. S. E. p. 102. *Chrysom.* 45.

48. *Aestuans*, der amerikanische Blattkäfer mit acht gelben Flecken.\*\*) )

Müller l. c. p. 179. No. 48. das Sonnenhähnchen.

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 352. No. 5. t. 16. f. 12.

*Chrysomela à huit taches rouges.*

8-guttata, ovata ferruginea, thorace lato, elytris singulis maculis quatuor magnis flavis.

49. *Sacra*, der rothe Blattkäfer aus dem gelobten Lande, mit zwey schwarzen Punkten, auch einer schwarzen Nath auf den Flügeldecken.†)

Müller l. c. p. 179. No. 49. der Türk.

Fabric. S. E. p. 102. *Chrysom.* 46.

50. *Minuta*, das Zwerghähnchen.

Müller l. c. p. 180. No. 50.

Fabric. S. E. p. 118. *Cistela* 13.

Nigra, elytris pedibusque griseis.

— — — p. 229. *Hydrophilus* 8.

Ovatus niger, elytris, pedibus, thoracisque lateribus griseis.

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 85. No. 27. Le Scarabe nageur.

*Scarabaeus totus rufo-niger*, maculis nigrioribus.

Müller

\* ) Nirgends abgebildet.

\*\*) Als etwas besonders hat der Ritter dabey angemerkt, dass in jedem Auge drey der Länge nach gesetzte schwarze Pupillen durchscheinen.

† ) Nirgends abgebildet.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 660.

*HYDROPHILUS chrysomelinus*, niger, thorace vtrinque; pedibus; elytris striatis, lividis.

II. *Springhähnchen mit dicken Hinterbeinen, (Erdflöhe, Hüpfkäfer).*

*Geoffr.* Inf. I. p. 244-251. *Alticae, Sauteurs, mordelles.*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 84. *Altica.*

*Fabric.* S. E. p. 112-116. *Altica.*

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 290. 343-348. *Altise; Scarabée-puce; Chrysomelis sauteuse:* schwed. *Loppmask.*

*Neuer Schauplatz der Natur*, 2. B. S. 665. *Erdflöhe.*

51. *Oleracea*, der *Gartenhüpfer.*\*)

*Müller* l. c. p. 180. No. 51. t. 4. f. 8.\*\*) )

*Füesslins schweiz. Inf.* S. 8. No. 146. der *Erdfloh.*

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 202. (eigentlich 204) No. 18.

*Fördloppe, Erdfloh.*

*Naturforscher* 6. St. S. 69. *Erdflöhe.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 8. No. 75.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 921. *Altica;* *Förd-Loppe.*

*Fabric.*

\*) Dies sind die eigentlichen *Erdflöhe*, wie sie der gemeine Mann, und die Gärtner nennen, welche an den jungen Kohlplanten, und andern niedrigen Erdgewächsen so großen Schaden thun.

\*\*) Es ist unrichtig, wenn Herr Müller sagt: dies Exemplar nenne *Geoffroi* l'Altise bedaule. Dieses ist des *Geoffr.* Altica 3. schwarz, mit rothem Brustschilde, und kommt gar nicht mit der Linneischen Beschreibung der Oleracea überein. *Fabric.* und von *Geer* haben richtig das *Geoffr.* Altica 1. l'Altise bleue angeführt, und dies ist es auch. S. 2te Kl. der *neuen Chrysom.* No. 7. *Bicolor.*

Fabric. S. E. p. 112. *Altica* 3.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 245. No. 1. L'Altise bleue.\*)

*Altica viridi-coerulea.*

de Geer Inf. Tom. 5. p. 344. No. 49. *Chrysomela sauteuse potagére.*

Saltatoria ovata tota *viridi-coerulea*, antennis nigris.

52. *Bicolor*, der amerikanische zweyfarbige Blattkäfer.

Müller l. c. p. 181. No. 52. das zweyfarbige Hähnchen.

Fabric. S. E. p. 112. *Altica* 1.

Rufa, elytris femoribusque posticis coeruleis. *Gigas* in hoc genere.

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 357. No. 12. t. 16. f. 20.

*Chrysomela à deux couleurs.*

Saltatoria *rubra*, elytris coeruleis nitidissimis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 919. *Altica*.

53. *Chrysocephala*, der Goldkopf.\*\*)

Müller l. c. p. 181. No. 53. das Gelbköpfchen.

Mülleri Faun. Fridr. p. 8. No. 76.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 920. *Altica*.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 337. No. 41. *Chrysomela cylindrique à tête jaune.*

Cylindrica *coeruleo-nigra*, capite antice pedibusque quatuor anterioribus rufo-flavis.

54. *Hyo-*

\*) Geoffr. hat dabey des Ritters Faun. Suec. ed. 1. No. 539. angeführt, die ich aber in der ed. 2. bey No. 540. Chrys. *Helxines* citirt finde. Linné aber hält diese Altise bleue mit seinem *Chrysolio Saticis* p. 611. No. 43. für einerley.

\*\*) Nirgends abgebildet.

54. *Hyoscyami*, der *Bilsenfresser*.\*)

*Müller* l. c. p. 181. No. 54.

*Fabric.* S. E. p. 113. *Altica* 5.

*Viridis*, *nitida*, *pedibus testaceis*, *femoribus posticis violaceis*.

*Müller's* Faun. Fridr. p. 8. No. 77.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 927. *Altica*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 5. p. 247. No. 3.

*Raj.* Inf. pag. 98. No. 9. *Capricornus exiguis* saltatrix.

*Acta Upsal.* 1736. p. 18. No. 5. *Gyrinus coeruleus nitidus*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 540. *Mortella* etc.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 248. *Altica* II. *L'Altise du choux*.

*Coerulea*, elytris striatis, tibiis ferrugineis.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 345. No. 51. *Chrysomela Jautense de la Fusquiamo*.

*Saltatoria ovata*, viridi-coerulecente aenea, elytris punctatis, pedibus rufis, femoribus posticis viridi-aeneis.

55. *Atricilla*, das *Schwarzköpfchen*.\*\*)

*Müller* l. c. p. 182. No. 55.

*Fabric.* S. E. p. 114. *Altica* II.

*Nigra*, thorace elytrisque cinereis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 251. *Altica* 19. *La Paillette*.†)

Elytris pallide-flavis, capite nigro.

56. *Ery-*

\* ) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Dieses Citatum hat der Herr von Geer bey einer neuen Art *Melanocephala* angeführt Tom. 5. p. 348. No. 57. S. die neuen 2te Kl. No. 16.

56. *Erythrocephala*, das *Rothköpfchen*.\*)

Müller l. c. p. 182. No. 56.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 8. N. 147. der *Rothkopf*.

Fabric. S. E. p. 114. *Altica* 10.

*Atro-coerulea*, capite geniculisque pedum rufis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 246. No. 4. *L'Altise noire dorée*.

*Nigro-aenea*, elytris striatis, pedibus ferrugineis.

57. *Modeeri*, der *Gelbfuß*.\*\*)

Müller l. c. p. 182. No. 57.

Füesslins Verzeich. schweiz. Inf. S. 8. No. 148. *Mo-deers-Blattkäfer*.

58. *Helxines*, das *Buchweizenhähnchen*.

Müller l. c. p. 182. No. 58.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 8. No. 149.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 539.†)

*Mordella subrotunda atro-aenea*.

— — — ed. 2. No. 540.

Fabric. S. E. p. 113. *Altica* 8.

*Viridi-aenea*, antennis fuscis, pedibus testaceis.

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 248. No. 3. *Mordella* etc.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 929. *Altica*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 249. *Altica* 14. *Le Plutus*.

*Aurea*, pedibus flavis.

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 345. No. 52. *Chrysomela sauteuse verte dorée*.

*Viridi-aurata*, saltatoria, ovata, nitidissima, pedibus antennisque rufis, elytris punctatis.

\* ) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

† ) Dieses Citatum hat Geoffr. zu *Oleracia* No. 51. gesetzt.

59. *Exsoleta*, das Ochsenzungenhähnchen.\*)*Müller* I. c. p. 182. No. 59.*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 8. No. 150. der *Ditrichblattkäfer*.*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 535.*Mordella* flava.

— — — — ed. 2. No. 541.

*Müller* Zool. Dan. p. 85. No. 930. *Altica*.*Onomatol.* hist. nat. P. 5. p. 246. No. 1. *Mordella* etc.*Fabric.* S. E. p. 115. *Altica* 17.*Ferruginea*, elytris striatis.\*\*)*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 250. *Altica* 16. L' *Altise* fauve à stries.*Oblonga*, ferruginea, elytris striatis.— — — — *Altica* 18. *flava*. L' *Altise* jaune.de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 338. No. 42. *Chrysomela cylindrique jaune à ventre noir.* †)*Cylindrica* flavo-testacea, abdomine nigro, elytris punctatis.60. *Nitidula*, der Glanzrücken.*Müller* I. c. p. 183. No. 60.*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 8. No. 151.*Gleditsch*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) *Fabricius* hat hierbey *Geoffr.* *Altica* 16 und 18. angeführt, weil sie beyde ein Insekt bezeichnen, und nichts als eine Varietät zu seyn scheinen. Es muss aber bey dem *Fabric.* 18. statt 4. heissen.†) Nach des Herrn von *Geer* Urtheil hat sie einen cylindrischen Körper, und ist die kleinste unter dieser Art von Chrysomelen. Sie kann auch nicht *springen*, und hat keine dicke Hinterfüsse. *Linné* hat sie also unrichtig in diese Klasse gesetzt.

Gleditsch. Einl. in die Forstwiss. 2. Th. S. 795. N. 36.  
der goldfarbige Springkäfer mit blauen Flügeldecken  
und rothen Füssen.

Fabric. S. E. p. 113. *Altica* 7.

Viridis, nitens, capite thoraceque aureis, pedibus  
ferrugineis.

Schaeff. Icon. t. 87. f. 5.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 249. *Altica* 13. L'Altice  
rubis.

*Nigro-aurata*, thorace aureo, femoribus ferru-  
gineis.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 346. No. 54. *Chrysomela*  
*santeuse à corcelet doré*.

*Saltatoria* ovata, elytris coeruleis seu viridibus, tho-  
race aureo, antennis pedibusque rufis, femoribus po-  
sticis nigris.

61. *Trifasciata*, der weisslichte Blattkäfer mit drey  
braunen Strichen.\*)

Müller l. c. p. 183. No. 61. der *Braunstrich*.

Fabric. S. E. p. 113. *Altica* 9.

Supra albida, fasciis tribus fuscis.

62. *Nemorum*, das *Waldhähnchen*.

Müller l. c. p. 183. No. 62.

Füesslin's Verzeich. schweiz. Inf. S. 8. No. 152. der  
*Waldblattkäfer*.\*\*)

Sulzers Gesch. S. 34. t. 3. f. 11. der *Gestreifte*.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 543.

*Mordella* etc.

— — — ed. 2. No. 543.

S 3

Lift.

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Was Füesslin l. c. mit vide t. 3. f. 10. anzeigen will, kann  
ich nicht sagen.

*List. mut.* t. 31. f. 29.

*Asta Vpsal.* 1736. pag. 18. No. 6. *Gyrinus niger,*  
vtrinque albus.

*Müller* Faun. Fridr. p. 8. No. 78.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 922. *Altica.*

*Onomat. hist. nat.* P. 5. p. 247. No. 1.

*Mordella oblonga* etc.

*Fabric.* S. E. p. 115. *Altica 20.*

*Atra*, elytris flavis, margine omni nigro.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. pag. 247. *Altica 9.* L'Altise  
à bandes jaunes.

*Atra*, elytris longitudinaliter in medio flavescentibus.

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 347. No. 55. *Chrysomela*  
*sauteuse à bandes jaunes.*

*Fasciata saltatoria ovata nigra nitida, elytris fascia*  
*flava longitudinali.*

#### 63. *Rufica*, das *Baurenhähnchen*.\*)

*Müller* l. c. p. 183. No. 63.

#### 64. *Pulicaria*, das *Flohhähnchen*.\*\*) )

*Müller* l. c. p. 184. No. 64.

#### 65. *Rufipes*, der *Rothfüss*.

*Müller* l. c. p. 184. No. 65.

*Füesslins Verz. schweiz. Inf.* S. 9. No. 153.

*Fabric.* S. E. p. 114. *Altica 14.*

*Coerulea*, capite, thorace, pedibus, antennarumque basi-rufis.

*Müller* Faun. Fridr. p. 8. No. 79.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 931. *Altica.*

*Scop.*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

*Scop.* Entom. carn. No. 214. \*)

*Schaeff.* Icon. t. 166. f. 5. a. b.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 245. *Altica* 2. L'Altise de la mauve.

*Nigra*, elytris coeruleis, thorace pedibusque rubris.

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 343. No. 47. t. 10. f. II.

*Chrysomele sauteuse à pattes rouges.*

*Saltatoria* ovata coerulea, capite, thorace pedibusque rufis, antennis dimidio rufis fuscisque, elytris laevibus.

66. *Fuscicornis*, das *Braunhorn*. \*\*)

*Müller* l. c. p. 184. No. 66.

67. *Holsatica*, der *Holsteinische an den Spitzen der Flügeldecken roth punktirte Blattkäfer*. †)

*Müller* l. c. p. 184. No. 67. der *Holsteiner*.

*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 795. No. 35. der schwarze glänzende *Springkäfer mit rothen Flügeldeckenspitzen*.

*Füesslins* Verzeich. schweiz. Inf. S. 9. No. 154. der *Rothpunkt*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 544. *Mordella nigra*, elytris apice rubris.

— — — ed. 2. No. 544.

*Acta Vpsal.* 1736. No. 8. *Gyrinus niger nitidus*, elytrorum apice rubro.

*Onomatol.* hist. nat. P. 5. p. 246. No. 5. *Mordella nigra* etc.

*Fabric.* S. E. p. 115. *Altica* 18.

*Nigra* nitida, elytris apice puncto rubro.

S. 4

*Geoffr.*

\*) Bey des Scop. Citato im Linné ein Druckfehler: 212 statt 214.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Nirgends abgebildet.

*Groffr.* Inf. Tom. I. pag. 250. *Altica* 15. *L'Altice à points rouges.*\*)

*Nigra*, coleoptris punctis quatuor rubris.

68. *Haemisphaerica*, der halbkugliche Blattkäfer.\*\*) *Haemisphaerica*

*Müller* l. c. p. 185. No. 68. die *Halbkugel*.

*Fabric.* S. E. p. 115. *Altica* 22.

*Suborbiculata*, *depressa*, *nigra*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 348. No. 56. *Chrysomela sauteuse brune.*

*Chrysomela saltatoria subglobosa obscure fusca nitida.*

69. *Surinamensis*, der gelbliche Surinamische Blattkäfer mit rothgesäumten Flügeldecken.

*Müller* l. c. p. 185. No. 69. der *Surinamer*.

*Fabric.* S. E. p. 115. *Altica* 23.

*de Geer* Inf. Tom. 5. pag. 355. No. 10. t. 16. f. 17.

*Chrysomela sauteuse de Surinam.*

*Saltatoria*, thorace rubro pallido, elytris rufis, fascia transversali coccinea, antennis pedibusque griseis.

70. *S. Litera*, der *bläsfarbige auf den Flügeldecken gleichsam mit einem lateinischen S. bezeichnete Blattkäfer*.

*Müller* l. c. p. 185. No. 70. das *lateinische S.*

*Fabric.* S. E. p. 115. *Altica* 24.

*de Geer* Inf. Tom. 5. pag. 357. No. 13. t. 16. f. 21.

*Chrysomela à la lettre S.*

*Saltatoria griseo-flava*, elytris fuscis; fascia longitudinali flexuosa albida.

71. *Aequi-*

\*) Vielleicht eine bloße *Varietät* der Linnéischen.

\*\*) Nirgends abgebildet.

71. *Aequinoctialis*, der *Violetflügel*.

Müller l. c. p. 185. No. 71.

Fabric. S. E. p. 112. *Altica* 3.

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 356. No. 11. t. 16. f. 19.

*Chrysomela equinoctiale*.

*Saltatoria*, thorace carneo, elytris violaceis nitidis, singulo maculis quatuor albis.

### III. Mit cylindrisch-rundem Körper.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 195-197. *Melolontha*. pag.

231-237. *Cryptocephalus*, *Gribouri*.

Fabric. S. E. p. 105-112. *Cryptocephalus*.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 329-338.

*Chrysomeles à corps cylindrique et à tête enfoncée dans le corcelet bossu*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 58. *Cryptocephalus*, 57. *Melolontha*.

72. *Cyanea*, der *amerikanische Bläuling*.

Müller l. c. p. 186. No. 72. der *Bläuling*.

Sulzers Gesch. S. 34. t. 3. f. 12. der *Bläuling*.

Fabric. S. E. p. 109. *Cryptoc.* 20.

*Cyaneus*, thorace pedibusque rufis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 197. *Melol.* 4. *La melolonte bleuette*.

*Coerulea*, thorace pedibusque ferrugineis.

73. *Tridentata*, der *dreyzähnige Blattkäfer auf den Hundskirschen*.

Müller l. c. p. 186. No. 73. der *Dreyzahn*.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 940. No. 6. der *walzenförmige blaue Blattsauger*.

Fabric. S. E. p. 106. *Cryptoc.* 5.

*Coeruleus*, elytris testaceis.

*Schaeff. Icon.* t. 77. f. 5.

*Geoffr. Ins. Tom. I.* p. 196. *Melol.* 3. *La Melolonte lisette.*

*Nigro-viridis, elytris luteo-pallidis.*

*de Geer Ins. Tom. 5.* pag. 333. No. 36. t. 10. f. 10.

*Chrysomela bleue verdâtre à etuis jaunes.*

*Cylindrica viridi-coerulea nitida; elytris testaceis,  
thorace angulato gibbo.*

74. *Gorteriae, Gorters Blattkäfer vom Vorgebirge der guten Hoffnung.* \*)

*Müller l. c. p. 186. No. 74. der Schwärzling.*

*Fabric. S. E. p. 107. Cryptoc. 7.*

75. *Aurita, der gelböhrichte Blattkäfer.* \*\*)

*Müller l. c. p. 187. No. 75. das Gelbohr.*

*Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 9. No. 155.*

*Fabric. S. E. p. 107. Cryptoc. 8.*

*Ater, thorace vtrinque macula lutea, tibiis flavis.*

76. *4-punctata, der vierfache Schwarzpunkt.* †)

*Müller l. c. pag. 187. No. 76. der Schwarzpunkt.  
(t. 4. f. 9.)*

*Füesslins Verzeich. schweiz. Ins. S. 9. No. 156. der  
Vierpunkt.*

*Schriften der Dronth. und Norweg. Gesellschaft.  
4. Th. S. 270.*

*Scop. Entom. carn. No. 206. *Buprestis quadripunctata.**

*Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 840. No. 1. der ab lange  
schwarze Mayenkäfer mit rothen Flügeldecken, und  
vier schwarzen Flecken.*

*Mülleri*

\*) Nirgends abgebildet.

\*\*) Nirgends abgebildet.

†) Einer der größten Blattkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. pag. 57. No. 510. *Melolontha*.

*Schaeff.* Elein. t. 83. f. 1. *Melolontha*, Sägenblattkäfer.

— — Icon. t. 6. f. 1. 2. 3.

*Fabric.* S. E. p. 106. *Cryptoc.* 2.

*Niger*, elytris rubris, punctis duobus nigris, antennis brevibus serratis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. pag. 195. *Melol.* I. t. 3. f. 4. La Melolonte quadrille à corcelet noir.

*Coleoptris rubris*, maculis quatuor nigris, thorace nigro.

*de Geer* Inf. Tom. 5. pag. 329. No. 32. t. 10. f. 7.

*Chrysomela cylindrique à 4 points noirs.*

*Cylindrica 4-punctata*, thorace nigro, elytris rubris, maculis duabus nigris, antennis serratis.

77. 4-maculata, der gelbliche Blattkäfer mit vier blauen Flecken.

*Müller* l. c. p. 188. No. 77. der Blaufleck.

*Füesslins* Verzeich. schweiz. Inf. S. 9. No. 157. der Vierfleck.

*Schaeff.* Icon. t. 6. f. 6. 7.

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 204. No. 29. t. 16.

*Fabric.* S. E. p. 107. *Cryptoc.* 10.

*Mülleri* Zool. Dan. p. 83. No. 912. *Luperus.*

*Pontopp.* Atl. Dan. I. t. 29.

78. 2-punctata, das Langhorn.<sup>\*)</sup>

*Müller* l. c. p. 188. No. 78.

*Füesslins* Verzeich. schweiz. Inf. S. 9. No. 158. der Zweypunkt.

*Mülleri*

<sup>\*)</sup> Eine Nebenart statt der Punkte mit länglichsten Flecken.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 9. No. 80.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 524. *Cryptoc.*

*Petiv.* Gazoph. t. 31. f. 4.

*Fabric.* S. E. p. 108. *Cryptoc.* 12.

*Niger*, nitidus, elytris rubris, punctis duobus nigris, antennis longitudine corporis.

*Geoffr.* Ins. Tom. I. p. 234. *Cryptoc.* 6. t. 4. f. 3.  
*Le Gribouri rouge strié à points noirs.*

*Niger*, elytris rubris striatis, maculis quatuor limbique nigris.

*de Geer* Ins. Tom. 5. pag. 332. No. 35. *Chrysomela cylindrique à deux grandes taches noires.*

*Cylindrica*, thorace nigro nitidissimo, elytris rubris, maculis duabus margineque nigris.

79. *8-guttata*, der Blattkäfer mit acht gelben Tropfen.\*)

*Müller* l. c. p. 188. No. 79. der Spanier.

80. *4-pustulata*, der schwarze Blattkäfer mit vier rothen blatterförmigen Flecken.\*\*)

*Müller* l. c. p. 189. No. 80. die Rothblätter.

*Fabric.* S. E. p. III. *Cryptoc.* 28.

81. *Scopoliana*, *Skopolis* Blattkäfer.†)

*Müller* l. c. p. 189. No. 81. das Bänderhähnchen.

*Fabric.* S. E. p. III. *Cryptoc.* 30.

*Niger*, thorace rufo, elytris rufis, fasciis duabus cyaneis.

82. *Moraei*, *Moräi* Blattkäfer.

*Müller* l. c. p. 189. No. 82. der Randfleck.

Fließ-

\*.) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†.) Nicht abgebildet.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 9. No. 159. Moräi  
Blattkäfer.

Scop. Entom. carn. No. 202. *Buprestis Moraei*.

Gadd. diss. 28. *Cassida nigra* etc.

Schaeff. Icon. t. 30. f. 5.

Fabric. S. E. p. 110. *Cryptoc. 25.*

Ater, elytris maculis duabus flavis marginalibus.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 234. *Cryptoc. 5.* Le Gribouri à deux taches jaunes.

Niger, capite thoraceque antice luteis, elytro singulo externe macula duplii flava.

83. *Bilineata*, der kleine schwarze Blattkäfer mit zwei gelben Linien. \*)

Müller l. c. p. 190. No. 83. das Lilienhähnchen.

Schriften der Dronth. und Norweg. Gesellschaft.

4. Th. S. 270.

84. *Nitens*, der blauglänzende Blattkäfer. \*\*)

Müller l. c. p. 190. No. 84. das Glanzhähnchen. †)

Füesslins Verzeich. schweiz. Inf. S. 9. No. 160.

Fabric. S. E. p. 110. *Cryptoc. 22.*

*Viridis*, nitens, ore pedibusque testaceis.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 334. No. 38. *Chrysomela cylindrique bleue à pattes jaunes.*

*Cylindrica coeruleo-violacea*, seu viridi-aurata nitida, capite antice pedibusque flavis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 522. *Cryptoc.*

85. Bar-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Herr Müller sagt zwar mit dem Ritter: es sey des Geoffr. Melolonte bleuette Tom. I. p. 197. No. 4. Da aber dieses Citatum vom Fabric. zu Chrys. cyanea No. 72. gesetzt ist, auch von Geer bey der gegenwärtigen den Geoffr. nicht angeführt hat; so zweifle ich, ob es die la Bleuette sey.

85. *Barbareae*, der *Hederichfresser*.\*)

*Müller* l. c. p. 190. No. 85. der *Senffresser*.

86. *Sericæa*, das *Seidenhähnchen*.\*\*) )

*Müller* l. c. p. 190. No. 86.

*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 757. No. 87. der *walzenförmige ins seidenhafte spielende Weidenblattkäfer*.

*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. p. 9. No. 161.

*Onomatol.* hist. nat. P. 2. p. 845. No. 1. der *grüne glänzende Weidenmayenkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 109. *Cryptoc.* 21.

*Viridi-coeruleus*, antennis nigris.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 518. *Cryptoc.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 233. *Cryptoc.* 3. Le *Velours vert*.

*Viridi-auratus sericeus*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 334. No. 37. *Chrysomela cylindrique verte dorée*.

*Cylindrica viridi-aurata*, thorace gibbo, antennis longis nigris, elytris scabris dehiscentibus.

87. *Labiata*, der *Blattkäfer mit der gelben Lippe*.†)

*Müller* l. c. p. 191. No. 87. das *Lippenhähnchen*.

*Fabric.* S. E. p. 112. *Cryptoc.* 33.

*Ater, nitidus*, ore pedibus basique antennarum lu-

tescentibus.

88. *Coryli*, das *Haselhähnchen*.††)

*Müller* l. c. p. 191. No. 88.

*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 9. No. 162. der *Haselblattkäfer*.

*Fabric.*

\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 109. *Cryptoc.* 16.

*Niger*, thorace elytrisque testaceis, immaculatis.

Müller Zool. Dan. p. 58. No. 523. *Cryptoc.*

89. *Pini*, der Fichtenblattkäfer. \*)

Müller l. c. p. 191. No. 89. der Fichtensauber.

Fabric. S. E. p. 112. *Cryptoc.* 32. \*

*Testaceus*, elytris pallidis, antennis fuscis.

90. *Bothnica*, der westbothnische Blattkäfer mit rothgerändeltem Bruststück. \*\*)

Müller l. c. p. 192. No. 90. der Bothnier.

Fabric. S. E. p. 108. *Cryptoc.* 14.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 335. No. 39. *Chrysomela cylindrique noire à pattes jaunes.*

*Cylindrica nigra*, pedibus testaceis, thorace linea longitudinali capiteque macula irregulari flavis.

91. *Cordigera*, der Herzträger.

Müller l. c. p. 192. No. 91.

Fabric. S. E. p. 108. *Cryptoc.* 13.

*Thorace variegato*, elytris rubris, punctis duobus nigris.

Schaeff. Icon. t. 30. f. 1.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 235. *Cryptoc.* 7. *Le gribouri rouge sans stries à points noirs.*

*Niger*, thorace lineis flavis, elytris rubris punctatis, maculis quatuor limboque nigris.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 330. No. 33. *Chrysomela cylindrique à corcelet tacheté.*

*Cylindrica*, thorace nigro maculis flavis, elytris rubris, punctis duobus nigris, antennis filiformibus flavis nigrisque.

92. 6-pun-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

92. *6-punctata*, der *sechspunktirte Blattkäfer*.

*Müller* l. c. p. 192. No. 92. der *Gelenkpunkt*.

*Füesslins Verzeich. schweiz. Inf.* S. 9. No. 163. der *Sechspunkt*.

*Sulzers Kennz.* t. 3. f. 18. der *schwarz dupfirte rothe Blattkäfer*.

*Schaeff. Icon.* t. 30. f. 1. 3.

*Fabric. S. E.* p. 109. *Cryptoc.* 18.

*Scop. Entom. carn.* No. 208. *Buprestis sexpunctata*.  
*de Geer Inf. Tom. 5.* pag. 331. No. 34. t. 10. f. 9.

*Chrysomela cylindrique à 6 taches noires*.

*Cylindrica rubra*, elytris maculis tribus nigris, thorace maculis magnis binis nigris rubro cinctis.

*Müller's Zool. Dan.* p. 58. No. 521. *Cryptoc.*

93. *10-maculata*, der *Zehnfleck*.

*Müller* l. c. p. 192. No. 93. der *Schwarzchild*.

*Linn. Faun. Suec. ed. 2.* No. 560. \*)

*Chrysom. decem punctata cylindrica*, thorace variegate, elytris flavis, punctis quinque nigris.

*Schaeff. Icon.* t. 86. f. 7.

94. *14-punctata*, der *Vierzehnpunkt*. \*\*)

*Müller* l. c. p. 193. No. 94. die *Rothbrust*.

95. *Longimana*, der *Langfuß*. †

*Müller* l. c. p. 193. No. 95.

*Füesslins Verzeich. schweiz. Inf.* S. 9. No. 164. der *Langarm*.

*Fabric. S. E.* p. 107. *Cryptoc.* II.

*Obscure teneus*, elytris testaceis.

96. Ob.

\*) Im Linné ein Druckfehler 561 statt 560.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

96. *Obscura*, der dunkelschwarze Blattkäfer.\*)

Müller l. c. p. 193. No. 96. der Hökerflügel.

Müller's Faun. Fridr. p. 9. No. 81.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 525. *Cryptoc.*

Fabric. S. E. p. 103. *Chrysom.* 48.

*Ovata*, *nigra*, thorace rotundato angustiori, pedibus posticis elongatis.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 336. No. 40. *Chrysomele noire quarrée.*

*Nigro-quadrata*, subcylindrica nigra, abdomine subquadrato, thorace globoſo, antennis longis.

IV. *Mit länglichem Körper und schmalem Bruststück.*

Fabric. S. E. p. 118-122. *Crioceris.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 237-243. *Crioceris.* p. 251-255. *Galerupe.*

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 338-342. *Chrysomeles à corps allongé, et à corcelet étroit presque cylindrique.*

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 85. *Crioceris.* p. 83. *Luperus.*

97. *Merdigera*, das *Lilienhähnchen*.

Müller l. c. p. 194. No. 97.

Füesslin's Verz. schweiz. Inf. S. 9. No. 195. der *Lilienblattkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 34. t. 3. f. 14. der *Lilienkäfer.*

Blankart Schauplatz der Raupen etc. Uebers. durch Rodochs. 8. Leipzig. 1690. p. 70. 29. Hauptst. von dem *Lilienwurm* und seinen Veränderungen. t. XI. f. G. H. I.

*Onoma-*

\*) Nicht abgebildet.

*Onomatol.* hist. nat. P. 2. p. 840. No. 4. der *rothe Mayenkäfer mit einer runden und auf beyden Seiten eingebogenen Brust.*

*Scop.* Entom. carn. No. 112. *Altelabus Lilii.*

*I.* Bauch hist. plant. 2. p. 696. *insecta rubella.*

*Muralto* Anatom. *Scarab. liliacei* v. Misc. N. C. Ann. 1682. p. 156.

*Müller* Faun. Fridr. p. 9. No. 82.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 935. *Crioceris.*

*Schaeff.* Elem. t. 52. f. 1. *Crioceris, Lilienkäfer.*

— — Icon. t. 4. f. 4.

*Reaum.* Mém. des Inf. Tom. III. P. I. Mém. 7. p. 282. t. 17. f. 1. 2. *Scarabé des Lis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 239. *Crioceris 1. Le Criocere rouge du Lys.*

*Crioceris rubra.*

de Geer Inf. Tom. 5. p. 338. No. 43. *Chrysomela rouge du Lis.*

*Rubra Liliorum, thorace tereti, capite antennis pedibus abdomineque subtus nigris.*

#### 98. *Stercoraria*, das *Runzelhähnchen*.\*)

*Müller* l. c. p. 195. No. 98.

#### 99. *Nymphaeae*, der *Seeblumenblattkäfer*.

*Müller* l. c. p. 195. No. 99. der *Faulenzer*.

*Füesslins* Verzeich. schweiz. Inf. S. 9. No. 166. der *Faulenzer*.

*Onoma-*

\*.) Nicht abgebildet.

Beyde führen eigentlich davon den Namen, weil der Wurm seinen eigenen Koth mit sich herumführt. *Reaum.* Tom. 3. t. 17. f. 4.

*Onomatol.* hist. nat. P. 2. p. 836. No. 7. der braune Mayenkäfer mit einem bläsigelben Rande an den Flügeldecken.

*Fabric.* S. E. p. 118. *Crioceris* 1.

*Fusca*, elytris margine prominulo flavescente.

*Geoffr.* Ins. Tom. I. p. 254. *Galeruque* 4. La *Galeruque aquatique*.

*Galeruca pallida*, thorace nigro variegato, elytris unicoloribus pallidis.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 907. *Galeruca*.

*de Geer* Ins. Tom. 5. p. 326. No. 31. t. 20. f. 1. 2.

*Chrysomela brune du Nénufar.*

*Ovata nigro-fusca*, thorace angusto maculis duabus nigris, elytris margine flavis, antennis fuscis.

100. *Capreæ*, das bockförmige Weidenhähnchen.\*)

*Müller* l. c. p. 196. No. 100. das Bockhähnchen.

*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 757. No. 88. der schmale graue Werftblattkäfer.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 48. No. 1. *Altelabus* subrotundus griseus, der schwarze Lilienmayenkäfer.

— — — — — p. 838. No. 2.

*Chrysomela nigra* etc.

*Aða Vpsal.* 1736. pag. 19. No. 6. *Altelabus* subrotundus griseus.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 909. *Galeruca*.

*Fabric.* S. E. p. 118. *Crioceris* 2.

Thorace nigro-maculato, elytrisque griseis, antennis nigris.

*Geoffr.* Ins. Tom. I. p. 254. *Galeruque* 5. La *Galeruque grisette*.

*Nigra*, thorace elytrisque luteo-lividis.

T 2 de Geer

\*) Nicht abgebildet. Im Linné ein Druckfehler Cuprea, statt Capreæ.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 325. No. 30. *Chrysomela grisea de l' Aune.*

Chr. (*grisea Alni*) ovata grisea opaca, thorace angusto puncto nigro, elytris pallide flavo marginatis, basi puncto nigro, antennis variegatis.

101. *Calmariensis*, der rostfarbige Blattkäfer am Colmarsund in Schweden.\*)

Müller l. c. p. 196. No. 101. der Schwede.

Fabric. S. E. p. 119. *Crioceris* 4.

*Ovata cinerea*, elytris vitta lineolaque baseos nigris.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 253. *Galeruque* 3. La Galeruque à bandes de l' orme.

*Pallida*, thorace nigro variegato, elytris fasciis duabus longitudinalibus nigris.

102. *Tenella*, ein zartes gelbliches Blattkäferchen.\*\*) )

Müller l. c. p. 196. No. 102. der Zärtling.

Fabric. S. E. p. 119. *Crioceris* 6.

*Ferruginea*, elytris margine thoraceque flavis.

103. *4-maculata*, der Weitfleck.†)

Müller l. c. p. 197. No. 103.

Schaeff. Icon. t. 36. f. 14.

104. *Cyanella*, der blaugrünlche Blattkäfer.††)

Müller l. c. p. 197. No. 104. die Blaunase.

Fabric. S. E. p. 121. *Crioceris* 16.

*Coerulea*, thorace cylindrico, lateribus gibbis.

Geoffr.

\*) Nicht abgebildet. \*\*) Nicht abgebildet.

†) Zum Unterschiede von No. 77.

††) Nicht abgebildet.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 243. Crioceris 5. Le Criocere tout bleu.*

*Tota coeruleo-viridis.*

*de Geer Inf. Tom. 5. pag. 340. No. 44. Chrysomèle bleue à corcelet étroit.*

*Coeruleo-violacea, thorace tereti, lateribus gibbis.*  
*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 934. Crioceris.*

105. *Melanopa*, der Schwarzfuss.

*Müller l. c. p. 197. No. 105.*

*Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 9. No. 167.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 87.*

*Fabric. S. E. p. 121. Crioceris 17.*

*Oblonga coerulea, thorace pedibusque rufis.*

*de Geer Inf. Tom. 5. p. 342. No. 46. Chrysomèle bleue à corcelet étroit rouge.\*)*

*Oblonga, viridi-coerulea nitida, thorace tereti, pedibusque flavo-rufis.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 936. Crioc.*

106. *Flavipes*, der Gelbschenkel.\*\*) )

*Müller l. c. p. 197. No. 106.*

*Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 9. 168.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 939. Crioc.*

107. *Tomentosa*, der amerikanische blaue Blattkäfer mit schwarzen wolligen Flügeldecken.†)

*Müller l. c. p. 198. No. 107. der Staubshild.*

*Fabric. S. E. p. 122. Crioceris 22.*

T 3

*Oblonga,*

\*) Hierbey hat der Herr von Geer eben das Citatum des Geoffroi angeführt, welches Linné zu No. 24. Chrys. Polygoni gesetzt hat: Tom. I. p. 242. No. 4. Le Criocere bleu à corcelet rouge.

\*\*) Nicht abgebildet. †) Nicht abgebildet.

*Oblonga*, thorace pallido, punctis tribus nigris, elytris nigris vittis duabus albis.

108. *Punctatissima*, der *surinamische kupfergrüne, ganz punktierte Blattkäfer*.\*)

Müller l. c. p. 198. No. 108. das *Grieshähnchen*.

109. *8-punctata*, der *surinamische Blattkäfer mit vier gelben Punkten auf den schwarzen Flügeldecken*.\*\*)

Müller l. c. p. 198. No. 109. der *Ausländer*.

110. *12-punctata*, der *rothe Blattkäfer mit zwölf Punkten*.

Müller l. c. p. 199. No. 110. der *Inländer*.

Füesslins Verzeichn. schweiz. Inf. S. 9. No. 169. der *Zwölfpunkt*.

Frisch Inf. 13. Th. S. 29. t. 28. die *Spargelraupe und deren Käfer*.

Scopol. Entom. carn. No. 115. *Altelabus 12-punctatus*.

Fabric. S. E. p. 120. *Crioceris II.*

Thorace cylindrico, rubra, elytris *punctis sex nigris*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 932. *Crioceris*.

— — Faun. Fridr. p. 9. No. 85.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 240. *Crioceris 2.* t. 4. f. 5.

Le *Criocere rouge à points noirs*.

*Rubra*, punctis tredecim nigris.

Schaeff. Icon. t. 4. f. 5.

III. *Phelandrii*, der *Schierlingfresser*.

Müller l. c. p. 199. No. III.

Füess-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 9. No. 170.

*Schriften* der Dronth. und Norweg. Gesellschaft.

4. Th. S. 271.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 9. No. 86.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 900.

*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 838. No. 2. der *schwarze kupferglänzende Mayenkäfer mit gelben Linien auf den Flügeldecken.*

*Fabric.* S. E. p. 122. *Crioceris* 20.

*Oblonga, nigra,* thorace elytrisque lineis duabus flavis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 266. *Chrys.* 20. La *Chrysomele à bandes jaunes.*

*Oblonga nigra;* elytrorum lineis duabus longitudinalibus luteis.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 324. No. 28. t. 9. f. 34. *Chrysomele de la Philandrie.*

*Oblonga nigro-aenea* obscura nitida, thorace marginibus flavis, elytris fasciis duabus longitudinalibus flavis.

112. *Asparagi*, das *Spargelhähnchen*.

*Müller* I. c. p. 199. No. 112. t. 4. f. 10.

*Füesslins* Verzeich. schweiz. Inf. S. 9. No. 171. der *Spargelblattkäfer*.

*Frisch* Inf. I. S. 27. t. 6. der *Kreuzkäfer*.

*Neue Berlin. Mannigf.* 3. Jahrg. S. 100.

*Rösel's* Infektenbel. 2. B. Erdk. 3. Kl. S. 11. t. 4. das *buntgefleckte Spargelkäferlein*.

*Onomatol. hist. nat.* P. 2. p. 842. No. 3. der *Mayenkäfer mit rother runder Brust, und gelben Flügeldecken mit einem schwarzen Kreuz: der Spargenmayenkäfer.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 9. No. 83.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 933. *Crioceris.*

*Scop. Entom. carn.* No. 113. *Altelabus Asparagi.*

*Fabric. S. E. p. 121. Crioceris* 19.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 241. Crioceris* 3. *Le Criocere porte-croix de l'asperge.*

*Thorace rubro, punctis duobus nigris, coleoptris flavis, cruce coeruleo-nigra.*

*Schaeff. Icon. t. 52. f. 9, 10.*

113. *Campestris*, das *Feldhähnchen.*\*)

*Müller l. c. p. 200. No. 113.*

#### V. *Langgedehnte Goldhähnchen.*

114. *Sulphurea*, das *Schwefelhähnchen.*\*\*) (

*Müller l. c. p. 200. No. 114.*

*Fabric. S. E. p. 117. Cistela* 5.

*Flava, elytris sulphureis.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 351. Tenebrto* II. *lutea.*  
Le *Tenebrion jaune.*

*Müller Zool. Dan. p. 83. No. 904.*

115. *Cervina*, das *Hirschhähnchen.*

*Müller l. c. p. 200. No. 115.*

*Fabric. S. E. p. 116. Cistela* I. †)

*Livida, pedibus fuscis.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 116. t. 1. f. 8. Cistela* I. La *Cistele satinée.*

*Subvillosa viridescens, fasciis longitudinalibus fuscis interruptis.*

116. Ca-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Bey dieser Cervina hat *Fabric.* des *Geoffroi Cist. satinée* frageweise angeführt, die ich unter den neuen Cistelis aufgestellt habe: No. 2. *fasciata.*

116. *Caraboides*, der erdkäferförmige Blattkäfer.\*)

Müller l. c. p. 201. No. 116. das Käferhähnchen.

117. *Ceramboides*, der Blattkäfer mit bockförmigen Fühlhörnern.\*\*)

Müller l. c. p. 201. No. 117. das Bockhorn.

Fabric. S. E. p. 116. *Cistela* 3.

*Atra*, elytris striatis, testaceis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 354. *Mordella* 3. La Mordelle à étuis jaunes striés.

*Nigra*, elytris fulvis striatis.

118. *Murina*, das Mausähnchen.†)

Müller l. c. p. 201. No. 118.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 512. *Anaspis*.

Fabric. S. E. p. 117. *Cistela* 7.

*Nigra*, elytris pedibusque testaceis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 355. *Mordella* 4. La Mordelle à étuis jaunes sans stries.

*Nigra*, elytris fulvis laevibus.

119. *Hirta*, das Rauhhähnchen.

Müller l. c. p. 201. No. 119.

Füesslin's Verz. schweiz. Inf. S. 9. No. 172. haariger Blattkäfer.

Müller Faun. Fridr. p. 9. No. 88.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 937. *Crioc*.

Fabric. S. E. p. 125. *Lagria* 8.

*Villosa*, nigra, thorace tereti, elytris testaceis.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 44. *Tenebrio* 6. t. 2. f. 23. 24.

*Tenebrion velu*.

T 5

Alatus

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

† ) Nicht abgebildet.

*Alatus villosus niger, elytris villosis fulvis, thorace teretiusculo.*

120. *Pubescens*, das *Wollenhähnchen*.\*)

Müller l. c. p. 201. No. 120.

Fabric. S. E. p. 125. *Lagria* 7.

*Nigra*, thorace marginato villoso, elytris glabris, testaceis.

121. *Inda*, der *indianische Stelzenläufer*.\*\*)

Müller l. c. p. 202. No. 121.

122. *Elongata*, der *Schmalrücken*.

Müller l. c. p. 202. No. 122.

Pontopp. Nat. Gesch. v. D. S. 204. t. 16.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 980. No. 30. der schmal- und langleibige schwarze Blattkäfer mit dem rothen zottigen Bruststück.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 938. *Crioceris*,

### *Unabgebildete Linneische Chrysomelen.*

1. No. 6. *Haemorrhoidalis* f. *Viminalis* N. 31.
2. No. 7. *Graminis*.
3. No. 14. *Padi*.
4. No. 15. *Minutissima*.
5. No. 16. *Armoraciae*.
6. No. 18. *Fastuosa*.
7. No. 19. *Speciosa*.
8. No. 20. *Halenfis*.
9. No. 21. *Hypochaeridis*.
10. No. 22. *Vulgatissima*.
11. No. 23. *Vitellinae*.

12. No.

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

12. No. 25. *Pallida.*
13. No. 28. *Lurida.*
14. No. 31. *Viminalis s. No. 6.*
15. No. 33. *Variolosa.*
16. No. 35. *Vndulata.*
17. No. 40. *Marginella.*
18. No. 41. *Castanea.*
19. No. 42. *Analis.*
20. No. 45. *3-maculata.*
21. No. 47. *Lineola.*
22. No. 49. *Sacra.*
23. No. 53. *Chrysoccephala.*
24. No. 54. *Hyosciami.*
25. No. 55. *Atricilla.*
26. No. 56. *Erythrocephala.*
27. No. 57. *Modeeri.*
28. No. 59. *Exsoleta.*
29. No. 61. *Trifasciata.*
30. No. 63. *Rustica.*
31. No. 64. *Pulicaria.*
32. No. 66. *Fuscicornis.*
33. No. 67. *Holsatica.*
34. No. 68. *Haemisphaerica.*
35. No. 74. *Gorteriae.*
36. No. 75. *Aurita.*
37. No. 79. *8-guttata.*
38. No. 80. *4-pustulata.*
39. No. 81. *Scopolina.*
40. No. 83. *Bilineata.*
41. No. 84. *Nitens.*
42. No. 85. *Barbareae.*
43. No. 86. *Sericia.*
44. No. 87. *Labiata.*
45. No. 88. *Coryli.*
46. No. 89. *Pini.*

47. No. 90. *Bothnica.*  
 48. No. 94. *14-punctata.*  
 49. No. 95. *Longimana.*  
 50. No. 96. *Obscura.*  
 51. No. 98. *Stercoria.*  
 52. No. 100. *Capreae.*  
 53. No. 101. *Calmariensis.*  
 54. No. 102. *Tenella.*  
 55. No. 104. *Cyanella.*  
 56. No. 106. *Flavipes.*  
 57. No. 107. *Tomentosa.*  
 58. No. 108. *Punctatissima.*  
 59. No. 109. *8-punctata.*  
 60. No. 113. *Campestris.*  
 61. No. 114. *Sulphurea.*  
 62. No. 116. *Caraboides.*  
 63. No. 117. *Ceramboides.*  
 64. No. 118. *Murina.*  
 65. No. 120. *Pubescens.*  
 66. No. 121. *Inda.*

*Neue Chrysomelenarten.*I. *Mit eyrundem Körper.*1. *Bimaculata*, der *Ziveyfleck*.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 8. No. 73.*Ovata testacea*, elytris basi ferrugineis.2. *Fridrichsdalensis*, der *Fridrichsdalische Blattkäfer mit blutrothen Flügeldecken*.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 8. No. 74.*Ovata*, thorace macula nigra; elytris sanguineis immaculatis, abdomine nigro.*Mülleri*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 885.

*Ovata*, nigra, supra sanguinea, thorace vnicā; elytris octo maculis nigris, vel immaculatis.

*Schaeff.* Icon. t. 194. f. 4.

3. *Violacea*, der *Blauschilde*.\*)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 259. *Chrys.* 6. La *Chrysomèle bleue à corcelet violet*.

*Coerulea*, *thorace violaceo*.

4. *Atra*, der *ganz schwarze Blattkäfer mit rothen Flügeln*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 259. *Chrys.* 7. La *Chrysomèle noire à ailes rouges*.

*Tota nigra*:

5. *10-striata*, der *galonirte Blattkäfer*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 261. *Chrys.* 13. La *Chrysomèle à galons*.

*Viridis nitida*, *striis decem cupreis*, *punctorum dupli* *serie divisis*.

6. *Ruficaudis*, der *Rothschwanz*.

*de Geer* Inf. Tom. 5. p. 305. No. 17. *Chrysomèle bronzée à ventre bordé de rouge*.

*Ovata*, *viridi-aenea*, *obscura*, *nitida*, *abdominis lateribus anno alarumque margine rubris*.

7. *Viridula*, der *Grünling*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 520. B.

— — — ed. 1. No. 421.

*Chrys-*

\*) Hiervon giebt es noch eine Varietät *thorace nigro-violaceo*.

*Chrysomela viridis nitida*, thorace antice aequali, elytris pone contiguis.

*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 844. No. 4. der grüne glänzende Mayenkäfer mit einer vornen gleichen Brust, und hinten neben einander stehenden Flügeln.

*Geoffr. Inf. Tom. I.* p. 261. *Chrys. II.* La *Chrysomèle dorée*.

*de Geer Inf. Tom. 5.* p. 311. No. 19. *Chrysomèle verte à corps noir.*

*Ovato-oblonga viridis aurata nitida*, thorace antice aequali, abdomine supra toto nigro.

*Goedart Inf. Tom. I.* t. 45.

8. *Coeruleo-violacea*, der violetblaue Blattkäfer.

*de Geer Inf. Tom. 5.* p. 316. No. 22. *Chrysomèle bleue violette ovale.*

*Ovata*, supra *coeruleo-violacea*, subtus *violaceo-viridis*, punctis excavatis sparsis, thorace amplio, antennis brevicribus nigris.

9. *Griseo-nitida*, der grauglänzende Blattkäfer.

*de Geer Inf. Tom. 5.* pag. 325. No. 29. t. 9. f. 35. *Chrysomèle grise luisante à corcelet étroit.*

*Oblonga*, thorace teretiusculo, supra *griseo-fusca nitida* subtus nigra, capite nigro, antennis longis.

10. *Vndata*, der surinamische gewässerte Blattkäfer.

*de Geer Inf. Tom. 5.* pag. 350. No. 2. t. 16. f. 9. *Chrysomèle ondée.*

*Ovata nigra*, elytris glabris, fasciis transversalibus *vndulatis*, maculisque rubris.

11. *Rubro-punctata*, der *surinamische Rothpunkt*.

de Geer Inf. Tom. 5. pag. 350. No. 3. t. 16. f. 10.  
*Chrysomela à points rouges*.

*Ovata*, capite thoraceque viridi-aeneis obscuris,  
elytris nigris, maculis plurimis rubris punctisque ex-  
cavatis.

12. *Obscura*, der *dunkelbraune surinamische Blatt-  
käfer*.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 354. No. 8. t. 16. f. 15. *Chry-  
somele sombre*.

*Ovata fusca depressa*, thorace elytrisque griseo-  
fuscis, antennis nigris.

13. *Tenebricosa*, der *dunkelschwärzliche Blattkä-  
fer.\*)*

Fabric. S. E. p. 94. *Chrysomela* 1.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 265. No. 19. La *Chrysomèle  
à un seul étui*,

14. *Bicolor*, der *orientalische zweifarbig Blatt-  
käfer*.

Fabric. S. E. p. 95. *Chrysom.* 3.

*Ovata*, viridi-aenea, subtus violacea.

D. Forstkähl.

15. *Bankii*, Banks *Blattkäfer*.

Fabric. S. E. p. 95. *Chrysom.* 4.

*Ovata*, supra aenea, subtus testacea.

Mus. D. Banks.

16. *Sutu-*

\*) Dies ist nach dem Geoffr. des Linnei *Tenebrio caraboides* ed. 12.  
p. 677, No. 25, aber nach dem Fabric. No. 29. *laevigatus*.

16. *Suturalis*, die *amerikanische Kupfernath*.

*Fabrit.* S. E. p. 95. *Chrysom.* 7.

*Aenea*, *elytris flavis*, *sutura vittaque aeneis*.

17. *Surinamenis*, der *surinamische Braunfuss*.

*Fabrit.* S. E. p. 96. *Chrysom.* 8.

*Cyanea*, *glaberrima*, *antennis plantisque fuscis*.

Mus. Dom. *Banks*.

18. *Cuprea*, das *deutsche Kupferhähnchen*.

*Fabrit.* S. E. p. 96. *Chrysom.* 10.

*Ovata*, *capite thoraceque aeneis elytris cupreis*,  
*corpore atro*.

D. de *Hottorf*.

19. *Semistriata*, der *brasiliatische halbgestreifte Blattkäfer*.

*Fabrit.* S. E. p. 96. *Chrysom.* 12.

*Ovata nigra*, *elytris flavis*, *fascia media nigra*, *antice posticeque nigro-striatis*.

20. *Fervida*, der *muschelfarbige javanische Blattkäfer*.

*Fabrit.* S. E. p. 97. *Chrysom.* 15.

*Ovata*, *testacea*, *elytris aeneis margine testaceo*.

21. *Stolida*, der *amerikanische Scheckflügel*.

*Fabrit.* S. E. p. 98. *Chrysom.* 19.

*Ovata*, *ferruginea*, *capite thoraceque flavis*, *elytris variegatis*.

22. *Nigricornis*, das *neuholländische Schwarzhorn*.

*Fabrit.* S. E. p. 98. *Chrysom.* 20.

*Ovata*,

*Ovata*, nigro-aenea, capite, thoracisque lateribus  
elytrorumque macula dupli, baseos ferrugineis.

Mus. Dom. Banks.

23. *Cyanipes*, der *neuholländische Blaufuß*.

Fabric. S. E. p. 98. *Chrysom.* 23.

*Ovata*, rufa, elytris punctis posticeque cyaneis.

Mus. Dom. Banks.

24. *Cyanicornis*, das *neuholländische Blauhorn*.

Fabric. S. E. p. 99. *Chrysom.* 24.

*Ovata*, rufa, thorace macula dorsali punctisque  
duobus, coleoptris maculis octo cyaneis.

Mus. Dom. Banks.

25. *Crafficornis*, das *neuholländische Dickhorn*.

Fabric. S. E. p. 99. *Chrysom.* 27.

*Ovata*, flavescens, elytris maculis duabus nigris.

Mus. Dom. Banks.

26. *18-guttata*, der *neuholländische Blattkäfer mit  
achtzehn Tropfen*.

Fabric. S. E. p. 100. *Chrysom.* 31.

*Ovata*, elytris fuscis, punctis octo pallidis, qui-  
busdam connexis.

Mus. Dom. Banks.

27. *Festiva*, der *amerikanische Prachtblattkäfer*.

Fabric. S. E. p. 100. *Chrysom.* 35.

*Nigro-aenea*, lineis tribus suturaque antica flavis.

Mus. Brit.

28. *Aurata*, der *pensylvanische Blattkäfer mit goldenen Flügeldecken*.

*Fabrit.* S. E. p. 101. *Chrysom.* 38.

*Ovata*, thorace rotundato cyaneo, elytris aureis, margine cyaneo.

*Mus. Brit.*

29. *Limbata*, der *englische Rothsaum*.

*Fabric.* S. E. p. 101. *Chrysom.* 39.

*Ovata*, atra, coleoptrorum limbo sanguineo.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 260. *Chrys.* 9. La *Chrysomelle bleue à bordure rouge*.

*Nigro-coerulea*, elytris lucidis punctatis, margine exteriore et anteriore rubris.

30. *Hannoveriana*, die *hannoverische Roststreife*.

*Fabric.* S. E. p. 102. *Chrysom.* 43.

*Ovata*, cyanea, thorace margine, elytris margine vittaque ferrugineis.

D. de Hattorf.

31. *Litura*, die *englische Schwarznath*.

*Fabric.* S. E. p. 102. *Chrysom.* 44.

*Ovata*, rufescens, elytris sutura lineaque longitudinali nigris.

32. *Adonidis*, das *Adonishähnchen*.

Pallas Reisen I. Th. App. No. 29. Ausz. I. pag. II.  
No. 29. Magnit. *collaris* L. No. 37.

Müllers Suppl. B. S. 226. No. 129.

33. *Asiatica*, das *asiatische Hähnchen*.

Pallas Reisen I. Th. App. No. 30. Ausz. I. pag. II.  
No. 30. Magnit. *Scarab. solstit.* L.

Müllers Suppl. B. S. 226. No. 30.

34. *Ascle-*

34. *Asclepiada*, das *Aeskulaphähnchen*.

Pallas Reisen II. Th. App. No. 69. Magnitud. Chr.  
*Polyg.* L. No. 24.

Müllers Suppl. B. S. 225. No. 127.

35. *Absinthii*, das *Wermuthhähnchen*.

Pallas Reisen II. Th. App. No. 70.

Aequat. Chr. *Tanaceti*. No. 5.

Müllers Suppl. B. S. 225. No. 128.

36. *Sapphirica*, der *sapphirne Blattkäfer*.

Forsteri Nov. sp. Inf. Cent. I. p. 19. No. 19.

*Ovata*, tota *Sapphirica*, nitida, ore oculisque rubeis, antennis nigris.

37. *Hyperici*, der *Johanniskraut-Blattkäfer*.

Forsteri Nov. sp. Inf. Cent. I. p. 20. No. 20.

*Ovata*, atro-coerulea, elytris nigro-aeneis, striato-punctatis, alis rubris.

38. *Rhoi*, der *amerikanische Sumach-Blattkäfer*.

Forsteri Nov. sp. Inf. Cent. I. p. 21. No. 21.

*Ovata*, ferruginea, capite thorace et striis aliquo: elytrorum pallidis.

39. *Lineato-punctata*, die *amerikanische Punktlinie*.

Forsteri Nov. sp. Inf. Cent. I. p. 22. No. 22.

*Ovata*, thorace rufo, disco punctis nigris, elytris rufis, sutura, punctis lineolisque nigris.

40. *Olivacea*, der *englische olivenfarbige Blattkäfer*.

Forsteri Nov. sp. Inf. Cent. I. p. 23. No. 23.

*Ovata*, nigra, capite, thorace, elytris pedibusque olivateis, elytris stria longitudinali et sutura nigra.

41. *Frontalis*, die amerikanische Roststirn.

*Forsteri* Nov. sp. Inf. Cent. I. p. 24. No. 24.

*Ovata*, nigra, capite, antennarum basi, elytrorum margine, et pedibus ferrugineis.

42. *Viridi-coerulea*, der alexandrinische grünblauchige Blattkäfer.

*Forstahl* descr. Animal. etc. p. 77. No. 2.

*Ovata*, elytris striis quinque.

43. *Sisymbrii*, der russische Wellsaamenblattkäfer.

*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 10. t. 4. f. 16. ein unbeschriebener Sonnenkäfer, zum Geschlecht der Blattkäfer auf dem Wellsaamen.

*Chrysomela* atro capite, marginibus thoracis atque elytrorum vndique sanguineis.

Berlin. Samml. 8. B. p. 580. f. 9.

44. *Polygoni frutescentis*, der russische Blattkäfer auf dem Stautigten Wegetritt.

*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 311. t. 20. f. 3.

*Corpore atro*, thorace atque elytris rubicundis, incisuris abdominalibus albis.

45. 4-punctata, der Blattkäfer mit vier Punkten.

*Lepechins* Tageb. II. Th. S. 208. t. 11. f. 20.

*Ovata*, thorace nigro, rubro-marginato, elytris sanguineis, maculis 4 nigris.

46. *Cyaneo-fasciata*, der blaibandirte russische Blattkäfer.

*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 29. t. 4. f. 7.

Thorace et elytris rubris, capite fasciisque duabus elytrorum coeruleis.

47. Ob-

47. *Obscuro-viridis*, der russische dunkelgrüne Blattkäfer.

*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 312. t. 20. f. 6.

*Corpore viridi, thorace atque elytris marginatis.*

48. *Similis*, der schwarzblauliche Blattkäfer.\*)

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 880.

*Ovata, nigro-violacea, thorace lateribus, anten-  
nisque basi rubris.*

49. *Oricalcia*, der messingfarbige Blattkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 889.

*Nigra, supra aenea, elytris punctis striatis.*

50. *Grossa*, der schwarze dicke Blattkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 875.

*Ovata, atra, subtus violacea, tarsis spongiosis, sub-  
tus fuscis.*

*Schaeff.* Icon. t. 126. f. 1.

51. *Affinis*, der Rothafteter.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 890.

*Ovata, violacea, elytris punctato-striatis, ano  
rubro.*

52. *Obtusa*, der abgestumpfte Blattkäfer.\*\*)

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 895.

*Ovata, violacea, thorace pedibusque rufis.*

V 3

53. *Tho-*

\*) Vielleicht das zweyte Geschlecht von *C. Cellaris* L. No. 37.

\*\*) Vielleicht nur das andere Geschlecht von Linn. No. 24. *Po-  
lygoni.*

53. *Thoracica*, der breitgeschilderte Blattkäfer.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 82. No. 898.

*Ovata*, violacea, thoracis margine laterali dilatato, elyttis punctato-striatis.

54. *Bilineata*, die Zweylinie.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 83. No. 904.

*Viridi-aurea*, thorace antice excavato; elytrorum linea dupli coerulea.

*Act. Nidr. IV.* p. 8. t. 16. f. 5.

55. *Serotina*, der späte Blattkäfer.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 83. No. 905.

*Ovata*, nitida, rufa, oculis nigris, tibiis posticis arcuatis.

56. *Menthae*, Wassermünzblattkäfer.

*P. Schrank Beytr. zur N. G. S.* 63. §. 5.

*Ovata*, nigro-aenea, nitida.

57. *Pruni*, Elexenblattkäfer.

*P. Schrank Beytr. zur N. G. S.* 63. §. 6.

*Ovata*, nigra; capite, thorace, elytrorumque apicibus rufis.

## II. Springhähnchen.

1. *Iuliana*, des Herrn Julians neu entdeckter Blattkäfer der Cocosbäume.

*Beckmanns physik. oekon. Bibl.* 3. B. S. 75.

Ein Mittelinsekt zwischen *Chrysomela*, *Necydalis* und *Silpha*.

2. *Fimbriata*, der amerikanische gesäumte Blattkäfer.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 25. No. 25.

*Saltatoria oblonga*, capite, thorace quadripunctato, elytrisque pallide testaceis, linea nigra cinctis, femoribus rufis.

3. a. *Hudsonias*, der schwarze Hudsonische Blattkäfer.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 26. No. 26.

*Saltatoria*, atra, oblongiuscula, antennarum basi ferruginea.

3. b. *4-guttata*, der dänische Vier tropf.

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 204. t. 16.

Caput et thorax nigra, basi antennarum flavescentia, elytra nigra maculis testaceis.

4. *Ferruginea*, das Rosthähnchen.

*Scop.* Entom. carn. No. 216.

Tota ferruginea, oculis nigris.

5. *Truncata*, die abgestumpfte Flügeldecke.

*Scop.* Ent. carn. No. 218.

Nigra, elytris truncatis, apice ferrugineis, pedibus antennisque rufis.

6. *Lurida*, der braunrothe Blattkäfer.

*Scop.* Ent. carn. No. 219.

*Fusco-rufa*, abdomine oculisque nigris.

7. *Bicolor*, der kupferschwärzliche Blattkäfer.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. pag. 245. *Altica* 3. t. 4. f. 4.  
L'Altise bedoude.\*)

*Nigra*, elytris nigro-aeneis striatis, thorace rubro,  
pedibus nigris.

8. *Nigra ovalis*, der schwarze eyförmige Blattkäfer.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. pag. 246. *Altica* 5. L'Altise  
noire ovale.

*Nigro-aenea*, ovata, pedibus nigris.

9. *Cruiferae*, das Springhähnchen auf den *Plantis cruciferis*.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. pag. 246. *Altica* 6. L'Altise  
noire allongée des crucifères.

*Nigro-aenea*, oblonga, pedibus nigris.

10. *Flavipes*, der Gelbfuss.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. pag. 246. *Altica* 7. L'Altise  
noire à pattes fauves.

*Nigra*, ovata, pedibus rufis, elytris non striatis.

11. *Nigro-fasciata*, der schwarz bandirte Blattkäfer.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 248. *Altica* 10. L'Altise  
à bordure noire.

*Nigra*, thorace elytrisque flavis, oris nigris.

12. *Non-striata*, der blaue ungestreifte Blattkäfer.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 249. *Altica* 12. L'Altise  
bleue sans stries.

*Coerulea*, elytris punctis sparsis, tibiis ferrugineis.

13. *Co-*

\*.) S. die 2te Anm. bey Chrys. L. Olerac. No. 51.

13. *Coeruleo-striata*, der blaue gestreifte Blattkäfer.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 343. No. 48. *Chrys.* Santeuse à étuis bleus canelés.

(*Coeruleo-striata*) *saltatoria* ovata coerulea, capite thorace antennis pedibusque rufis, elytris striatis.

14. *Violaceo-punctata*, der himmelblaue punktirte Blattkäfer.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 344. *Chrys.* 50. Santeuse violette pointillée.

*Saltatoria* ovata, thorace punctato virescenti coeruleo, elytris violaceis punctato-striatis, pedibus rufis.

15. *Viridi-coerulea*, der grünblauliche Blattkäfer.

de Geer Inf. T. 5. p. 346. *Chrys.* 53. Santeuse verte bleuâtre.

*Saltatoria*, ovata, *viridi-coerulea* nitidissima, thorace laevi, antennis pedibusque rufis, femoribus posticis nigris.

16. *Melanocephala*, der Schwarzkopf.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 348. *Chrys.* 57. Santeuse jaune à tête noire.

*Saltatoria* pallide flava, capite abdomine femoribusque posticis nigris.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 251. *Altica* 19. La paillette.\*)

*Altica* elytris pallide flavis, capite nigro.

17. *Albicollis*, der neuholländische Weißhals.

Fabric. S. E. p. 112. *Altica* 4.

V 5

Thorace

\*) Dieses Citatum hat Fabricius S. E. p. 114. zu Linn. *Atricilla* No. 55. gesetzt.

*Thorace pallido, elytris aeneis, maculis duabus fasciaque aureis.*

Mus. Dom. Banks.

18. *Nigripes*, der *englische Schwarzfuss*.

*Fabric. S. E. p. 113. Altica 6.*

*Viridi-aenea, pedibus nigris.*

Mus. Dom. Hunter.

19. *Anglica*, der *englische schwarze Blattkäfer mit blässen Flügeldecken*.

*Fabric. S. E. p. 114. Altica 12.*

*Atra, elytris tibiisque pallidis.*

Mus. Dom. Hunter.

20. *4-pustulata*, die *rothe Vierblätter*.

*Fabric. S. E. p. 114. Altica 13.*

*Nigra, coleoptris punctis quatuor rufis.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 250. Altica 15. L'Altise à points rouges.*

*Müller. Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 928.*

*Altica quadriguttata ovata, nigra, antennis, pedibus elytrorumque punctis quatuor luteis.*

*Pontopp. Atlas Dan. I. t. 29.*

21. *Fuscipes*, der *englische Braunfuss*.

*Fabric. S. E. p. 114. Altica 15.*

*Violacea, capite thoraceque rufis, pedibus nigris.*

22. *Testacea*, das *muschelbraune englische Springhähnchen*.

*Fabric. S. E. p. 114. Altica 16.*

*Testacea, gibba, elytris laevissimis.*

*Geoffr.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 250. *Altica* 17. L'Altise  
fauve sans stries.

Ovata, ferruginea, elytris punctis sparsis.

23. *Tabida*, das englische blaße Springhähnchen.

Fabric. S. E. p. 115. *Altica* 19.

Pallida, oculis nigris.

Mus. Dom. Banks.

24. *Atra*, das pechschwarze Springhähnchen.

Fabric. S. E. p. 115. *Altica* 21.

*Atra*, nitida, antennarum basi plantisque piceis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 247. *Altica* 8. L'Altise noire  
à jambes jaunes.

Nigra subrotunda, tibiis ferrugineis.

25. *Pusilla*, das ganz kleine Springhähnchen.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 923.

*Altica (pusilla)* ovata, nigra, antennis pedibusque  
pallidis.

26. *Luteola*, das gelbbräunliche Springhähnchen.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 924.

Ovata lutea, oculis pectore antennarumque apice  
nigris.

27. *Flaveola*, das bläsgelbe Springhähnchen.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 925.

Ovata, nigra, thorace capiteque rufo, elytris an-  
tennis pedibusque luteis.

28. *Latiiscula*, das breite Springhähnchen.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 926.

Nigro-fusca, tibiis tarsisque subluteis.

, 29. *s-guttata*, der *amerikanische Achttropf*.

*Fabric.* App. S. E. p. 821.

*Thorace ferrugineo; elytris atris; maculis quatuor flavis.*

30. *Thoracica*, der *amerikanische Blattkäfer mit schwarzpunktiertem Brustsilde*.

*Fabric.* App. S. E. p. 821.

*Oblonga, flava; thorace nigro punctato, elytris violaceis.*

31. *Biguttata*, der *amerikanische Zweytropf*.

*Fabric.* App. S. E. p. 821.

*Ferruginea; thorace elytrorumque maculis duabus albis.*

32. *Marginata*, der *amerikanische Blaßrand*.

*Fabric.* App. S. E. p. 822.

*Flavescens; elytris viridibus, margine pallido.*

### III. Mit cylindrischrundem Körper.

1. *Paracenthesis*, das *Cylinderhähnchen*.

*Linn.* Addend. p. 1066. No. I.

*Fabric.* S. E. p. III. *Cryptoceph.* 31.

*Müllers Supplementb.* S. 223.

2. *Laticlavia*, der *mitternächtlichamerikanische Blattkäfer mit breiten schwarzen Linien auf den Flügeldecken*.

*Forsteri nov. spec.* Inf. Cent. I. p. 27. No. 27. *Cylindrica nigra; capite thorace elytrisque rufis; sutura et margine elytrorum nigro; antennis ferratis.*

3. *Obscuræ-viridis*, der russische dunkelgrüne Blattkäfer.

*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 312. t. 20. f. 6.

*Corpo viridi; thorace atque elytris marginatis.*

4. *8-punctata*, der russische Achtpunkt.

*Lepechins* Tageb. 2. Th. S. 207. t. 11. f. 19.

*Cylindrica; thorace elytrisque slavis; thoracis 4-puncta; elytrorum 4 paria punctorum nigrorum.*

5. *6-punctata*, der russische Sechspunkt.

*Lepechins* Tageb. 2. Th. S. 207. t. 10. f. 14.

*Cylindrica; thorace nigro, rufo marginato, elytris itidem ovatis, punctis duobus, maculisque 4 nigris.*

6. *Longipes*, der dresdensche Langfuß.

*Fabric.* S. E. p. 105. *Cryptoceph.* 1.

*Niger, obscurus; elytris pallidis; maculis tribus nigris; pedibus anticis elongatis.*

7. *10-maculata*, der kapensische Zehnfleck.

*Fabric.* S. E. p. 106. *Cryptoceph.* 3.

*Niger; thorace elytrisque rubris; punctis quatuor nigris.*

8. *Obsita*, der amerikanische Schwarzrand.

*Fabric.* S. E. p. 106. *Cryptoceph.* 4.

*Testaceus; antennis elytrorumque margine nigris.*

9. *Lineata*, die brasiliatische Schwarzlinie.

*Fabric.* S. E. p. 106. *Cryptoceph.* 6.

*Rufescens; thorace maculis; elytris lineis duabus nigris.*

10. *Didyma*, der neu-holländische Zwilling-Blattkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 107. *Cryptoceph.* 9.

Rufus, elytris maculis tribus nigris anteriore postice *didyma*.

11. *Ruficollis*, der Rothals von der Insel Helena.

*Fabric.* S. E. p. 109. *Cryptoceph.* 17.

Niger; thorace rufo; elytris testaceis.

12. *Calcarata*, der afrikanische Spornträger.

*Fabric.* S. E. p. 109. *Cryptoceph.* 19.

Violaceus; capite thorace femoribusque dentatis rufis.

13. *Glabrata*, der brasiliatische Blattkäfer mit glattem Brustschild.

*Fabric.* S. E. p. 110. *Cryptoceph.* 23.

Violaceus; thorace elytrisque viridi-aeneis; anten-nis fuscis.

14. *Vittata*, der bandirte Blattkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 110. *Cryptoceph.* 24.

Niger; elytris margine striaque abbreviata flavis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 233. *Cryptoc.* 4. Le Gribouri à deux bandes jaunes.

Coeruleo-violaceus, punctis per strias digestis.

15. *15-guttata*, der brasiliatische Funfzehn-tropf.

*Fabric.* S. E. p. 110. *Cryptoceph.* 26.

Rufus; thorace maculis tribus; elytris sex flavis.

16. *Koenigii*, Königs tranquebarischer Blattkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 111. *Cryptoceph.* 29.

Rufus, elytris punctis duobus coerulecentibus.

17. *Longimana*, der russische Langarm.

Pallas Reisen 2. Th. Anh. No. 67.

Capite, pectore, abdomine, scutelloque nigra; pedibus testaceis; articulis nigris; tarfis fuscis, primis longissimis.

Müllers Suppl. B. S. 224.

18. *Atrapraxidis*, das Strauchmeldenhähnchen.

Pallas Reis. 2. Th. Anh. No. 68.

Corpore, capite, femoribusque nigris. Tibiis, tarsisque nigris; thorace coccineo.

Müllers Suppl. B. S. 224.

19. *Bimaculata*, der Müllersche Zweyfleck.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 511.

*Melolontha nigra*, villosa; elytris punctis duobus rubris.

20. *Bipustulata*, die schweizerische Zweyblätter.

Fabric. App. S. E. p. 821.

*Cryptocephalus ater*, elytris macula apicis rufa.

21. *Quadrivittata*, der Vierfleck.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 196. *Melolontha* 2. La Melolonte quadrille à corcelet rouge.

*Coleoptris rubris*; maculis 4 nigris; thorace rubro nigra macula.

22. *Musciformis*, der fliegenartige Blattkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 197. *Melol.* 5. La Melolonte mouche.

Viridi-coerulea; thorace rubro coerulea macula; tibiis ferrugineis.

24. *Vitis*, der Weinblattkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 233. Criptoc. 2. Le Gribouri de la vigne.*

Niger, *elytris rubris.*

*Fabric. S. E. p. 108. Cryptoceph. 15.*

Niger, glaber, *elytris rufis.*

24. *Rubro-striata*, der rothgestreifte Blatthäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 234. Crytoceph. 6. t. 4. f. 3. Le Gribouri rouge strié à points noirs.*

Niger, *elytris rubris striatis, maculis quatuor limboque nigris.*

25. *Nigro-coerulea*, der schwarzblaulichte Blattkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 235. Cryptoc. 8. Le Gribouri bleu strié.*

*Coeruleo-violaceus, punctis per strias digestis.*

*Müller Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 519.*

*C R Y P T O C. parvulus coeruleus, antennarum basi maculaque oris pallida.*

26. *Punctata*, der punktirte Blattkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 236. Cryptoc. 9. Le Gribouri bleu à points.*

*Coeruleus, punctis sparsis; tibiis anticis ferrugineis.*

27. *Nigro-striata*, der schwarzgestreifte Blattkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 236. Cryptoc. 10. Le Gribouri noir strié.*

Niger, *striatus; pedibus rufis.*

28. *Rufi-*

28. *Rufipes*, der *Rothfuss*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 236. Cryptoc. II. Le Gri-*  
*bouri noir à corcelet rouge.*

*Niger striatus; thorace pedibusque rufis.*

29. *Fulva*, der *braungelbe Blattkäfer*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 237. Cryptoc. 12. Le Gri-*  
*bouri fauve.*

*Capite; thoraceque fulvo; elytris pallidis.*

30. *Ferrugata*, der *brandfleckichte Blattkäfer*.

*P. Schrank Beytr. zur N. G. S. 64. §. 7.*

*Cylindrica, nigra, nitida; elytris apice macula*  
*lutea; antennis thorace duplo longioribus.*

*Poda Mus. graecens. p. 38. Sp. 9.*

IV. *Mit länglichem Körper und schmalem Brust-*  
*stück.*

1. *Riparia*; *Füesslins Verz.* S. 8. No. 132.

2. *Erratica*; *Füesslin* No. 133.\*)

3. *Chrys. Luperus*, der *Fadenblattkäfer*.

*Füesslins Verz.* S. 9. No. 173.

*Sulzers Gesch.* S. 35. t. 3. f. 15. e. der *Fadenkäfer*.

*Schaeff. Elem.* t. 80.

4. *Luperus niger*, der *schwarze Fadenkäfer mit ro-*  
*tem Brustschild*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 231. No. 1. t. 4. f. 2. Le Lu-*  
*pere noir à corcelet et pattes rouges.*

5. *Lupe-*

\*) Diese beyden *Skopoli'schen Coccinellen* hat *Füesslin* unter die  
*Chrysomelen* gesetzt. S. unter den *neuen Coccinellen* No. 40. 41.

5. *Luperus rufipes*, der rothfüssiche Fadenkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I.* p. 231. No. 2. *Le Lupre noir à pattes rouges.*

6. *Luperus aeruginosus*, der rostfarbige Fadenkäfer.

*Milleri Zool. Dan. Prodr.* p. 84. No. 913.

*Pallidus, capite pectoreque nigris, elytris viridis, politis.*

7. *Lusitanica*, das Ziegelhähnchen.

*Linn. Add.* p. 1066. No. 2.

*Müllers Suppl. B.* S. 223.

8. *Crataegi*, der Hagedornblattkäfer.

*Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I.* p. 28. No. 28.

*Oblonga, rubra, elytris linea longitudinali punctisque nigris.*

9. *Trifurcata*, die Dreygabel.

*Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I.* p. 29. No. 29.

*Oblonga, nigra; thorace elytrisque pallidis; elytris margine et futura, furca tridente, punctisque octo nigris notatis.*

10. *Longipes*, der russische Langfuß.

*Lepechins Tageb. I. Th. S. 312. t. 16. f. 10.*

*Corpore viridi; elytris flavis; pedibus anticis longioribus.*

II. *Cichorii*, der Zichorienblattkäfer.

*Hasselquists Reise nach Paläst. S. 449. No. 101.*

*Os porrectum; Rostrum (pars capitinis infra oculos) longiusculum, oblongum, parum depresso; mandibulae articulato-clavatae, vtrinque duae.*

*Insectum*

Insectum medium inter *Dermesten*, *Curculionem* et *Cantharidem*.

12. *Cincta*, der *tranquebarische Gürtelblattkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 119. *Crioceris* 3.

Pallida; *elytrorum* margine omni atro.

13. *Sanguinea*, der *hallische blutrote Blattkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 119. *Crioceris* 5.

Ovata, rufa; *antennis oculisque nigris*.

14. *Sanguinea*, der *surinamische blutrote Blattkäfer*.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 355. No. 9. t. 16. f. 16.

*Chrysomela sanguine*.

Oblonga rubra; *thorace elytrisque teretibus, antennis nigris basi rufis*.

15. *Nigricornis*, das *Schwarzhorn*.

*Fabric.* S. E. p. 119. *Crioceris* 7.

Ferruginea; *elytris violaceis, antennis nigris*.

16. *Melanocephala*, der *neuholländische Schwarzkopf*.

*Fabric.* S. E. p. 119. *Crioceris* 8.

Rufa, capite nigro; *elytris violaceis*.

17. *Cantharoïdes*, der *englische cantharisförmige Blattkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 120. *Crioceris* 9.

Violacea, capite thorace, pedibusque rufis.

18. *Bifasciata*, der *neuholländische zweygestreifte Blattkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 120. Crioceris* 12.

*Thorace cylindrico; rufa, elytris fastiis duabus atris.*

19. *Vnifasciata*, der *neuholländische eingestreifte Blattkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 120. Crioceris* 13.

*Thorace cylindrico; rufa, elytris fascia atra.*

20. *Nigripes*, der *neuholländische Schwarzfuss.*

*Fabric. S. E. p. 120. Crioceris* 14.

*Thorace cylindrico, flava, antennis pediore pedibusque nigris.*

21. *Oculatata*, der *neuholländische geäugelte Blattkäfer.*

*Fabric. S. E. p. 121. Crioceris* 15.

*Thorace cylindrico, flava, elytris basi nigris, puncto flavo.*

22. *Cyanocephala*, der *neuholländische Blaukopf.*

*Fabric. S. E. p. 121. Crioceris* 18.

*Cyanea, thorace rufo; antennis pedibusque fuscis.*

23. *Caroliniana*, der *gelbliche karolinische Blattkäfer.*

*Fabric. S. E. p. 122. Crioceris* 21.

*Oblonga, flava; thorace punctis duobus, coleoptrisque vittis quinque nigris.*

24. *Vittata*, der *schwarzbandirte karolinische Blattkäfer.*

*Fabric. S. E. p. 122. Crioceris* 23.

*Oblonga; thorace rufo, elytris flavis, vitta nigra.*

25. 12-pun-

25. *12-punctata*, der *Zwölfpunkt*.

*Fabric.* S. E. p. 103. *Chrysom.* 52.

Oblonga; *thorace flavescente; elytris viridibus;*  
*punctis sex nigris.*

26. *10-maculata*, der *amerikanische Zehnfleck*.

*Fabric.* S. E. p. 105. *Chrysom.* 60.

Oblonga, nigra, *coleoptris rubris, punctis decem*  
*nigris, duobus communibus.*

27. *10-punctata*, der *englische Zehnpunkt*.

*Fabric.* S. E. p. 105. *Chrysom.* 65.

Oblonga, *viridi-aenea; thoracis marginibus albis;*  
*elytris albis, maculis decem aeneis.*

28. *Aquatica*, der *Wasserblattkäfer*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 908.

*Galeruca nigra; thorace maculato; elytrorum mar-*  
*gine futuraque lata, pedibusque flavis.*

29. *Veris*, der *Frühlingsblattkäfer*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 910.

*Galeruca nigra; thorace cupreo; elytris viridibus,*  
*pedibus rufis.*

30. *Striata*, der *gestreifte Blattkäfer*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 940.

*Crioceris atra; capite supra; elytris abdomineque*  
*apice albis.*

*Schaeff.* Icon. t. 89. f. 6.

*Groffr.* Inf. Tom. I. p. 307. *Anthribus* 3. t. 5. f. 2.  
*L'Antribe noir strié.*

*Ater, elytris apice cinerascentibus.*

31. *Binaculata*, der amerikanische Zweyfleck.

*Fabric.* S. E. App. p. 820.

*Oblonga*, atra, *elytris testaceis*, *macula atra*.

32. *Fasciata*, der amerikanische Blattkäfer mit drey gelben Streifen.

*Fabric.* S. E. App. p. 820.

*Oblonga*, atra; *elytris fasciis tribus flavis*.

33. *Ruficollis*, der englische Rothhals.

*Fabric.* S. E. App. p. 820.

*Oblonga*, *viridi-aenea*; *thorace pedibusque rufis*.

34. *Sanguineo-rubra*, der blutröthliche Blattkäfer.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 253. *Galeruca 2.* La Galeruque sanguine.

35. *Nigro-violacea*, der schwarzblaulichte Blattkäfer.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 254. *Galeruca 6.* La Galeruque violette.

#### V. Langgedehnte Blattkäfer.\*)

I. *Striata*, der Schwarzstrich.

*Sulzers Gesch.* S. 35. t. 3. f. 16.

*Tota rubescens*, *abdomine nigro*; *fronte duabus*; *thorace tribus*, *elytrisque quatuor fasciis seu striis nigris*.

200. GE-

\*) Die *Chrysom.* elongatas Linn. hat *Fabricius* unter ein eigenes Geschlecht *Lagria* gebracht S. E. p. 124. wo auch noch einige ausländische angeführt sind, denen er aber besondere Kennzeichen beygeleget hat.

200. GESCHLECHT. Hispa. Dorn- Stachel-  
Igelkäfer.

Müllers Linn. Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 203. Dorn-  
käfer.

Füesslins Verz. S. 9. Stachelkäfer.

Börners Samml. 1. Th. S. 468. \*)

Sulzers Gesch. S. 35. Igelkäfer.

Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 367. Dorn-  
käfer.

Onomatol. hist. nat. P. 4. p. 250.

de Geer Ins. Tom. 5. p. 48. \*\*)

Fabric. S. E. p. 70.

1. *Atra*, der schwarze Stachelkäfer. †)

Müller l. c. S. 203. No. 1. der Schwärzling.

Füesslins Verz. S. 9. No. 174. Schwarzer.

Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 367. Schwärz-  
ling.

Onomat. hist. nat. P. 4. p. 250.

Fabric. S. E. p. 71. No. 7. Thorace elytrisque spinosis; corpore atro.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 243. *Crioceris* 7. La Chateigne noire. ††)

Tota atra, spinis horrida.

X 4

2. *Testa-*

\*) Ein sehr rares Geschlecht, das nur in den südlichen Theilen von Europa wohnen soll.

\*\*) Vielleicht hätte der Ritter nicht Ursache gehabt, ein besonderes Geschlecht daraus zu machen, da Geoffr. eine Art davon unter seinem *Crioceris* Ins. Tom. I. p. 243. No. 7. und de Geer l. c. unter *Tenebrio* aufgestellt hat.

†) Nicht abgebildet.

††) Wie das Gehäuse einer Kästchens.

Sulzers Gesch. S. 35.

2. *Testacea*, der muschelbraune Stachelkäfer.\*)

*Müller* l. c. S. 204. No. 2. der *Röthling*.

*Onomat. hist. nat.* P. 4. p. 251.

*Fabric.* S. E. p. 71. No. 8.

3. *Bihamata*, der *Doppelhaaken*.\*)

*Müller* l. c. S. 204. No. 3.

*Onomat. hist. nat.* P. 4. p. 251.

4. *Muticus*, das *Fadenhorn*.

*Müller* l. c. S. 205. No. 4.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 602. *Dermestes clavironnis*, der *haarichte Hautfresser*.

— — — P. 4. p. 252.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 47. t. 3. f. 1. *Tenebrion à antennes velues*.

*Tenebrio (hirticornis) alatus niger*, capite depresso; *antennis pilosis*; thorace bicarinato; elytris punctato-striatis.

*Fabric.* S. E. p. 71. No. 6.

*Inermis*, nigra, *antennis pilosis*, elytris striatis.

### Unabgebildete.

1. No. 1. *Atra*.

2. No. 2. *Testacea*.

3. No. 3. *Bihamata*.

### Neue Arten dieses Geschlechts:

1. *Mycticina*, der *neuholländische größte Stachelkäfer*.

*Fabric.* S. E. pag. 70. No. 1. *Antennis peccinatis*; elytris testaceis albo-punctatis.

2. *Fla-*

\*). Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

2. *Flabellicornis*, das *Fliegenwedel-Fächelhorn*.

*Fabric.* S. E. pag. 70. No. 2. *Antennis pectinatis; elytris laevibus.*

3. *Coerulea*, der *deutsche himmelblaue Stachelkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 70. No. 5. *Antennis subserratis, coerulea, hirta.*

4. *Sanguinicollis*, der *amerikanische Bluthals*.

*Linn.* Mantiss. p. 530.

*Fabric.* S. E. p. 71. No. 9. *Nigra, thorace elytrorumque basi rufis, elytris ferratis.*

*Müllers Suppl. B. S. 228.* der *Bluthals*.

201. GESCHLECHT. *Bruchus. Saamenkäfer; Muffelkäfer.*

*Müllers Linn.* Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 206. *Saamenkäfer.*

*Füsslins Verz.* S. 9. *Muffelkäfer.*

*Sulzers Gesch.* S. 36. *Müffelkäfer; la Brucke.*

*Börners Samml.* 1. Th. S. 469. *Braachkäfer.*

*Catholicon B.* p. 399. der *Erbsen- und Saamenzerstöhrer.*

*Schaeff. Elem.* t. 86. f. 8. *Fühlspitzenkäfer.*

*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 266. *Mylabris.*

*de Geer Inf.* Tom. IV. prael. XI. No. 65. Tom. V. p. 277. des *Bruches.*

*Fabric. S. E. p. 64. Bruchus.\*)*

\*) Eey dem *Fabric.* p. 261. ist *Mylabris* des *Linn.* *Meloe.*

In der *Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 302. wird durch *Bruchus* eine gewisse Art von *Cimicibus* verstanden.

1. *Pisi*, der *Erbsenfresser*.*Müller* l. c. S. 206. No. 1. t. 3. f. 6.*Fliesslins* Verz. S. 9. N. 175. *Erbsenfresser*.*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 607. der *amerikanische Erbsenfresser*; *Dermestes Pisorum*.*Scop.* Entom. carn. No. 63. *LARIA Salicis*. *Caput* deflexum; *thorax* elytris concolor; albo puncto in medio marginis postici; *elytra* striata, fusco-grisea; *abdomine* breviora, punctis posticis albis contiguis ad instar fasciae transversae.*Fabric.* S. E. p. 64. No. 2.*Ledermüller* Microscop. pag. 195. t. 99. f. 2. t. 100. *Erbsenkäfer*; *Kreuzkäfer*.*Bomar.* Dict. P. VII. p. 299.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 267. *Mylabris* 1. t. 4. f. 9. *Le Mylabre à croix blanche*.*Fusca*; *cinereo-nebulosa*, *abdominis apice cruce albâ*.*Baekner* Noxa Inf. p. 15.*Linn.* Amoen. acad. Tom. 3. p. 347. *Curculio Pisorum*.*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 278. No. 1. t. 16. f. 3. 4. *Bruche des Pois*.*Nigro-fuscus*, *maculis villosis sparsis albescientibus*; *abdominis apice albo maculis binis nigris*.2. *Theobromae*, der *ostindianische Cacaofresser*.\*)*Müller* l. c. S. 208. No. 2.*Fabric.* S. E. p. 65. No. 5.3. *Gleditsiae*, das *amerikanische Muffelkäferchen auf den Gleditsienkräutern*.\*\*)*Müller*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Müller l. c. S. 208. No. 3.

Linn. Amoen. acad. Tom. 6. p. 392. No. 5. *Der-  
mestes Gleditsiae.*

4. *Bactris*, das amerikanische Muffelkäferchen auf  
der Palmfrucht.\*)

Müller l. c. S. 208. No. 4. der *Kernbeißer*.

Linn. Amoen. acad. Tom. 6. p. 392. No. 6. *Der-  
mestes Bactris.*

5. *Granarius*, der *Kornfresser*.\*\*)

Müller l. c. S. 209. No. 5.

Füesslins Verz. S. 10. No. 177. *Kornfresser*.

Fabric. S. E. p. 65. No. 6. *Elytris nigris, atomis  
albis, femoribus posticis vnidentatis.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 628. *Curculio ato-  
marius.*

6. *Seminarius*, der *Saamennager*.†)

Müller l. c. S. 209. No. 6.

Fabric. S. E. p. 65. No. 8. *Ater, antennarum basi  
pedibusque anticis testaceis; femoribus muticis.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 268. *Mylabris* 3. Le *My-  
labre satine*.

Nigra, abdomine albo sericeo.

7. *Pectinicornis*, das *Kammhorn*.

Müller l. c. S. 209. No. 7.

Schaeff. Elem. t. 86. f. 1.

Fabric. S. E. p. 66. No. 11. *Antennis pectinatis;  
corpo ferrugineo longioribus.*

de Geer

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

† ) Nicht abgebildet.

de Geer Ins. Tom. V. p. 281. No. 2. *Bruche rouffe.\**)  
*(Rufus) rufo-fuscus; elytris pedibusque rufis; cor-*  
*pore griseo-maculato; antennis ferratis.*

*Unabgebildete.*

1. No. 2. *Theobromae.*
2. No. 3. *Gleditsiae.*
3. No. 4. *Batiris.*
4. No. 5. *Granarius.*
5. No. 6. *Seminarius.*

*Neue Arten dieses Geschlechts.*

1. *Fuscus*, der ganz braune Muffelkäfer.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 268. *Mylabris* 2. Le *Mylabre brun.* Tota *fusca.*

2. *Gleichenii*, des Herrn von *Gleichen* Muffelkäferchen im Mays oder türkischen Korn.

Neuestes im Reich der Pflanzen. Anh. S. 1. t. 1.

*Elytra rufo-fusca; reticulata; pedes rufi, pilosi;*  
*antennae decem articulatae; magnitudo pediculi.*

Müllers Linn. Naturs. 5. Th. 1.B. S. 207.

3. *Bipunctatus*, der schweizerische Zweypunkt.

Füesslins Verz. S. 9. No. 176.

Sulzers Gesch. S. 36. t. 4. f. 2. a.

*Capite deflexo; cinereus, antennis fuscis; thorace*  
*griseo tuberculato; elytris striatis postice truncatis.*

4. *Spi-*

\*) Recht gewiss ist der Herr von Geer nicht, ob dieses der nämliche Linneische sey, weil bey seinem Exemplar die Fühlhörner nur so lang als der Kopf und der Brautchild sind.

4. *Spinosus*, der *jamaische gedörnte Muffelkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 64. No. 1. Antennis filiformibus; thorace elytrisque spinosis.*

5. *Scabrosus*, der *englische Muffelkäfer mit höckrigen Streifen auf den Flügeldecken*.

*Fabric. S. E. p. 64. No. 3. Niger, elytris rufis elevato-striatis scabris, punctis nigris sparsis.*

6. *Cacao*, der *gefleckte Kakao-Muffelkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 64. No. 4. Corpore fusco, griseo, maculato.*

7. *Cisti*, der *Heidenyop-Muffelkäfer*.

*Fabric. S. E. pag. 65. No. 7. Ater, immaculatus, femoribus muticis.*

8. *Maculatus*, der *amerikanische schwarzgefleckte Muffelkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 65. No. 9. Elytris punctatis, testaceis, nigro-maculatis, podice griseo punctis binis nigris.*

9. *Serraticornis*, der *orientalische Muffelkäfer mit sägeförmigen Fühlhörnern*.

*Fabric. S. E. p. 65. No. 10. Antennis valde serratis, corpore longioribus, corpore griseo, fusco, maculato.*

202. GESCHLECHT. *Curculio*; \*) *Rüsselkäfer*; *Kornwurm*; *Getraigewurm*. *Scarabaeus proboscidarius*; *Scarabé à trompe*; *Rhinomacer*; *Charanson*; *Calandre*; *Becmare*. *Holl.* *Olyphant* - *Torretjes*, *Elephantenkäfer*; *Varkens-* *Torretjes*, *Schnauzen-Schweinkäfer*.

*Müllers Linn. Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 210. Rüsselkäfer.*

*Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 10. Rüsselkäfer.*

*Sulzers Kennz. S. 57. Rüsselkäfer; Kornwurm.*

— — *Gesch. S. 36. Rüsselkäfer; le Charanson.*

*Börners Samml. 1. Th. S. 469. Rüsselkäfer.*

*Beckmanns Anfangsgr. S. 92. Rüsselkäfer.*

*Eberhards Thiergesch. S. 201. Rüsselkäfer.*

*Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 1509. Rüsselkäfer.*

*Pontoppid. Nat. Gesch. von D. S. 204. Rüsselkäfer.*

*Lessers Theol. der Inf. S. 253. Schweinsrüssel. S. 70.*

*Kornwürmer, Curculiones. S. 403. 442.*

*Berlin. Samml. 4. B. S. 341. ff.*

*Schrötters Abhandlungen über verschiedene Gegenst. der Naturgesch. 1. Th. S. 228.*

*Lehmann im 2. B. der physikal. Belust. 17. St. No. 4. S. 522.*

*Swammerd. B. der N.S. 294. 295. von einigen Thieren, die zwischen der ersten und zweyten Haut der Weidenblätter leben, und zu Käfern werden. t. 44. f. 8 - 13.*

*Wochenblatt für Kinder. VI. Th. S. 15.*

*Bresl. Samml. 1722. Novemb. Cl. 4. Art. 7. §. 5. Wipfelbeißer.*

*Catho-*

\*) Einige Schriftsteller, als *Skopoli*, *Fabricius* und *Müller* (Otto Fridr.) haben verschiedene Linneische *Curcul.* zu den *Attelabis*, *Aftermüsselkäfern* gerechnet.

*Catholicon* C. p. 801. *Rüsselkäfer*; *Kornkäfer*. p. 26.

*Charançon*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 509. *Curculio*; *Rüsselkäfer*.

*Aldrovand.* Lib. 7. c. 14. f. 134. *Microronchoteri*;  
*Scarabaei proboscidarii*.

*Ionst.* hist. nat. Inf. p. 169. Art. 4. de *Curculione*.

*Stroen.* Act. Nidr. III. p. 351.

*Histoire des Charançons avec les moyens de les détruire.* Avignon 1768.

*Rozier* Samml. brauchbarer Abhandl. 2. Th. S. 54.

*Commentar.* Lips. Dec. I. Vol. V. p. 606. I. p. 430.

X. pag. 4.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 174.

*Scop.* Entom. carn. p. 23.

*Fabric.* S. E. p. 127.

*Müller* Faun. Fridr. p. 9.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 85. *Curculio*. p. 90.

*Rhinomacer*.

*Forsteri* nov. spec. Inf. Cent. I. p. 31.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 269. *Rhinomacer*; *Becmare*.  
p. 274-301. *Curculio*; *Charançons*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. prélim. XI. No. 64. Tom. V.  
p. 199. des *Charançons*.

### I. LANGRÜSSEL mit dünnen Schenkeln.

1. *Palmarum*, der *Palmenrüsselkäfer*; *Palmbaumwurm*.

*Müller* l. c. S. 211. No. 1. *Palmbohrer*.

*Sulzers* Gesch. S. 37. der *grosse Palmbohrer*.

*Allgemeines Magaz.* der Nat. etc. 8. Th. S. 217.  
*Saguicampus*; *Saguholzwürmer*; *Cossi Saguarii*, S. 229.  
f. E. F. G. H.

*Bankrofts* N. G. von Guinea S. 148. der *Palmbaumwurm*.

*Fermius* Beschr. dēr Kolon. Surinam. I. Th. S. 150. *Würmer des Palmkohls; Kabisch-Worm.*

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 517. der *Rüsselkäfer auf den Palmen.*\*)

*Bomar.* Dict. XII. p. 100. *Ver du Palmiste.*

*Plin.* hist. nat. lib. 17. c. 24.

*Fabric.* S. E. p. 128. No. 2.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 89. No. 40.

*Maximus*, niger, *rostro longo; elytris striatis; capitula antennarum magna, compressa, truncata.*

de Geer Ins. Tom. V. pag. 269. No. 4. t. 15. f. 26.

*Charanson du Palmier.*

*Curc. longirostris; antennis fractis clava truncata; femoribus imuticis, corpore nigro depresso; thorace ovato planiusculo; elytris abbreviatis striatis.*

2. *Indus*, der *indianische Rüsselkäfer mit zwey Lappen am Rüssel.*

*Müller* l. c. S. 213. t. 4. f. 11. der *Elephantenrüssel.*

*Houltin* hist. nat. de *gepluinde Tor.*

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 515. der *indianische Rüsselkäfer.*

*Fabric.* S. E. p. 128. No. 4.

de Geer Ins. Tom. V. pag. 265. No. 1. t. 15. f. 22.

*Charanson des Indes.*

*Curc. longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore nigro depresso; thoracis lateribus tuberculoso villoso; elytris rugoso-sulcatis.*

3. *Hemi-*

\*) Hierzu gehört noch des *Gronov.* No. 577. in der *Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 516. der *einen furchicht erhöbeten Schnabel besitzende Rüsselkäfer auf den zeylonischen Palmen.*

3. *Hemipterus*, der *indianische Halbflügel*.*Müller* l. c. S. 215. No. 3.*Sulzers Gesch.* S. 39. t. 4. f. 5. der *Kurzflügliche*.*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 515. der *mit halb harten Flügeldecken versehene Rüsselkäfer*.*Fabric.* S. E. p. 128. No. 5.*de Geer* Inf. Tom. V. p. 271. No. 5. t. 15. f. 25. *Charanson roux rayé*.

*Curculio (rufo-fasciatus) longirostris, antennis fractis; femoribus muticis; corpore oblongo rufo; thorace magno; fasciis longitudinalibus nigris.*

4. *Alliariae*, der *Knoblauchrüsselkäfer*.*Müller* l. c. S. 215. No. 4. der *Stengelbohrer*.*Füesslins Verz.* S. 10. No. 178. *Rüsselkäfer des Knoblauchkrauts*.*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 512. der *Rüsselkäfer des Knoblauchkrauts*.*Fabric.* S. E. p. 132. No. 27.*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 89. No. 995.*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 251. No. 39. *Charanson bleu velu*.

*Curc. (coeruleus) longirostris, antennis rectis; corpore obtuso villoso, coeruleo-violaceo nitido.*

*Frisch* Inf. P. IX. p. 35. t. 18. der *blaue Rüsselkäfer aus der kleinen Art Feldrüben*.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 271. *Rhinomacer 5. Le Bemare bleu à poil.*\*)*Subvillosum coeruleum.*5. *Cya-*

\*) Dieses vom Herrn von Geer bey C. Alliar. angeführte Geoffroische Citatum hat *Fabricius* S. E. pag. 141. zu *Violaceus* L. No. 63, gesetzt.

5. *Cyaneus*, der *Weidenbohrer*.\*)*Müller* l. c. S. 215. No. 5.*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 760. No. 97. der *lang-schnäbliche schwarze Rüsselkäfer mit blauen Flügeldecken, und dem weißen Schildchen*.*Onomat.* hist. nat. P. 3. pag. 514. der *blaue Rüsselkäfer*.*Fabric.* S. E. p. 132. No. 128.*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 987. *Niger, elytris striatis, coeruleis.**de Geer* Ins. Tom. V. pag. 252. No. 41. *Charanson noir violet.**Longirostris, antennis rectis, corpore oblongo nigro; elytris nigro-coeruleis nitidis.*6. *Craccae*, der *Wickenrüsselkäfer*.*Müller* l. c. S. 215. No. 6.*Fabric.* S. E. p. 132. No. 29. *CVRCVLIO globosus, longirostris, gibbus, supra ater, subtus cinereus.**de Geer* Ins. Tom. V. p. 253. No. 43. t. 6. f. 31. 32.*Charanson de la Vesse.**Curc. (Viciae) longirostris; antennis rectis; corpore oblongo villoso cinereo-nigro; elytris sulcatis.*7. *Campanulae*, der *Rüsselkäfer auf den Glockenblumen*.\*\*) )*Müller* l. c. S. 216. der *Glockenblumensauger*.*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1013. *Rhinomacer Campan. niger ovatus; elytris subfulcatis.**de Geer* Ins. Tom. V. p. 236. No. 23. *Charanson de la Campanule.*

Longi-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Longirostris; antennis fractis fuscis; femoribus muticis; corpore subgloboso cinereo nigro; elytris lineis griseis.

8. *Badensis*, der schwarze Rüsselkäfer des Badener Gebiets mit rostfarbig schwarzen Füßen.\*)

Müller l. c. S. 216. No. 8.

9. *Aequatus*, der Schrebersche Schwarzzüsel.\*\*)

Müller l. c. S. 216. No. 9. der Schwarzzüsel.

10. *Aterrimus*, der allerschwärzeste Rüsselkäfer.†)

Müller l. c. S. 217. No. 10. der Köhler.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 513. der allerschwärzeste Rüsselkäfer.

Müller Faun. Fridr. p. 10. No. 90.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 991.

Fabric. S. E. p. 141. No. 74.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 299. Cerc. 48. Le Charançon noir à corcelet armé.

Niger, thorace vtrinque dentato.

II. *Cerasi*, der Kirschzüselkäfer.

Müller l. c. S. 217. No. 11. Kirschkäfer.

Füesslins Verz. S. 10. No. 179. Kirschzüselkäfer.

Gleditsch Forstwiß. 2. Th. S. 791. No. 25. der schwarze lang schnäbliche Rüsselkäfer mit länglichen dunklen Flügeldecken.

Frisch Inf. XI. Th. p. 31. t. 23. f. 1. 3 Pl. der Rüsselkäfer in den sauren Kirschen.

Y. 2

Onomat.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 514. der *Rüsselkäfer der Kirschen*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. II. No. 91.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 992.

*Fabric.* S. E. p. 141. No. 75.

12. *Pruni*, der *Pflaumenrüsselkäfer.* \*)

*Müller* l. c. S. 217. No. 12. das *Zwetschenmännchen*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 977.

*Ater, thorace maculato; tibiis ferrugineis.*

13. *Acridulus*, der *Rüsselkäfer auf den kreuzförmigen Pflanzen.* \*\*)

*Müller* l. c. S. 217. No. 13. der *Laugenfresser*.

*Füeßlins* Verz. S. 10. No. 180.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 512. der *scharfe Rüsselkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 133. No. 32.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. II. No. 92.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 993.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 291. No. 32. *Le Charanson pyriforme*.

*Pyriformis, nigro-coerulescens, abdomine ovato.*

*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 235. No. 22. *Charanson acridula*.

*Longirostris arcuatus; antennis fractis fuscis, femoribus muticis, corpore ovato nigro-fusco, tibiis pallidis.*

14. *Purpureus*, der *purpurfarbige Rüsselkäfer*.

*Müller* l. c. S. 218. No. 14. der *Langschnabel*.

*Füeßlins* Verz. S. 10. No. 181. der *Purpurfarbige*.

*Poda*

\*) *Nicht abgebildet.*

\*\*) *Nicht abgebildet.*

*Poda* Mus. graecens. p. 29.

*List. loqu.* p. 394. *Scarabaeus ex toto coccineus.*

*Müller* Faun. Fridr. p. II. No. 93.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 986. \*)

de Geer Inf. Tom. 5. p. 250. No. 38. *Charanson cramoisi.*

Rostro longissimo; *antennis* rectis; *corpore* villoso subquadrato *purpureo-aurato* nitidissimo.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 270. *Rhinom. 4.* Le *Bec-mare doré à étuis rouges.* \*\*)

Niger; *elytris* rubris; capite, thoraceque *aureis*; proboscide longitudine fere corporis.

### 15. *Frumentarius*, der rothe Kornwurm.

*Müller* l. c. S. 218. No. 15. *holl.* Kalander.

*Füeßlins* Verz. S. 10. No. 182. *Getraudreuter.*

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 515. der *Frucht-Rüsselkäfer.*

*Catholicon C.* p. 226. †)

*Fabric.* S. E. p. 133. No. 34.

*Müller* Faun. Fridr. p. 10. No. 94.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1011.

Y 3

*Rhino-*

\*) Der Staatsrath Müller hat aus dem *Skopolischen Curc. purpureus* No. 86. den Linné hier bey seinem purp. angeführt hat, l. c. einen neuen gemacht, und mit einem Sternchen bezeichnet: *Purpureus rüber, oculis abdomineque nigris.* *Scop. Inf.* 86.

\*\*) Dieses Citatum hat *Fabric.* p. 130. No. 15. zu *Linn. Bacchus* No. 38. gesetzt.

†) Bey verschiedenen Schriftstellern ist *Calandre* und *Charanson* einerley; andere aber verstehen durch *Calandre* blos den Curc. *Linn. frument.* und *granar.* durch *Charanson* hingegen den Curc. *L. segetis.* Die beyden ersten Arten heissen *Glander*, Reiter und *Wippel*.

*Rhinomacer sanguineus*, elytris striato-punctatis:  
*Kornormi*; *Snude Bille*.

*Affa Nidr.* III. p. 391.

*Journ. des Savans* 1774. Mars p. 194. *Calandre*.  
de Geer Inf. Tom. V. p. 251. No. 40. *Charanson rouge.* \*)

*Sanguineus*, longirostris, antennis rectis, corpore oblongo sanguineo.

16. *Granarius*, der schwarze Kornwurm.

Müller I. c. S. 219. No. 16.

Füeslins Verz. S. 10. No. 183. der Kornreuter.

Berlin. Samml. 4. B. S. 342.

Schröters Abhandl. 1. B. S. 228. ff.

Rozier Samml. brauchbarer Abhandl. 2. B. S. 55. ff.  
t. 2. f. 2. *Calandre*; *Calande*; *Loffon*; *Loffan*; *Gon* und *Chatepeleuse*.

Pontopp. N. G. v. D. S. 204. No. 5. t. 16. *Kornkreke*; *Klanner*; *Klander*; *Calandre*; *Glander*; *Wippel*; *schwarze Kornwurm*; *Reiter*.

Altes hamburg. Magaz. 1. B. S. 301. der schwarze Wurm oder *Glander*. 4. B. S. 562. *Kornwurm*.

Selecta phys. oecon. 2. St. S. 97.

Schwenkfeld. Theriotr. Silef. p. 527. *Cis*; *Curculio*; *Gurgulio*; *Pediculus frumenti*; *Kornwurm*; *Kornkäfer*; *Kalander*; *Triticiarius*.

Loewenhoek Arcan. Nat. detecta. pag. 252. *Klander*, p. 480. f. 1. 2. Segreijn-leer. \*\*)

Joblot

\*) Der Herr von Geer hat das vom Linné zu diesem frumentar. gesetzte *Loewenböksche* Citatum bey dem folgenden granar. angeführt.

\*\*) Dies *Loewenböksche* Citatum hat Linné zu *Curcul. frument.* gesetzt.

*Goblot* obs. microscop. 1754. P. I. pag. 15. chap. 4. t. 7. f. 1. La Licorne; Scarabé à tête en forme de trompe.\*)

*Fabric.* S. E. p. 134. No. 39.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 515. der Haberrüßelkäfer.

*Catholicon C.* p. 226. der Korn- oder Haberrüßelkäfer.

*Müller* Faun. Fridr. p. 10. No. 95.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 88. No. 976. Dan. Korn-Krae; Glander.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 285. *Charanson* 18. Le Charanson brun du bled.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 239. No. 25.

Longirostris, antennis fractis, femoribus muticis; corpore oblongo fusco-castaneo; thorace longitudine elytrorum.

17. *Dorsalis*, der Rüsselkäfer auf dem Scharbockskraut mit der schwarzen Rückennath.\*\*)

*Müller* l. c. S. 219. No. 17. der Schwarzstriem.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. pag. 514. der Rückenrüßelkäfer.

*Abt. Vpsal.* 1736. p. 16. No. 6.

*Fabric.* S. E. p. 133. No. 35.

*Müller* Faun. Fridr. p. 10. No. 96.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 972.

Y 4 18. *Mela-*

\*) *Goblot* sagt daselbst noch: Le Charanson, qui fait tant de tort dans les greniers, où l'on conserve des grains, est une espece de ce genre.

Von beyden Arten siehe noch *Kolbens* Beschr. des Vorgebirges der guten Hoffn. Ausz. 4. S. 358.

\*\*) Nicht abgebildet.

18. *Melanocardius*, der Rüsselkäfer mit dem schwarzen Herzflecke.

Müller l. c. S. 219. No. 18. der Herzfleck.

Sulzers Gesch. S. 40. t. 4. f. II. *Cordiger*, der Herzfleck.

Fießlins Verz. S. II. No. 218. *Herzfleck*.

Fabric. S. E. p. 129. No. 7. *Longirostris*, *cinereus*; *coleoptris macula communi cordata fusca*.

19. *Pini*, der Fichtenrüsselkäfer. \*)

Müller l. c. S. 220. No. 19. der Fichtenkäfer.

Fießlins Verz. S. 10. No. 184. *Fichtenrüsselkäfer*.

Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 505. No. 12. der Rüsselkäfer des Nadelholzes; *Harzrüsselkäfer*.

Frisch Inf. XI. Th. S. 30. No. 29. 3. Pl. t. 23. f. 5. der Rüsselkäfer der dritten Größe an den schmalen Blättern oder Spitzen der Kienbäume.

Schaeff. Icon. t. 25. f. 7.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 518. der Rüsselkäfer des Fichtenbaums.

Fabric. S. E. p. 129. No. 10.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 990.

*Piceus*; *thorace maculis*; *elytris fasciis duabus fulvis*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 222. No. 15. *Charanson du Pin*.

*Longirostris*; *antennis fractis*; *femoribus muticis*; *corpore oblongo testaceo*; *maculis lineisque transversis flavis*; *elytris gibbosis*.

20. *La-*

\*) Diesen, und *Abietis* No. 57. hat Linné in der Begattung angetroffen; also ist entweder dieser oder jener das zweyte Geschlecht.

20. *Lapadi*, der Sauerampferrüßelkäfer.

Müller l. c. S. 220. No. 20. das Sauermanl.

Füesslins Verz. S. 10. No. 185. Sauerampferrüßelkäfer.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 515. der Rüsselkäfer des Saueramps.

Fabric. S. E. p. 138. No. 61.

Longirostris, femoribus bidentatis, albo nigroque varius; thorace elytrisque muricatis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 988. Niger, thorace vtrinque; elytris gibbosis vtrinque et postice albis.

de Geer Ins. Tom. V. p. 223. No. 16. t. 7. f. 1. 2.  
*Charanson noir à derriere blanc.*

*Curculio (albicaudis) longirostris; antennis fractis; femoribus muticis; corpore ovato nigro; fasciulis pilosis; elytris postice albis.*

21. *Cupreus*, der kupferfarbige Rüsselkäfer.\*)

Müller l. c. S. 220. No. 21. der Kupferkäfer.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 514. der kupferfarbene Rüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 131. No. 20.

22. *Scaber*, der Rüsselkäfer mit hökrichten Flügeldecken.\*\*)

Müller l. c. S. 221. No. 22. der Puderläuse.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 947. Fuscus, setosus, antennis pedibusque rufis.

Faun. Fridr. p. 12. No. 117.

Y 5

23. *T-* al-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

23. *T-album*, der *Rüsselkäfer mit dem weissen T.*<sup>\*)</sup>

Müller l. c. S. 221. No. 23. das *weisse T.*

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 515. der *schwarze und milchfarbne Rüsselkäfer.*

24. *Ruficollis*, der *Rothhals.*<sup>\*\*)</sup>

Müller l. c. S. 221. No. 24.

25. *Quercus*, der *Eichenrüsselkäfer.*<sup>\*\*\*)</sup>

Müller l. c. S. 222. No. 25.

Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 658. No. 49. der *kleine blässgelbe und lang schnäbliche Rüsselkäfer mit schwarzen Augen.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 519. der *Rüsselkäfer des Eichbaumes.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 981. Cinereus; *elytris pallide flavis; fascia obliqua alba; antennis pedibusque rufis.*

26. *Polygoni*, der *Rüsselkäfer auf dem Wegetritt.*<sup>†)</sup>

Müller l. c. S. 222. No. 26. der *Wegetrittkäfer.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 980. Griseus, *thorace terlineato; elytris striis abruptis, nigris.*

27. *Viscariae*, der *Mistelrüsselkäfer.*<sup>††)</sup>

Müller l. c. S. 222. No. 27. der *Mistelkäfer.*

28. *2-punctatus*, der *zweypunktirte Rüsselkäfer.*<sup>†††)</sup>

Müller l. c. S. 222. No. 28. der *Schwarzfleck.*

Onomat.

<sup>\*)</sup> Nicht abgebildet.

<sup>\*\*)</sup> Nicht abgebildet.

<sup>\*\*\*)</sup> Nicht abgebildet.

<sup>†)</sup> Nicht abgebildet.

<sup>††)</sup> Nicht abgebildet.

<sup>†††)</sup> Nicht abgebildet.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 513. der zweifachgedüppelte Rüsselkäfer.

29. 4-maculatus, der Rüsselkäfer mit vier weissen Flecken. \*)

Müller l. c. S. 223. No. 29. der Weissfleck.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 518. der vierfachgefleckte Rüsselkäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 999. Griseus, elytris nigris maculis quatuor albis; tibiis rufis.

Fabric. S. E. p. 133. No. 31.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 287. Cerc. 22. Le Charançon quadrille à longue trompe.

Cinereus; elytrorum punto quadruplici albo; proboscide thorace longiori.

30. 5-maculatus, der Fünffleck. \*\*)

Müller l. c. S. 223. No. 30. der Greis.

31. Pericarpius, der Rüsselkäfer in den Kernbehältern. †)

Müller l. c. S. 223. No. 31. der Kernwächter.

Füesslins Verz. S. 10. No. 186. der Kernwächter.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 517. der Rüsselkäfer des Feigwarzenkrauts. ††)

Fabric. S. E. p. 132. No. 26. Longirostris, subglobosus, nebulosus, elytrorum sutura basi alba.

Akt. Vpafal. 1736. p. 16. No. 7. Curculio minimus cinereus subrotundus obtusus.

Mülleri

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) In der Onomat. hist. nat. p. 519. der Rüsselkäfer des Wollkrauts Linn. Syst. N. ed. 10. pag. 380. No. 27. Subglobosus etc. mit diesem einerley.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 10. No. 98.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 994.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 298. *Curc. 46.* *Le Charan-*  
*son porte-coeur de la Scrofulaire.*

32. *Sprengleri*, *Sprenglers amerikanischer Rüssel-*  
*käfer.* \*)

*Müller* l. c. S. 223. No. 32. der *Sprenglerkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 151. No. 125. *Brevirostris*; *elytris*  
*flavis, lineis atris, glaberrimis, abbreviatis.*

33. *Vittatus*, *der amerikanische Streifrücke.* \*\*)

*Müller* l. c. S. 224. No. 33.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 124. *Brevirostris*, *ater,*  
*elytris striis albis rubrisque abbreviatis.*

34. *Paraplecticus*, *der Lähmer.*

*Müller* l. c. S. 224. No. 34. der *Lähmer*; *holl. bonte*  
*Olyphantjes.*

*Börners Samml.* I. Th. 136.

*Schrebers Samml.* XI. Th. S. 336. t. 4.

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 204. No. 14. t. 16.

— — *Atlas Dan.* I. t. I.

*Lepechins Tageb.* I. Th. S. 207.

*Berlin. Samml.* 8. B. S. 35.

*Fießlins Verz.* S. 10. No. 187. der *Lähmer*.

*Sulzers Gesch.* S. 39. t. 4. f. 7. der *Lähmende*.

*Onomat. hist. nat. P.* 3. p. 517. der *lähmende Rüssel-*  
*käfer.*

*Acta Vpsal.* 1736. p. 16. No. 1. *Curculio acuminatus*, *longus*, *fuscus*.

*Fabric.* S. E. p. 135. No. 44.

*Mülleri*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Müller* Faun. Fridr. p. 10. No. 100.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 971.

*Schaeff.* Inf. t. 44. f. 1.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 279. *Curc. 4.* Le *Charanson à future noire.* \*)

Oblongus, *elytris villoso-cinereis futura nigra.*

de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 224. No. 18. t. 7. f. 8.

*Charanson de la Philandrie.*

*Curculio (Phellandrii) longirostris, antennis fractis, femoribus muticis; corpore oblongo cylindrico griseo-viridi-flavescente; elytris acuminatis remotis.*

35. *Anguinus*, der *Schlängenkäfer.* \*\*)

*Müller* l. c. S. 224. No. 35.

*Füesslins* Verz. S. 10. No. 188. die *Schlange.*

36. *Ascanii*, der *Ascanius-Rüsselkäfer.* †)

*Müller* l. c. S. 225. No. 36. der *Ascaniuskäfer.*

*Martini* allgem. Gesch. der Natur 3. B. 1ste Abth.

S. 356.

*Fabric.* S. E. p. 135. No. 47.

37. *Algirus*, der *algierische punktierte Rüsselkäfer.* ††)

*Müller* l. c. p. 225. No. 37. der *Algierer.*

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 512. der *Rüsselkäfer von Algier.*

38. *Bacchus*, der *Bacchusrüsselkäfer.*

*Müller* l. c. S. 226. No. 38.

*Füesslins*

\*) Nach *Fabricio* ist dieser *Geoffroische* der *Paraplecticus*, nach *Müller* Zool. Dan. aber *Curc. Similis* p. 89. No. 998. S. unter den neuen der dritten Klasse No. 8.

\*\*) Nicht abgebildet. †) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

*Füesslins* Verz. S. 10. No. 189. der *Bacchus*.  
*Beckmanns phys. oek. Bibl. 6. B.* S. 249.  
*Sulzers Gesch.* S. 38. t. 4. f. 4. der *Bacchus*.  
*Schaeff. Icon.* t. 37. f. 13.  
*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 513. der *Weingott*.  
*du Bois Tableau annuel 1772.* p. 118 - 121. *Charan-*  
*son de la Vigne; le Rouleur*.  
*Schaeff. Icon.* t. 27. f. 3.  
*Stop. Ann. 5. hist. nat.* p. 90. No. 42.  
*Aurato-virens supra, subtus cupreo-auratum*.  
*Fabric. S. E.* p. 130. No. 15. \*)

39. *Betulae*, der Birkenrüsselkäfer.

*Müller I. c.* S. 226. No. 39. der *Birkenfelder*.  
*Füesslins* Verz. S. 10. No. 39. der *Birkenfreund*.  
*Sulzers Gesch.* S. 38. t. 4. f. 3. der *Birkenfreundt*.  
*Gleditsch Forstwiss. 1. Th.* S. 551. No. 12. der *grün*  
*und goldfarbige lang schnäbliche Rüsselkäfer der Bir-*  
*ken und Erlen*.  
*Frisch Inf. XII. Th.* S. 17. t. 8. 2. Platte. der *purpur-*  
*roth verguldete Rüsselkäfer*.  
*Schaeff. Icon.* t. 6. f. 4.  
*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 513. der *Rüsselkäfer des*  
*Birkenbaums*.  
*Fabric. S. E.* p. 130. No. 16.  
*Müller's Zool. Dan. Prodr.* p. 91. No. 1022.  
*R H I N O M.* *Alni*, *supra viridis*, *subtus aeneus*, *an-*  
*tannis tarisque nigris*.  
*Geoffr. Inf. Tom. I.* p. 270. *Rhinom. 2.* *Le Bec-*  
*mare vert*.  
*Totus viridi-fericeus*.

de Geer

\*) Bey diesem hat *Fabricius* des *Geoffr. Rhinom. 4.* p. 270. Tom. I.  
 angeführt, so der Herr von *Geer* bey *Linn. Purpur.* No. 15.  
 gesetzt hat.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 248. No. 5. t. 7. f. 25.  
*Charanson du Bouleau.*

Longirostris; antennis rectis nigris; corpore subquadrato viridi-aurato nitidissimo, pedibus purpureo-aeneis.

40. *Populi*, der *Pappelnüsselkäfer*.\*)

Müller l. c. S. 226. No. 40. der *Pappelnager*.

Gleditsch Forstwissl. I. Th. S. 571. No. 10. der grüne lang schnäbliche Rüsselkäfer mit einem meist stachlichen Bruststück.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 518. der *Rüsselkäfer des Pappelbaums*.

Fabric. S. E. p. 131. No. 17.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1012.

RHINOMACER *Populi*, supra viridis, subtus atrocoeruleescens.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 270. Rhinom. 3. Le Bec-mare doré.

Viridi-auratus, subtus nigro-violaceus.

de Geer Inf. Tom. V. p. 249. No. 37. *Charanson du Tremble*.

Longirostris; antennis rectis nigris; corpore subquadrato supra viridi-aurato, nitido, subtus violaceo, pedibus violaceis.

II. Springende Langrüsseln mit dicken Hinterschenkeln.

41. *Beccabungae*, der *springende Rüsselkäfer auf den Bachbungen*.

Müller loc. cit. S. 226. No. 41. der *Bachbungen-springer*.

42. *Alni*,

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

42. *Alni*, der *Erlenhüpfen*.\*)

Müller l. c. S. 227. No. 42.

Fließlins Verz. S. 10. No. 191. der *Schwarzpunkt*.Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 559. No. 21. der *lang-schnäbliche springende grünlich blaue Rüsselkäfer der Erle*.Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 520. der *Rüsselkäfer der Erle*.Geoffr. Inf. Tom. I. p. 286. *Curc. 20. Le Charanson sauteur à taches noires.*

Rufus, femoribus posticis crassioribus; elytris maculis quatuor nigris.

de Geer Inf. Tom. V. p. 262. No. 49. *Charanson sauteur de l'Aune.*Curculio (*saltator alni*) longirostris; corpore ova-to testaceo; elytris maculis binis fuscis; capite nigro.43. *Salicis*, der *Springkäfer auf den Sahlweiden*.\*\*) de GeerMüller l. c. S. 227. No. 43. der *Weidentünzer*.Fließlins Verz. S. 10. No. 192. *Weidenrüsselkäfer*.Gleditsch Forstw. 2. Th. S. 760. No. 96. der *schwarze lang-schnäbliche und springende Rüsselkäfer mit zwey schwarzen Binden*.Onomat. hist. nat. P. 3. p. 520. der *Rüsselkäfer der Weyde*.

Bom. Dict. I. p. 214.

Fabric. S. E. p. 144. No. 91.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Hierbey hat der Ritter des *Geoffroi Altica* I. Tom. I. p. 245. angeführt, welches die *Chrysomela L. oleracia* No. 51. ist, wenigstens hat keiner von den übrigen genauen Entomologen bey diesem *Curc. Salicis* des *Geoffr.* gedacht.

de Geer Inf. Tom. V. p. 264. No. 51. *Charanson sauteur du Saule.*

*Longirostris; corpore subgloboso atro; elytris fasciis duabus transversis albis maculaque fulva.*

44. *Fagi*, der *Springrüsselkäfer auf den Buchen.\**)

Müller l. c. S. 227. No. 44. der *Buchenweider.*

Füesslin Verz. S. 10. No. 193. *Buchrüsselkäfer.*

Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 601. No. 6. der *lang-schnäbliche schwarze und springende Rüsselkäfer mit braunen Oberfüssen.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 520. der *Rüsselkäfer der Buche.*

Fabrit. S. E. p. 145. No. 93.

Mülleri Faun. Fridr. p. 10. No. 101.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1009.

45. *Segetis*, der *Springrüsselkäfer auf der Kornsaat.\*\**)

Müller l. c. S. 227. No. 45. der *Saatspringer.*

Füesslin Verz. S. 10. No. 194. *Saatriüsselkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 520. der *Rüsselkäfer auf den Ackerfeldern.*

de Geer Inf. Tom. V. p. 264. No. 50. *Charanson sauteur des bleus.*

*Longirostris; corpore ovato nigro griseo-nebuloso; antennis plantisque pallide fuscis.*

### III. Längsrüssel mit gezähnelten Schenkeln.

46. *Pomorum*, der *Rüsselkäfer in den Äpfeln.*

Müller l. c. S. 228. No. 46. der *Apfelschäler.*

Füesslin

\* ) Nicht abgebildet.

Dieter Wurm, *Larva subciliata*, ist die Ursache, dass die meisten Blätter an den Büchenbäumen verdirren.

\*\*) Nicht abgebildet.

Füesslins Verz. S. 10. No. 195. der *Apfelbohrer*.

Frisch Inf. I. Th. S. 32. t. 8. von den kleinen Maden,  
und daraus kommenden Rüsselkäfern in der Baumblüte.

Glaser von schädlichen Raupen S. 45-48.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 792. No. 26. der lang-  
schnäbliche nebelgraue Rüsselkäfer mit gezackten  
Hüften.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 525. der aus der Apfel-  
blüte entspringende Käfer.

Fabric. S. E. p. 143. No. 84.

Mülleri Faun. Fridr. p. II. No. 103.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1002.

#### 47. *Ovalis*, das *Marmorey*.

Müller l. c. S. 228. No. 47.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 525. der eyerförmige Rüs-  
selkäfer.

Mülleri Faun. Fridr. p. II. No. 104.

Drury Inf. t. 33. f. 1. 2. *Jamaicensis*.

#### 48. *Carbonarius*, der *Köhler*.\*)

Müller l. c. S. 229. No. 48. der *Schwarze*.

Füesslins Verz. S. 10. No. 196. der *Kohler*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 521. der *Kohlenrüsselkäfer*.

Mülleri Faun. Fridr. p. II. No. 105.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1004.

*Corpore nigro, oblongo; elytris striatis*.

#### 49. *Mucoreus*, der *indianische Gelbschimmel*.\*\*)

Müller l. c. S. 229. No. 49. der *Gelbschimmel*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 524. der *schimmlichte Rüs-  
selkäfer*.

Fabric. S. E. p. 136. No. 52.

50. *Pusio*,

\*.) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

50. *Pusio*, der *indianische Zwergrüssel*.\*)

*Müller* l. c. S. 229. No. 50. der *Zwergrüssel*.

*Fabric.* S. E. p. 136. No. 53.

51. *Vaginalis*, der *amerikanische Scheidenkäfer*.

*Müller* l. c. S. 229. No. 51. der *Scheidenkäfer*.

*Lepechins* Tageb. 1. Th. S. 302. der *Rüsselkäfer mit der Scheide*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 526. der *indianische mit einem Grübchen versehene Rüsselkäfer*.\*\*)

*Gronov.* Gazoph. No. 581. t. 14. f. 6.

*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 266. No. 2. *Charanson à etui*. t. 15. f. 23.

Longirostris; antennis fractis, femoribus dentatis; corpore nigro; elytris sulcatis; tuberculis sparsis juxta apicem mucronatis.

52. *Stigma*, der *indianische Brandfleck*.†)

*Müller* l. c. S. 230. No. 51.

*Fabric.* S. E. p. 137. No. 56.

53. *Depressus*, der *amerikanische Plattrücken*.

*Müller* l. c. S. 230. No. 53. der *Plattrücken*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. pag. 521. der *unter sich gedrückte Rüsselkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 143. No. 83.

*Seba* Mus. IV. t. 95. f. 4.

54. *Annulatus*, der *indianische Ringelträger*.††)

*Müller* l. c. S. 230. No. 54. der *Ringelträger*.

Z 2 *Onomat.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Der *amerikanische Rüsselkäfer* in der *Onomat.* hist. nat. P. 3. pag. 522. wobei *Gronov.* No. 581. angeführt ist, mit diesem einerley.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

*Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 521.* der *ringförmige Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 137. No. 57.*

*Longirostris; pallidus; femoribus dentatis; thorace elytrisque striis nigris.*

55. *Dispar*, der *indianische Bastard*.

*Müller l. c. S. 230. No. 55.* der *Bastard*.

*Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 521.* der *durchsichtige Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 143. No. 87.*

*Longirostris, femoribus dentatis; elongatus, niger; elytris maculis quatuor rufescensibus.*

*Drury Inf. Tom. I. t. 42. f. 3. 7. Curculio minutus.* \*)

56. *Anchorago*, die *indianische Langbrust*.

*Müller l. c. S. 231. No. 56.* die *Langbrust*.

*Sulzers Gesch. S. 39. t. 4. f. 6.* der *Langbrustkäfer*.

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 523.* der *Rüsselkäfer mit einem sehr langen und dünnen Schnabel und Brustschild*.

*Fabric. S. E. p. 143. No. 86.*

*de Geer Inf. Tom. V. pag. 273. No. 8. t. 15. f. 28.*  
*Charanson à long col.* \*\*)

*Curculio (longicollis) longirostris; antennis rectis; femoribus dentatis; corpore longissimo nigro; thorace elongato cylindrico; elytris flavo-striatis.*

57. *Abie-*

\*) Nach dem *Fabricius*; nach dem *Geer* aber Tom. V. pag. 274.  
No. 8. ist dieser *Drury'sche* des Linn. *Curc. Anchorago* No. 56.

\*\*) Hierbey hat er die vom *Fabric.* bey dem vorigen *Dispar* ci-  
tirten *Drury'schen* Rüsselkäfer Tom. I. t. 42. f. 3. 7. angeführt.  
S. die vorige Anmerkung.

57. *Abietis*, der Tanneurüsselkäfer.<sup>\*)</sup>

Müller l. c. S. 231. No. 57. der Tannenkäfer.

Füesslins Verz. S. 10. No. 198. der Tanneurüsselkäfer.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 521. der Rüsselkäfer des Tannenbaums.

Schaeff. Icon. t. 25. f. 1.

Fabric. S. E. p. 138. No. 59.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 984. Niger, elytris piceis, punctis pilosis fulvis subfasciatis.

de Geer Inf. Tom. V. p. 205. No. 1. t. 6. f. II. Chanson du Sapin.

Longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo nigro maculis griseo-flavis.

58. *Germanus*, der deutsche Gelbpunkt.

Müller l. c. S. 231. No. 58. der Deutsche.

Füesslins Verz. S. 10. No. 199. der Gelbpunktirte.

Sulzers Gesch. S. 39. t. 4. f. 8. der Deutsche.

Frisch Inf. XIII. S. 28. t. 26. der grosse schwarze Rüsselkäfer.

Schaeff. Icon. t. 25. f. 2.

Fabric. S. E. p. 139. No. 67. Longirostris; femoribus dentatis; ater; thorace vtrinque punctis duobus testaceis.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 522. der deutsche Rüsselkäfer.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 91. No. 44.

Maximus inter nostros. Elytra nigra, punctis maculisque testaceis varia.

Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 110.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 982.

Ovatus, ater, punctis testaceis maculatus.

Z 3

59. Nu-

\*) Mit Circ. Pini No. 19. in der Begattung angetroffen, also ein oder das andere Geschlecht.

59. *Nucum*, der *Haselnussrüttelkäfer*.*Müller* l. c. S. 232. No. 59. der *Nusskäfer*.*Füesslins* Verz. S. 10. No. 200. der *Nussbohrer*.*Gleditsch* Forstwiss. I. Th. S. 567. 571. No. II. der *Haselnusskäfer*; der *graue lang schnäbliche Rüsselkäfer*.*Röfels* Infektenbel. 3. B. S. 385. t. 67. f. 6. 7. der *Haselnusswurm*, mit seinem *Rüsselkäfer*.*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 524. der *aus der Haselnuss entspringende Rüsselkäfer*.*Poda* Mus. graecens. p. 29.*Schaeff.* Elem. t. 55. f. 1.

— — Icon. t. 50. f. 4.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 996.*Ovatus* gilvus, *rostro longissimo*.*Fabric.* S. E. p. 141. No. 77.*Raj.* Inf. 3. t. 67. f. 5. 6.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 295. *Curcul. 42.* La *Charanson trompette*.Rufo-marmoratus; *scutello* cordato albo; *proboscide* subulata longissima.

de Geer Inf. Tom. V. p. 205. No. 2. t. 6. f. 14. 15. 16.

*Charanson des Noisettes*.Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis rufis, *corpo* oblongo nigro, *pilis* viridi flavis.60. *Rumicis*, der *Sauerampferrüttelkäfer*.*Müller* l. c. S. 232. No. 60. der *Ampfersauger*.*Fabric.* S. E. p. 134. No. 38.*Raj.* Inf. p. 85. No. 36. *Scarabaeus parvus*, *corpo* sublongo; *totus obscure rufus seu fuscus*, *punctis nigricantibus* adspersus.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 10. No. 97.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1001.

de Geer

de Geer Inf. Tom. V. p. 231. No. 20. t. 7. f. 10. 11.  
*Charanson de la Patience.*

Longirostris; antennis fractis; femoribus muticis;  
corpore oblongo griseo-fusco-nebuloso; thorace fa-  
sciis binis nigricantibus; pedibus fuscis.

61. *Scrophulariae*, der *Braunwurzrüsselkäfer*.

Müller l. c. S. 233. No. 61. der *Braunwurzlecker*.

Füesslins Verz. S. 10. No. 201. der *Braunwurznager*.

Fabric. S. E. p. 140. No. 68. *Longirostris; femo-*  
*ribus dentatis; coleoptris maculis duabus dorsalibus*  
*atris.*

*Act. Vpsal.* 1736. p. 16. No. 5. *Curculio globosus*,  
proboscide reflexa.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 10. No. 99.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 997.

Subglobosus ater; thorace pallido villoso; elytro-  
rum lineis elevatis; albo nigroque tessulatis.

*Reaum.* Inf. Tom. III. P. I. p. 42. t. 2. f. 12. Le *Scarabé à tête allongée en trompe*; le *Mineur du Bouil-  
lon-blanc.*\*)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 296. *Curc.* 44. Le *Charan-  
son à lozange de la Scrofulaire*.

Subglobosus niger; punctis duobus atris suturae  
longitudinalis coleoptrorum; thorace exalbido.

de Geer Inf. Tom. V. p. 208. No. 3. t. 6. f. 17. 18.

19. 20. *Charanson de la Scrofulaire*.

Z 4

Longi-

\*) Dass sich verschiedene *Minirwürmer* in allerley Pflanzenblättern in *Rüsselkäfer* verwandeln, ist eine wichtige Entdeckung, die wir dem grossen *Reaumur* Inf. Tom. III. Part. I. p. 40. sq. zu danken haben. Die Minirwürmer verwandeln sich in drey verschiedene Arten von Insekten: in *Nachtmothen*; in *Fliegen*, und in *Rüsselkäferchen*.

*Longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis;*  
*corpo subgloboſo fusco griseove; coleoptris maculis*  
*duabus rotundis nigris dorsalibus;*

62. *Druparum*, der Kernbohrer.

Müller I. c. S. 233. No. 62. der *Rothschnabel*.

Füesslins Verz. S. II. No. 203. der *Kernbohrer*.

Fabric. S. E. p. 143. No. 82.

Müller's Faun. Fridr. p. II. No. 106.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1003.

Schaeff. Icon. t. I. f. II. a. b.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 296. *Curc. 43. Le Charan-*

*son damier.*

Flavescens; *elytris luteo- et rufo-tessellatis.*

de Geer Inf. Tom. V. p. 214. No. 7. *Charanson des*

*bayes.*

*Longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis;*  
*corpo oblongo rufo-fusco; elytris obsolete fasciatis.*

63. *Violaceus*, der *violette Fichtenrüsselkäfer*.\*)

Müller I. c. S. 233. No. 63. der *Violettrüssel*.

Füesslins Verz. S. II. No. 204. der *Kienbohrer*.

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 519. der *violette Rüssel-*

*käfer.*

Fabric. S. E. p. 141. No. 76.\*\*) )

Müller's Faun. Fridr. p. 9. No. 89.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1000. p. 91.

No. 1024. *RHINOM. unispinus*, *violaceus*; thorace  
 antrorsum spinoso, *antennis* nigris.

Scop. Entom. carn. No. 78.

Totus ex coeruleo-violaceus; *antennis* nigris.

*Poda*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Fabric. hat bey diesem den vom Geer bey Curc. L. Alliar.

No. 4. citirten Geoffr. I. 271. Rhinom. 4. angeführt.

*Poda Mus. graec.* p. 28..

de Geer Inf. Tom. V. p. 213. N. 5. *Charanson noir-bleuâtre.*

Longirostris; *antennis fractis; femoribus dentatis;* *corpore oblongo nigro-coerulecente nitido: elytris* striatis.

64. *s-punctatus*, der *Fünfpunkt.* \*)

Müller l. c. S. 233. No. 64. die *Weissnath.*

Fabric. S. E. p. 140. No. 70. Longirostris; *femoribus dentatis; elytris futura punctisque duobus albis.*

65. *Hispidus*, der *stachlichte Rüsselkäfer.* \*\*)

Müller l. c. S. 234. No. 65. der *Schuppenkäfer.*

Onomat. hist. nat. p. 3. p. 522. der *haarigte Rüsselkäfer.*

66. *Pedicularius*, der *Rüsselkäfer in der Grösse einer Laus.* †)

Müller l. c. S. 234. No. 66. der *Lauser.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 525. der *Lausrüsselkäfer.*

67. *Tortrix*, der *Blattroller.* ††)

Müller l. c. S. 234. No. 67.

Fabric. S. E. p. 143. No. 85.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 300. Curc. 51. Le *Charanson couleur de ronille.*

Ferrugineus; *elytris striatis, oculis nigris.*

Z 5 de Geer

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Von der Art ist des Herrn von Geer Curc. Vlmi, Tom. V. p. 215. 217. No. 8. t. 6. f. 26, 27. der hinten unter den *neuen* vorkommen wird.

††) Nicht abgebildet.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 214. No. 6. *Charanson fauve.*

*Curculio (fulvus) longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo flavo-testaceo; oculis nigris.*

#### IV. Kurzrüssel mit gezähnelten Schenkeln.

##### 68. *Ligustici*, der Liebstöckelrüsselkäfer.

Müller I. c. S. 234. No. 68. der Liebstöckelkäfer.

Füesslins Verz. S. II. No. 205. der Kleerrüsselkäfer.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 526. der Rüsselkäfer des Liebstöckel oder Badkrauts.

Schaeff. Icon. t. 2. f. 12.

Fabric. S. E. p. 155. No. 145.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 962. Niger; thorace murino; elytris maculis pallidis striatis.

de Geer Inf. Tom. V. p. 218. No. 10. *Charanson du Ligusticum.*

*Apterus, brevirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo nigro-fusco; squamulis griseis nitidis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 292. Curr. 36. Le Charanson gris à étuis reunis et chagriniés.

Cinereus, squamosus, alis carens, elytris rugosis.

##### 69. *Ovatus*, der eyerförmige Rüsselkäfer.\*)

Müller I. c. S. 235. No. 69. der Eyerkäfer.

Fabric. S. E. p. 156. No. 151.

Mülleri Faun. Fridr. p. II. No. 109.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 969.

Scop. Entom. carn. No. 83. Curr. Vrticae: an ovatus Linn.?

de Geer

\*.) Nicht abgebildet.

de Geer Inf. Tom. V. p. 219. No. II. Charanson de l'Eglantier.

Curculio (*Rosae*) apterus brevirostris; pedibus antennisque fractis rufis; femoribus dentatis; corpore oblongo nigro fusco.

70. *Cervinus*, der Hirschhornrüsselkäfer.\*)

Müller l. c. S. 235. No. 70. der Hirschhornkäfer.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 526. der Hirschrüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 149. No. 114.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 970.

de Geer Inf. Tom. V. p. 220. No. 13. Charanson gris bronze.

Curculio (*griseo-aeneus*) brevirostris; antennis fractis rufis; femoribus dentatis; corpore oblongo griseo-aeneo nitido.

71. *Oblongus*, der längliche Rüsselkäfer.\*\*)

Müller l. c. S. 235. No. 71. der Schmalbauch.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 526. der längliche Rüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 156. No. 150.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 294. Curr. 39. Le Charanson à étoiles fauves.

Oblongus, niger; elytris pedibusque testaceis.

72. *Pyri*, der Birnrüsselkäfer.

Müller l. c. S. 235. No. 72. der Birnkleider.

Füesslins Verz. S. 11. No. 206.

Sulzers Kennz. t. 3. f. 23. der erzbraune Rüsselkäfer auf den Birnbäumen.

Gleditsch

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 791. No. 24. der *dunkelgrüne Blattkäfer des Birnbaums*.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 526. der *aus den Blättern des Birnbaums entspringende Rüsselkäfer*.

*Acta Vpsal.* 1736. p. 16. No. 2. *Curculio acuminatus oblongiusculus aeneo-fuscus*.

*Lift. loqu.* p. 394. No. 31. *Scarabaeus majusculus e nigro rufescens*.

*Fabric.* S. E. p. 155. No. 147.

*Müller* Faun. Fridr. p. II. No. 107.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 965.

*Schaeff.* Icon. t. 2. f. II.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 282. *Curc. 12. Le Charanson à écailles vertes et pattes fauves*.

*Squamoso-viridis; rostro thorace breviore, pedibus rufis.*

de Geer Inf. Tom. V. p. 246. No. 34. *Charanson bronzé du Poirier*.

*Brevirostris; antennis fractis rufis; femoribus muticis; corpore oblongo aeneo-nitido; pedibus rufis.*

### 73. *Argentatus*, der *Silberrüsselkäfer*.

*Müller* l. c. S. 236. No. 73. der *Silberkäfer*.

*Füesslins* Verz. S. II. No. 207. *Silberrüsselkäfer*.

*Sulzers* Gesch. S. 40. t. 4. f. 9. d. c. \*) *Fühlspitzenkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 155. No. 148.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. pag. 526. der *silberfarbene Rüsselkäfer*.

*Müller* Faun. Fridr. p. II. No. 108.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 966.

*Viride-auratus; antennis pedibusque rufis.*

*Geoffr.*

\*) *Mylabris Schaefferi.* Unter *Scopoli calcáratos*.

Hat die prächtigsten Schnuppen auf den Flügeldecken.

*Groffr.* Inf. Tom. I. p. 293. *Curc.* 38. *Le Charanson à écailles vertes.*

*Squamofus*, viridi-auratus.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 219. No. 12. *Charanson verd-doré de l'Ortie.*

*Curculio (Vrticae) brevirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo viridi-nitido; pedibus viridibus.*

V. Kurzrüssel mit ungezähnelten Schenkeln.

74. *Argyreus*, der *indianische Silberrüssel.*\*)

*Müller* l. c. S. 236. No. 74. der *Silberrüssel.*

*Fabric.* S. E. p. 145. No. 94.

75. *Regalis*, der *peruanische Goldrüssel.*\*\*) )

*Müller* l. c. S. 236. No. 75. der *Goldrüssel.*

*Fabric.* S. E. p. 145. No. 95.

76. *Viridis*, der *Grünrüssel.*

*Müller* l. c. S. 236. No. 76.

*Füesslins Verz.* S. 11. No. 209. der *Grünling.*

*Schaeff.* Elem. t. 108. *Rhinomacer.*

— — Icon. t. 53. f. 6.

*Fabric.* S. E. p. 146. No. 102. *Brevirostris; femoribus muticis; virescens; thorace elytrorumque lateribus flavis.*

*Mülleri Faun. Fridr.* p. 11. No. 111.

— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 87. No. 958.

*Corpose viridi, supra obscurō; subtus flavidiore.*

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 256. No. 45. *Charanson verd à bande jaune.*

*Curcu-*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Curculio (flavo-cinctus) brevirostris; antennis rectis; corpore oblongo viridi; fascia laterali flava.*

77. *Speciosus*, der *indianische Rüsselkäfer mit fünf Stacheln auf den Flügeldecken.\**)

*Müller l. c. S. 237. No. 77. die Stacheldecke.*

78. *Ruficornis*, das *Rothhorn.\*\**)

*Müller l. c. S. 237. No. 78.*

*Fabric. S. E. p. 149. No. 115.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 115.*

— — *Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 959.*

*Corpore atro; thorace bituberculato; antennis rubris.*

79. *Albinus*, der *Rüsselkäfer mit der weißen Stirn.*

*Müller l. c. S. 237. No. 79. die Weißstirn.*

*Fabric. S. E. p. 151. No. 127.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 973.*

*Niger, tuberculatus; thorace subtus; elytris antice et postice albis.*

*de Geer Inf. Tom. V. p. 255. No. 44. t. 8. f. 1. Chanson à extremités blanches.*

*Brevirostris; antennis longis rectis; corpore oblongo nigro hispido; capite elytrorumque apice albis; rostro planiusculo lato.*

80. *Lineatus*, der *lineirte Rüsselkäfer.*

*Müller l. c. S. 237. No. 80. der Bruststrich.*

*Füesslins Verz. S. 11. No. 210. der Bruststrich.*

*Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 528. der unienförmige Rüsselkäfer.*

*Fabric.*

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 148. No. III.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 953. Oblongus aurato-griseus; thorace terlineato; antennis rufescens.

*Akt. Nidr.* IV. p. 14.

*Schaeff.* Icon. t. 103. f. 8.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 283. *Curc.* 13. Le Charanson à corcelet rayé.

Rostro thoracis longitudine; thorace tribus striis pallidioribus.

de Geer Inf. Tom. V. p. 247. No. 35. *Charanson rayé à courte trompe.*

Brevirostris; antennis fractis; femoribus muticis; corpore oblongo griseo; thorace striis tribus pallidioribus.

81. *Incanus*, die Stumpfdecke.\*)

*Müller* l. c. S. 237. No. 81.

*Füeslins* Verz. S. II. No. 211. der Stumpfdeckel.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 528. der schwarzgrauliche Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 147. No. 106. Brevirostris, fuscus, oblongus, thoracis dorso plano.

*List.* loqu. f. Scarab. anglic. 394. No. 30. *Scarabaeus fuscus lanugine incanus.*

*Müller* Faun. Fridr. p. II. No. 112.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 946.

Oblongus, cinereus, hirtus.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 282. *Curc.* 10. Le Charanson gris, strié et sans ailes.

Cinereus, squamosus, alis carens; elytris striatis.

de Geer Inf. Tom. V. p. 242. No. 28. *Charanson gris non ailé.*

*Curcu-*

\*.) Nicht abgebildet.

*Curculio (griseo-apterus) brevirostris; antennis fractis longissimis rufis; femoribus inuticis; corpore oblongo nigro-fusco; pilis nitidis griseis.*

82. *Cloropus*, der *Graufuß*.\*)

Müller l. c. S. 238. No. 82.

Fabric. S. E. p. 149. No. 116.

Mülleri Faun. Fridr. p. II. No. 113.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 957.

83. *Rufipes*, der *Rothfuß*.\*\*)

Müller l. c. S. 238. No. 83.

Füeßlins Verz. S. II. No. 212. der *Rothfuß*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 529. der *Rüsselkäfer mit rothen Füßen*.

Mülleri Faun. Fridr. p. II. No. 114.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 945.

84. *Nebulosus*, der *neblichfarbige Rüsselkäfer*.

Müller l. c. S. 238. No. 84. die *Wolkendecke*.

Füeßlins Verz. S. II. No. 213.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 980. No. 31. der *kurz-schnäbliche nebelgraue Rüsselkäfer mit schwarz und schräg gestreiften Flügeldecken*.

Frisch Ins. XI. Th. S. 32. t. 23. f. 5.

Ein Käfer mit etwas kurzem Rüssel.

Schaeff. Icon. t. 25. f. 3.

Fabric. S. E. p. 147. No. 104.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 529. der *Rüsselkäfer mit neblicher Farbe*.

Geoffr.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 278. Curc. I. t. 4. f. 8. Le Charanson à trompe filonnée.\*)*

*de Geer Inf. Tom. V. p. 241. No. 27. Charanson à trompe à arrête.*

*Curculio (carinatus) brevirostris, antennis fractis; femoribus muticis; corpore oblongo nigro maculis fasciisque albidis; elytris gibbosis.*

85. *Sulcirostris*, der Rüsselkäfer mit gefurchtem Rüssel.

*Müller l. c. S. 238. No. 85. t. 4. f. 14. die Rinnennase.*

*Füeßlins Verz. S. II. No. 214. die Rinnennase.*

*de Geer Inf. Tom. V. p. 240. No. 26. Charanson à trompe filonnée.*

*Brevirostris; antennis fractis; femoribus muticis; corpore oblongo cinereo; elytris maculis fasciisque obliquis nigris.\*\*)*

86. *Ater*, der ganz schwarze Rüsselkäfer. †)

*Müller l. c. S. 239. No. 86. der Schwarzrock.*

*Füeßlins Verz. S. II. No. 215.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 954. Thorace punctato terque lineato; tibiis antennisque rufis.*

87. *Emeritus*, der indianische Rüsselkäfer mit haarrichtigen Warzen. ††)

*Müller l. c. S. 239. No. 87. der Spinnenkäfer.*

*Fabric. S. E. p. 152. No. 133.*

88. *Bar-*

\* ) Nach dem Linné und Fabricius ist hierbey der Geoffroi; von dem Herrn von Geer aber bey Linn. Curc. *Sulcirostris* No. 85. angeführt.

\*\*) Hierbey hat der Herr von Geer das vorige Citatum des Geoffroi gesetzt.

† ) Nicht abgebildet.

†† ) Nicht abgebildet.

88. *Barbarus*, der französische Rüsselkäfer mit ausgehöhltem Brustschild. \*)

Müller l. c. S. 239. No. 88. der Franzose.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 527. der bartige Rüsselkäfer. \*\*)

Fabric. S. E. p. 152. No. 134.

89. *Capensis*, der kapensische Rüsselkäfer. \*\*\*)

Müller l. c. S. 240. No. 89. der Afrikaner.

Fabric. S. E. p. 152. No. 130.

90. *Verrucosus*, der kapensische Warzenträger.

Müller l. c. S. 240. No. 90. t. 4. f. 15.

Fabric. S. E. p. 152. No. 129.

Drury Ins. Tom. I. t. 32. f. 5.

91. *Cornutus*, der indianische Hornträger. †)

Müller l. c. S. 241. No. 91.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 528. der gehörnte Rüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 153. No. 137.

92. *16-punctatus*, der indianische Rüsselkäfer mit sechzehn schwarzen Punkten. ††)

Müller l. c. S. 241. No. 92. der Furchenkopf.

Fabric. S. E. p. 146. No. 98.

93. Gra-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) In der Onomat. hat man statt Barbarus in der Barbarey, oder in Afrika; *Barbatus* gelesen, woraus die Benennung: der bartige entstanden.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

93. *Granulatus*, die *indianische Körnerdecke*.  
*Müller l. c. S. 241. t. 4. f. 17.* die *Körnerdecke*.

94. *Abbreviatus*, der *martinikische Rüsselkäfer mit abgekürzten Flügeldecken*.\*)

*Müller l. c. S. 242. No. 94.* der *Kurzmantel*.

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 527.* der *abgekürzte Rüsselkäfer*.

95. *Apterus*, der *indianische Ohnflügel*.

*Müller l. c. S. 242. No. 95.* der *Kahlflügel*.

*Fabric. S. E. p. 154. No. 142.* *Brevirostris; thorace spinoso; cruce impresso; elytris ferrugineo punctatis.*

*de Geer Ins. Tom. V. p. 275. t. 16. f. 1.* *Charanson croix de chevalier.*

*Curculio (cruciatus) apterus brevirostris carinatus; antennis rectis; corpore ovato, atro subtus maculis rubris; thorace spinoso crucigero.*

### *Unabgebildete Linnéische Rüsselkäfer.*

#### I. Der ersten Klasse.

- |    |     |     |                    |      |  |  |  |  |         |
|----|-----|-----|--------------------|------|--|--|--|--|---------|
| 1. | No. | 5.  | <i>Cyaneus.</i>    |      |  |  |  |  |         |
| 2. | No. | 7.  | <i>Campanulae.</i> |      |  |  |  |  |         |
| 3. | No. | 8.  | <i>Badensis.</i>   |      |  |  |  |  |         |
| 4. | No. | 9.  | <i>Aequatus.</i>   |      |  |  |  |  |         |
| 5. | No. | 10. | <i>Aterrimus.</i>  |      |  |  |  |  |         |
| 6. | No. | 12. | <i>Pruni.</i>      |      |  |  |  |  |         |
| 7. | No. | 17. | <i>Dorsalis.</i>   |      |  |  |  |  |         |
| 8. | No. | 21. | <i>Cupreus.</i>    |      |  |  |  |  |         |
| 9. | No. | 22. | <i>Scaber.</i>     |      |  |  |  |  |         |
|    |     |     |                    | Aa 2 |  |  |  |  | 10. No. |

\*.) Nicht abgebildet.

10. No. 23. *T-album.*
11. No. 24. *Ruficollis.*
12. No. 25. *Quercus.*
13. No. 26. *Polygoni.*
14. No. 27. *Viscariae.*
15. No. 28. *2-punctatus.*
16. No. 29. *4-maculatus.*
17. No. 30. *5-maculatus.*
18. No. 31. *Pericarpius.*
19. No. 32. *Sprengleri.*
20. No. 33. *Vittatus.*
21. No. 35. *Anguinus.*
22. No. 36. *Astanii.*
23. No. 40. *Populi.*

### II. Der zweiten Klasse.

1. No. 41. *Beccabungae.*
2. No. 42. *Alni.*
3. No. 43. *Salicis.*
4. No. 44. *Fagi.*
5. No. 45. *Segetis.*

### III. Der dritten Klasse.

1. No. 48. *Carbonarius.*
2. No. 49. *Mucoreus.*
3. No. 50. *Pusio.*
4. No. 52. *Stigma.*
5. No. 54. *Annulatus.*
6. No. 63. *Violaceus.*
7. No. 64. *5-punctatus.*
8. No. 65. *Hispidus.*
9. No. 67. *Tortrix.*

### IV. Der

IV. Der vierten Klasse.

1. No. 69. *Ovatus.*
2. No. 70. *Cervinus.*
3. No. 71. *Oblongus.*

V. Der fünften Klasse.

1. No. 74. *Argyreus.*
2. No. 75. *Regalis.*
3. No. 77. *Speciosus.*
4. No. 78. *Ruficornis.*
5. No. 81. *Incanus.*
6. No. 82. *Cloropus.*
7. No. 83. *Rufipes.*
8. No. 86. *Ater.*
9. No. 87. *Emeritus.*
10. No. 88. *Barbarus.*
11. No. 89. *Capensis.*
12. No. 91. *Cornutus.*
13. No. 92. *16-punctatus.*

NEUE RÜSSELKÄFERARTEN.

I. Langrüssel mit dünnen Schenkeln.

1. *Vlicis*, der englische Rüsselkäfer auf dem Heckfuamen.

*Forsteri* nov. spec. Inf. Cent. I. p. 31. No. 31. Longirostris, femoribus simplicibus; cinereus, abdomine ovato, antennis, tarsis, tibiis omnibus et femoribus primi parisi rufi.

2. *Longipes*, der Langfuß von der S. Johannisinsel bey Madagascar.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 33. f. 3.

*Longirostris, femoribus simplicibus, totus rufo-  
obscure-fuscus; pedibus anticis longissimis.*

3. *4-punctatus*, der *russische Vierpunkt*.

*Lepechins* Tageb. 2. Th. S. 204. t. II. f. 23.

*Longirostris; corpore griseo; thorace lineis duabus  
atque elytrorum punctis 4 albis.*

4. *Variegatus*, der *russische gescheckte Rüsselkäfer*.

*Lepechins* Tageb. 2. Th. S. 204. t. II. f. 33.

*Longirostris; albo nigroque varius, elytris apice  
acuminatis.*

5. *Gibbus*, der *Buckelrüsselkäfer*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1014.

*Longirostris, niger, ovatus, elytris violaceis sul-  
catis.*

6. *Similis*, der *schwarze Rüsselkäfer mit eyförmigen Flügeldecken*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1015.

*Longirostris, ater; elytris ovatis, punctato-striatis.*

7. *Nemoralis*, der *Waldrüsselkäfer*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1016.

*Longirostris niger; elytris striato-punctatis; oculis  
fuscis.*

8. *Politus*, der *glatte Rüsselkäfer*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1017.

*Longirostris, niger; elytris cyaneis, striatis, ni-  
tidis.*

9. *Flavi-*

9. *Flavipes*, der Rüsselkäfer mit gelben Hüften.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1018.

*Longirostris*, niger, ovatus; *femoribus flavo-rufis*,  
*Ast. Nidr. IV. 15.*

10. *Griseus*, der aschgraue Rüsselkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 974.

*Oblongus*, *cinereus*, *antennis rufis*.

11. *Nitidulus*, das schwarz violet glänzende Rüsselkäferchen.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 975. *Oblongus nigro-violaceus*; *thorace elytrisque nigro virentibus*.

12. *Arvensis*, der Feldrüsselkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 978. *Griseus*; *thorace terlineato*, *elytris rufis*, *obscure tessulatis*.

13. *Tuberculatus*, der schwarze Rüsselkäfer mit dem Hökerschild.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 979.

*Niger*; *thorace rugoso*; *elytris lineis tuberculisque muricatis*.

14. a. *Glaucinus*, der blaugrüne Rüsselkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 989.

*Niger*; *thorace vtrinque linea pallida*; *tibiis rufis*,

14. b. *Trifolii*, der Kleekäfer.

*Müllers Suppl. B. S. 230.*

*Supra ater*; *femoribus pallidis*; *ventre niveo*; *elytris striatis*.

15. *Gigas*, der *große japanische Rüsselkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 127. No. 1. *Longirostris, thorace elytrisque scabris; antennis apice albis.*

16. *Cruentatus*, der *karolinsche Blutpunkt*.

*Fabric.* S. E. p. 128. No. 3. *Longirostris ater; thorace lineis, elytrisque punctis duobus sanguineis.*

17. *Paganus*, der *indianische Landmann*.

*Fabric.* S. E. p. 128. No. 6. *Longirostris, griseus; thoracis dorso fusco; arcubus cinereis; rostro bifuscato.*

18. *Cruciatus*, der *neuholländische Rüsselkäfer mit einem Kreuz*.

*Fabric.* S. E. p. 129. No. 8. *Longirostris, subspinosis, niger, thorace lineis, elytris postice cruce albis.*

19. *Striatulus*, der *gestreifte Rüsselkäfer von der Insel Terre neuve in Amerika*.

*Fabric.* S. E. p. 129. No. 9. *Longirostris, niger; elytris holosericeo-striatis.*

20. *Iaceae*, der *Rüsselkäfer der Flockenblume*.

*Fabric.* S. E. p. 129. No. 11. *Longirostris, niger, cinereo-irroratus, elytris punto baseos distincto.*

21. *Biguttatus*, der *amerikanische Zweytropf*.

*Fabric.* S. E. p. 130. No. 13. *Longirostris, niger; elytris punto elevato, abdomine pedibusque posticis flavis.*

22. *Equi-*

22. *Equiseti*, der Rüsselkäfer auf dem englischen Kannenkraut.

Fabric. S. E. p. 130. No. 14. *Longirostris; thorace laevi; elytris muricatis nigris, punctis duobus apice-que albis.*

23. *Bicolor*, der amerikanische zweifarbiges Rüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 131. No. 18. *Longirostris, niger, thorace elytrisque rufis.*

24. *Pubescens*, das deutsche rauches Rüsselkäferchen.

Fabric. S. E. p. 131. No. 19. *Longirostris, violaceus, hirtus, rostro atro.*

25. *Tragiae*, das brasilianische kupferfarbige Rüsselkäferchen.

Fabric. S. E. p. 131. No. 21. *Longirostris, aeneus, rostro pedibusque nigris.*

26. *Aeneus*, das englische kupferfarbige Rüsselkäferchen.

Fabric. S. E. p. 131. No. 22. *Longirostris, niger, elytris aeneis.*

27. *Fuscirostris*, der deutsche Braunrüssel.

Fabric. S. E. p. 131. No. 23. *Longirostris, griseus, pedibus rufis, rostro femoribusque basi nigris.*

28. *Nigrirostris*, der englische Schwarzrüssel.

Fabric. S. E. p. 132. No. 24. *Longirostris, viridis, rostro atro.*

29. *Rufirostris*, der *englische Rothrüssel*.

*Fabric.* S. E. p. 132. No. 25. *Longirostris*, niger, rostro dimidiato pedibusque rufis.

30. *Malvae*, der *englische Malven-Rüsselkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 132. No. 30. *Longirostris*, griseus, *elytris* pedibusque testaceis.

31. *Suturalis*, der *deutsche Sahlweiden-Rüsselkäfer*, mit der *weissen Nath*.

*Fabric.* S. E. p. 133. No. 36. *Longirostris*, ovatus, fuscus; *linea longitudinali alba*.

32. *Exclamationis*, das *neuholländische Exclamationszeichen*.

*Fabric.* S. E. p. 133. No. 37. *Longirostris*, ater; *elytris* puncto lineolaque apicis albis.

33. *Orizae*, das *Reiß-Rüsselkäferchen*.

*Fabric.* S. E. p. 134. No. 40. *Longirostris*, piceus; *thorace* punctato, longitudine *elytrorum*; *elytris* punctis duobus rufis.

*Linn.* Amoen. acad. Vol. VI. p. 395. No. 19.

*Longirostris*, oblongus, niger; *elytris* maculis quatuor ferrugineis; femoribus muticis.

34. *Barbicornis*, das *neuseeländische Barthorn*.

*Fabric.* S. E. p. 134. No. 41. *Longirostris*, cylindricus, *rostro longissimo*, subtus *barbato*; *elytris* elongato clavatis.

35. *Affimilis*, der *dem vorigen sehr ähnliche neuseeländische Rüsselkäfer*.

*Fabric.*

*Fabric.* S. E. p. 134. No. 42. *Longirostris*, cylindricus; rostro apice glabro, atro; elytris ferrugineo subfasciatis. Videtur mas praecedentis.

36. *Semipunctatus*, der neuzeelandische Halbpunktirte.

*Fabric.* S. E. p. 135. No. 43. *Longirostris*, cylindricus; thorace lineis, elytris punctis albis.

37. *Barbirostris*, der indianische Bartrüffel.

*Fabric.* S. E. p. 135. No. 45. *Longirostris*, niger; rostro barbato; tibiis anticis tridentatis.

38. *Angustatus*, die englische Punktstreife.

*Fabric.* S. E. p. 135. No. 46. *Longirostris*, cylindricus, ater; elytris obtusis striato-punctatis.

39. *Lineola*, die neuholländische Linie.

*Fabric.* S. E. p. 136. No. 48. *Longirostris*, cylindricus, niger; elytris vitta testacea.

40. *Linearis*, der straßburgische linienförmige Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 136. No. 49. *Longirostris*, elongatus, niger; antennis pedibusque piceis; rostro basi attenuato.

41. *Crassipes*, der straßburgische Dickfuß.

*Fabric.* S. E. p. 136. No. 50. *Longirostris*; femoribus anticis subclavatis, corpore atro.

42. *Elongatus*, der Windhund.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 269. *Rhinom.* I. Le Bec-mare levrette.

Corporē

*Corpore angusto longo, niger, thorace fasciis quatuor albicantibus.*

43. *Nigro-striatus*, der schwarzgestreifte Rüsselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 271. Rhinom. 6. Le Bec-mare noir strié.*

*Nigro-fuscus glaber, punctato-striatus.*

44. *Oblongus*, der längliche gestreifte Rüsselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 272. Rhinom. 7. Le Bec-mare allongé.*

*Nigro-viridesceus, oblongus, striatus.*

45. *Flavipes*, der Gelbfuss.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 272. Rhin. 8. Le Bec-mare noir à pattes fauves.*

*Subglobosus niger, striatus; femoribus rufis.*

*Fabric. S. E. p. 133. No. 33. Flavipes. Longirostris ater, femoribus luteis.*

46. *Pulex*, das Flohrißselkäferchen.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 272. Rhinom. 9. Le Bec-mare-puce.*

*Subglobosus, villosus, niger, pedibus elytrisque rufis.*

47. *Rugosus*, der runzliche Rüsselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 278. Curc. 2. Le Charançon ride.*

*Totus fuscus rugosus.*

48. *Sulca-*

48. *Sulcatus*, der gefurchte Brustschild.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 278. Curr. 3. Le Charan-*  
*son à corcelet sillonné.*

Fusco-nebulosus; thorace sulcato; elytris striatis.

49. *Nigro-suturatus*, die Schwarznath.\*)

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 279. Curr. 4. Le Charan-*  
*son à suture noire.*

Oblongus; elytris villoso-cinereis, sutura nigra.

50. *Carduelis*, der Diftelrüsselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 281. Curr. 8. Le Charan-*  
*son tacheté des têtes de chardon.*

Niger, striatus, maculis villoso-fuscis nebulosis.

51. *Pulverulentus*, der bestäubte Rüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 75. Totus fuscus; thorax*  
*punctis prominulis scaber; elytra transversim rugosa.*

52. *Centaureae*, der Skopolische Flockenblumen-  
Rüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 76.*

Fuscus totus ovatus, tenui subrufo villo adspersus;  
rostro deflexo marginato; linea ad apicem elevata media.

53. *Auratus*, der goldne Rüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 77.*

Totus viridi-auratus; antennis rostrique apice di-  
latato nigris.

54. *Ico-*

\*) Nach Fabric. ist es *C. L. paraplecticus* No. 34. Nach Müller  
Zool. p. 89. No. 998. vermutlich *Similis*, wie das Fragzeichen  
angezeigt. S. No. 8. 3. Kl.

54. *Icosandriae*, der achtgestreifte Rüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 85. Color atro-coeruleus. Rostrum porrectum. Elytrum octo-striatum.*

55. *Coerulescens*, der himmelblaue Rüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 87. Color obscure coeruleus; rostrum deflexum; elytrum decem-striatum.*

56. *Oleraceus*, der Kohlrüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 88. Globosus, nigricans, elytris puncto lineaque lunata ad apicem albi coloris.*

57. *Pellucens*, der durchsichtige Rüsselkäfer.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 90. No. 41. Longirostris, muticus, alatus, parvus, flavicans; oculis et rostri apice nigris.*

58. *Piceus*, der pechfarbige Rüsselkäfer.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 221. No. 14. Charanson couleur de poix.*

*Longirostris; antennis fractis fuscis; femoribus muticis; corpore oblongo nigro piceo.*

59. *Nigro-gibbosus*, der Schwarzhöker.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 224. No. 17. Charanson noir boissu.*

*Longirostris; antennis fractis, femoribus muticis; corpore ovato nigro; elytris tuberculatis postice cinereis.*

60. *Castaneus*, der kastanienbraune Rüsselkäfer.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 231. No. 19.*

Longi-

Longirostris; *antennis fractis; femoribus muticis;*  
*corpore oblongo fusco-castaneo subtus nigro, elytris*  
*striato-punctatis gibbosis.*

61. *Fasciatus*, der graubandirte Rüsselkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 234. No. 21. *Charanson*  
*rayé à longue trompe.*

Longirostris, *antennis fractis, femoribus muticis;*  
*corpore oblongo nigro-fusco; fasciis longitudinalibus*  
*griseis.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 2274.

*Cinereus; fasciis longitudinalibus dilutioribus.*

62. *Plantaginis*, der Wegerichrüsselkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 237. No. 24. t. 7. f. 17. 18.  
*Charanson du Plantain.*

Longirostris; *antennis fractis; femoribus muticis;*  
*corpore ovato griseo; thorace fasciis elytris macula*  
*magna punctisque fuscis.*

63. *Rostratus*, der Schnauzenrüsselkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 252. No. 42. t. 7. f. 27. 28.  
*Charanson à museau.*

Longirostris; *antennis rectis; corpore oblonge ru-*  
*fo; capite elytrisque viridi-coeruleis nitidis.*

64. *Melanocephalus*, der surinamische Schwarzkopf.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 272. No. 6. t. 15. f. 27.  
*Charanson à tête et trompe noires.*

Longirostris; *antennis fractis; femoribus muticis;*  
*corpore subgloboso fusco; capite rostroque nigris ely-*  
*tris gibbis.*

65. *Frugilegus*, der surinamische Kornrüsselkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 273. No. 7. *Charanson des grains.*

*Longirostris; antennis fractis; femoribus muticis;*  
*corpore oblongo castaneo; coleoptris maculis quatuor*  
*rufis; thorace longitudine elytrorum.*

66. *Nomas*, der russische Nomas.

Pallas Reis. I. Anh. No. 31. Ausz. I. S. 11. No. 31.

*Longirostris, oblongus, alatus; femoribus muticis;*  
*corpore subtus albo-tomentoso; elytris canescentibus,*  
*striis punctato-sulcatis.*

Müllers Suppl. B. S. 230. No. 40.

67. *Piceus*, der russische pechfarbige Rüsselkäfer.

Pallas Reis. I. Anh. No. 34. Ausz. I. S. 12. No. 34.

*Totus piceus; Curc. Palmarum egregie similis, sed*  
*quadruplo minor; elytris abdomen aequantibus.*

Müllers Suppl. B. S. 232.

68. *Longimanus*, die kapensische Langhand.

Fabric. App. S. E. pag. 822. *Longirostris; nigricans,*  
*elytris ferrugineis; rostro emarginato; pedibus*  
*anticis longioribus. Magnitudo fere 6 palmarum.*

II. Springende Langrüssel mit dicken Hinterschenkeln.

1. *Foliorum*, der Blätterrüsselkäfer.

Mülleri Faun. Fridr. p. 10. No. 102.

*Longirostris, pedibus saltatoriis; corpore femori-*  
*busque atris; antennis pedibusque luteis.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1010.

2. *Subater*, das schwärzliche rauche Springrüsselkäferchen.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1005.

*Tomentosus*, elytris striatis; antennis tarfisque flavis.

3. *Testaceus*, der muschelbraune Springrüsselkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1006.

Pallide flavus; elytris striatis; oculis abdomineque nigris.

4. *Rufus*, der fuchsfichte Springrüsselkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1007.

Elytris striatis; oculis abdomineque nigris.

5. *Setosus*, der borstige Springrüsselkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1008.

Rufus, oculis, pediore abdomineque basi nigris.

6. *Alni*, das englische Erlen-Springrüsselkäferchen.

*Fabric.* S. E. p. 144. No. 90.

*Pedibus saltatoriis*, niger; coleoptris testaceis; manubris duabus obscuris.

7. *Viminalis*, das deutsche Bindweiden-Springrüsselkäferchen.

*Fabric.* S. E. p. 145. No. 92.

Longirostris; pedibus saltatoriis; corpore testaceo.

8. *Ulni*, der Uln- oder Rüster-Springrüsselkäfer.

de Geer Ins. Tom. V. p. 260. No. 48. t. 8. f. 5. *Chrysanthus sauteur de l'Orme*.

Cure. (*Saltator Ulni*) longirostris, corpore ovato flavo-testaceo, oculis nigris.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 286. Cerc. 19. Le Charanson sauteur brun.*

*Rufus, femoribus posticis crassioribus; elytris rufis.*  
*Reaum. Inf. Tom. 3. p. 31. t. 3. f. 17. 18.*

### III. Langrüssel mit gezähnelten Schenkeln.

#### 1. *Colon*, der Kolonrüsselkäfer.

*Linn. Mantiss. p. 531.*

*Longirostris canescens; femoribus anticis subdentatis; thorace vtrinque linea elytrisque puncto albo.*

*Fabric. S. E. p. 130. No. 12.*

*Longirostris, griseus; elytris puncto albo.*

*Scop. Entom. carn. No. 104. Curculio palustris.*

*Proboscis thorace longior; thorax linea laterali pallidiore — elytra coadunata, cinerascentia, albo puncto in medio signata.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 280. Cerc. 6. Le Charanson à deux points blancs.*

*Oblongus, fuscus; thoracis lateribus albidos; elytris striatis, puncto albo.*

*Schaeff. Icon. t. 155. f. 2.*

*Müllers Suppl. B. S. 229. der Kolonkäfer.*

#### 2. *Arator*, der Kornährenrüsselkäfer.

*Linn. Mant. p. 531.*

*Longirostris, subovatus; thorace fusco, lineis tribus pallidis; elytrorum futura nigro-dentata; pedibus fuscis edentulis.*

*Müllers Suppl. B. S. 229. der Pflüger.*

#### 3. *Muricatus*, der amerikanische Warzenrüsselkäfer.

*Drury Inf. Tom. II. t. 34. f. 4.*

Totus

*Totus fuscō-nigricans, elytris verrucosis striatis;  
femoribus vñidentatis.*

4. *Longimanus*, die *englische Langhand*.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 32. No. 32. Longirostris; femoribus dentatis, manibus longissimis.

5. *Pollinarius*, der *englische bestäubte Rüsselkäfer*.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 33. No. 33. Longirostris; femoribus omnibus dentatis; elytris depresso-planis abbreviatis; ventre, elytrorum margine et pedibus polline adspersis.

6. *Albicans*, der *Russische Weißafter*.

*Lepechins* Tageb. 2. Th. S. 206. t. 10. f. 6. Longirostris; tuberculis thoracis 5; elytrorum 6; ano albo; tibiis dentatis.

7. *Vrticae*, der *Nesselrüsselkäfer*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 983. Niger planiusculus; thorace vtrinque dentato; elytris striatis, postice bipunctatis.

8. *Similis*, der *dem Braunwurzrüsselkäfer ähnliche*.\*)

*Müller* Zool. Dan. Prodr. pag. 89. No. 998. Subglobosus rufus; elytrorum lineis elevatis, albo nigro-que tessulatis.

Bb 2

9. *Bidens*,

\*) Nach dem *Müller* ist dieses des *Geoffroi* Cuc. 4. T. I. p. 279.

Nach *Fabricio* aber dieser *Geoffroische* des *Linn.* Cuc. *paraplecticus* No. 34. S. No. 49. 1. Kl.

9. *Bidens*, der *neuseeländische zweygezähnte Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 136. No. 51. Longirostris; femoribus posticis dentatis niger; elytris unispinosis.*

10. *Scaber*, der *kayennische höckrige Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. pag. 137. No. 54. Longirostris; femoribus dentatis; elytris sulcatis, tuberculato spinosis.*

11. *Cylindrirostris*, der *neuholländische Walzenrüssel*.

*Fabric. S. E. p. 137. No. 55. Longirostris; femoribus dentatis; thorace scabro; elytris postice bituberculatis.*

12. *Caliginosus*, der *englische schwarzdunkle Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 137. No. 58. Longirostris; femoribus dentatis, oblongus; elytrorum striis punctatis approximatis.*

13. *Reticulatus*, der *trankebarische Rüsselkäfer mit netzförmigen Flügeldecken*.

*Fabric. S. E. p. 138. No. 60. Longirostris; femoribus dentatis; oblongus, piceus; elytris reticulatis; fasciis obliquis pallidis; tibiis anticis spinosis.*

14. *6-guttatus*, der *amerikanische Sechstropf*.

*Fabric. S. E. p. 138. No. 62. Longirostris; femoribus dentatis, niger; elytris maculis tribus albis.*

15. *Luridus*, der *neuholländische dunkelschwarze Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 138. No. 63. Longirostris; femoribus dentatis, ovatus, obscure niger; elytris punctostriatis.*

16. *Meditabundus*, der *neuholländische ernsthafte Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 139. No. 64. Longirostris; femoribus dentatis; elytris striatis, postice acuminatis.*

17. *Stupidus*, der *neuholländische unansehnliche Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 139. No. 65. Longirostris; femoribus dentatis, niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinosis.*

18. *Mangiferae*, der *Rüsselkäfer in den Kernen der Mangasfrucht*.

*Fabric. S. E. p. 139. No. 66. Longirostris; femoribus dentatis, griseus, thorace linea, punctisque duobus dorsalibus albis.*

19. *Gravis*, der *kapensische rostfarbig gescheckte Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 140. No. 69. Longirostris; femoribus dentatis, niger, elytris ferrugineo variegatis, femoribus canaliculatis.*

20. *Haemorrhoidalis*, der *neuholländische Rothaftter*.

*Fabric. S. E. p. 140. No. 71. Longirostris; femoribus dentatis; thorace fusco, lateribus cinerascentibus; elytrorum sutura apice ferrugineo.*

21. *Trimaculatus*, der elsassische Dreyfleck.

*Fabric.* S. E. p. 141. No. 72. *Longirostris; femoribus dentatis; coleoptris nigris, maculis tribus cinereis, postica communi lunata.*

22. *Litura*, der europäische Rüsselkäfer mit der schwarzen Rückenlinie.

*Fabric.* S. E. p. 141. No. 73. *Longirostris; femoribus dentatis, albo nigroque varius, rostro atro; thoracis linea dorsali nigra.*

23. *Proboscideus*, der nördlichamerikanische Rüsselkäfer mit außerordentlich langem Rüssel.

*Fabrit.* S. E. p. 142. No. 78. *Longirostris; femoribus dentatis; griseus, rostro corpore duplo longiore.*

24. *Varius*, die kayennische Schecke.

*Fabric.* S. E. p. 142. No. 79. *Longirostris; femoribus dentatis omnibus, griseo nigroque varius, rostro pedibusque rufis.*

25. *Cerasorum*, der englische Kirschrüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 142. No. 80. *Longirostris; femoribus dentatis, fuscus, scutello, elytrorumque fasciis obsoletis cinereis.*

26. *Amoenus*, der neuholändische anmuthige Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 142. No. 81. *Longirostris; femoribus dentatis, ater, thorace punctis duobus; coleoptris quinque niveis.*

27. *4-pustulatus*, die *kapensische Vierblätter*.

*Fabric.* S. E. p. 144. No. 88. *Longirostris; femoribus dentatis, niger, elytris maculis duabus ferrugineis.*

28. *Elongatus*, der *jamaische lange Brustschild*.

*Fabric.* S. E. p. 144. No. 89. *Longirostris; femoribus dentatis; thorace elongato; tibiis anticis bidentatis.*

29. *Tuberculifer*, der *Rüsselkäfer mit vier Reihen Hökern auf den Decksschilden*.

*Scop.* Ent. carn. No. 80. *Niger, thorace lateribus albidis; elytro seriebus 4 tuberculorum.*

30. *Cariosus*, der *Rüsselkäfer in den faulen Birnstämmen*.

*Scop.* Entom. carn. No. 81. *Oblongus, rostro porrecto; tereti, nitidulo, elytris striatis; femoribus anticis crassioribus et majore dente notatis.*

31. *Syngenesiae*, das *hirschfarbige raue Rüsselkäferchen*.

*Scop.* Entom. carn. No. 82. *Cervinus, brevissimis villis adspersis, rostro nigro; apice nitido.*

32. *Fuscus*, der *braune Rüsselkäfer mit weißem Rückenschild*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 300. *Curc. 50. Le Charançon brun à ecusson blanc.*

*Fuscus, scutello puncto albo, elytris macula rubescente.*

33. *Fraxini*, der Eschenrißselkäfer.

de Geer Ins. Tom. V. p. 212. No. 4. *Charanson du Fresne.*

Longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore subgloboſo griseo; coleoptris macula magna fusca dorsali.

34. *Vlmi*, der Rüsterknospen-Rüsselkäfer.

de Geer Ins. Tom. V. p. 215. No. 8. t. 6. f. 26. 27. *Charanson des boutons de l'Orme.*

Longirostris; antennis fractis, femoribus dentatis; corpore oblongo rufo-fusco; elytris macula nigricante, proboscide nigra.

35. *Pulverulentus*, der surinamische Puderläufer.

de Geer Ins. Tom. V. pag. 268. No. 3. t. 15. f. 24. *Charanson poudré.*

Longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo nigro; elytris cinereo maculatis.

36. *Crucifer*, der Kreuzträger.

*Pallas* Reif. I. Th. Anh. No. 35. Ausz. S. 12. No. 35. *Aequalis Curc. Scrophulariae, subtus flavo-cinereus tomento nitido; supra fuscus; elytris nota ad scutellum cruciformi; femora omnia dentata.*

*Müllers Supplem.* B. S. 231. No. 67.

37. *Ircos*, der Iris-Rüsselkäfer.

*Pallas* Reif. II. Th. Anh. No. 57.

*Triplo major Scrophul. corpus totum candidum.*

*Müllers Supplem.* B. S. 230. No. 67. der Schwertelkäfer.

IV. Kurzrüssel mit gezähnelten Schenkeln.

1. *Gemmatus*, der äugigte Rüsselkäfer.

Scop. Entom. carn. No. 90. *Apterus, niger; elytris coadunatis scabris maculatis; maculis argenteo-viridibus.*

Naturforscher 6. St. S. 97. t. 4. f. 6.

2. *Authracinus*, der kohlschwarze Rüsselkäfer.

Scop. Ent. carn. No. 92. *Totus niger, elytra punctatim striata; femora omnia vnidentata.*

3. *Tristis*, der Trauerrüsselkäfer.

Scop. Ent. carn. No. 93. *Fuscus, elytra punctis scabra, substriata, villosula, coadunata.*

4. *Infidus*, der Rüsselküfer von betrügerischer Farbe.

Scop. Ent. carn. No. 94. *Nudis oculis inspectus obsolete cupreus; ad lentem vero coerulescentibus nitidis prostratis villis superne adspersus haeret.*

5. *Pruni*, der die Pflaumenblätter zusammenwickelnde Rüsselkäfer.

*Vilosulus niger; antennis elytris pedibusque rufis.*

6. *Coelestinus*, der ganz himmelblaue Rüsselkäfer.

Scop. Entom. carn. No. 96. *Totus coeruleus; antennis pedibusque sanguineis.*

7. *Glaucus*, der blaugrauliche Rüsselkäfer.

Scop. Entom. carn. No. 97. *Fuscus, glaucescente tenui villo adspersus, nullibi scaber; elytris punctatim sparsis.*

8. *Rufipes*, der *Skopolische Rothfuß*.

*Scop.* Entom. carn. No. 98. *Fuscus, villosulus,*  
*parumper nitens, antennis pedibusque rufis.*

9. *Roeselii*, das *Rösel'sche Nelkenrüsselkäferchen*.

*Rösel's* Infektenbelust. III. B. S. 391. t. 67. f. A, B,  
 C, D.

*Crassirostris; elytris fusco-fulvis, lineis elevatis*  
*fulcatis; thorace obscure-viridi, linea longitudinali*  
*ad finem proboscidis alba.*

10. *Levistici*, der *Müller'sche Liebstöckel-Rüsselkäfer*.

*Müller's* Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 963. *Niger,*  
*elytris substriatis; oculis rufis.*

11. *Punctatus*, der *Müller'sche Blaßpunkt*.

*Müller's* Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 964. *Ater,*  
*elytris subfulcatis, pallide punctatus; oculis rufis.*

12. *Squamifer*, der *Schuppenträger*.

*Müller's* Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 968. *Oblongus;*  
*elytris griseo-nigroque striatis.*

13. *Speabilis*, der *neuholländische schöne Rüsselkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 155. No. 144. *Brevirostris; femoribus*  
*dentatis; corpore viridi nigroque variegato.*

14. *Sulcatus*, der *sächsische gefurchte Rüsselkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 155. No. 146. *Brevirostris; femoribus*  
*dentatis, ater, elytris striatis; ferrugineo-maculatis.*

15. *Viridarius*, der *tranquebarische Grünling*.

*Fabric.* S. E. p. 155. No. 149. *Brevirostris; femoribus dentatis, viridis; ore antennisque nigris, oculis atris.*

16. *Attelaboides*, der *brazilianische attelabusförmige Rüsselkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 156. No. 152. *Brevirostris; femoribus dentatis; rostro elytrisque vnituberculatis.*

17. *Coronatus*, der *gekrönte Rüsselkäfer*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 291. *Circ. 34. Le Charanson à corcelet couronné.*

*Niger, apterus; thorace vtrinque puncto duplice fulvo; basi pilis fulvis coronata.*

18. *Tigris*, der *gefleckte Tiger*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 292. *Circ. 35. Le Charanson tigrée.*

*Niger, maculis villoso-flavis, elytris subrugosis.*

19. *Rugoso-striatus*, der *gestickte Rüsselkäfer*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 293. *Circ. 37. Le Charanson cartisanne.*

*Fuscus, apterus, elytris rugoso-striatis.*

20. *Geographicus*, der *geographische Rüsselkäfer*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 294. *Circ. 40. Le Charanson geographique.*

*Subglobosus, nigro-fuscus, squamosus, lineolis albis variegatus.*

21. *Transverso-vittatus*, die Queerstreife.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 295. Curc. 41. Le Charan-*  
*son brun à bandes transverses de taches blanches.*

*Fuscus; elytris striatis; macularum albarum fascia*  
*triplici transversa.*

22. *Albo-punctatus*, der Weißpunkt.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 299. Curc. 47. Le Charan-*  
*son brun à points blancs.*

*Subglobosus, squamosus, cinereo-fuscus; elytro-*  
*vrum maculis tribus et apice albis.*

23. *Sericetus*, der Sammetrüffelkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 300. Curc. 52. Le Charan-*  
*son velouté.*

*Obscure rufus, villis cinereis adspersus; rostro tho-*  
*race breviore.*

24. *Virgo*, die Jungfrau.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 301. Curc. 53. Le Charan-*  
*son vierge.*

*Oblongus; villis cinereis adspersus, rostro thorace*  
*aequali.*

25. *Griseo-punctatus*, der Graupunkt.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 217. No. 9. Charanson*  
*noir à points gris.*

*Brevirostris; antennis longis fractis; femoribus*  
*dentatis; corpore oblongo nigro; punctis flavescenti-*  
*bus sparsis.*

## V. Kurzrüssel mit ungezähnelten Schenkeln.

1. *Scabriculus*, das gehöckerte Rüsselkäferchen.

*Linn.* Mantiss. p. 531. *Brevirostris*, *femoribus multicis*, *cinereus*, *elytris hispidis*.

*Fabric.* S. E. p. 149. No. 113. *Brevirostris*; *corpore cinereo hispido*.

*Müllers Supplm.* B. S. 233. No. 96. g. der *Stachelschäfer*.

2. *Singularis*, der *seltsame Rüsselkäfer mit ausgehöhlten Punkten*.

*Linn.* Add. p. 1066. No. 3. *Subbrevirostris*, *cinerous*; *elytris striis punctatis*; *punctis excavatis centro eminentibus*.

*Müllers Supplm.* B. S. 232. No. 96. e. der *Warzenkäfer*.

3. *Carinatus*, der *Rüsselkäfer mit eckigen gehöckerten Flügeldecken*.

*Linn.* Add. p. 1066. No. 4. *Subbrevirostris*, *niger*; *thorace subcarinato*, *elytris angulatis tuberculatis*.

*Müllers Supplm.* B. S. 233. N. 96. f. der *Kielkäfer*.

4. *Aurifer*, die *jamaische Goldstreife*.

*Drury* Ins. Tom. I. t. 32. f. 1.

*Fabric.* S. E. p. 147. No. 103.

*Brevirostris*, *corpore ferrugineo*, *aureo-maculato*.

5. *Globosus*, der *kapensische hügliche Rüsselkäfer*.

*Drury* Ins. Tom. I. t. 32. f. 4.

*Fabric.* S. E. p. 153. No. 135.

*Brevirostris*; *thorace spinoso*, *quinque sulcato*; *elytris laevibus*.

6. *Im-*

6. *Imperialis*, der *brasiliische majestätisch prächtige Rüsselkäfer*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 34. f. 1.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 34. No. 34. *Brevirostris ater; femoribus muticis; thoracis linea longitudinali; elytrorumque punctis per sticas dispositis viridi-inauratis.*

7. *Rufescens*, der *jamaische Fuchs*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 33. f. 4.

*Cupreo-fuscus totus, brevirostris; femoribus muticis; elytris substriatis.*

8. *Similis*, der *jamaische grauschwarzlich gestreifte dem vorigen sehr ähnliche Rüsselkäfer*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 34. f. 3.

*Totus griseo-nigro-striatus; elytris nigris, viridivareo-maculatis.*

9. a. *Ornatus*, der *kupferfarbige große ausländische Prachtrüsselkäfer mit grauen Punktstreifen*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 34. f. 3.

*Nigro-cupreo-fuscus; thorace linea lata longitudinali nigra griseo-lunulata, elytris punctis griseis striatis; femoribus rubro-maculatis.*

9. b. *Niger*, der *schwarze Rüsselkäfer von der S. Johannisinsel*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 34. f. 2.

*Totus niger, capite brevi, rotundatoque; brevirostris, femoribus muticis; elytris striatis.*

10. *Oedematosus*, der amerikanische Oehlbein-Rüsselkäfer.

Sulzers Gesch. S. 40. t. 4. f. 10.

Niger, glaber, politus; *elytris rubreis*.

11. *Noveboracensis*, der neuysorfsche graue schwarz und weiß punktirt gestreifte Rüsselkäfer.

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 35. No. 35.

Brevirostris, muticus, *canus*; *elytris subfastigiatis*; *striis quinque albidis nigro-punctatis*, *scutello flavicante*.

12. *Melanogrammus*, der schwärzlich gezeichnete englische Rüsselkäfer.

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 36. No. 36. Brevirostris; *femoribus muticis*; *corpore cano*; *sutura elytrorum antice nigra*, *nitida*, *rostro brevissimo*.

13. *Cypri*, der Haßelquistische Cyprische Rüsselkäfer.

Haßelqui. Reis. S. 449. No. 100.

Mediocris, sulcus, *linea longitudinali atra* in dorso.

14. *Albicans*, der russische graulich weisse Rüsselkäfer.

Lepechins Tageb. I. Th. S. 313. t. 17. f. 7.

Brevirostris, apterus, supra *albicans*; infra dilute roseus; thorace bicuspido; *elytris sulcatis*, *punctis canis adspersis*.

15. *Nassiformis*, der Rüsselkäfer mit der Reuse.

Lepechins Tageb. II. Th. S. 203. t. 11. f. 27.

Brevirostris; *corpore cano*; *elytris sulcatis nigromaculatis*.

16. 2-pun-

16. *2-punctatus*, der *Rüsselkäfer mit zween Punkten*.

*Lepechins* Tageb. II. Th. S. 205. t. II. f. 25.

Brevirostris; thorace scabro; elytris nebulosis; punctis 2 prope apicem nigris nitidis.

17. *Guttatus*, der *tüpfelichte Rüsselkäfer*.

*Lepechins* Tageb. II. Th. S. 205. t. II. f. 30.

Brevirostris niger, vellere rufescente obsitus punctulis innumeris nigris in elytris transparentibus.

18. *Piger*, der *Faulenzer*.

*Scop.* Entom. carn. No. 65.

*Rostrum* striis elevatis senis, lateralibus apice conjunctis; *femora* antica clavata.

19. *Resinosus*, der *Harzpfanzenrüsselkäfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 67. Niger, scaber; *abdomine* subitus; *elytrum* apice albidis.

20. a. *Iners*, der *zehngestreifte punktirte Rüsselkäfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 68. *Rostrum* linea vnica elevata; *elytrum* striis 10 punctatis.

20. b. *Piceus*, der *Pechrüsselkäfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 69. *Thorax* et *elytra* picea; *abdomen* nigrum; subitus albidum; *femora* clavata.

21. *Erraticus*, der *Schwärmer*.

*Scop.* Entom. carn. No. 70. *Rostrum* apice concavum; *elytrum* villosulum; striatum; stria tertia tuberculata.

22. *Populi*,

22. *Populi*, der *Pappelnrißselkäfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 74. Color, facies, et omnia  
*Curc.* Linn. *Fagi* No. 44. sed *femora* aequalia.

*Füeßlins Verz.* S. II. No. 216.

23. *C-album*, das *Skopolische weisse C.*

*Scop.* Ent. carn. No. 99. Cupreo-nigroque varius;  
 angulo externo baseos *elytri* singuli linea arcuata alba,  
*litteram C.* referente signato.

24. *Sensitivus*, der *empfindliche Rüsselkäfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 100. Niger; *femoribus* fulvis,  
 apice nigris; captus valde se torquens.

25. *Nemoreus*, der *Skopolische Waldrißselkäfer*.

*Scop.* Entom. carn. No. 101. Apterous niger, opacus;  
*rostro* bifido; *capite* glabro; *thorace* *elytrisque*  
*scabris acuminatis*.

26. *Momus*, der *Skopolische Momus*.

*Scop.* Ent. carn. No. 102. *Proboscis* superne sulcis  
 duobus; *abdomen* inter pedes posticos fulvo villo to-  
 mentosum; *femora* antica crassiora.

27. *Zoilus*, die *Skopolische Schecke*.

*Scop.* Ent. carn. No. 103. *Rostrum* deflexum; *ely-  
 trum* striatum; et punctis nigris variegatum, uno ma-  
 jore communi ad apicem.

*Füeßlins Verz.* S. II. No. 217.

28. *Quercus*, der *Skopolische Eichenrißselkäfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 106. Niger, *scutello* trilobo;  
 lobo antico albo, *elytro* unipunctato; puncto albo.

29. *Punctatus*, der *Skopolische punktirte Rüsselkäfer*.

*Scop. Ent. carn. No. 107.* Niger, *thorace albido; elytro striis elevatis 5 nigris, albo-punctatis.*

30. *Fasciatus*, der *Skopolische bandirte Rüsselkäfer*.

*Scop. Entom. carn. No. 108.* Rufus, *villosum; elytra fasciis duabus obscurioribus, obsoletis.*

31. *Praecox*, der *frühzeitige Rüsselkäfer*.

*Scop. Ent. carn. No. 109.* Ferrugineus, *elytra stria-ta, villosum, sub finem Aprilis.*

32. *Tricolor*, der *dreyfarbige Rüsselkäfer*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 91. No. 45.* *Brevirostris, inermis, niger, thorace punctis binis albis; elytra punctata in margine interno albo lineisque binis longitudinalibus flavis.*

33. *Candidatus*, der *russische Weißbauch*.

*Pallas Reis. I. Anh. No. 32. Ausz. I. S. II. No. 32.* *Brevirostris, oblongus, subtus pedibusque albus; femoribus muticis.*

*Müllers Suppl. B. S. 231. No. 96.* der *Candidat.*

34. *Pictus*, der *gemahlte Rüsselkäfer*.

*Pallas l. c. No. 33.* *Alatus, minor, pulcherrimus, albus; brevirostris; thorax fasciis tribus longitudinalibus.*

*Müllers Suppl. B. S. 232. No. 96.*

35. *Inderiensis*, der *weiße Rüsselkäfer am inderischen See*.

*Pallas*

*Pallas* l. c. No. 36. *Brevirostris, femoribus muticis, totus albus; thorax scaberimus, mucroneque vtrinque conico cornutus; elytra striis profunde punctatis.*

*Müllers Suppl. B. S. 232.* No. 96. d.

36. *Dentirostris*, der *Zahnrißsel*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 85.* No. 941. *Ovatus, niger; rostro apice quadridentato.*

37. *Tardus*, der *Träge*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86.* No. 942. *Nigricans; thorace elytrisque vtrinque rufis; macula apicis atra.*

38. *Murinus*, der *mausefahle Rüsselkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86.* No. 943. *Ovatus, nigricans, elytris pallide maculatis.*

— — *Faun. Fridr. p. 12.* No. 116.

39. *Fasciatus*, der *Müllersche bandirte Rüsselkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86.* No. 944. *Oblongus ater; thorace vtrinque; elytris fasciis duabus suturaque albis tomentosis.*

40. *Nodosus*, der *knotige Rüsselkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86.* No. 948. *Cane-scens; elytris nodulis minimis striatis.*

*Olaffs Reis. durch Isl. I. Th. S. 319. Silakkepr.*

41. *Longicornis*, das *Müllersche Langhorn*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86.* No. 949. *Nigricans; thorace hirto; elytris cinereis; maculis flavican-tibus; pedibus antennisque rufis.*

42. *Opacus*, der dunkelgraue Rüsselkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 950. *Griseus* absque striis et punctis.

43. *Latirostris*, der Müllersche Breitrüssel.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 951. *Griseus*, antennis pedibusque rufescentibus.

44. *Maculosus*, der gelbgefleckte Rüsselkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 952. *Ovatus*, obscure flavicans; *elytris luteo-maculatis*.

45. *Carinatus*, der gewölbte Rüsselkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 955. *Cervinus*, *ovatus*; *elytris* lineis tribus elevatis; futura postflice *carinata*.

46. *Striatus*, der dreyfach gestreifte Brustschild.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 956. *Elongatus*, *cinereus*; *thorace* terlineato; *antennis* nigris.

47. *Mollis*, die weiche Flügeldecke.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 960. *Brevirostris*, *griseo-auratus*; *nitens*, *femoribus* muticis; *elytris* *mollibus*.

*Act. Nidr.* IV. p. 12. t. 16. f. 6.

48. *Fasciatus*, die Rothbinde.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 961. *Brevirostris*, *griseo-nitens*; *fasciis* *elytrorum* *vndulatis* ferrugineis.

*Act. Nidr.* IV. p. 13.

49. *Bifpi-*

49. *Bispinus*, der Zweydorn.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1023. *Rhinom.* coeruleus; thorace vtrinque spinoso; antennis nigris.

*Schaeff.* Icon. t. 6. f. 4.

50. *Inermis*, der unbewehrte Rüsselkäfer.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1025. *Rhinom.* violaceus; thorace mutico; puncto vtrinque impresso; antennis nigris.

*Schaeff.* Icon. t. 56. f. 8.

51. *Marginatus*, der amerikanische Goldrand.

*Fabrit.* S. E. p. 145. No. 96.

Brevirostris, fuscus; elytrorum sutura abdominalis que marginibus aureis.

52. *19-punctatus*, der kayennische Neunzehnpunkt.

*Fabric.* S. E. p. 145. No. 97.

Brevirostris, canescens; thorace punctis nigris quatuor; coleoptris novendecim.

53. *Decorus*, der brasiliische zierliche Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 146. No. 99.

Brevirostris, supra fuscus; thorace coleoptrisque vittis duabus viridi-aureis.

54. *Nitidulus*, der kayennische Grünglanz.

*Fabric.* S. E. p. 146. No. 100.

Brevirostris; femoribus muticis, viridi-tomentosus; elytris punctatis.

55. *Candidus*, der kayennische Weißdorn.

*Fabric.* S. E. p. 146. No. 101.

Brevirostris; femoribus muticis; elytris spinosis albis; macula laterali fusca.

56. *Crenulatus*, der *neuholländische geriefte Rüsselkäfer*.

*Fabrit.* S. E. p. 147. No. 105.

Brevirostris, cinereus; elytris tribus lineis elevatis, crenulatis, atris.

57. *Longimanus*, die *brasiliatische Langhand*.

*Fabric.* S. E. p. 147. No. 107.

Brevirostris, fuscus; thorace margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus antitidis elongatis.

58. *Griseus*, der *englische graue Rüsselkäfer*.

*Fabrit.* S. E. p. 148. No. 108.

Brevirostris, supra griseo-fuscus, subtus cinereus, rostro canaliculato.

59. *3-guttatus*, der *englische Dreytropf*.

*Fabrit.* S. E. p. 148. No. 109.

Brevirostris, nigricans, elytris griseis; maculis duabus albis; posteriori majori communi.

60. *Coryli*, der *englische Haselmußkäfer*.

*Fabrit.* S. E. p. 148. No. 110.

Brevirostris; cinereo-fuscoque varius; elytrorum futura dimidiata, atra.

61. *Lunatus*, der *englische Schwarzmond*.

*Fabrit.* S. E. p. 148. No. 112.

Brevirostris; coleoptris elevato-striatis, fascia semi-circulari maculaque postica albis; lunula nigra.

62. *Trifinis*, der *Trauerkäfer*.

*Fabrit.* S. E. p. 149. No. 117.

Brevirostris, niger, elytris striatis cinereis.

63. *Ad.*

63. *Adspersus*, der neuholändische besprengte Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 149. No. 118.

*Brevirostris*, ater; *elytris* postice albo-maculatis.

64. *Punctatus*, der schwedische Punktrüßselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 119.

*Brevirostris*, fuscus; *elytris* punctis holoericis elevatis, margineque flavo.

65. *Obscurus*, der schwedische dunkelrostfarbige Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 120.

*Brevirostris*, ovatus, ferrugineo-fuscus.

66. *Niger*, der schwarze deutsche Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 121.

*Brevirostris*, ovatus, *niger*, scaber, pedibus rufis.

67. *Variofus*, der sächsische Blatterkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 122.

*Brevirostris*, *niger*; thorace carinato *varioloso*; *elytris* striatis.

68. *Valgus*, der amerikanische sperrbeinige Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 123.

*Brevirostris*, ater, nitens; *elytris* punctato-striatis; *femoribus* annulo cinereo.

69. *Rohrii*, der amerikanische Rohrische Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 151. No. 126.

*Brevirostris*; *elytris* acuminatis griseis; *margine baseos* flavescente.

70. *Latirostris*, der sächsische Breitrusself.

*Fabric.* S. E. p. 151. No. 128.

Brevirostris; rostro latissimo; explanato; *elytris* apice albis, punctis duobus nigris.

71. *Vitulus*, das Feuerländische Kalb.

*Fabric.* S. E. p. 152. No. 131.

Brevirostris, niger; fronte bidentato; *elytris* vni-spinosis.

72. *Acuminatus*, der neuseeländische Spitzflügel.

*Fabric.* S. E. p. 152. No. 132.

Brevirostris, cylindricus, fuscus, *elytris* apice acuminatis.

73. *Cultratus*, der neuholländische zweyhöckrige Brustschild.

*Fabric.* S. E. p. 153. No. 136.

Brevirostris; thorace tuberculis duobus compressis; *elytris* tuberculatis, postice cinereis.

74. *Tribulus*, der neuholländische Dornträger.

*Fabric.* S. E. p. 153. No. 138.

Brevirostris, cinereus; thorace scabro; antice impresso; *elytris* spinosis.

75. *4-dens*, der neuholländische Vierzahn.

*Fabric.* S. E. p. 153. No. 139.

Brevirostris, cinereus; thorace scabro; *elytris* spinosis; spinis quatuor posticis longioribus.

76. *Clavus*, der neuholländische Keulrusself.

*Fabric.* S. E. p. 154. No. 140.

Brevirostris, albicans; thorace canaliculato; *coleoptris* spinosis; lineolis tribus baseos rubris.

77. No-

77. *Nodulosus*, der *kapensische knotige Rüsselkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 154. No. 141.

Brevirostris; thorace lineis sex nodulosis; elytris spinosis.

78. *Ocellatus*, der *madagaskarische äugigste Rüsselkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 154. No. 143.

Brevirostris; thorace spinoso, antice excavato; elytris cinereis, punctis atris subspinosis.

79. *Obesus*, der *kapensische Dickbauch*.

*Fabric.* App. S. E. p. 822.

Brevirostris, ater; thorace spinoso; inaequali, elytris rubris, punctis nigris confertis.

80. *Rubifer*, der *kapensische Rothdorn*.

*Fabric.* S. E. App. p. 822.

Brevirostris, cinereus; thorace scabro; elytris spinis elevatis sanguineis.

81. *Globifer*, der *kapensische Kugelträger*.

*Fabric.* S. E. App. p. 823.

Brevirostris; thorace scabro; elytris spinosis, postice acuminato.

82. *Transverso-fasciatus*, die *Queerstreife*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 280. *Curc.* 7. Le Charançon à deux bandes transverses.

Nigro-fuscus; thorace vtrinque fascia longitudinali; elytris dupli transversa cinerea.

83. *Striato-punctatus*, die Punktſtreife.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 281. Curr. 9. Le Charan-*  
*son brodé.*

Niger; thorace punctato; elytris alternatim striatis  
 et punctatis.

84. *Sulcatus*, der *Geoffroische gefurchte Rüssel-*  
*käfer.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 282. Curr. 11. Le Charan-*  
*son noir à sillons.*

Oblongus, totus niger; thorace punctato; elytris  
 fulcatis.

85. *Cupreo-squamosus*, die Kupferschuppe.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 284. Curr. 14. Le Charan-*  
*son écailléux à bandes.*

Rostro thorace breviore; squamis nitentibus; tho-  
 racis elytrorumque fasciis longitudinalibus.

86. *Griseus*, der *Geoffroische graulichte Rüssel-*  
*käfer.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 284. Curr. 15. Le Charan-*  
*son grisette.*

Rufus, subvillosum; capite nigricante; rostro tho-  
 race breviore.

87. *Viridi-sericeus*, der grünsammetne Rüsselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 284. Curr. 16. Le Charan-*  
*son satin-vert.*

Coeruleo-viridis nitens; thorace punctato; elytris  
 striatis.

*Petiv. Gazoph. p. 77. No. 6.*

88. *Dolorosus*, der *Trauermantel*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 285. Curc. 17. La Pleureuse.*

*Oblongus, niger, abdomine squamoso, lateribus albis.*

89. *Quadratus*, der *Vierfleck.\**)

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 287. Curc. 21. Le Charan-  
son quadrille à courte trompe.*

*Cinereus, elytrorum puncto quadruplici nigricante;  
proboscide thorace breviore.*

90. *Griseo-sericeus*, das *graufämmige Rüsselkä-  
ferchen*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 288. Curc. 23. Le Charan-  
son satin-gris.*

*Niger, ovatus, striatus, totus villoso-cinereus;  
thorace inermi.*

91. *Thorace-spinosus*, der *Dornschild*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 288. Curc. 24. Le Charan-  
son à corcelet épineux.*

*Ovatus, nigro-cinereus; thorace vtrinque denti-  
culato.*

92. *Albo-fasciatus*, der *weißgestreifte Rüsselkäfer*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 288. Curc. 25. Le Charan-  
son à bandes blanches.*

*Subrotundus, niger, squamosus, elytris striatis;  
thorace vtrinque aculeato, lateribus lineaque media  
albis.*

93. *Nigro-*

\*) v. *Linn. Curc. 4-macul. No. 29.*

93. *Nigro-striatus*, der *schwarzgestreifte Rüsselkäfer*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 289. Curr. 26. Le Charançon noir strié.*

*Subglobosus, cinereo-ater, striatus; proboscide thoracis longitudine.*

94. *Transverse-albo-fasciatus*, die *weiße Queerstreife*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 289. Curr. 27. Le Charançon roux à bande transversale blanche.*

*Globosus rufus; elytris striatis; fascia transversa alba.*

95. *Niger, transverse-albo-striatus*, der *schwarze Rüsselkäfer mit der weißen Queerstreife*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 289. Curr. 28. Le Charançon noir à bande transversale blanche.*

*Globosus niger; elytris striatis, fascia transversa alba.*

96. *Muricatus*, das *Geoffroische Mause-Rüsselküferchen*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 290. Curr. 29. Le Charançon souris.*

*Subvilleo-murinus; scutello albicante.*

97. *Spinosus*, der *Geoffroische Dornträger*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 290. Curr. 30. Le Charançon à côtes épineuses.*

*Totus fuscus spinosus; elytris striis elevatis villoso-spinosis.*

98. *Striato-denticulatus*, der *Rüsselkäfer mit gezählten Streifen*.

*Geoffr.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 290. *Curc. 31.* Le Charan-  
son noir à côtes.

Niger; scutello albicante; elytrorum striis vtrinque  
denticulatis.

99. *Marmoratus*, der marmorirte Rüsselkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 291. *Curc. 33.* Le Charan-  
son marbré à bandes.

Lividus; coleopiris fasciis plurimis obscuris.

100. *Atro-apterus*, der schwarze ungeflügelte Rüs-  
selkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 243. No. 29. t. 7. f. 22.  
*Charanson non-ailé noir.*

Brevirostris; antennis fractis; femoribus muticis;  
corpore oblongo nigro nitido laevi.

101. *Griseo-punctatus*, der Graupunkt.

de Geer Inf. Tom. V. p. 244. No. 30. *Charanson*  
*brun tacheté de gris.*

Brevirostris; antennis fractis; femoribus muticis;  
corpore subgloboso rufo-fusco, punctis flavo-griseis;  
elytris carinatis.

102. *Flavipes*, der Geerische Gelbfuß.

de Geer Inf. Tom. V. p. 245. No. 31. *Charanson*  
*vert à pattes jaunes.*

Brevirostris; antennis flavis fractis; femoribus mu-  
ticis; corpore oblongo viridi nitido; pedibus flavis.

103. *Capitatus*, der Breitkopf.

de Geer Inf. Tom. V. p. 245. No. 32. *Charanson*  
*gris à large tête.*

Brevi-

*Brevirostris; antennis fractis fuscis; femoribus muticis; capite lato; corpore subgloboso griseo-cinereo; pedibus fuscis.*

104. *Tereticollis*, der *Rundhals*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 246. No. 33. *Charanson gris à tête cylindrique.*

*Brevirostris; antennis fractis, pedibusque rufis; femoribus muticis; capite cylindrico; corpore oblongo griseo-cinereo.*

105. *Fasciculatus*, der *surinamische Bürsten-Rüsselkäfer*.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 276. No. 10. t. 16. f. 2. *Charanson à brosse.*

*Brevirostris; antennis longis rectis; corpore ovato fusco; fasciculis pilosis griseis.*

203. G E S C H L E C H T. *Attelabus; Afterrüsselkäfer.* \*)

Müllers Linn. Naturf. 5. B. 1. Th. S. 243. *Bastard-rüsselkäfer.* Holl. Bastard-Olyphantjes.

Börners Samml. 1. Th. S. 470. *Bienenkäfer.*

Eberhards Thiergesch. S. 195. *Schildkrötenkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der Nat. H. S. 92. *Afterrüsselkäfer.*

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 11. *Afterrüsselkäfer.*

Sulzers Kennz. S. 60. *Afterrüsselkäfer; Bienen gast.*

— — Gesch. S. 40. *Afterrüsselkäfer. Le Becmare.*

Catholicon A. p. 596. *Afterrüsselkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. II. p. 44-48. \*\*)

Bom.

\*) Des Geoffr. *Attelabus* ist Linn. *Hister*, aber des Linn. *Attelabi* sind einige vom *Rhinom*, und *Clerus* des Geoffroi.

\*\*) In diesem Artikel herrscht noch daselbst grosse Verwirrung, die

Bom. Dicht. des Anim. X. p. 290.

\*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 273. *Rhinom.* 10. II. p. 303.  
*Clerus;* le *Clairon.*

de Geer Inf. Tom. IV. prélim. P. I. 39. *Colliuris;*  
*Colliure.* VIII. 50. L' *Attelabe;* *Attelabus.* X. 61. le  
*Clairon;* Tom. IV. p. 79. des *Colliures.* p. 347. des  
*Attelabes.* Tom. V. p. 156. des *Clairons.\**)

Fabric. S. E. pag. 156. *Attelabus.* pag. 157. *Clerus.*  
p. 158. *Notoxus.* p. 159. *Spondylis.*

Scop. Entom. carn. p. 35. *Attelabus.*

Müller. Faun. Fridr. p. 12.

— — Zool. Dan. Prodri. p. 91. 95.

Pontopp. N. G. v. D. p. 205.

Gleditsch Forstwiss. II. Th. pag. 1509. N. 4. *After-  
rüsselkäfer.*

1. *Coryli,* der *Afterrüsselkäfer auf den Haseln.*

Müllers Linn. Natursl. 5. Th. 1. B. S. 243. No. 1. t. 4.  
f. 18. der *Rollendreher.*

Füesslins Verz. S. 11. No. 219. der *Rollenwickler.*

Sulzers Kennz. S. 10. t. 4. f. 25. der *Afterrüsselkä-  
fer in den Haselnussblättern.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 205. No. 1. t. 16.

Linn. Reis. durch Oel. Uebersl. S. 168.

Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 571. No. 12. der *schwar-  
ze Afterrüsselkäfer mit rothen Flügeldecken und lan-  
gem Hinterkopfe.*

### Catho-

die ich bey den Chrysomelen einigermassen habe in Ordnung  
zu bringen gesucht.

Bey den Alten hieß das wahre herumwandelnde Puppchen  
der Heuschrecke *Attelabus.* S. Swammerd. B. der N. S. 91.  
Jonston Hist. Nat. Inf. p. 191.

\*) Der Herr von Geer hat einige *Tenebriones* Linn. unter seine  
*Attelabos* gerechnet.

*Catholicon* A. p. 596. der schwarze Afterrüsselkäfer  
der Haselnussstaude mit rothen Flügeldecken.

*Müller* Faun. Fridr. p. 12. No. 119.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1019.

*RHINOMACER Coryli*; thorace elytrisque rubris.

*Pontopp.* Atl. Dan. I. t. 1.

*Schaeff.* Icon. t. 75. f. 8.

*Attia Vpsal.* 1736. p. 19. No. 4. *Necydalis rubra*;  
*capite minimo nigro.*

*Scop.* Ent. carn. No. 71. *CVRCVLI O collaris.* \*)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 273. *Rhinom.* II. La tête  
écorchée.

Niger; thorace, elytrisque rubris; capite pone  
elongato. \*\*)

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 257. No. 46. t. 8. f. 3. *Charançon tête écorchée rouge.* \*\*)

*CVRCVLI O (excoriato-ruber) brevirostris; anten-*  
*nis rectis; corpore brevi subquadrato nigro; elytris*  
*rubris; capite ovato postice attenuato.*

*Fabric.* S. E. p. 156. No. 1. Niger, elytris rufis,  
reticulatis.

## 2. *Avellanae*, der Nussbeisser.

*Müller* l. c. S. 244. No. 2.

*Füesslins* Verz. S. 11. No. 220. der Nussbeisser.

*Catholicon* A. p. 596. der schwarze Afterrüsselkäfer  
der Haselnussstaude mit rothen Flügeldecken, Brust-  
schild und Füssen.

*Fabric.*

\*) Dieses Citatum hat *Fabric.* zu dem folgenden Att. *Avellanae*  
gesetzt, den er für eine blosse Varietät des *Coryli* hält, wie  
auch diesen *Geoffroischen Rhinomacer*.

\*\*) Das Schaeffersche Citatum des *Geers* Icon. t. 56. f. 5. 6. ge-  
hört nach des *Müllers* Zool. No. 1020. zu dem Attel. *Avellanae*.

Fabric. S. E. p. 157. B. \*)

Müller i Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1020. Niger,  
thorace; elytris femoribusque rubris.

Schaeff. Icon. t. 56. f. 5. 6.

3. *Curculionoïdes*, der kleine Nussbeisser.

Müller l. c. S. 244. No. 3. der Zwerghästard.

Fließlins Verz. S. 11. No. 221. der Zwerghästard.

Sulzers Gesch. S. 41. t. 4. f. 12. der kleine Nuss.  
beisser.

Catholicon A. p. 596. der dem Rüsselkäfer gleichen-  
de Afterrüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 157. No. 2. Niger, elytris striatis  
thoraceque rubris.

Scop. Ent. carn. Nö. 72. C V R C. nitens.

Schaeff. Icon. t. 75. f. 8.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 273. Rhinom. 10. Le Bec-  
mare laque.

Niger, thorate elytrisque rubris proboscide longi-  
tudine capitisi.

4. *Surinamensis*, der surinamische Afterrüsselkäfer  
mit gezähnelten Flügeldecken.

Müller l. c. S. 244. No. 4. der Zahnsflügel.

Catholicon A. p. 596. der surinamische A. R. K. mit  
braungestreiften zweymal gezackten Flügeldecken.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 80. t. 17. f. 16. Colliure  
de Surinam.\*\*)

COLLIVRIS (*Surinamensis*) fusca, thorace subu-  
lato longissimo arcuato; elytris striatis apice bidenta-  
tis; pedibus ferrugineis.

5. *Pen-*

\*) S. die Anmerkungen bey Nö. 1.

\*\*) Er gleicht der *Raphidia* vollkommen, nur hat er harte Flügel-  
decken.

5. *Pensylvanicus*, der *pensylvanische Afterrüsselkäfer mit rothen breit-schwarzgestreiften Flügeldecken.*\*)

*Müller* l. c. S. 245. No. 5. der *Pensylvanier.*

*Catholicon* A. p. 596.

6. *Melanurus*, der *Schwarzschwanz.*\*\*) )

*Müller* l. c. S. 245. No. 6.

*Catholicon* A. p. 596. der *schwarzgeschwänzte Afterrüsselkäfer.*

7. *Betulae*, der *Birkenafterrüsselkäfer.* †)

*Müller* l. c. S. 245. No. 7. der *Blattkräusler.*

*Gleditsch* Forstw. I. Th. S. 552. No. 13. der *schwarze springende Afterrüsselkäfer der Birke.*

*Catholicon* A. p. 596. der *Afterrüsselkäfer der Birke mit Springfüssen.*

*Fabric.* S. E. p. 157. No. 3. *Ater, pedibus saltatoriis.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 12. No. 120.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. N. 1021. *Totus niger.*

*de Geer* Ins. Tom. V. p. 259. No. 47. *Charanson tête ecorchée noir.*

*CVRCVLIO* (*excoriato-niger*) *brevirostris; antennis rectis; corpore brevi subquadrato nigro nitido; capite ovato postice attenuato; femoribus posticis maximis.*

8. *Formicarius*, der *ameisenförmige Speckküfer-Jäger.*

*Müller* l. c. S. 246. No. 8. der *Jäger.*

*Füesslins*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Füesslins Verz. S. II. No. 223. der Jäger.

Fonston hist. nat. Inf. t. 15. *Scarabaeus minor* 69.  
(ultimo.)

Raj. Inf. p. 103. No. 29. *Cantharis* 29.

Fabric. S. E. p. 157. *Clerus* 2.

*Elytris fascia duplice alba basique rubris.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 12. No. 121.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1077.

Niger; thorace abdome, elytrorumque basi rubra;  
dorso fasciis binis albis.

Schaeff. Icon. t. 186. f. 4. *Cleroïdes*.

Catholicon A. p. 596. der Ameisen- Afterrißselkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 160. No. 3. t. 5. f. 8. *Clai-  
ron fourmi*.

CLERVS (*formicarius*) niger; thorace elytris an-  
tice abdomeque rubris; elytris fasciis binis albis.

Poda Mus. graec. p. 31.

9. *Sipylus*, der grüne morgenländische Afterrißsel-  
käfer.\*)

Müller I. c. S. 246. No. 9. der Morgenländer.

Catholicon A. p. 596. der aegyptische Afterrißsel-  
käfer.

Fabric. S. E. p. 158. *Clerus* 3.

10. *Apiarius*, der Bienenfeind.

Müller I. c. S. 246. No. 10. t. 4. f. 19. der Bienen-  
fresser.

Füesslins Verz. S. II. No. 224. der Bienenfresser.

Sulzers Kennz. t. 4. f. 25. b. der bläuliche After-  
rißselkäfer mit rothen Flügeldecken.

— — Gesch. S. 42. t. 4. f. 14. der Bienenfresser.

Dd 2 Taubens

\*) Nicht abgebildet.

- Taubens* Nat. Gesch. von Zelle II. Th. S. 104.  
*Pontopp.* N. G. v. D. S. 205. No. 3.  
*Grünitz* Bienengesch. S. 303. No. 8. *Bienenwolf*;  
*Rankmade*; der *Rieht*- oder *Rehwurm*.  
*Börners* Samml. I. Th. S. 470. *Bienenkäfer*.  
*Beckmannus* phys. oek. Bibl. I. Th. S. 133. *Immenwolf*.  
*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 219. der *den Bienen feindselige Afterrüsselkäfer*; *Attelabus apicaster*.  
*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 44. die *kleine Heuschrecke*.  
*Schaeff.* Mauerbiene 1764. S. 22. 23. 37. t. 5. f. 10.  
der *Bienenfresser*.  
— — Elem. t. 46. *Clerus*, *Bienenkäfer*.  
— — Icon. t. 48. f. II.  
*Catholicon* A. p. 386. *Bienenkäfer*.  
— — — p. 596. der *Bienenafterrüsselkäfer*.  
*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1076.  
*Fabric.* S. E. p. 158. *Clerus* 4.  
*Elytris rubris*; *fasciis tribus coerulescentibus*.  
*Scop.* Entom. carn. No. 35.  
*Atro-coeruleus*, *villosum*; *elytris rubris*, *apice fasciisque binis atris*.  
*Poda* Mus. graec. p. 31.  
*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 304. *Clerus* 1. t. 5. f. 4. *Le Clairon à bandes rouges*.  
*Nigro-violaceus*, *hirsutus*; *elytris fascia triplici coccinea*.  
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 157. No. 1. t. 5. f. 3. *Clairon apivore*.  
*Coeruleo-violaceus*; *elytris rubris*, *fasciis tribus transversis violaceis*.  
II. *Mollis*, der *weichschaaliche* *Afterrüsselkäfer*.  
*Müller* l. c. S. 247. No. II. der *Sammetrock*.  
*Catholicon* A. p. 596. der *weiche grauliche* *Afterrüsselkäfer*.

*Fabric.*

Fabric. S. E. p. 158. *Notoxus* 1.

Pubescens; *elytris nigris, fasciis tribus pallidis.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1078. Flavicans; *thorace fasciisque elytrorum duabus fuscis.*

Schaeff. Icon. t. 60. f. 2.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 305. *Clerus* 3. Le Clairon porte-croix.

Fuscus, villosus; *elytris flavis, cruce fusca.*

de Geer Inf. Tom. V. p. 159. No. 2. t. 5. f. 6. Clairon à bandes brunes.

*Clerus (fusco-fasciatus); elytris flavo-griseis; fasciis duabus transversis fuscis, abdomine rubro.*

12. *Ceramboïdes*, der holzbockartige Afterrißselkäfer.

Müller l. c. S. 247. No. 12. der Schwammkäfer.

Catholicon A. p. 596. der holzbockartige Afterrißselkäfer.

Fabric. S. E. p. 159. *Spondylis* 2.

Atra; *elytris rugosis; thorace latioribus.*

de Geer Inf. Tom. V. p. 32. No. 2. t. 2. f. 1. *Tenebrion à étruis variolés.*

*TENEBRIO (variolosus) alatus ater; elytris rugosis.*

13. *Buprestoides*, der stinkkäferartige Afterrißselkäfer.

Müller l. c. S. 248. t. 4. f. 20. der Dickhals.

Frisch Inf. 13. Th. S. 23. t. 19. der dickhalsige Holzkäfer.

Catholicon A. p. 596. der stinkkäferartige Afterrißselkäfer.

Fabric. S. E. p. 159. *Spondylis* 1.

Müller Faun. Fridr. p. 12. No. 122.

*Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 44. der schwarze Stink-käfer.* p. 353. *Buprestis ater.*

*Acta Vpsal. 1736. p. 19. No. 2.*

*de Geer Ins. Tom. V. p. 84. No. 21. t. 3. f. 21. Capricorne à grandes dents.*

C E R V M B Y X (*maxillosus*) niger, *thorace* mutico subgloboso; *antennis* longitudine thoracis; articulis compressis; *dentibus* maximum prominentibus.

### *Unabgebildete Attelabi.*

1. No. 5. *Pensylvanicus.*
2. No. 6. *Melanurus.*
3. No. 7. *Betulae.*
4. No. 9. *Sylvae.*

### *Neue Arten dieses Geschlechts.*

1. *Formicarius minor*, der kleine Jäger.\*)

Füesslins Verz. S. II. No. 222.

Sulzers Gesch. S. 42. t. 4. f. 13. b.

Niger; *antennis* clavatis; articulis cordiformibus; *thorace* atro, ab *abdomine* remoto. *Elytra* striata, apice rubra, *fascia* alba.

2. *Polymorphus*, der in seinen Zeichnungen veränderliche Aßterrüsselkäfer an der Wolga.

Pallas Reisen. I. Th. Anh. No. 44. Ausz. I. S. 13. No. 44.

Totus ater, lanugine nigra pubescens; *elytra* subcompressa, rotundata, flexilia.

Müllers Suppl. B. S. 234. No. 15. der Unbestand.

3. *Bima-*

\*) S. No. 8. *Linn.*

3. *Bimaculatus*, der *Zweyfleck*.*Pallas* Reis. I. Th. Anh. No. 45. *Ausz.* S. 14. No. 45.Toton e nigro - cyaneus, nitidissimus, fuscaque lanugine pubescens; in floribus *Euphorbiae*.*Müllers Suppl.* B. S. 235. No. 16.4. *Senex*, der *Altvater*.*Pallas* Reis. II. Th. Anh. No. 48.Magnitudo infra *Attel. formicar.* totus aterrimus.*Müllers Suppl.* B. S. 234. No. 14.5. *Mutillarius*, der *mutillenartige Afterrüsselkäfer*  
bey Halle in Sachsen.*Fabric.* S. E. p. 157. *Clerus* I.Niger; *elytris* fascia triplici alba.6. *5-punctatus*, der *Skopolische Fünfpunkt*.*Scop.* Entom. carn. p. 36. No. 114.Niger; *thorace* fulvo; *elytris* pallidioribus; *punctis* 5, uno communi et inajore.7. *14-punctatus*, der *Skopolische Vierzehnpunkt*.*Scop.* Entom. carn. p. 37. No. 116. \*)Thorax fulvus, punctis tribus nigris; *elytrum* pallidius punctis septem, uno in apice sito.8. *Hungaricus*, der *ungarische Skopolische Afterrüsselkäfer*.*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 92. No. 46.Niger, *thorace* hirsuto; *elytro* singulo fasciis duabus flavis, punctisque totidem flavis, uno ad basin, uno ad apicem.

Dd 4

9. *Niger*,\*) *Skopoli* hat verschiedene *Linnéische Chrysomelen* unter seine *Attelabos* gerechnet.

9. *Niger*, der ganz schwarze sammetartige Afterrüsselkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 305. *Clerus* 4. Le Clairon satiné.

*Clerus niger subovatus*, villis cinereis.

de Geer Inf. Tom. V. p. 164. No. 5. *Clairon noir*.

*CLERVS (niger) oblongus*.

10. *Glaber*, der Geerische glatte Afterrüsselkäfer.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 351. No. 2. t. 19. f. 14.  
*Attelabe lisse*.

*Fusco-castaneus*, nitidissimus, *elytris glabris*; maxillis magnis arcuatis.

11. *Rufipes*, der surinamische Rothfuss.

de Geer Inf. Tom. V. p. 165. No. 1. t. 15. f. 4. *Clairon à pattes rousses*.

*Oblongus*, nigro-coeruleus nitidus; antennarum basi, pedibusque flavo-rufis.

12. *Formicaroides*, der rothleibige Afterrüsselkäfer.

P. Schrank Beytr. zur N. G. S. 65. §. 8.

*Thorace elytrisque nigris*; *elytris fascia rubra albaque*.

204. G E S C H L E C H T. *Cerambyx*; *Bockkäfer*;  
*Holzbock*; *holl. Bock-Torren.* \*)

Müllers

\*) Ob die Larve der wahre Cossus der Alten, ist wohl nicht auszumachen, da von andern die Holzraupe, der Weidenbohrer, (Phalaena Cossus); von andern die Larve des Lucan. *Cervus* u. s. w. dafür gehalten wird. S. Swammerdams B. der N. S. 132. Den Larven der Holzwürmer schreibt Rösel aus Erfahrung das unähnliche Picken in den Wänden zu. S. 2. B. Erdk. 2. Kl. S. 9. 10.

Müllers Linn. Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 249. *Bockkäfer.*

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 12. *Bockkäfer.*

Sulzers Kennz. der Inf. S. 61. *Holzkäfer; Steinbock; Hirsch; Bisanthäfer.*

— — Gesch. der Inf. S. 42. der *Bockkäfer.*

Hanovs Seltenheiten der Natur I. B. S. 339. *langhörnige Maykäfer.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 205. *Holzbock. dän. Tömermann (Zimmermann).*

Gleditsch Einl. in die Forstwiss. II. Th. S. 1509. der *Holzkäfer, oder der eigentliche Holzwurm.*

Röfels Insektenbel. 2. R. Erdk. 2. Kl. Vorb. pag. 3. *Holzböcke, oder Holzkäfer.*

Börners Samml. I. Th. S. 470. *Holzbock.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 96. der *Holzbock oder Bisanthäfer.*

Eberhards Thiergeesch. S. 198. der *Holzkäfer.*

Lessers Theologie der Insekten S. 308. der *Geiger; Lierdräner; Scar. Lyricen.*

Swammerd. R. der N. S. 119. *fliegende Böcke und Ziegen.*

Frisch Inf. V. Th. S. 5. *Holzkäfer; Geiger.*

Neuer Schauplatz der Natur. S. 883. *Bockkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. II. p. 604. *Capricornus; p. 754. Cerambyx; der Holzbock; der Holzkäfer.*

Catholicon C. p. 83. *Steinbockkäfer; Holzbock; Bisanthäfer; Fliegenkäfer.*

Commentar. Lipf. Dec. I. Vol. III. pag. 69. Vol. V. p. 534. 606.

Bomar. Dict. des Anim. II. 364.

Imperat. hist. nat. p. 922. 923. Scar. *Taurus.*

Jonston hist. nat. Inf. p. 91. t. 15. *Capricornus; Agocerus; Cerambylus; Quicius.*

Scop. Entom. carn. p. 50.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 94.

*Müller* Faun. Fridr. p. 12.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. 92.

*Fabric.* S. E. pag. 159. *Prionus.* p. 164. *Cerambyx,* pag. 170. *Lamia.* p. 178. *Stenocorus.* p. 182. *Calopus.* ibid. *Rhagium.* p. 184. *Saperda.* p. 187. *Callidium.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 198. *Prionus.* p. 221. *Stenocorus;* le *Stencore.* p. 199. *Cerambyx;* le *Capricorne.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. prélim. IX. 58. Le *Capricorne;* *Cerambyx.* Tom. V. p. 55. des *Capricornes.*

I. Bockkäfer, deren Bruststück zur Seiten mit beweglichen Dornen besetzt ist.

1. *Longimanus*, die amerikanische Langhand.\*)

*Müller* l. c. S. 251. No. 1. der *Langhand.*

*Röfels* Infektenb. 2. B. Erdk. 2. Kl. Vorb. S. II. t. 1. f. a.

*Sulzers* Gesch. S. 44. t. 5. f. 1. der *Langhandbock.*

*Aubent.* Miseill. t. 64. f. 1.

*Fabric.* S. E. p. 159. *Prionus* I.

*Grew* Mus. 161. t. 13. *Nocoonaca.*

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 94. No. 52. *Pedes anticī* corpore longiores; *caput, thorax, elytra nigra lineis* curvis rubris albisque variegata.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 102. No. 6. *Capricorne à longues mains.*

*Thorace spinoso; pedibus anticis longissimis; elytris* basi vnidentatis apiceque bidentatis, *antennis longissimis.*

2. *Trochlearis*, der ostindianische Scheibenbock.\*)

*Müller* l. c. S. 252. No. 2. der *Scheibenbock.*

II. Bock-

\*) Diesen giebt Schenckzer in seiner Phys. sacr. für eine Heuschrecke aus. S. *Röfels* Heuschr. und Grill. Samml. 2. Band. Vorb. pag. 19.

\*\*) Nicht abgebildet.

II. Bockkäfer, deren Bruststück zur Seiten nur einen gezähnelten Rand hat.

3. *Cervicornis*, der amerikanische Hirschbock.

Müller l. c. S. 252. No. 3. t. 5. f. 1. der *Hirschbock*.

Röfels Insektenbel. 2. B. Vorb. Erdk. 2. Kl. S. 12. t. 1. f. b. der *berbycenische Holzkäfer aus einer holländischen Kolonie in Amerika*.

Aubent. Miscell. t. 90. f. 3.

Fabric. S. E. p. 161. *Prionus* 6.

*Thorace marginato, vtrinque tridentato, maxillis porrectis, extus vniispinosis, antennis brevibus.*

de Geer Inf. Tom. V. p. 94. No. 1.

*Fasciis longitudinalibus vndulatis ferrugineis; thorace depresso dentato; maxillis porrectis corniformibus dentatis; antennis brevibus.*

4. *Armillatus*, der indianische Ringelfuß.

Müller l. c. S. 253. No. 4. der *Ringelfuß*,

Fabric. S. E. p. 162. *Prionus* 9.

5. *Imbricornis*, das Schuppenhorn.

Müller l. c. S. 253. No. 5.

Röfels 2. B. Erdk. 2. Kl. S. 15. t. 1. f. 1. der aus dem Eichbaum, oder anderem harten Holz entspringende schwarzbraune Holzkäfer. \*)

6. *Faber*, der Zinnumermann.

Müller l. c. S. 254. No. 6.

Frisch Inf. 13. Th. S. 23. t. 18. der braunflügliche mittlere Holzkäfer. \*\*)

Schaeff. Icon. t. 72. f. 3.

7. *Coria-*

\*) Das Männchen von No. 7. *Coriarius*.

\*\*) Forte sagt der Ritter in der Faun. Suec. ed. 2. No. 646.

7. *Coriarius*, der *Gerber*.

Müller l. c. S. 254. No. 7.

Fließlins Verz. S. 12. No. 225. der *Gerwer*.Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 551. No. 11. der *schwarze* oder *dunkelgräue Birkenrindenkäfer*.

Röfels 2. B. Erdk. 2. Kl. t. 1. f. 2.\*)

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 759. der *schwarze Holzbock mit grossen gelenksamen und zurückgebogenen Fühlhörnern*: der *allergröste Holzbock mit einer platten Brust und dreyen Dornen an derselben*.Frisch Inf. XIII. Th. S. 15. t. 9. der *sägehörnige schwarze Holzkäfer*.Raj. Inf. 95. *Cerambyx maxima*, cornubus magnis articulatis et reflexis.Schaeff. Elem. t. 103. *Prionus*, der *Sägenholzkäfer*.

— — Icon. t. 67. f. 3. (nach Fließlin.)

— — — t. 9. f. 1. (nach Müllers Zool.)

Fabric. S. E. p. 161. *Prionus* 7.Müller Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 802. *Prionus piceus*; *thorace vtrinque tridentato*.Geoffr. Inf. Tom. I. p. 198. *Prionus* 1. t. 3. f. 5. Le Brione.de Geer Inf. Tom. V. p. 59. No. 1. t. 3. f. 5. *Capricorne prione*.Cerambyx (*Prionus*) fusco-castaneus obscurus nitidus, *thorace depresso dentato*, *corpo lato*, *antennis brevioribus*.8. *Melanopus*, der *karolinische Schwarzfuss*.\*\*)

Müller

\*) Das *Weibchen* von No. 5. *Imbricornis*.\*\*) Da Linné hieraus in seiner Mantissa p. 532. eine ganz neue Art gemacht; der Herr de Geer aber bey diesem *Melanopus* alle daselbst befindliche Citata, selbst den *Druy* angeführt hat;

Müller I. c. S. 254. No. 8. der Schwarzfuss.

— — Suppl. B. S. 237. 17. a. der Hirschgeweihbock.

Linn. Mantiss. p. 532. *Ceramb. damicornis*.

Brown Jain. 429. t. 44. f. 8. *Lucanus fuscus maximus*.

Fabric. S. E. p. 162. *Prionus 10.*

*Cerambyx damicornis*; thorace marginato, denticulato; maxillis porrectis, bidentatis; antennis brevibus.

Drury Inf. I. p. 85. 86. t. 38. f. 1. Le Makoko Scarabé; the Makoko-Beetle.\*)

de Geer Inf. Tom. V. pag. 97. No. 2. Capricorne à corne de daim.

*Cerambyx (damicornis) castaneus*; thorace depresso ferrato, maxillis porrectis intus villosis apice tridentatis; antennis brevibus.

9. *Thomae*, der Holzbock von der Thomasinsel.\*\*) )

Müller I. c. S. 255. No. 9. der Thomasbock.

Fabric. S. E. p. 162. *Prionus 12.*

Thorace inmarginato, crenulato, corpore nigro; elytris glabris ferrugineis; margine luteo.

10. *Cinnamomeus*, der Zimmetbock.

Müller I. c. S. 255. No. 10.

Sulzers Gesch. S. 44. t. 5. f. 2. der Zimmetbock.

Fabric.

hat; so wollen wir denselben folgen, und dies merkwürdige Insekt, dessen wir schon bey der ersten Numer der neuen Schröterarten unter dem Namen *Lucanus fuscus maximus* gedacht haben, mit diesem Menalopius für einerley halten.

\*) Die Larve ist bey den Amerikanern eine grosse Delikatesse.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Fabrit. S. E. p. 163. Prionus 16.*

*Thorace marginato, denticulato, maxillis porrectis tridentatis.*

*Drury Inf. Tom. I. t. 40. f. 2.*

11. *Festivus*, der *Staatsbock*.

*Müller l. c. S. 256. No. 11. der Tressenbock.*

*Fabrit. S. E. p. 179. Stenocorus 4.*

*Drury Inf. Tom. I. t. 37. f. 5.*

*de Geer Inf. Tom. V. p. 100. No. 4. t. 13. f. 14. Capricorne épineux.*

*Cerambyx (spinosus); thorace depresso rufo, vtrinque bidentato, fasciis longitudinalibus quinque nigris; elytris bidentatis viridibus; linea lutea.*

12. *Dapsarius*, der *schwedische Pechbock*.\*)

*Müller l. c. S. 257. No. 12. der Pechbock.*

13. *Atratus*, der *zeylonische schwarze Holzbock*.

*Müller l. c. S. 257. No. 13. der Zingaleser.*

14. *Lineatus*, der *jamaische lineirte Holzbock*.

*Müller l. c. S. 257. No. 14. der Schleyerschild.*

*Fabrit. S. E. p. 160. Prionus 3.*

*Thorace marginato, crenato, vndentato, niger, albo-vittatus; elytris apice crenato-dentatis.*

15. *Spinibarbis*, der *amerikanische Stachelbart*.

*Müller l. c. S. 258. No. 15. der Stachelbart.*

*Fabrit. S. E. p. 163. Prionus 14.*

*Thorace*

\*.) Nicht abgebildet.

*Thorace marginato, crenato — maxillis tridentatis.*

*Drury* Inf. Tom. I. t. 37. f. 2. t. 38. f. 2. \*)

16. *Bifasciatus*, das *amerikanische doppelte Schwarzband*.

*Müller* l. c. S. 258. No. 16. der *Schwarzband*.

*Fabric.* S. E. p. 162. *Prionus*. II.

17. *Planatus*, der *Plattschild*. \*\*)

*Müller* l. c. S. 258. No. 17.

III. *Bockkäfer mit rundem Brustschild*, welches an den Seiten durch fest sitzende Dornen zugespitzt ist.

18. *Barbicornis*, das *asiatische Barthorn*. †)

*Müller* l. c. S. 258. No. 18. der *Barthorn*.

*Fabric.* S. E. p. 168. *Ceramb.* 18.

19. *Ammiralis*, der *ammiralische Holzbock aus Surinam*. ††)

*Müller* l. c. S. 259. No. 19.

*Schröters Abhandl.* 1. Th. S. 351.

*Neuer Schauplatz der Nat.* 1. B. S. 106.

20. *Batus*, das *ostindianische Klauenhorn*. †††)

*Müller* l. c. S. 259. No. 20. das *Klauenhorn*.

21. *Rubus*,

\*) Den ersten hält *Drury* für eine ähnliche aber doch von diesem *Spinib.* verschiedene Art, den zweiten aber für eben denselben.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

†††) Nicht abgebildet.

21. *Rubus*, das ostindianische Stachelhorn.

*Müller* l. c. S. 259. No. 21. das Stachelhorn.

*Schröters* Abhandl. 1. Th. S. 332. t. 2. f. 2.

(Eine blosse Abänderung des Rubus).

*Fabric.* S. E. p. 177. *Lamia* 29.

*Thorace spinoso*, bimaculato; *elytris* bidentatis; basi scabris mucronatis.

*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 106. No. 7. t. 13. f. 16.  
*Capricorne noir à bande blanche.*

*Cerambyx (albo-fasciatus) niger*; *thorace spinoso*; *antennis* longis aculeatis; *elytris* basi vnidentatis apice bidentatis; maculis quatuor albis.

22. *Araneiformis*, der amerikanische Spinnenbock.

*Müller* l. c. S. 260. No. 22. der Spinnenbock.

*Fabric.* S. E. p. 164. *Ceramb.* 2.

*Sloan.* Jam. II. t. 237. f. 24.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 35. f. 4.

23. *Sentis*, der indianische Dornstrauch.\*)

*Müller* l. c. S. 261. No. 23. der Dornstrauch.

24. *Farinosus*, der westindianische Mehlbock.

*Müller* l. c. S. 261. No. 24. t. 5. f. 2. der Mehlack.

*Fabric.* S. E. p. 168. *Ceramb.* 19.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 31. f. 4.

*Forster* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 39. No. 39. *Cerambyx Chinen sis.*\*\*)

*Thorace spinoso*; ater totus, *elytris* antice scabris punctis paucis albis sparsis, *antennis* longioribus, singulo articulo basi canescente.

*de Geer*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nach dem Drury.

de Geer Inf. Tom. V. p. 108. No. 9. t. 13. f. 17.

Niger; thorace spinoso; elytris maculis rotundatis pilosis flavo-albidis sparsis, abdomine bidentato.

25. *Ferrugineus*, der *indianische Rothbock*.\*)

Müller l. c. S. 261. No. 25. der *Rothbock*.\*\*)

26. *Depressus*, der *ostindianische Platträcken*.

Müller l. c. S. 262. No. 26. t. 5. f. 3. der *Platträcken*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 110. No. 11. t. 14. f. 2. *Capricorne applati*.

*Cerambyx thorace quadrispinoso*; dorso depresso; elytris fulco-nebulosis: antice punctis elevatis; antennis longis.

27. *4-maculatus*, der *amerikanische Vierfleck*.

Müller l. c. S. 262. No. 27. der *Stachelrücken*.

Fabric. S. E. p. 180. *Stenocorus II.*

Drury Inf. Tom. I. t. 37. f. 3.

28. *Glaucus*, der *amerikanische seladongrüne Holzbock*.†)

Müller

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Von dieser Art befinden sich einige in den Kabineten, deren Fühlhörner über *einen halben Schuh* lang sind, und daher von den Holländern *Lang-Spriet* genannt werden.

†) Drury sagt im 2ten Theile p. 57. von einem Bockkäfer t. 31. f. 3. es habe fast den Anschein, als wär' es dieser *Tuberculatus* Linn. allein er setzt hinzu, dass er doch in vielen Stücken, z. B. in der Farbe und den grossen merklichen Stacheln von den Linnéischen abweiche. Und so ist es auch. Daher heisst er auch mit Recht nicht sowohl *Tuberculatus*, als vielmehr *Spinosus*. S. unter den neuen 3. Kl. No. 37.

*Müller* l. c. S. 263. No. 28. der *Seledonbock*.

*Fabric.* S. E. p. 165. *Ceramb.* 5.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. III. No. 13. t. 14. f. 4. *Capricorne à tubercules*.

*Cerambyx (tuberculatus) cinereus; thorace quinque spinoso, elytris spinosis postice vnidentatis latere fasciaque nigris; antennis longioribus.*

### 29. *Nebulosus*, der *Tannenbock*.

*Müller* l. c. S. 263. No. 29.

*Füesslins Verz.* S. 12. No. 226.

*Gleditsch* Forstwiß. I. Th. S. 507. No. 14. der *graue Holzbock*, *Holzkäfer*, oder *Holzwurm*; der *graue Tannenkäfer*.

*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 756. der *graue Holzbock mit schwarzen Punkten, und einem schwarzen Strich auf den Flügeldecken, und anderthalb längern Fühlhörnern als der Leib*.

*Fabric.* S. E. p. 168. *Ceramb.* 20.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 13. No. 124.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1034.

*Cinereus; elytris punctis fasciisque nigris.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 204. *Ceramb.* 7. *Le Capricorne noir marbré de gris.*

*Niger; elytris vellere cinereo marmoratis; antennis pedibusque cinereo intersectis.*

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 71. No. 8. *Capricorne nebulieux.*

*Thorace spinoso; elytris cinereis punctis fasciisque nigris; antennis mediocribus, cinereo nigroque maculatis.*

### 30. *Hispidus*, der *kleine Dornbock*.

*Müller* l. c. S. 263. No. 30. der *Dornbock*.

*Füesslins Verz.* S. 12. No. 228. der *Dornbockkäfer*.

*Frisch*

Frisch Inf. 13. Th. S. 22. t. 16. Einer der *kleinsten Holzböcke*.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 756. der *graue Holzbock mit schwarzen Punkten und einem weissen Strich auf den ausgezackten Flügeldecken und anderthalbmal längern Fühlhörnern als der Leib*.

Fabric. S. E. p. 169. *Ceramb. 21.*

*Thorace spinoso; elytris apice bidentatis; antennis mediocribus hirtis.*

Schaeff. Icon. t. 14. f. 9.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 206. *Ceramb. 9. Le Capricorne à etuis dentelés.*

Ovatus fuscus; *elytris antice cinereis, apice bidentatis.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1035.

Fusco-alboque varius; *thorace tuberculato; elytris postice praemorsis, supra punctis hispidis.*

de Geer Inf. Tom. V. p. 71. No. 9. t. 3. f. 17. *Capricorne à brosses.* \*)

*Cerambyx (fasciculatus) thorace spinoso; elytris fuscis, fascia transversa alba fasciculisque sex nigris; antennis longioribus.*

31. *Desertus*, der *amerikanische Weißstrich.* \*\*).

Müller l. c. S. 263. No. 31.

32. *Succinctus*, der *surinamische Gelbband.* †)

Ee 2 Müller

\*) Der Herr de Geer zweifelt mit Recht, ob dieser Holzbock von der Art sey, die Geoffroi à etuis dentelés mit gezähnelten Flügeldecken beschreibt, indem dieser und acht andere Exemplare seines Kabinets abgestumpfte Flügeldecken hatten.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Bey diesem sowohl als bey No. 63. *Zonarius* hat Linné einerley Citatum, nämlich *Marogr. Bras. 254.* In *Surinam* und *Brasilien* heißt diese Art *Quici*.

*Müller* l. c. S. 264 No. 32. t. 5. f. 4. der *Gelbband*.

*Schröters* Abhandl. I. Th. S. 352.

*Fabric.* S. E. p. 168. *Ceramb.* 16.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 39. f. 2.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 113. No. 14. t. 14. f. 5. *Capricorne à cordon*.

*Fusco-castaneus*; *thorace rugoso quadrispinoso*;  
*elytris fascia transversali flava*; *antennis longioribus*  
*compressis*.

### 33. *Virens*, der *ostindianische Grünling*.

*Müller* l. c. S. 264. No. 33. der *Grünling*.\*)

*Fabric.* S. E. p. 166. *Ceramb.* 8.

*Thorace rotundato*, *spinofo*; *corpore viridi*; *femoribus rufis*.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 40. f. 1.

*Elytris apice duabus maculis roseis*.

### 34. *Moschatus*, das *Bifambocklein*; der *Rosenbock*.\*\*)}

*Müller* l. c. S. 264. No. 34.

*Füesslin's Verz.* S. 12. No. 227. der *Bifambockkäfer*.

*Frisch*

\*) Heißt wegen seiner schönen goldgrünen Farbe in *England* der *Lady-Capricorn*, oder *Frauenbock*.

\*\*) Ich habe ihn besonders in solchen *Haberstücken* häufig gefunden, die in einem Strich unter alten Weidenbäumen weggiengen.

Sonderbar ist es, dass der Herr Hofr. *Gleditsch* dessen in seiner Forstwiss. bey den Weiden nicht gedacht hat. Ich schlüsse fast daraus, dass er in den dasigen Gegenden nicht einheimisch sey.

*Drury* Tom. I. préf. p. 9. sagt: er heisse im Englischen *Musk-Beetle*, und habe nach dem Zeugniß eines erfahrenen Chirurgen, Herrn *Gui*, gleiche Arzneykräfte als die spanischen Fliegen.

Frisch Inf. 13. Th. S. 17. t. II. der blaulich-grüne Holzkäfer.

Pontopp. N. G. v. D. S. 206. No. 5. \*)

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 606. der grüne wohlriechende Holzbock.

Act. Vpsal. 1736. p. 120. No. 1. *Cerambyx viridiaeetus.*

Mouffet lat. p. 134. f. vlt. *Cerambyx tertius.*

Raj. Inf. p. 81. No. 17. *Scarabaeus Capricornus* distans major viridis odoratus.

Fabric. S. E. p. 165. *Ceramb. 7.* \*\*)

*Thorace spinoso, viridis, nitens, antennis cyanis mediocribus.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1037. *Elytris obtusis viridibus, nitentibus; femoribus muticis; antennis mediocribus.*

de Geer Inf. Tom. V. pag. 64. No. 2. *Capricorne odoriferant.*

*Cerambyx (odoratus); thorace spinoso, viridi-aureo-nitidus; antennis mediocribus coeruleo-violaceis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 203. *Ceramb. 5. Le Capricorne vert à odeur de rose.*

Viridi-coerulescens.

Poda Mus. graec.

35. *Alpinus*, das schweizerische Steinböcklein.

Müller l. c. S. 265. No. 35. t. 5. f. 5. das Steinböcklein.

E e 3 Fließlins

\*) Der Bischof hat angemerkt, dass das Weibchen besonders den starken Bisamgeruch an sich habe: vielleicht das Männchen dadurch desto eher an sich zu locken.

\*\*) Herr Prof. Fabricius versichert, dass er seinen Bisamgeruch nach dem Tode verliere, welches ich wahr gefunden habe, dagegen solchen der Silpha Vespollo viele Jahre behält.

Füesslins Verz. S. 12. No. 229. der *Alpenbockkäfer*.

Fabriç. S. E. p. 168. *Ceramb.* 15.

Schaeff. Icon. t. 123. f. 1.

Drury Ins. Tom. II. t. 31. f. 5.

Groffr. Ins. Tom. I. pag. 202. *Ceramb.* 4. t. 3. f. 6.

*La Rosalie.*

*Cinereo-coerulescens; elytrorum maculis sexfuscis.*

36. *Capensis*, das *kapensische Zebraböcklein*.

Müller l. c. S. 265. No. 36. das *Zebraböcklein*.

Fabric. S. E. p. 173. *Lamia* 14.

Drury Ins. Tom. I. t. 39. f. 3.

Petiv. Gazoph. t. 3. f. 8.

Poda Mus. graec. p. 32. No. 3. **CERAMB. pilosus.**

37. *Aedilis*, der *Zimmermann*.

Müller l. c. S. 266. No. 37. der *Schreiner*.

Füesslins Verz. S. 12. No. 230. der *Zimmermann*.

Frisch Ins. 13. Th. S. 18. t. 12. der *Holzkäfer mit den längsten Hörnern*.

Pontopp. N. G. v. D. S. 206. No. 6. der *Holzmeister*.

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 507. No. 15. der *Bau-meister oder russische Holzbock*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 653. *Smoland. Timberman.*

Act. Vpsal. 1736. p. 120. No. 2. 3. *Ceramb. fuscus, antennis corpore quater longioribus.*

Pet. Gaz. 14. t. 8. f. 8. *Capricornus russicus cine-reus, antennis longissimis.*

Acta Nidr. IV. 16. t. 16. f. 8.

Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 605. der *Baumeister; der graue russische Holzbock mit langen Fühlhörnern.*

Schaeff. Icon. t. 14. f. 7. *femina.*

Scop.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 95. No. 53. *Antennae* valde longae, griseae, annulis nigris; *elytra* fuscescentia; *fastia* alba.

*Fabric.* S. E. p. 164. *Ceramb.* I.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 13. No. 125.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1033.

Cinereus; *thorace* punctis quatuor luteis transversalibus. Dan. *Tömmermann*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 66. No. 5. t. 4. f. 1. 2. *Capricorne charpentier.* Suec. Timmerman.

*Thorace* spinoso, punctis quatuor luteis; *elytris* griseo-cinereis, fuscomaculatis; *antennis* longissimis.

### 38. *Sutor*, der *Schuster*.\*)

*Müller* I. c. S. 266. No. 38.

*Füesslin* Verz. S. 12. No. 231. der *Schuster*.

*Sulzers* Gesch. S. 44. t. 5. f. 4. der *Schuster*.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 755. der *schwarze Holzbock* mit tiefen *Punkten* und zerstreueten gelblichen *Flecken* auf den Flügeldecken.

*Fabric.* S. E. p. 172. *Lamia* 10.

*Thorace* spinoso; *elytris* atris, ferrugineo maculatis, scutello luteo; *antennis* longissimis.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 13. No. 126.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1032.

Nigricans; *elytris* punctis excavatis, maculisque rubiginosis.

de Geer Inf. Tom. V. p. 65. No. 4.

*Cerambyx (atomarius)*; *thorace* spinoso, niger nitidus atomis albescensibus; *antennis* longissimis, scutello albicante.

\*) Dies ist nach dem Linn. des Scop. *Cerdo* Entom. Carn. No. 162, woraus aber *Füesslin* eine neue Art gemacht hat.

39. *Cerdo*, der *Flicker*.\*)*Müller* l. c. S. 256. No. 39.*Füesslin* Verz. S. 12. No. 232. der *Flicker*.\*\*)*Frisch* Insect. 13. Th. S. 14. t. 8. der *langgehörnte schwarze Holzkäfer*.*Pontopp.* N. G. von Dänem. S. 206. t. 16.*Fabric.* S. E. p. 167. *Ceramb.* 14. †)*Thorace spinoso, rugoso, niger, antennis longis.**Scop.* Entom. carn. No. 163. *Heros*.*Schaeff.* Icon. t. 124. f. 3. *fem.* t. 14. f. 8.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 13. No. 123.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1026.

Ater; *thorace rugoso; elytris concoloribus. Nullum maris et feminae discriminem.**Pontopp.* Atlas Dan. I. t. 29.*Drury* Inf. Tom. I. t. 39. f. 1.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 201. *Ceramb.* 2. *Le petit Capricorne noir.*Ater, *elytris rugosis integris, antennis corpore longioribus.*de *Geer* Inf. Tom. V. p. 69. No. 6. *Capricorne savetier.*Niger; *thorace spinoso rugoso, elytris scabris; antennis mediocribus.*40. *Auri-*\*) Nach dem *Linné* ist dies des *Skop. Heros* No. 163. da doch dieser den *Linné* nicht dabey angeführt hat.\*\*) Nach *Füesslin* ebenfalls.†) Nach *Fabric.* aber ist des *Skop. Heros* eine Varietät des *Linnéischen Cerdo*, und des *Geoffr. Inf. Tom. I. p. 200. Cer. I. Le grand Capricorne noir.* Fusco-niger; *elytris rugosis, apice interiori spinosis; antennis corpore longioribus; wobey Geoffr. des Frisch* 13. Th. t. 8. angeführt hat.

S. Beckmanns phys. oekon. Bibl. 7. B. 2. St. p. 288.

40. *Auricomus*, der amerikanische Goldschläger.

Müller l. c. S. 267. No. 40. der Goldschläger.

41. *Textor*, der Stricker.

Müller l. c. S. 267. No. 41. der Weber.

Füsslins Verz. S. 12. No. 234. der Weber.

Poda Mus. graec. p. 33.

Schaeff. Icon. t. 10. f. 1.

Fabric. S. E. p. 171. *Lamia* 5.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1027. Nigricans; elytris punctis elevatis; antennarum articulo infuso, clavato.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 201. *Ceramb.* 3. Le Capricorne noir chagriné.

Ater, elytris punctis elevatis, antennis corpore brevioribus.

de Geer Inf. Tom. V. p. 64. No. 3. Capricorne noir chagriné.

*Cerambyx (nigro-rugosus)*; thorace spinoso, niger opacus; antennis brevioribus crassis; elytris convexis.

42. *Triftis*, der Cypressenholzbock.

Müller l. c. S. 268. No. 42. der Trauerbock.

Stop. Ann. 5. hist. nat. p. 95. No. 54.\*)

Nigro-cinereus; elytrum singulum maculis duabus nigris.

Fabric. S. E. p. 175. *Lamia* 21.

Thorace spinoso, fusca; elytris maculis duabus atris, antennis mediocribus.

E e 5

43. *Fuli-*

\*) Skopoli hält ihn für eine Varietät des *Textoris*: auch hat sein Exemplar längere Fühlhörner gehabt.

43. *Fuliginator*, der Schlotfeger.*Müller* l. c. S. 268. No. 43.*Füesslins* Verz. S. 12. No. 235.*Frisch* Inf. 13. Th. S. 23. t. 19. der *dickhälfige Holzkäfer*.*Fabric.* S. E. p. 175. *Lamia* 23.*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1028. *Niger*; *thorace subspinoso, elytris tomentosis, cinereis*.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 205. *Ceramb.* 8. *Le Capricorne ovale cendré*.*Ater*, *ovatus*; *antennis corpore dimidio brevioribus*; *elytris vellere cinereo albidis*.*de Geer* Inf. Tom. V. p. 70. No. 7. *Capricorne ramoneur*.*Niger*; *thorace spinoso*; *elytris cinereis*; *corpore ovato*; *antennis brevioribus*.44. *Coquus*, der kanadaische Koch.\*)*Müller* l. c. S. 268. der Koch.*Fabric.* S. E. p. 176. *Lamia* 24.45. *Cursor*, der Läufer.*Müller* l. c. S. 268. No. 45.*Füesslins* Verz. S. 12. No. 236. der Läufer.*Sulzers* Gesch. S. 45. t. 5. f. 7. der Läufer.*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 761. der *röthliche Holzbock mit drey schwarzen Strichen auf den Flügeldecken*.*Fabric.* S. E. p. 183. *Rhagium* 2.*Thorace spinoso; elytris rufis, sutura lineaque nigris*.*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1030. *Elytris obtusis, rufis margine lineaque nigris, antennis mediocribus*.

de Geer

\*) Nicht abgebildet.

de Geer Ins. Tom. V. p. 127. No. 3.

LEPTURA (*cursor*); *thorace spinoso nigro; elytris rufis, viridi-griseo-tomentosis; fasciis binis longitudinalibus nigris; antennis longis rufis.*

46. *Lamed*, das hebräische *Lamed*.\*)

Müller l. c. S. 269. No. 46.

Fabric. S. E. p. 178. *Stenocorus* 2.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1031.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 226. *Stenocorus* 6. Le *Stenocore bedeau*.\*\*)

47. *Meridiana*, der *Holzbock mit hellglänzendem Bruststück*.

Müller l. c. S. 269. No. 47. der *Tagdieb*.

Füesslins Verz. S. 13. No. 238. der *Tagschwärmer*.

Fabric. S. E. p. 178. *Stenocorus* 1.

Raj. Ins. 96. 1. *Elytris spadiceis, ventre argenteo.*

Schaeff. Icon. t. 3, f. 13, t. 79, f. 7.

de Geer Ins. Tom. V. p. 130. No. 5. *Lepture meridienne*.

*Fusco-cinerea; thorace spinoso, femoribus rufis apice nigris, corpore subtus nitente; abdominis apice rufo.*

48. *Noëris*,

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Herr Prof. Müller erinnert mit Recht, dass der vom Linné hierbey citirte Geoffroische *Stenoc.* 6. nicht hieher gehöre, weil derselbige kein dorniches Bruststück wie das *Lamed* habe. Fabricius hat nach dem Ritter eben diesen *Geoffr. Stenoc.* citirt; der Herr de Geer aber daraus eine neue *Lepture* gemacht T. V. p. 138. No. 15. *Lepture à suture noire*.

48. *Noctis*, der nachtschwarze Holzbock.\*)

Müller I. c. S. 269. No. 48. der Nachtschwärmer.

Füesslins Verz. S. 13. No. 239. der Nachtschwärmer.

49. *Inquisitor*, der *Inquisitor*.

Müller I. c. S. 269. No. 49. der Stänkerer.

Füesslins Verz. S. 13. No. 240. der *Inquisitor*.

Frisch Inf. 13. Th. S. 21. t. 14. die mittlere Art Holzböcke.

Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 757. der graue und schwarz nebelfarbige Holzbock mit sehr kleinen Fühlhörnern und stachlicher Brust.

Fabric. S. E. p. 182. *Rhagium* 1.

Schaeff. Icon. t. 83. f. 3.

Aëta Nidr. III. II.

Mülleri Faun. Fridr. p. 13. No. 128.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1029.

Niger tomento testaceus; oculis tuberculatis; elytris fascia duplici fulva.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 223. *Stenocorus* 2. Le *Stenocore noir velouté de jaune*.

Niger, vellere flavo variegatus, elytris lineis duabus elevatis; thorace spinoso.

Aëta Vpsal. 1736. p. 20. No. 1. *Necydalis* cinereo-maculata, fulcata.

de Geer Tom. V. p. 126. No. 2. t. 4. f. 7. *Lepture inquisiteur*.

LEPTURA (*inquisitor*); thorace spinoso, fusca, maculis punctisque cinereis villosis; antennis brevioribus.

B. Schaeff. Elem. t. 118. f. 1. *Stenocorus*, Stutzkäfer.

Fabric. S. E. p. 183. B.

Onomat.

\*). Nicht abgebildet.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. pag. 755. No. 2. der graue Holzbock mit zwey gelben Bändern auf den Flügeldecken, und sehr kleinen Fühlhörnern.

Schaeff. Icon. t. 2. f. 10. t. 8. f. 2. 3.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 222. *Stenocorus* 1. Le Stenocore lisse à bandes jaunes.

Glaber, e fusco niger; elytro singulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis; thorace spinoso.

de Geer Inf. Tom. V. p. 124. No. 1. t. 4. f. 6. *Lepture hargneuse*.

LEPTURA (*mordax*); thorace spinoso, nigra, maculis punctisque griseis villosis; elytris fascia duplicita fulva maculaque nigra, antennis brevioribus.

### 50. Kähleri, der Kählersche Holzbock.

Müller I. c. S. 270. No. 50.

Friesius Verz. S. 13. No. 242. Kählers Bockkäfer.

Fabric. S. E. p. 173. *Lamia* 13.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 96. No. 56.

Elytra sanguinea, macula communi, lanceolata, magna, nigra.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 204. *Ceramb.* 6. Le Capricorne rouge.

Niger; elytris thoracisque lateribus rubris.

### 51. Pedestris, der langsame und ungeflügelte Bockkäfer.\*)

Müller I. c. S. 270. No. 51. der Fußknecht.

Fabric. S. E. p. 176. *Lamia* 27.

Thorace spinoso; atra, vitta integra alba; antennis mediocribus.

Scop. Ent. carn. No. 168. *Cerambyx arenarius*.

Poda Inf. 34. 9. *Ceramb. pedestris*.

### IV. Bock-

\*) Nicht abgebildet.

IV. Bockkäfer mit cylindrisch-rundem und unbewaffneten oder ungedornten Brustschild.

52. *Carcharias*, der *seehundfarbige Holzbock*.\*)

*Müller* l. c. S. 271. No. 52. der *Hundsbock*.

*Fließlins* Verz. S. 13. No. 243.

*Lepechinus* Tageb. II. p. 199. t. II. f. 18.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 604. No. 4. p. 758. No. 2.  
der *schwarze norwegische Holzbock*.

*Fabric.* S. E. p. 184. *Saperda* 1.

*Corpo griseo, punctato nigro, antennis medio-*  
*cibis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 208. *Leptura* 1. La *Lepture chagrinée*.

*Cinerea, nigro-punctata; thorace cylindriaceo.*

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 73. No. 10. t. 3. f. 19. *Capricorne ponctué.*

*Punctatus, thorace mutico cylindrico; flavo-griseus nigro-punctatus; antennis mediocribus griseo-nigroque maculatis.*

*Schaeff.* Icon. t. 38. f. 4. t. 152. f. 4.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 41. f. 5.

53. *Iuvencus*, der *amerikanische wollichte Holzbock mit gezähnelter Flügelnath*.\*\*)

*Müller* l. c. S. 271. No. 53. der *Wollenbock*.

*Fabric.* S. E. p. 169. *Cerambyx* 24.

54. *Surinamus*, die *surinamische Braunlinie*.

*Müller* l. c. S. 272. No. 54. der *Surinamer*.

*de Geer*

\*) Diesen nennt Franz von Paula Schrank in seinen Beytr. zur Naturgesch. S. 65. §. 9. den *Seehund*.

\*\*) Nicht abgebildet.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 117. No. 20. t. 14. f. 11.  
*Capricorne à long col.*

*Longicollis; thorace mutico cylindrico elongato rufo; elytris testaceis punctis quatuor nigris; antennis longioribus.*

55. *Scalaris*, der *Treppenbock*.

Müller l. c. S. 272. No. 55. t. 5. f. 6. der *Stiegenbock*.

Füesslins Verz. S. 13. No. 244. der *Stiegenbockkäfer*.

Frisch Inf. 12. Th. S. 29. t. 3. der *Holzkäfer von mittelmäßiger oder vierter Größe mit schwarzen Flügeln und gelben oder weissen Zierrathen darauf*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 607.

LEPTURA scalaris.

Fabric. S. E. p. 184. *Saperda* 2.

Poda Mus. graec. p. 34.

Schaeff. Icon. t. 38. f. 5.

Hoefnag. Inf. t. 7.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 758. No. 4. der *schwarze Holzbock mit gelben Flecken*.

Abta Vpsal. 1736. p. 20. No. 7. *Cerambyx cineus*, fascia alba.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 102. No. 77. *Leptura scalaris*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 77. No. 14. *Capricorne à bande dentelée*.

Flavo-viridis; thorace mutico cylindrico; macula nigra, elytris nigris fascia dentata, punctisque flavo-viridibus, antennis mediocribus.

56. *Cardui*, der *Distelbock*.\*)

Müller l. c. S. 272. No. 56. der *Distelkäfer*.

Füesslins Verz. S. 13. No. 255. der *Distelbockkäfer*.

Fabric.

\*) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 186. *Saperda* 10.

*Fusca; thorace lineato, scutello flavo; antennis longis.*

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 101. No. 74.

57. *Populneus*, der *Pappelnbock*.

*Müller* l. c. S. 273. No. 57. t. 5. f. 7. 8.

*Füesslins Verz.* S. 13. No. 256. der *Pappelnbock-käfer*.

*Schröters Abhandl.* I. S. 349. t. 3. f. 1.

*Fabric.* S. E. p. 186. *Saperda* 12.

*Schaeff.* Icon. t. 48. f. 5.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 95. No. 1070.

**L E P T V R A** *populnea nigra; thorace cylindrico; lineis tribus; elytris punctis decem luteis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 208. *Leptura* 3. La *Lepture à corcelet cylindrique et taches jaunes*.

*Nigra, thoracis lineis tribus, elytrorumque maculis villoso-flavis; thorace cylindraceo; antennis corpus aequantibus.*

*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 78. No. 15. *Capricorne à dix points jaunes.*

*10-punctatus nigro-plumbeus, thorace mutico cylindrico; lineis binis flavis; elytris punctis quinque flavis; antennis mediocribus.*

58. *Linearis*, die *Parallele*.\*)

*Müller* l. c. S. 274. No. 58.

*Füesslins Verz.* S. 13. No. 257.

*Fabric.* S. E. p. 185. *Saperda* 5.

*Scop.* Ent. carn. No. 153. **L E P T V R A parallela.**

*Mülleri Faun. Fridr.* p. 13. No. 129.

— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 93. No. 1044.

59. *Cylin-*

\*.) Nicht abgebildet.

59. *Cylindricus*, der walzenförmige Holzbock.

Müller l. c. S. 274. No. 59. die Rolle.

Rösel's Inf. 2. B. Erdk. 2. Kl. S. 21. t. 3. der kleine orangen-gelbe Holzwurm in den abgestandnen Zweigen der Haselstauden mit seinem kleinen schwarzen schmal-leibigen Holzkäfer.

Fabric. S. E. p. 185. *Saperda* 6.

Scop. Ent. carn. No. 157. *LEPTURA cylindrica*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1043.

Nigro-cinerea; thorace cylindrico, linea flava; tibiis anticis femoribusque rufis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 208. *Leptura* 2. La Lepture ardoisée.

Tota coeruleo-atra, capite thoraceque subvilloso.

de Geer Inf. Tom. V. p. 75. No. 12. *Capricorne ardoisé.\*)*

(*Cinereus*) coeruleo-niger; thorace mutico cylindrico linea albida, pedibus anticis flavis, antennis me-diocribus.

60. *Oculatus*, das Schildauge.

Müller l. c. S. 274. No. 60.

Füesslin Verz. S. 13. No. 260. *Schildauge*.

Hoefn. Inf. 13.

Schaeff. Icon. t. 128. f. 4.

Fabric. S. E. p. 184. *Saperda* 3.

Thorace luteo; punctis duobus atris, elytris ni-gris.

de Geer

\*.) Der Herr de Geer hält diesen für des Geoffroi ardoisé; Füesslin aber S. 13. No. 258. hat daraus eine neue Art gemacht, die er *Micans* nennt, und er scheint Recht zu haben, da er ver-sichert: er habe die Größe und Gestalt des Pappe/nbockkäfers No. 57. Wir werden ihn hinten unter den neuen mit an-führen.

de Geer Ins. Tom. V. p. 74. No. 11. t. 3. f. 20. *Capriconne à yeux.*

*Thorace mutico cylindrico rufo-flavo; punctis duobus nigris, capite antennisque nigris; elytris cinereo-coeruleofuscis.*

*Scop. Ent. carn. No. 152. LEPTURA oculata.*

61. *Ranphygeus*, der *amerikanische Gelbfleck.*\*)

Müller l. c. S. 274. No. 61.

62. *Irroratus*, der *amerikanische bereifte Holzbock.*

Müller l. c. S. 275. No. 62. der *Thaubock.*

Fabric. S. E. p. 180. *Stenocorus* 9.

Drury Ins. Tom. I. t. 33. f. 3.

63. *Zonarius*, der *amerikanische Gürtelbock.*\*\*) )

Müller l. c. S. 275. No. 63. t. 5. f. 9. der *Gürtler.*

V. *Bockkäfer*, deren *Bruststück etwas rund oder kugelförmig platt gedrückt, und dabey unbewaffnet ist.*

64. *Curculionoïdes*, der *rüsselkäferartige Holzbock.*

Müller l. c. S. 276. No. 64. der *Rüsselbock.*

Füesslins Verz. S. 13. No. 261. der *Argus.*

Fabric. S. E. p. 175. *Lamia* 20.

*Fusca; thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris.*

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 101. No. 75. LEPTURA Curculioïdes.*

*Fusco-cinerascens; elytrum singulum ocellis binis, thorace quaternis.*

Schaeff.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) S. No. 32. *Succinctus*, wobei einerley Citatum des Marcgr.

Schaeff. Icon. t. 39. f. 1. t. 153. f. 5.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 210. *Leptura* 5. La *Lepture à yeux de paon.*

Nigro-cinerea; thorace elytrisque maculis oculiferis atris, circulo cinereo; thorace subcylindraceo.

65. *Serraticornis*, das *Sägshorn.\**)

Müller I. c. S. 276. No. 65.

Fabric. S. E. p. 182. *Calopus* 1.

Fuscus, *antennis compressis.*

de Geer Inf. Tom. V. pag. 79. No. 16. *Capricorne à antennes dentelées.*

Thorace mutico cylindrico; griseo-fuscus, oculis nigris, *antennis serratis* mediocribus, tentaculis longis pedibusque teretibus.

66. *Hispicornis*, das *amerikanische Stachelhorn.\*\**)

Müller I. c. S. 276. No. 66. das *Dornhorn.*

67. *Rusticus*, der *Bauer.*

Müller I. c. S. 276. No. 67.

Fießlins Verz. S. 13. No. 262. der *Bauer.*

Sulzers Kennz. t. 4. f. 29.†).

— — Gesch. S. 46. der *Bauer.*

Schaeff. Elem. t. 13. f. 1. t. 76. f. 1. *Afterholzkäfer.*

— — Icon. t. 63. f. 6. (t. 2. f. 7. allegante Müller).)

Müller. Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1041.

*Leptura nigra; thorace globoso, elytris fuscis, lineis transversis tribus albis, antica arcuata punto medio.*

Ff 2

*Onomat.*

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

† ) Im Linn. muss es statt f. 9. heißen: f. 29.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. pag. 758. der braune Holzbock mit Vertiefungen auf der Brust.

*Fabric.* S. E. p. 188. *Callidium* 6.

*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 83. No. 20. *Capricorne rustique.*

*Griseo-fuscus;* *thorace* mutico subrotundo depresso; punctis impressis; *antennis* subulatis brevioribus.

68. *Luridus*, der *Bräunling.* \*)

*Müller* l. c. S. 277. No. 68.

*Fabric.* S. E. p. 190. *Callidium* 14.

*Thorace* subtuberculato, nudo, nigrum; *elytris* testaceis.

69. *Femoratus*, der *Rothschenkel.*

*Müller* l. c. S. 277. No. 69.

*Schaeff.* Icon. t. 55. f. 7.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 93. No. 31. *Capricorne à cuisses rouges.*

70. *Violaceus*, der *blaue Bockkäfer.*

*Müller* l. c. S. 277. No. 70. der *Blaubock.*

*Füesslin's Verz.* S. 13. No. 263.

*Frisch* Inf. 12. Th. S. 33. 3. Pl. t. 6. f. 1. der *ganz violetblaue Holzkäfer.*

*Affa* *Vpsal.* 1736. pag. 20. No. 4. *Buprestis collaris nigro;* *elytris* aeneo-coeruleis.

*Fabric.* S. E. p. 188. *Callidium* 4.

*Thorace* subpubescente, *corpo* violaceo; *antennis* brevibus.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 763. der *glänzende blaue Holzbock mit schwarzen Fühlhörnern und keulförmigen Schenkeln.*

*Scop.*

\*) Nicht abgebildet.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 97. No. 59. *STENOCERVS violaceus.*

*Thorax* una cum antennis niger et villosus; *elytra* violacea, villosa, punctata.

*Müller* Faun. Fridr. p. 13. No. 130.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1059.

*LEPTURA violacea*; tota violacea, pubescens; *thorace* depresso; *oculis* fuscis.

*Schaeff.* Icon. t. 4. f. 13.

*de Geer* Ins. Tom. V. p. 88. No. 24. *Capricorne violet.*

*Violaceus* nitens; *corpo thoraceque* mutico subrotundo depresso; *femoribus* clavatis; *antennis* mediocribus nigris.

### 71. *Auratus*, der amerikanische Goldbock.

*Müller* l. c. S. 277. No. 71. der *Goldbock*.

*de Geer* Ins. Tom. V. p. 101. No. 5. t. 13. f. 15. *Capricorne doré.*

*Viridi-inauratus*; *thorace* depresso marginato-dentato; *pedibus* rufo-violaceis; *antennis* mediocribus violaceo-nigris.

### 72. *Stigma*, die amerikanische Marke.

*Müller* l. c. S. 278. No. 72. die *Marke*.

*Fabric.* S. E. p. 189. *Callidium* 7.

*de Geer* Ins. Tom. V. pag. 119. No. 22. t. 14. f. 13.  
*Capricorne stigmate.*

*Totus niger*; *thorace* submutico semi-lunari punctato, *corpo* depresso; *elytris* laevibus *stigmate* flavo; *antennis* brevibus.

73. *Striatus*, der *gestreifte Holzbock*.\*)*Müller* l. c. S. 278. No. 73. der *Streifbock*.*Füesslin's Verz.* S. 13. No. 264. der *Streifbockkäfer*.*Fabric.* S. E. p. 191. *Callidium* 17.de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 90. No. 26. *Capricorne strié*.

*Niger nitidus; thorace mutico subrotundo subdepresso; elytris striatis; antennis brevioribus dentibusque parvis.*

74. *Variabilis*, der *in seinen Farben sehr veränderliche Holzbock*.*Müller* l. c. S. 278. No. 74. der *Unbestand*.

*Frisch* Inf. 12. Th. S. 34. 35. 3. Pl. t. 6. f. 3. 4. der *braune Holzkäfer mit blauen Oberflügeln; der schwarzbraune kleine Holzkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 188. *Callidium* 5.

*Thorace glabro, corpore fusco-aeneo; antennis pedibusque fuscis.*

*Schaeff.* Icon. t. 4. f. 12.*Müller's Zool. Dan. Prodr.* p. 94.

*Leptura* No. 1060. *Violacea, thorace depresso abdomine pedibusque rufis.*

75. *Testaceus*, der *ziegelrothe Holzbock*.*Müller* l. c. S. 279. No. 75. der *Rothbock*.*Füesslin's Verz.* S. 13. No. 265.*Schaeff.* Icon. t. 64. f. 6.

*Onomat. hist. nat. P. 2. p. 762. der muschelfarbige Holzbock mit kahler Brust.*

*Aet. Vpsal. 1736. p. 20. No. 3. Buprestis collaris glabro, elytris testaceis.*

*Fabric.*

\*) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 190. *Callidium* 13.

*Thorace subtuberculato; corpore testaceo; anten-*  
*nis mediocribus fuscis.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 94. No. 1061.

*Leptura testaceo-fusca; thorace depresso; abdomi-*  
*ne femoribusque nigris.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 218. Leptura* 18. La *Lepture*  
*livide à corcelet lisse.*

*Testacea; thorace glabro.*

*de Geer Inf. Tom. V. pag. 93. No. 30. Capricorne*  
*fauve.*

76. *Bajulus*, der *Bockkäfer mit zween Hökern auf dem Brustsilde.*

*Müller I. c. S. 279. No. 76. der Lastträger.*

*Füeslin Verz. S. 13. No. 266. der Lastträger.*

*Sulzers Kennz. t. 4. f. 29.*

*Frisch Inf. 13. Th. S. 17. 2. Pl. t. 10. Ein Holzkäfer mit kleinen Fühlhörnern und grauem Halschild mit zween Punkten.*

*Fabric. S. E. p. 187. Callidium* 1.

*Thorace villoso; tuberculis duobus, corpore fusco.*

*Schaeff. Icon. t. 64. f. 4. 5.*

*Att. Vpsal. 1736. pag. 20. No. 1. Buprestis collari*  
*villoso; elytris cinereis.*

*Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 760. der schwärzliche Holzbock mit einer wollichten grauen Brust, und zweyen kahlen Punkten auf derselben.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 13. No. 131.*

— — *Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1062.*

*Leptura variabilis, nitida; thorace depresso villoso;*  
*tuberculis duobus.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 218. Leptura* 17. La *Lepture*  
*brune à corcelet romboïdale.*

*Testaceo-fusca; thorace rhomboïdali villoso; elytrorum maculis quatuor albidis transversim positis.*

de Geer Ins. Tom. V. p. 86. No. 82. *Capricorne à queue.*

*Cerambyx (caudatus,) fusco-obscurus; thorace multico subrotundo depresso cinereo-villoso, punctis duobus nigris glabris, antennis brevibus.*

B. *Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 762. der *muschelfarbige Holzbock mit einer haarichen Brust.*

77. (*Fennicus, der Finnländer.\**)

Müller l. c. S. 279. No. 77.

Füesslin's Verz. S. 14. No. 267. der *Finnländer.*

Fabric. S. E. p. 188. *Callidium 2.*

*Thorace tuberculato, rufo; elytris violaceis, antennis mediocribus.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1068.

*Thorace subrotundo, tuberculis subferrugineis, obsoletis; elytris violaceis; antennis longiusculis.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 219. *Leptura 19. La Lepture noire à corcelet rougeatre.*

Atra, *thorace testaceo, femoribus crassis.*

78. (*Liciatus, der Striembock.\*\**)

Müller l. c. S. 280. No. 78.

79. (*Vndatus, der Wellenbock.*)

Müller l. c. S. 280. No. 79.

Act. Vpsal. 1736. p. 20. No. 6.

Fabric. S. E. p. 191. *Callidium 20.*

*Thorace tuberculato; elytris nigris, fasciis duabus vndatis albis, antennis brevibus.*

Schaeff.

\*.) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Schaeff. Icon. t. 68. f. 1.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 759. der schwarze Holzbock mit schwarzen Strichen auf den Flügeldecken.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1069.

*Lepiura: thorace subrotundo, tuberculato, elytris fasciis duabus vndulatis, antennis submediocribus.*

de Geer Inf. Tom. V. p. 91. No. 28. *Capricorne à ondes blanches.*

Nigro-fuscus; *thorace* mutico subrotundo depresso tuberculato, *elytris* fasciis duabus albidis vndulatis, *antennis* submediocribus.

80. *Sanguineus*, der Blutbock.

Müller l. c. S. 280. No. 80.

Fabric. S. E. p. 190. *Callidium 12.*

*Thorace* subtuberculato, *elytrisque* sanguineis; *antennis* mediocribus.

Raj. Inf. 97. 3. *Cerambyx minor.*

Schaeff. Icon. t. 64. f. 1.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1038.

Niger, *thorace* elytrisque rubris. Dan. *Trae-Buk.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 220. *Leptura 21.* La *Lepture veloutée couleur de feu.*

Nigra, *thorace* colcoptrisque sericeo-rubris.

de Geer Inf. Tom. V. p. 92. No. 29. *Capricorne couleur de feu.*

*Thorace* mutico subrotundo depresso angulato *elytrisque* sanguineis, corpore nigro; *antennis* brevioribus.

81. *Castaneus*, der kastanienfarbige Bock.

Müller l. c. S. 281. No. 81.

Füesslins Verz. S. 14. No. 268. der Kastanienbraune.

Müller Zool. Fridr. p. 13. No. 132.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1005.

*Thorace* subrotundo, corporeque nigro; *elytris* antennis pedibusque ferrugineis.

*Schaeff.* Icon. t. 108. f. 1.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 90. No. 27. *Capricorne rouffaeatre.*

*Thorace* nigro mutico subrotundo subdepresso; *elytris* pedibusque ferrugineis; *antennis* brevioribus.

82. *Cantharinus*, der *Johannisfliegenartige Bock.*\*)

*Müller* l. c. S. 281. No. 82. der *Johannisbock.*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1075. *Leptura rufo-fusca*; *thorace* cylindrico; *antennis* corpore longioribus; *oculis* nigris.

83. *Ebulinus*, der *Hollunderbock.*

*Müller* l. c. S. 282. No. 83.

*Schaeff.* Icon. t. 4. f. 12.

### *Unabgebildete Holzböcke.*

#### I. Klasse.

No. 2. *Trochlearis.*

#### II. Klasse.

1. No. 9. *Thomae.*

2. No. 12. *Dapsarius.*

3. No. 17. *Planatus.*

#### III. Klasse.

1. No. 18. *Barbicornis.*

2. No. 19. *Ammiralis.*

3. No. 20. *Batus.*

4. No.

\*) Nicht abgebildet. v. unter den neuen *Leptur.* 2. Kl. No. 5.

4. No. 23. *Sentis.*
5. No. 31. *Desertus.*
6. No. 44. *Coquus.*
7. No. 46. *Lamed.*
8. No. 48. *Noëtis.*
9. No. 51. *Pedestris.*

IV. Klasse.

1. No. 53. *Iuvencus.*
2. No. 56. *Cardui.*
3. No. 58. *Linearis.*
4. No. 61. *Ramphygeus.*
5. No. 65. *Serraticornis.*

V. Klasse.

1. No. 66. *Hispicornis.*
2. No. 68. *Luridus.*
3. No. 73. *Striatus.*
4. No. 77. *Fennicus.*
5. No. 78. *Liciatus.*
6. No. 82. *Cantharinus.*

*Neue Arten von Holzböcken.*

I. K L A S S E.

*Holzböcke, deren Bruststück zur Seiten mit beweglichen Dornen besetzt ist.*

1. *Lusitanus*, der portugiesische Holzbock mit der bläffsen wellenförmigen Streife.

*Linn. Add. p. 1067. No. 5.*

*Müllers Supplem. B. S. 236. 2. a. der Ziegelbock.*

2. *Bal-*

2. *Balteus*, der portugiesische Rostbock.

*Linn. Add.* p. 1067. No. 6.

*Müllers Suppl. B.* S. 236. 2. b.

3. *Giganteus*, der kayennische Riesenbock.

*Linn. Mantiss.* p. 531.

*Fabric. S. E.* p. 161. *Prionus* 8.

*Müllers S. B.* S. 237, 2. c.

4. *Luzonum*, der luzonische Holzbock mit langen Vorderfüßen.

*Fabric. S. E.* p. 106. *Prionus* 5.

*Thorace marginato, multispinoso, maxillis porrectis, vndentatis, apice bifidis, pedibus anticis elongatis.*

*Petiv. Gazoph.* t. 47. f. 1.

## II. KLASSE.

*Holzböcke, deren Bruststück zur Seite einen gezähnelten Rand hat.*

1. *Fuliginosus*, der amerikanische Rostbock.

*Fabric. S. E.* p. 160. *Prionus* 2.

*Thorace marginato, crenato, vndentato, ater; elytris apice crenato dentatis.*

2. *Mucronatus*, der amerikanische Irontackige Bock.

*Fabric. S. E.* p. 160. *Prionus* 4.

*Thorace marginato, bidentato, elytris rufis, mucronatis.*

3. *Bilineatus*, die amerikanische Zweylinie.

*Fabric.* S. E. p. 163. *Prionus* 13.

*Thorace marginato, crenato, albo, bilineato; elytris ferrugineis, atomis albis, margineque luteo.*

4. *Maxillosus*, der amerikanische Holzbock mit hervorstehenden Kinnladen.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 38. f. 3.

*Fabric.* S. E. p. 163. *Prionus* 15.

*Thorace marginato, crenato, maxillis porrectis, intus hirsutus, quadridentatis.*

5. *Smirnensis*, der Haßselquistische Holzbock.

*Haßselquist's* Reif. nach Paläst. S. 451.

*Thorace teretiusculo, subconvexo ad latera vtrinque mucronatus.*

### III. KLASSE.

*Holzböcke mit rundem Brustsilde, das an den Seiten dornicht ist.*

1. *Afer*, der grünglänzende afrikanische Holzbock.

*Linnaeus* Mantissa p. 532.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 39. f. 4.

*Fabric.* S. E. p. 166. *Ceramb.* 9.

*Thorace rotundato, spinoso, corpore viridi; antennis pedibusque rufis.*

*Müllers* S. B. S. 238. 51. b. der afrikanische Bock.

2. *Suaveolus*, das karolinische Muskusböcklein.

*Müllers* S. B. S. 238. 51. a.

*Thorace spinoso, coeruleo-ferrugineo-aurato.*

3. *Scopoli*,

3. *Scopoli, Skopolis*-Bockkäfer.

*Füeßlins Verz.* S. 12. No. 233.

*Totus niger; in floribus plantarum umbelliferarum.*

*Scop. Ent. carn. No. 162. Cerdö. \*)*

*Niger, thorace rugoso, rugis transversis.*

*Poda Mus. graec. p. 33.*

4. *Maculatus*, der gefleckte Bockkäfer.

*Füeßlins Verz.* S. 12. No. 237.

*Sulzers Gesch.* p. 45. t. 5. f. 8. der *Gefleckte*.

*Fabric. S. E. p. 183. Rhagium 3. bifasciatum. \*\*)*

*Thorace spinoso; elytris fuscis; fasciis duabus obliquis, flavis.*

5. *Scabicornis*, das Rauchhorn.

*Füeßlins Verz.* S. 13. No. 241. fig. 3. a, b.

*Scop. Entom. carn. No. 174.*

*Fusco-rufescens, antennis aequalibus, nitidis, inferiore latere denticulatis, scabris.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 210. Leptura 6. La Lepture rouillée.*

*Tota nigro-ferruginea; thorace subcylindraceo.*

6. *Asper*, der chagrinschwarze italiänische Holzbock.

*Sulzers Gesch.* S. 44. t. 5. f. 3. der *Grobe*.

*Thorace bispinoso, ater, totus asper et rigidus; elytra in medio tuberculata.*

*z. Brevis,*

\*) S. No. 38. *Sutor*.

\*\*) Bey diesem hat *Fabric.* des *Geoffr. Stenocorus I. Inf. Tom. I.* p. 222. No. 1. citirt, den de *Geer* bey des *Linn. Inquisitor B.* No. 49. angeführt hat.

7. *Brevis*, der *surinamische Bockkäfer mit kuglichen kurzen Schenkeln*.

Sulzers Gesch. S. 45. t. 5. f. 5. der *Kurze*.

*Totus nigricans, thorace spinoso; femoribus rotundatis brevibus, tarsisque anticus lobatis, admodum hirsutis.*

8. *Sulcatus*, der *surinamische gefurchte Bockkäfer*.

Sulzers Gesch. S. 45. t. 5. f. 6. der *Gefurchte*.

*Thorace spinoso; totus viridis, antennis fuscis, articulo primo viridi; elytris sulcatis.*

9. *Ovatus*, der *württembergische eyrunde Bockkäfer*.

Sulzers Gesch. S. 45. t. 5. f. 9. der *Eyrunde*.

*Thorace leviter spinoso; capite grandi rotundo; elytris ovatis pallido-nigris.*

10. *Carinatus*, der *Kielbock in den Gebüschen an der Wolga*.

Pallas Reisen I. Anh. No. 43. Ausz. I. p. 13. No. 43.

*Thorace vtrinque tuberculo conico, elytra coalita, scabriuscula, obtusa, exterius carina longitudinali obtuse angulata.*

Müllers S. B. S. 239. 51. e. der *Kielbock*.

11. *Glizyrhizae*; der *Süßholzbock*.

Pallas Reisen II. Anh. No. 61.

*Forma C. pedestris; antennae et quibusdam caput picea; corpus subtus nigrum, sed totum polline albo irroratum; elytra aterrima.*

Müllers S. B. S. 238. 51. c.

12. *Holedendri*, der *Robinbock*.

*Pallas Reisen* II. Anh. No. 62.

Affinis C. Kähleri, sed minor; totus ater, poris excavatis punctatus; thorax albida lanugine pubescens; elytra atra.

*Müllers S. B. S.* 239. 51. d. der *Robinbock*.

13. *Crucifer*, der *Kreuzträger*.

*Lepechins* Tageb. I. S. 231. t. 16. f. 6.

*Thorace bispinoso*; ater; *elytris cruce alba notatis*.

14. *Striatus*, der *gestreifte Holzbock*.

*Lepechins* Tageb. II. S. 198. t. 10. f. 8.

*Thorace bispinoso*; totus ater, vbique albo marginatus.

15. *Bifasciatus*, die *Doppelstreife*.

*Lepechins* Tageb. II. S. 199. t. 11. f. 32.

*Thorare spinoso*; *elytris nigricantibus*; *fasciis duabus albidis*; *antennis corpore duplo longioribus*.

16. *Guianus*, der *guianische Bockkäfer mit haarigen Fühlhörnern*.

*Rozier Abhandl.* I. S. 26. t. 1. f. B.

*Americanus subflavescens*, nigro conspersus, *antennarum articulis quatuor primis*, numerando a basi pilosis.

17. *Spinosus*, der *amerikanische Stachelbock*.

*Rozier Abhandl.* I. S. 26. t. 1. f. C.

*Nigricans*; *antennis longissimis*, *spinis tribus introrsum armatis*.

18. *Brunnus*, der amerikanische braunhaarichte Bockkäfer.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 37. f. 1.

*Forsteri* nov. spec. Inf. Cent. I. p. 37. No. 37.

*Thorace trispinoso*, brunneus, *elytris obtusis*, striis duabus elevatis obscuris; *antennis compressis brevioribus*.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 99. No. 3. t. 13. f. 13. *Capricorne de Pensylvanie*.

*Pensylvanicus*, rufo-fuscus, *thorace vtrinque trispinoso*, pectore tomentoso fulvo, *antennis medio-cribus*.

19. *Incarius*, die Gelbstreife.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 38. No. 38.

*Thorace spinoso*, albus; *elytrorum fasciis* duabus longitudinalibus fulvis, nigro-marginatis, *antennis longioribus*, subciliatis.

20. *Palliatius*, der amerikanische Braunmantel.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 40. No. 40.

*Thorace spinoso*, violaceus; *elytris subfastigiatis a basi ad medium fere testaceis*; *antennis brevibus articulis quatuor clavatis*.

21. *Arenarius*, der Sandbock.

*Scop.* Entom. carn. No. 168.

*Niger*, *apterus*; *capite et thorace*, linea media longitudinali alba, *elytris margine albo*; *antennis brevibus*.

*Poda* Mus. graec. p. 34. *pedestris*.

22. *Aethiops*, der Mohr.

*Scop.* Entom. carn. No. 169.

Totus niger, nitidulus, punctatus; *apterus*, antennis brevibus.

23. *Fulvus*, der Gelbe.

*Scop.* Entom. carn. No. 170.

*Apterous*, punctatus; *elytris fulvis*; antennarum bases, abdomen, femora, et tibiae, *reliqua nigra*.

— Ann. 5. hist. nat. p. 99. No. 68. *Prionus sanguinolentus*.

24. *Timidus*, der Furchtsame.

*Scop.* Entom. carn. No. 171.

Niger; *elytro* flavescente, maculis binis atris; longe fugiens ab hoste, sub umbellaque se recipiens.

— Ann. 5. hist. nat. p. 99. No. 67. *Prionus*.

25. *Pulverulentus*, der Bestäubte.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 95. No. 55.

*Triflvi similis*, sed minor; antennis brevibus; *elytro* macula, puncto que uno aut duobus nigris conjugatis.

26. *Nodosus*, der maryländische Knotenbock.

*Fabric.* S. E. p. 164. *Ceramb.* 3.

*Thorace* spinoso; *elytris* cinereis, nigro-maculatis; *antennis* longissimis; articulo tertio apice *nodo* so.

27. *Cancriformis*, der jamaische krebsartige Holzbock.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 35. f. 1. *Pustulatus*.

*Fabric.* S. E. p. 165: *Cerambyx* 4.

*Thorace* multidentato; dorso plano; *elytris* tibiisque anticis videntatis.

28. *Bidentatus*, der amerikanische Holzbock mit zweymal gezähnelten Flügeldecken.

*Fabric.* S. E. p. 165. *Cerambyx* 6.

*Thorace subspinoso; elytris bidentatis, scabris, cinereo-fuscis.*

29. *Festivus*, der afrikanische Staatsbock.

*Fabric.* S. E. p. 166. *Cerambyx* 10.

*Thorace spinoso, viridi; elytris violaceis, basi viridibus, femoribus ferrugineis, vnidentatis.*

30. *Vittatus*, der brasiliatische schwarzbandirte Holzbock.

*Fabric.* S. E. p. 166. *Cerambyx* 11.

*Thorace spinoso; viridis, nitens, thorace elytrisque nigro-lineatis.*

31. *Velutinus*, die amerikanische Schwarzbinde.

*Fabric.* S. E. p. 167. *Cerambyx* 12.

*Thorace spinoso, niger, vitta atra.*

32. *Spinicornis*, das afrikanische Stachelhorn.

*Fabric.* S. E. p. 167. *Cerambyx* 13.

*Thorace suspinoso, niger, elytris viridibus, apice spinosis.*

33. *Fasciatus*, der trankebarische bandirte Bock.

*Fabric.* S. E. p. 168. *Cerambyx* 17.

*Thorace spinoso, cyaneus; elytris fascia flava; antennis mediocribus ante apicem flavis.*

34. *Pulcher*, der überaus schöne afrikanische Bockkäfer.

*Drury Ins. Tom. I. t. 32. f. 6.*

Gg 2

*Fabric.*

*Fabric.* S. E. p. 171. *Lamia* 6.

*Thorace* spinoso, nigra, antice fasciis, postice punctis viridibus, *elytris* basi mucronatis.

35. *Squamatus*, der *barbadosische Schuppenbock*.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 40. f. 4.

*Thorace* vtrinque acute spinoso, griseo-squamato; *elytris* nitide nigris, apice maculatis.

36. *Balteatus*, der *virginische Bockkäfer mit dem Quergehrenke*.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 37. f. 6.

*de Geer* Inf. Tom. V. pag. III. No. 12. t. 14. f. 3.  
*Capricorne à baudrier*.

Griseo-fuscus; *thorace* spinoso, *elytris* apice bidentatis, fasciaque ferruginea, antennis longissimis.

37. *Mirabilis*, der *afrikanische Wunderbock*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 31. f. 1.

*Thorace* spinoso, nigro-viridis, tantae pulchritudinis, vt describi non possit.

38. *Spinosus*, der *Drurysche Stachelbock*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 31. f. 3.

Fuscus; *thorace* duabus peracutis spinis prominentibus; supra duabus brevioribus; *elytris* supra, apice et ad latera admodum spinosis.

39. *Notatus*, der *norwegische merklich gezeichnete Bockkäfer*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 35. f. 2.

*Thorace* spinoso; capite, antennis, thorace, pedibusque flavis; *elytris* griseo-rufescentibus, atro-punctatis et maculatis.

40. *Seti-*

40. *Setifer*, der *Borstenträger*.

*Schaeff. Icon. t. 176. f. 5.*

*Müller. Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1036.*

*Fusco-alboque varius; thorace gibbo; elytris postice integris punctisque hispidis.*

41. *Tribulus*, der *afrikanische Vierdorn*.

*Fabric. S. E. p. 170. Lamia 1.*

*Thorace quadrispinoso, scutello, elytrisque spinosis; antennis longioribus.*

42. *Pedicornis*, das *neuholländische Fußhorn*.

*Fabric. S. E. p. 170. Lamia 2.*

*Thorace elytrisque spinosis; femoribus anticis cornutis.*

43. *Crista*, der *neuseeländische Federbusch*.

*Fabric. S. E. p. 170. Lamia 3.*

*Thorace acute spinoso, grisea, elytris basi tuberculo compresso tridentato.*

44. *Ambulator*, der *Wanderer auf den Luzonischen Inseln*.

*Fabric. S. E. p. 170. Lamia 4.*

*Thorace antice vtrinque bispinoso, corpore nebuloso.*

*Petiv. Gazoph. t. 37. f. 6.*

45. *Sternutator*, die *barbadosische Löcherdecke*.

*Fabric. S. E. p. 172. Lamia 7.*

*Thorace spinoso; elytris basi porosis, antennis mediocribus.*

46. *Gutturator*, der afrikanische Runzelschild.

Fabric. S. E. p. 172. *Lamia* 8.

*Thorace spinoso; elytris testaceis, albo irroratis,  
basi punctis elevatis, glabris; thoracis ruga media  
transversali.*

47. *Ariolator*, der indianische Linienschild.

Fabric. S. E. p. 172. *Lamia* 9.

*Thorace spinoso, lineolato; elytris fuscis; linea se-  
micirculari alba.*

48. *Titillator*, die karolinische Nebeldecke.

Fabric. S. E. p. 172. *Lamia* 11.

*Thorace spinoso; elytris cinereo - fusco - glaucoque  
nebulosis, antennis longissimis rufis.*

49. *Vittator*, die campechanische Doppelbinde.

Fabric. S. E. p. 173. *Lamia* 12.

*Thorace spinoso; elytris cinereo pulverulentis;  
vittis duabus flavis, nigro marginatis.*

Petiv. Gazoph. t. 24. f. 6.

50. *Hottentotta*, der Hottentotte.

Fabric. S. E. p. 173. *Lamia* 15.

*Thorace spinoso, rufo; elytris nigris, fascia ma-  
culisque duabus marginalibus sanguineis.*

51. *Humeralis*, der Drury'sche Schulterbock.

Fabric. S. E. p. 174. *Lamia* 16.

*Thorace spinoso; elytris flavis, nigro - fasciatis,  
antice mucronatis.*

52. *Trifasciatus*, der afrikanische dreygestreifte  
Bockkäfer.

Fabric.

*Fabric. S. E. p. 174. Lamia 17.*

*Thorace subspinoso, atra; elytris fasciis tribus flavis,  
antennis mediocribus.*

53. *Bifasciatus*, die *jamaische Doppelstreife*.

*Fabric. S. E. p. 174. Lamia 18.*

*Thorace spinoso, postice sinuato; elytris flavis;  
fasciis duabus maculaque rhombea cyaneis.*

54. *Aethiops*, der *kapensische Mohr*.

*Fabric. S. E. p. 174. Lamia 19.*

*Thorace spinoso, atra; elytris fasciis duabus pun-  
ctoque apicis luteis; antennis mediocribus.*

55. *Rotator*, der *indianische Räderbock*.

*Fabric. S. E. p. 175. Lamia 23.*

*Thorace spinoso, cinerea, elytris subfasciatis; an-  
tennis mediocribus.*

56. *Tornator*, der *amerikanische Schwarzfleck*.

*Fabric. S. E. p. 176. Lamia 25.*

*Thorace spinoso, quadripunctato; elytris rufis, ma-  
culis quatuor nigris; antennis brevibus.*

57. *Bankii*, der *kapensische Bankische Bockkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 176. Lamia 26.*

*Thorace subspinoso, grisea; elytris ferrugineo ir-  
roratis; fasciisque duabus cinereis.*

58. *Molitor*, die *indianische weiße Dreybinde*.

*Fabric. S. E. p. 176. Lamia 28.*

*Thorace subspinoso, fusca: vittis tribus integris  
albis, antennis mediocribus.*

59. *Bidens*, der *neuholländische Bockkäfer mit zweygezähnten Flügeldecken*.

*Fabric. S. E. p. 177. Lamia 30.*

*Thorace acute spinoso, grisea, elytris apice bidentatis;*

60. *Solandri*, der *neuholländische Solandersche Bockkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 177. Lamia 31.*

*Thorace subspinoso, nigro; elytris bidentatis, fuscis, cinereo irroratis.*

61. *Cornutor*, der *amerikanische Bockkäfer mit gehörnten Kinnladen*.

*Fabric. S. E. p. 177. Lamia 32.*

*Thorace obtuse spinoso; maxillis basi cornutis; antennis longissimis.*

62. *Leprosus*, der *amerikanische Blätterbock*.

*Fabric. S. E. p. 178. Lamia 33.*

*Thorace spinoso; elytris basi variolosis, cinereis, macula laterali nigra; antennis longis.*

63. *Garganicus*, der *maryländische Weißmond*.

*Fabric. S. E. p. 179. Stenocorus 3.*

*Thorace spinoso; elytris bidentatis, testaceis: lumen in medio alba.*

64. *Semipunctatus*, der *neuholländische halbpunktierte Bockkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 180. Stenocoris 8.*

*Thorace spinoso, inaequali; elytris bidentatis, basi punctatis, apice glabris.*

65. *maculatus*, der amerikanische Zehnfleck.

*Fabric.* S. E. p. 181. *Stenocorus* 13.

*Thorace subspinoso, quadrimaculato; elytris bidentatis, ferrugineis, flavo cinereoque maculatis.*

66. *Drurii*, der amerikanische Drury'sche Bockkäfer mit abgestumpften Flügeldecken.

*Fabric.* S. E. p. 181. *Stenocorus* 14.

*Thorace subspinoso; elytris truncatis, bidentatis, ferrugineis, cinereo fasciatis; antennis brevibus.*

67. *Vndatus*, der amerikanische Bockkäfer mit zwei schwarzen gewässerten Streifen.

*Fabric.* S. E. p. 181. *Stenocorus* 15.

*Thorace spinoso, cinereus; elytris bidentatis; fasciis duabus vndatis, nigris.*

68. *Ornatus*, der pensylvanische Prachtbockkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 183. *Rhagium* 4.

*Thorace spinoso, nigrum; elytris fascia lata flava.*

69. *Tristis*, der neuseeländische Trauerbockkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 186. *Saperda* II.

*Thorace quadrispinosa, corpore fusco.*

70. *Oculator*, der kapensische äugigte Bockkäfer.

*Fabric.* App. S. E. p. 823. *Lamia*.

*Thorace spinoso, nigra; elytris maculis quatuor flavis, subocellaribus, antennis longis.*

71. *Cyaneus*, der indianische blaulichte Bockkäfer.

*Fabric.* S. E. App. p. 823. *Stenocorus*.

*Thorace subspinoso, cyaneus, elytris basi flavis.*

72. *Lynceus*, der *kapensische Doppelfleck*.

*Fabric. S. E. p. 191. Callidium* 18.

*Thorace rotundato, subspinoso, villoso, nigrum; elytris macula subdidyma, fulva.*

73. *Acuminatus*, der *amerikanische Bockkäfer mit zugespitzten Flügeldecken*.

*Fabric. S. E. p. 194. Callidium* 30.

*Thorace rotundato, subspinoso, elytris bidentatis, fuscis, strigis quatuor, flavis; femoribus clavatis compressis.*

74. *Ovatus*, der *eyförmige Bockkäfer*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 206. Ceramb. 10. Le Capricorne brun de forme ovale.*

*Ovatus fuscus, elytris integris.*

75. *Rufo-maculatus*, der *Rothfleck*.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 107. No. 8. Capricorne à taches rouillées.*

*Griseus, thorace spinoso, antennis longis aculeatis; elytris basi vndentatis; maculis sex ferrugineis.*

76. *Chimenis*, der *Chineser*.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 109. No. 10. Capricorne de la Chine.*

*Niger; thorace spinoso, antennis longis cinereo-maculatis; elytrorum lateribus maculis albis sparsis.*

77. *Tigrinus*, der *pensylvanische gefleckte Tiger*.

*de Geer Inf. Tom. V. pag. 114. No. 15. t. 14. f. 6. Capricorne tigré.*

*Fusco-griseus; thorace spinoso, elytris maculis punctisque fuscis sparsis, antennis longioribus.*

78. *Fascia-*

78. *Fasciatus*, der *pensylvanische gefüreifte Bockkäfer*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 114. No. 16. t. 14. f. 7. *Capricorne rayé*.

*Thorace* subspinoso; *elytris* truncatis flavo-griseis; *fasciis* vndulatis punctatis fuscis; *antennis* longioribus maculatis.

79. *Hirsutus*, der *surinamische rauchhaarichte Bockkäfer*.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 115. No. 17. t. 14. f. 8. *Capricorne velu*.

Fuscus; *thorace* spinoso; *elytris* hirsutis striato-punctatis, *antennis* mediocribus maculatis.

80. *Gibbus*, der *surinamische Hökerbock*.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 116. No. 18. t. 14. f. 9. *Capricorne bossu*.

Fuscus, cinereo-maculatus; *thorace* rugoso subspinoso; *elytris* gibbis punctis nigris hispidis, *antennis* mediocribus.

#### IV. KLASSE.

*Holzböcke mit cylindrischem Brustschild ohne Dornen.*

1. *Punctatus*, der *portugiesische Punktirte*.

Füesslins Verz. S. 13. No. 259.

Sulzers Gesch. S. 45. t. 5. f. 10.

Schaeff. Icon. t. 101. f. 1.

Linn. Mant. p. 1067. No. 7.

Müllers Suppl. B. S. 240. 63. a. der *Punktbock*.

Fabric. S. E. p. 187. *Saperda* 14.

*Thorace*

*Thorace mutico, totus viridis, punctis nigris numerosis; antennis mediocribus.*

2. *Trilineatus*, die *jamaische Dreylinie*.

*Linn. Mantiss. p. 532.*

*Drury Ins. Tom. I. t. 41. f. 1.*

*Fabric. S. E. p. 179. Stenocorus 6.*

*Thorace mutico; elytris apice vnidentatis; margine omni albo.*

*Müllers Suppl. B. S. 240. 63. b. der *dreylinige Bock*.*

3. *Hieroglyphicus*, der *hieroglyphisch gezeichnete sibirische Bockkäfer*.

*Pallas Reisen II. Anh. No. 59.*

*Forma Scalaris; subtus coerulecenti-canus; elytra glabra nigra; caput et thorax lanuginosa.*

*Müllers S. B. S. 241. 63. c. der *Bilderbock*.*

4. *Perforatus*, der *sibirische durchbohrte Bockkäfer*.

*Pallas Reisen II. Anh. No. 60.*

*Magnitudo et forma praecedentis; supra pulvere albido, subtus lanugine flavescens; elytra albido-pulverulenta; quinque a dorso longitudinaliter positis punctis nigris, tot foramina referentibus.*

*Müllers S. B. S. 241. 63. d.*

5. *Tetraphthalmus*, das *neuyorkische Vierauge*.

*Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 41. No. 41.*

*Thorace mutico subcylindrico, corpore nigro-cinerascente; capite, thorace, et elytris rubris nigro-punctatis, oculis quatuor; antennis brevibus.*

6. *Ferru-*

6. *Ferrugineus*, der amerikanische Rostbock.

Rozier Abhandl. I. Th. S. 27. t. I. f. D.

*Capite et thorace nigricantibus, elytris ferrugineis; antennis introrsum spinosis.*

7. *Carbonarius*, der Köhler.

Scop. Ent. carn. p. 55. No. 178.

*Niger totus et opacus; antennis brevibus.*

8. *Lunulatus*, der jamaische Bockkäfer mit dunkelbraunen halben Monden.

Drury Inf. Tom. I. t. 37. f. 4.

*Obscure fusco-rufescens; thorace subcylindrico mucico; elytris pallide-rubeis, quatuor fuscis lunulis; apice dentatis; sutura prope thoracem cor fuscum referentibus.*

9. *Spinicornis*, das jamaische Stachelhorn.

Drury Inf. Tom. I. t. 41. f. 4.

Fabric. S. E. p. 179. *Stenocorus* 7.

*Thorace inermi, tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis.*

10. *Marginalis*, der kapensische Schwarzrand.

Fabric. S. E. p. 169. *Cerambyx* 22.

*Thorace inermi; elytris subtestaceis; margine omni nigro.*

11. *Brevicornis*, das afrikanische Kurzhorn.

Fabric. S. E. p. 169. *Cerambyx* 23.

*Thorace inermi, viridi; elytris obscuris; antennis brevibus nigris.*

12. *Glabratus*, die *Glattlinie von der Kreuzinsel.*

*Fabric.* S. E. p. 180. *Stenocorus* 10.

*Thorace mutico, cinereo, linea glabra, fusca;*  
*elytris bidentatis.*

13. *Annuulatus*, der *Bankische Dreyringel.*

*Fabric.* S. E. p. 180. *Stenocorus* 12.

*Thorace lineato; elytris vndentatis; antennis lon-*  
*gioribus; annulis tribus albis.*

14. *Hirtus*, der *neuseeländische Haarbock.*

*Fabric.* S. E. p. 184. *Saperda* 4.

*Grisea, villosa; scutello flavo.*

15. *Lateralis*, die *Bankische Rostseite.*

*Fabric.* S. E. p. 185. *Saperda* 7.

*Nigra; thoracis lateribus, elytrorumque vitta late-*  
*rati ferrugineis.*

16. *Lynceus*, der *neuseeländische Schielbock.*

*Fabric.* S. E. p. 185. *Saperda* 8.

*Thorace atro, puncto utrinque ferrugineo: elytris*  
*griseis, acuminatis.*

17. *Tremulus*, der *hallische Zitterbock.*

*Fabric.* S. E. p. 186. *Saperda* 13.

*Viridis, thorace punctis duobus; elytris quatuor*  
*nigris.*

18. *Violaceus*, der *piemontesische Blaubock.*

*Fabric.* S. E. p. 187. *Saperda* 15.

*Thorace cylindrico, inermi; corpore violaceo.*

19. *Villoso-viridescens*, der grünhaarichte Bockkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 76. No. 13. *Capricorne velu verdâtre.*

Flavo-viridis; thorace mutico cylindrico; fasciis tribus longitudinalibus flavis; antennis longioribus nigro cinereoque maculatis.

20. *Pygmaeus*, der Zwerp.

de Geer Inf. Tom. V. p. 80. No. 17. t. 4. f. 5. *Capricorne nain.*

*Minutissimus* fuscus; thorace mutico cylindrico; antennis ferratis pilosis.

21. *Minimus*, der kleinste Bockkäfer.

Seligm. ausl. Vögel Tom. IV. t. 108. f. 4.

Scarab. *capricornus*, cutem penetrans.

22. *Hirtipes*, der indianische Rauchfuß.

de Geer Inf. Tom. V. p. 116. No. 19. t. 4. f. 10. *Capricorne à tarses velus.*

Fuscus; thorace mutico cylindrico, elytris apice truncatis bidentatis, plantis anticis hirsutis; antennis longioribus medio macula alba.

23. *Pustulatus*, der gebrandmarkte Holzbock.

von Paula Schrank Beytr. zur Naturgesch. S. 66. §. 10.

Niger; thorace inermi cylindrico; medio macula ferruginea.

24. *Erytrocephalus*, der rothköpfige Holzbock.

von Paula Schrank Beytr. zur Naturgesch. S. 67. §. 12.

Thorace inermi cylindrico; niger; capite, thorace, pedibus abdomineque poslice testaceis.

## V. KLASSE.

*Holzböcke mit rundem Brustschild ohne Dornen.*

1. *Clavipes*, der amerikanische Keulfuß.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 42. No. 42.

*Thorace globoſo mutico, ferrugineo, corpore testaceo, capite nigro; femoribus clavatis, vſtulatis; antennis hispidis mediocribus.*

v. No. 8.

2. *Floralis*, der jaikische Blumenbock.

*Pallas Reisen* II. Anh. No. 63.

*Thorax flavus, zona lata flava. Corpus subtus totum pulcherrime citrinum; antennae pedesque testaceae. Caput flavo-annulatum. Elytra nigra, fasciis pulcherrime flavis.*

*Müllers S. B. S. 242. 84.*

3. *Villicus*, der Wollbock.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 13. No. 133.

*Thorace mutico, cupreο tuberculato; elytris nigris; punctis striatis; antennis abdomine pedibusque ferrugineis.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1066.

*Thorace cupreο, tuberculato; elytris nigris, punctis striatis; antennis abdomine pedibusque ferrugineis.*

*Fabric. S. E. p. 196. Lept. 3.*

*Ferruginea; antennis elytrisque fuscis.*

4. *Viridis*, der grüne Uferbock.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 14. No. 134.

*Thorace mutico, tuberculato, violaceo; elytris viridibus, punctis striatis; antennis nigris.*

*Müller*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1067.

*Leptura (viridis)* thorace violaceo, tuberculato; elytris viridibus, punctis striatis; antennis nigris.

5. *Variegatus*, die neuylorkische Buntschecke.

*Drury* Inf. Tom. I. t. 41. f. 6.

*Thorax* niger, ovatus, griseo-flavo-villosus; *elytra* griseo-flavo-variegata.

6. *Bipunctatus*, der afrikanische Zweypunkt.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 31. f. 2.

Totus griseo-fuscus; *thorace* rotundato mutico; \*) *elytris* griseis, ad marginem macula flava rhomboidali, in quarum margine bini oculi aterrimi.

7. *Marylandicus*, der maryländische Bockkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 179. *Stenocorus* 5.

*Thorace* depresso, tuberculato, mutico; *elytris* bidentatis, fusco cinereoque nebulosis; *antennis* mediocribus.

8. *Blandus*, der indianische violette Bockkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 182. *Calopus* 2.

Violaceus; *elytris* antice luteis, *antennis* brevibus.

9. *Clavipes*, der deutsche Keulträger.

*Fabric.* S. E. p. 188. *Callidium* 3.

Nigrum, opacum; *femoribus* omnibus clavatis; *antennis* longioribus. v. No. 1.

10. *Bar-*

\*) In der Beschreibung sagt der Verf. zwar: es lässe an jeder Seite des Brustschildes ein dicker Dorn, den ich aber in der Zeichnung gänzlich vermisste, weshalb ich ihn auch in diese Klasse gebracht habe.

10. *Barbatus*, der *trankebarische gebärtete Bockkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 189. *Callidium* 8.

*Thorace* rotundato, subitus vtrinque macula tomentosa, ferruginea; *antennis* longioribus *barbatis*.

11. *Variegatus*, die *neuseeländische Buntschecke*.

*Fabric.* S. E. p. 189. *Callidium* 9.

*Thoracis* dorso glabro, atro, lineis quatuor albis; *elytris* flavo irroratis.

12. *Lineatus*, der *neuseeländische lineirte Bockkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 189. *Callidium* 10.

*Thorace* lineis duabus; *elytris* quatuor albis, mediis coeuntibus, abbreviatis.

13. *Sulcatus*, der *neuseeländische Gefurchte*.

*Fabric.* S. E. p. 189. *Callidium* 11.

*Thorace* tomentoso, cinereo; *elytris* albo nigro-que striatis.

14. *Hafniensis*, der *kopenhagische schwarze Bockkäfer mit vier weissen Linien*.

*Fabric.* S. E. p. 190. *Callidium* 15.

*Thorace* subvilloso, nigro; *lineis* quatuor albis, intermediis abbreviatis; *antennis* brevibus.

15. *Aulicus*, der *kopenhagische schwarze glatte Bockkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 190. *Callidium* 16.

*Thorace* laevi, nitido, corpore nigro, opaco; *elytris* laevibus; *antennis* brevibus.

16. *Flavus*,

16. *Flavus*, der amerikanische gelbe Bockkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 191. *Callidium* 19.

*Thorace* subrotundo, mutico, *corpore* flavo; *fe-*  
*moribus* clavatis, *antennis* mediocribus.

17. *Colonus*, der karolinische Kolonist.

*Fabric.* S. E. p. 191. *Callidium* 21.

*Thorace* rotundato; *elytris* lividis, *fasciis* tribus  
fuscis; *antennis* brevibus.

18. *Flexuosus*, der amerikanische Bockkäfer mit sie-  
ben gebogenen Streifen.

*Fabric.* S. E. p. 191. *Callidium* 22.

*Thorace* rotundato, flavo-fasciato; *elytris* fasciis  
septem flavis, anticis antrorsum, posticis retrorsum  
arcuatis.

*Petiv.* Gazoph. t. 27. f. 3.

19. *Minutus*, der neuseeländische kleine Bockkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 192. *Callidium* 23.

*Testaceum*; *elytris* fascia abbreviata, alba.

20. *Angulatus*, der amerikanische Winkelbock.

*Fabric.* S. E. p. 192. *Callidium* 24.

*Thorace* globoso, nigro, flavo, fasciato; *elytris* ni-  
gris; *fasciis* sex flavis, secunda tertiaque *angulatis*.

21. *Fulminans*, der Bankische Strahlenbock.

*Fabric.* S. E. p. 192. *Callidium* 25.

*Thorace* globoso, maculato; *elytris* nigris; *fasciis*  
*undato-angulatis* albis.

22. *Mucronatus*, der amerikanische Bockkäfer mit krontzackigen Flügeldecken.

*Fabric.* S. E. p. 193. *Callidium* 29.

*Thorace* rotundato, maculato; *elytris* mucronatis nigris, strigis tribus arcuatis, flavis, basi ferrugineis.

23. *Aegyptiacus*, der aegyptische Rostbock.

*Fabric.* S. E. p. 194. *Callidium* 33.

*Thorace* rotundato, ferrugineo, *elytris* cinerascentibus; *fastiis* tribus fuscis, prima annulari.

24. *Clavicornis*, das kapensische Breithorn.

*Fabric.* S. E. App. p. 824. *Saperda*.

*Thorace* rotundato, viridis; *elytris* maculis tribus flavis.

25. *Longipes*, der kapensische Langfuß.

*Fabric.* S. E. App. p. 824. *Saperda*.

*Thorace* subgloboso, violacea; *antennis* longioribus; *femoribus* clavatis.

25. *Nigrò-planus*, der schwarze flache Bockkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 88. No. 23. *Capricorne noir applatti*.

*Corpo* thoraceque mutico subrotundo depresso; *femoribus* clavatis; *antennis* mediocribus crassis.

*Hoefn.* Inf. Tab. 16.

26. *Aeneus*, der erzfarbige Bockkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 89. No. 25. *Capricorne bronzé*.

*Fusco-aeneus*, nitidus; *thorace* mutico subrotundo depresso, *antennis* pedibusque nigris.

28. *Pulverulentus*, der *pensylvanische bestaubte Bockkäfer*.

de Geer Ins. Tom. V. pag. 118. No. 21. t. 14. f. 12.  
*Capricorne poudré*.

*Thorace mutico subrotundo, convexo, nigro-fusco; elytris castaneis griseo-villoso, apice bidentatis; antennis longioribus aculeatis.*

29. *Lucidus*, der *Leuchtböck*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 98. No. 60.

*Stenocorus niger; elytris fusco-castaneis, lucidis.*

30. *Rufus*, das *Fuchshorn*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 98. No. 61.

*Stenocorus niger; thorace villoso; antennis rufis;*

31. *Fuliginosus*; der *Rostböck*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 98. No. 62. *Stenocorus*.

*Totus ater, opacus; antennae mediocres.*

32. *Fenicus*, der *Zweyhöker*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 98. No. 63. *Stenocorus*.

*Elytra atro-violacea; thorax nitens, rufus; tuberculis obscuris binis.*

33. *Calcaratus*, der *Spornböck*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 98. No. 64. *Stenocorus*.

*Totus nigro-violaceus; femora rufa; posticis dentate instructis.*

34. *Caraboides*, der *laufkäferartige Holzbock*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 99. No. 65. *Stenocorus*.

*Statura et facies *Carabi minoris*; totus rufus; elytris atro-violaceis.*

35. *Ater*, der *schwarzpunktirte Holzbock*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 100. No. 69. Prionus.*

*Totus niger punctatus, elytris truncatis; antennis mediocribus.*

36. *Bracatus*, die *Dickhüfte*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 100. No. 70. Prionus.*

*Niger; antennis pedibusque rufis; femoribus posticis crassis; spina armatis.*

37. *Tenuis*, der *Schmale*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 100. No. 71. Prionus.*

*Niger, nitens; elytris attenuatis; antennis mediocribus.*

38. *Octopunctatus*, der *Holzbock mit acht Punkten*.

von *Paula Schrank* Beytr. zur Naturgesch. S. 65. §. 9.

*Viridis; thorace tereti mutico; elytris punctis octo nigris.*

39. *Ferreus*, der *eisenfarbige Holzbock*.

von *Paula Schrank* Beytr. zur Naturgesch. S. 66. §. II.

*Thorace tereti mutico, plumbeo-niger immaculatus.*

205. GESCHLECHT. *Leptura; Schmalschwanz.*  
*Holl. Bokjes. Afterbockküfer.*

*Müllers Linn. Naturf. 5. B. I. Th. S. 283. weiche Holzböcke.*

*Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 14. Afterbockküfer.*

*Sulzers Kennz. der Inf. S. 64. weicher Bockküfer.*

— — abgekürzte Gesch. der Inf. S. 46. *Afterbockküfer.*

*Pontop-*

*Pontoppid.* N. G. von D. S. 206. *weicher Holzbock.*

*Börners Samml.* I. Th. S. 471. \*)

*Eberhards Thiergesch.* S. 198. *Afterholzkäfer.*

*Beckmanns Anfangsgr.* der N. H. S. 97. *Holzkäfer.*

*Onomat.* hist. nat. P. 4. S. 790. *Holzkäfer.*

*Bomar.* Dict. des Anim. V. p. 291.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 212. *Leptura.* p. 221. *Stenocorus.*

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 121. des *Leptures.*

*Fabric.* S. E. p. 195. *Donacia* et p. 196. *Leptura.*

*Scop.* Entom. carn. p. 45.

— Ann. 5. hist. nat. p. 100.

*Milleri* Faun. Fridr. p. 14.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 92.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 194.

*Pallas* Spicil. Zool. fascic. 9. p. 4. \*\*)

### I. Mit eyförmigem Bruststück und abgestützten Flügeldecken.

#### 1. *Aquatica*, der *Wasserschwimmer*.

*Müllers L. N. S.* 5. Th. 1. B. S. 284.

*Fießlins Verz.* S. 14. No. 269. *Wasser-Afterbockkäfer.*

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 203. No. 1. †)

Hh 4

Frisch

\*) Der Name: *weiche Holzböcke*, den ihnen Sulzer in seinen Kennzeichen beigelegt hat, ist nicht der bequämste, wie Herr M. Börner erinnert, indem Sulzer selbst nachher sagt: dass die Flügeldecken der Lepturen härter, als bey den vorigen von gleicher Grösse wären.

\*\*) Nach Pallas Meynung ist der Uebergang von den Lepturis zu den Cerambycibus so unmerklich, dass sie füglich für einerley Geschlecht zu halten sind.

†) Der Bischof gedenkt einer Abänderung, die an der hintersten Lende keinen Zahn hat. Das besondere daran ist dieses, dass

*Frisch* Inf. XII. Th. S. 33. No. 28. 3. Pl. t. 6. f. 2. der  
braun verguldeten Holzkäfer von mittelmäßiger Größe  
nach den kleinen.

*Abta Vpsal.* 1736. p. 20. No. 3. *Leptura rubro-*  
*aenea.*

*Poda* Mus. graec. p. 36.

*Fabric.* S. E. p. 195. *Donacia* 1. *crassipes.*

*Femoribus posticis clavatis, dentatis.*

*Müller* Faun. Fridr. p. 14. No. 135.

— — Zool. Dan. Prodri. p. 92. No. 1039.\*)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 229. *Stenocorus* 12. Le *Sten-*  
*tore doré.*\*\*)

*Deauratus; femoribus posticis dentatis.*

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 140. No. 18. t. 4. f. 14. 15.

*Lepture aquatique à cuisses épineuses.*

*Leptura (aquatica spinosa) viridi deaurata, seu vio-*  
*lacea, antennis nigris, pedibus fuscis, femoribus po-*  
*sticis magnis dentatis.*

## 2. *Melanura*, der Schwarzafter.

*Müller* l. c. S. 284. No. 2. t. 6. f. 1. 2. der *Schwarz-*  
*arsch.*

*Füsslins* Verz. S. 14. No. 270. *Schwarzarsch.*

*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 792. No. 27. der *große*  
*schwarze Holzbock mit rothschwarzen Flügelspitzen.*

*Abta*

dass sie an den hintersten Füßen mit einem solchen *Haarbusche*  
verschen ist, wie der *Wasserkäfer*, und gleichwohl *Klauen* hat.  
Uebrigens ein ächtes *Amphybium*, sowohl der Gestalt, als der  
Lebensart nach.

\*<sup>o</sup>) Aliam, sagt der berühmte Staatsrath M. reperi copiose: tho-  
race elytrisque nigris; antennis pedibusque ferrugineis. An  
var. *aquatica*? *Schaeff.* Icon. t. 103. f. 6.

\*\*) *Geoffroi* hat fünfzehn Abänderungen derselben.

Aet. Vpsal. 1736. p. 20. No. 5. — *Elytris testaceis, apice nigris (quae mas)* — No. 4. *Elytris rubris.*

Schaeff. Icon. t. 39. f. 4. (cit. Füessl. et Fabric.)

— — — f. 8. 9. (cit. de Geer).

Fabric. S. E. p. 196. *Leptura I.*

Aet. Nidr. III. 13.

Mülleri Faun. Fridr. p. 14. No. 136.

— — Zool. Dain. Prodr. p. 93. No. 1053.

Nigra, thorace conico; elytris attenuatis, rufofuscis; sutura apiceque nigris.

a. Thorace con. elytr. att. luteis, margine apiceque nigris; abdomine argenteo.

b. Thorace con. elytr. att. pedibusque luteis; margine suturaque nigris.

An varietates?

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 226. *Stenocorus 7. t. 4. f. 1.*  
Le Stenocore noir à etuis rougeatres.

Niger, elytris rubescensibus lividis.

Scop. Ent. carn. No. 149. Nigra, elytris sordide flavescentibus, apice nigris.

Poda Mus. graec. p. 37.

de Geer Inf. Tom. V. p. 137. No. 14. *Lepture variable.*

L. (variabilis) nigra, pedibus posticis corpore longioribus; elytris MARIS flavo-testaceis, apice nigris; FEMINAE obscure rubris.

3. *Rubra*, der Rothschild.

Müller l. c. S. 285. No. 3. das Purpurſchild.

Füesslins Verz. S. 14. No. 271.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 792. No. 28. der große schwarze Holzbock mit dem rothen Bruststücke, Füssen und Flügeldäcken.

*Frisch* Inf. 12. Th. S. 37. 3. Pl. t. 6. f. 6.\* der braun-rothe Holzkäfer der größern und kleinern Art, als dem Weiblein, und deren braungelben Männlein.

*Schaeff.* Icon. t. 39. f. 2.

*Fabric.* S. E. p. 196. No. 4.

*Müller* Faun. Fridr. p. 14. No. 139.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1056.

*de Geer* Inf. Tóm. V. p. 132. No. 7. *Lepture rouge.*  
Nigra; thorace, elytris tibiisque obscure rubris.

#### 4. *Sanguinolenta*, der Blutflügel.

*Müller* l. c. S. 285. No. 4.

*Füeßlins* Verz. S. 14. No. 272. der Blutschild.

*Schaeff.* Icon. t. 39. f. 9.

*Fabric.* S. E. p. 196. No. 2.

*Müller* Faun. Fridr. p. 14. No. 137.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1052.

Nigra; thorace conico; elytris attenuatis, sanguineis.

#### 5. *Testacea*, der Gelbschild.

*Müller* l. c. S. 285. No. 5. das Ziegeldach.

*Füeßlins* Verz. S. 14. No. 274.

*Fabric.* S. E. p. 197. No. 5.

*Schaeff.* Icon. t. 39. f. 3. (alleg. *Füeßl.* et *Fabric.*)

— — — t. 85. f. 7. (teste *Müller*o).

*Raj.* Inf. 82. No. 19. *Scarabaeus, Capricornus* dilatus; elytris et pedibus fulvis, seu rufis; thorace longo, angusto nigro.

*Müller*

\*) Es hat zwar *Linné* bey der vorigen eben das Citatum des *Frisch* angeführt, das bey dieser stehtet, weil aber solches *Fabric.* sowohl als der Herr *de Geer* bey dieser allein gesetzt hat, so glaub' ich, daß es hier am rechten Orte stehe.

*Müller* Faun. Fridr. p. 14. No. 138.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1054.

Nigra; thorace conico; elytris attenuatis; tibiis, tarsisque luteis.

de Geer Inf. Tom. V. p. 135. No. 11. *Lepture à etuis jaunes.*

Nigra; elytris, tibiis pedibusque flavo-testaceis.

6. *Revestita*, Schrebers Schwarzdecke.\*)

*Müller* l. c. S. 285. No. 6. die Schwarzdecke.

7. *Virens*, das schwedische Grünböcklein.\*\*)

*Müller* l. c. S. 286. No. 7. das Grünböcklein.

*Aba Vpsal.* 1736. p. 20. No. 6. *Leptura maxima nigra*, subtus virescens.

*Fabric.* S. E. p. 197. No. 6.

Sericeto-virescens; antennis fusco viridique variis.

de Geer Inf. Tom. V. p. 131. No. 6. *Lepture verte.*

Flavo-viridis; antennis nigro-luteoque variis.

8. *Sericetia*, das schwedische Seidenböcklein.

*Müller* l. c. S. 286. No. 8. das Seidenböcklein.

*Fabric.* S. E. p. 198. No. 15.

*Schaeff.* Icon. t. 84. f. 1.

9. *4-maculata*, der schwarze Vierfleck.

*Müller* l. c. S. 286. No. 9. der Schwarzfleck.

*Füesslins Verz.* S. 14. No. 275. *Vierfleck.*

*Schaeff.* Elem. t. 118. f. 2. *Stenocorus*, *Stutzkäfer.*

— — Icon. t. 1. f. 7.

*Fabric.* S. E. p. 197. No. 10.

10. Inter-

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

10. *Interrogationis*, das *Fragzeichen*.*Müller* l. c. S. 286. No. 10.*Müller* Faun. Fridr. p. 14. No. 140.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1057.

11. *6-maculata*, der *Sixfleck*.*Müller* l. c. S. 287. No. 11. der *Punktrand*.*Füesslin* Verz. S. 14. No. 276. *Sixfleck*.*Acta Vpsal.* 1736. p. 20. No. 7. *Leptura elytris testaceis, maculis nigris*.*Fabric.* S. E. p. 197. No. 11.*Raj.* Inf. 81. 18. *Scarabaeus elytris pallidis, nigris maculis pictis*.*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1058.*Schaeff.* Icon. t. 39. f. 6. (alleg. *de Geer*). \*)*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 133. No. 9. *Lepture à bandes jaunes*.*L. (testaceo-fasciata) nigra, elytris fasciis tribus transversis vndulatis testaceo-flavis.*12. *4-fasciata*, das *Vierband*.*Müller* l. c. S. 287. No. 12.*Füesslin* Verz. S. 14. No. 277. *Vierband*. \*\*)*Schaeff.* Icon. t. 59. f. 6.*Fabric.* S. E. p. 198. No. 13.*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1047.*Nigra, thorace conico; elytris attenuatis; fasciis quatuor flavis.**de Geer*\*) Aus dieser Schäfferschen hat Müller Prodr. p. 93. No. 1046. eine *nene fasciata* gemacht.\*\*) Das Citatum beyn Füesslin muss nicht heissen Schaeff. Icon. t. 39. sondern t. 59. denn die t. 39. f. 6. ist eine *nene*. S. Müller Prodr. p. 93. No. 1046. L. *fasciata*.

de Geer Ins. Tom. V. pag. 132. No. 8. t. 4. f. II.  
*Lepture à huit tâches jaunes.*

L. (*oetho-maculata*) nigra, maculis quatuor flavis in singulo elytro.

13. *Attenuata*, der *Schmalbock*.\*)

Müller l. c. S. 286. No. 14. der *Schmalhans*.

Füesslin Verz. S. 14. No. 278.

Schaeff. Icon. t. 65. f. II.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1048. Nigra; thorace conico; elytris fastigiatis, attenuatis; fasciis quatuor; pedibus abdomineque fulvis.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 99. No. 66. *Prionus attenuatus*.

Fabric. S. E. p. 198. No. 12.\*\*)

14. *Nigra*, der *schwarze Afterbockkäfer*.

Müller l. c. S. 286. No. 14. t. 6. f. 3. der *Spiegel*.

Füesslin Verz. S. 14. No. 279. der *Schwarze*.

Abhandl. der schweed. Akad. der Wissensch. 30. Th. S. 195. †)

Schaeff. Icon. t. 39. f. 7.

Fabric. S. E. p. 197. No. 8.

*Mülleri*

\*) Linné frägt hierbey: ob dies wohl das Männchen des vorigen seyn möchte, und Herr Müller sagt nichts weiter, als es sey möglich; Scopoli aber und Füesslin bezeugen durch ihre Erfahrungen, da sie beyde in der Begattung angetroffen: dass diese Attenuata das Weibchen der L. quadrifasc. sey.

\*\*) Das Schäffersche Citatum daselbst Icon. t. 39. f. 6. ist falsch, und muss heissen: t. 65. f. II. (testa Müll.)

†) An diesen Lepturen hat der Herr von Geer eine besondere Art von Milben l. c. t. 4. f. 1-7. entdeckt.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1050. *Nigra*,  
atra; *thorace conico*; *elytris attenuatis*; *abdomine*  
*rufo*.\*)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 227. *Stenocor.* 9. *Le Stenocor*  
*noir à ventre rougeâtre.*

*Niger nitidus*, *abdomine fusco rubente.*

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 144. No. 24. *Lepture noire.*

II. *Mit erhabenem runden Bruststück und stumpfen Flügeldecken.*

15. *Virginea*, die *Jungfer*.

*Müller* l. c. S. 288. No. 15.

*Füesslins* Verz. S. 14. No. 280.

*Schaeff.* Icon. t. 58. f. 3. (all. *Füessl.* et *de Geer*).

— — — t. 4. f. 13. (all. *Müller*o).

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 552.

*Cicindela* *elytris viridi-coerulecentibus*; *abdomine* *fulvo*.

*Fabric.* S. E. p. 198. No. 17.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 856. *der grünblaulichte*  
*leuchtende Käfer mit dunkelrother Brust.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1064.

*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 144. No. 23. *Lepture*  
*à etuis bleues.*

*L.* (*violacea*) *nigra*; *elytris violaceis nitidis*; *abdo-*  
*mine flavo-rufo*.

16. *Collaris*, der *Rothhals*.

*Müller* l. c. S. 288. No. 16.

*Füesslins* Verz. S. 14. No. 281. \*\*)

*Fabric.*

\*) Das hier angeführte *Schäffersche Citatum* t. 29. f. 7. muss wohl  
heissen: t. 39.

\*\*) Im *Füesslin* muss es heissen: *Schaeff.* t. 58. f. 9.

*Fabric.* S. E. p. 198. No. 16.

*Schaeff.* Icon. t. 58. f. 9.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 228. *Stenocorus II.* Le *Sten-*  
*core noir à corcelet rouge.*

Niger, *thorace rubro.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. I. No. 551. *Cicindela atra;*  
*thorace rufo, elytris nigro-coeruleis.*

*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 855. der *schwarze leuchtende Käfer mit rother Brust und schwarzblauen Flügeldecken.*

*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 143. No. 22. *Lepture à corcelet rouge.*

*L. (ruficollis) nigra; thorace abdomineque rubris.*

### 17. *Rustica*, das Baurenböcklein.

*Müller* l. c. S. 288. No. 17.

*Füeßlin's Verz.* S. 14. No. 282.\*)

*Fabric.* S. E. p. 193. *Callidium 28.*

*Thorace globoſo, immaculato; elytris nigris; fuciſ linearibus albis.*

*Raj.* Inf. 83. 25. *Scarabaeus niger, elytris lineis duabus albis.*

*Petiv.* Gazoph. t. 63. f. 5.

*Müller's Zool. Dan. Prodr.* p. 93. No. 1041.

*Nigra; thorace globoſo; elytris fuscis, lineis transversis tribus albis, antica arcuata puncto medio.*

*Schaeff.* Icon. t. 2. f. 7.

*Geoffr.* Inf. Tom. V. p. 215. *Leptura 12.* La *Lepture à rayes blanches.*

*Nigra; elytrorum lineis transversis punctisque albis.*

### 18. *Mij-*

\*) Im Füeßlin muss es bey Schaeff. Icon. nicht t. 11. sondern t. 2. heißen.

18. *Mystica*, das vielfarbige Böcklein.*Müller* l. c. S. 288. No. 18. der Scheck.*Füeßlins Verz.* S. 14. No. 283. Vierfarbiger.*Fabric.* S. E. p. 194. *Callidium* 34.*Thorace rotundato; elytris fuscis, fasciis apiceque cinereis, basi rufis.**Raj.* Inf. p. 83. No. 26. *Scarabaeus parvus; elytris triplici colore, rufo, albo, nigro.**Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1042.*Nigra; thorace globoſo; elytris antice rufis, postice cinereis, medio nigro lineis arcuatis albis.**Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 217. *Leptura 15. La Lepture arlequine.**Nigra; elytris maculis testaceis, nigris, albidis, lineisque nigris, et albicantibus variegatis.**Lift.* App. p. 386. No. 15. *Scarabaeus niger, summis alarum thecis flavesceribus, iisdemque imis albicantibus, praeter alias quasdam lineolas albidas.**de Geer* Inf. Tom. V. pag. 82. No. 19. *Capricorne à rayes blanches courbées.*<sup>\*)</sup>*CERAMBYX (albi-fasciatus) niger, thorace multico subgloboso, elytris lineis tribus arcuatis, fascia que transversa griseis; antennis brevioribus.*19. *Alni*, das Erlenböcklein.<sup>\*\*)</sup>*Müller* l. c. S. 289. No. 19.*Fabrit.* S. E. p. 195. *Callidium* 35.20. *Detrita*, das verblaßte Böcklein.*Müller* l. c. S. 289. No. 20. der Queerstrich.*Vddm.*

<sup>\*)</sup> Der Herr de Geer hat hierbey des Geoffr. Lept. 12. Tom. I. p. 215. angeführt, die *Fabric.* bey der vorigen, nämlich bey der *Rustica* citirt hat.

<sup>\*\*) Nicht abgebildet.</sup>

Vddm. Diss. 31.

Schaeff. Elem. t. 76. f. 2. *Leptura*, *Asterholzkäfer*.

— — Icon. t. 38. f. 9. t. 64. f. 3.

Fabric. S. E. p. 194. *Callidium* 31.

*Thorace rotundato*, flavo, fasciato; *elytris nigris*;  
*fasciis quinque* flavis, pedibus ferrugineis.

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1049.

Nigra; *thorace globoso*, *fasciis duabus*; *elytris fa-*  
*sciis quinque luteis*; *antennis pedibusque rufis*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 216. *Leptura* 13.

La *Lepture noire à étuis gris tachés de jaune*.

Nigra; *elytris pallido-fuscis*, *signaturis flavis*.

## 21. *Arcuata*, der Bogenstrich.

Müller I. c. S. 289. No. 21. t. 6. f. 5.

Füesslin's Verz. S. 14. No. 284. *Bogenstrich*.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 980. No. 32. der schwarze Baumkäfer mit gelben Queerstreifen, von welchen etliche bogenweise zurückgeschlagen sind.

Frisch Inf. 12. Th. S. 31. No. 22. 3. Pl. t. 4. f. 1. der schwarze mit gelb bezeichnete Holzkäfer.

Fabric. S. E. p. 192. *Callidium* 26.

*Thorace rotundato*; *elytris fasciis quatuor flavis*,  
prima interrupta; reliquis retrorsum arcuatis.

Raj. Inf. p. 83. No. 23. *Scarabaeus major*, corpore longo, angusto, nigro, cum tribus in vtraque ala lineis transversis, lutescentibus.

Leche nov. inf. spec. diss. abo. sp. 30. *Cerambyx niger*, *elytris fasciis quatuor flavis*, arcuatis.

Müller's Faun. Fridr. p. 14. No. 142.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1063.

Nigra; *thorace globoso*; *elytris fasciis flavis*, tribus recurvis, *antennis pedibusque rufis*.

Schaeff. Icon. t. 38. f. 6. t. 107. f. 2. 3.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 97. No. 58.

*Stenocorus*, niger; *elytro* basi et apice fasciisque tribus flavis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 212. *Leptura* 10.\* *La Lep-*  
*ture aux croissans dorés.*

Nigra; *elytrorum* lineis quatuor arcuatis, punctis-  
que flavis; pedibus testaceis.

*Petiv.* Gazoph. t. 63. f. 7.

### 22. *Verbaisci*, das *Wollkrautböcklein*.

*Müller* l. c. S. 290. No. 22.

*Füesslin* Verz. S. 14. No. 285.

*Sulzers Gesch.* S. 47. t. 5. f. 12. der *Wollblumkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 194. *Callidium* 32.

*Thorace* rotundato, nigro, maculato; *elytris* sub-  
virescentibus, fasciis tribus nigris, prima lunari.

### 23. *Arietis*, der *Widder*.

*Müller* l. c. S. 290. No. 23. t. 6. f. 6. *holl.* Ourust;  
die *Unruhe*.

*Füesslins Verz.* S. 14. No. 286. der *Widder*.

*Frisch* Inf. 12. Th. S. 32. No. 25. die fünfte Art  
schwarzer mit gelb bezeichneter Holzkäfer. 3. Pl. t. 5. f. 3.

*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 981. No. 33. der schwar-  
ze gelb und queer gestreifte Baumkäfer, woran der  
zweyten Streif vorwärts in einen Bogen geht.

*Acta Vpsal.* 1736. p. 20. No. 8. *Leptura* elytris  
nigris lineis flavis.

*Fabric.* S. E. p. 193. *Callidium* 27.

*Mülleri Faun.* Fridr. p. 14. No. 141.

— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 92. No. 1040.

*Schaeff. Icon.* t. 38. f. 7.

*Scop.*

\*). Im *Linn.* steht statt No. 10. No. 23.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 96. No. 57.

*Stenocorus niger*; *elytro* singulo apice fasciisque binis luteis, suprema obliqua.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 214. *Leptura* II. La *Lepture à trois bandes dorées*.

Nigra; *elytrorum* lineis tribus transversis punctis que flavis; *pedibus* testaceis.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 81. No. 18. *Capricorne à quatre bandes jaunes.* \*)

*CERAMBYX (4-fasciatus) niger*; *thorace* mutico subgloboso; *elytris* fasciis flavo-citreis, secunda obliqua; *pedibus* ferrugineis; *antennis* brevioribus.

#### 24. *Praeufla*, das Zwergböcklein.

*Müller* 1. c. S. 290. No. 24.

*Füeßlins Verz.* S. 14. No. 287.

*Gleditsch Forstwiss.* 2. Th. S. 981. No. 34. der braune gelbgeflügelte Baumkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 187. *Saperda* 16.

Nigra; *elytris* flavis, apice nigris.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 95. No. 1074.

Nigra; *thorace* cylindrico; *elytris* flavis, apice nigris, *pedibus* anticis luteis.

*Schaeff.* Icon. t. 52. f. 8.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 103. No. 80.

Nigra; *elytris* testaceo-flavis, apice nigris.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 209. *Leptura* 4. La *Lepture noire à étruis jaunes*.

Nigra, *elytris* flavis, apice nigris.

#### II 2 25. Linea-

\*) Hierbey hat der Heer de Geer nach Schaeff. Icon. t. 107. f. 3. die ich in des Herrn Staatsrath Müllers Prodr. bey der arcuata finde.

25. *Linearis*, der ostindische Schmalbauch.\*)  
Müller l. c. S. 291. No. 25. der Schmalbauch.

*Unabgebildete Lepturen.*

I. Klasse.

1. No. 6. *Revestita.*
2. No. 7. *Virens.*

II. Klasse.

1. No. 19. *Alni.*
2. No. 25. *Linearis.*

NEUE LEPTURENARTEN.

I. Mit eyförmigem Bruststück, und abgeflutzten Flügeldecken.

1. *Plumipes*, der Federfuß.

Pallas Spicil. Zool. fasc. 9. p. 4. 5. t. 1. f. 2. 3.

Habitus gracillimus; moles infra *Melanuram*; corpus totum subtilissime punctatum; thorax teretiusculus muticus; elytra linearia, subattenuata, apice late praemorsa, pedes postici longissimi; eorumque tibiae extremitate laxo cinctae flocco.

Medium tenet inter *Lepturas* et *Cerambyces*.

Rozier Abhandl. 1. Th. S. 25. t. 1. f. A:

*Leptura americana*, tota nigra, *pedibus* posticis longissimis, *annulo pilorum* cinctis.

2. *Haftata*, der Spießträger.

Sulzers Gesch. S. 46. t. 5. f. II.

*Thorax*

\*.) Nicht abgebildet.

*Thorace ovato; elytris rubris subtus macula nigra,  
instar spiculi hastae.*

Füesslins Verz. S. 14. No. 273. *Cordigera*; der Herzfleck.

3. *Violacea*, das sibirische Rosenböcklein.

Pallas Reisen II. No. 64.

Magnitudo L. *aquaticae*. Caput, thorax, pectus atro-subaenea. *Elytra latiuscula*, obscure violaceo-coerulea; *abdomen sanguineum*.

Müllers S. B. S. 243. I. a. der Rosenbock.

4. *Simplex*, der englische Afterbockkäfer mit einfachen Hüftbeinen.

Fabric. S. E. p. 195. *Donacia* 2.

*Femoribus simplicibus.*

5. *Atra*, der deutsche Afterbockkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 228. *Stenocorus* 10. B. *Totus niger*.

Fabric. S. E. p. 197. *Leptura* 7.

*Corpore toto nigro.*

6. *Rufipes*, der schwarze mit rothen Hüften.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 227. *Stenocorus* 10. Le *Stenor noir à cuisses rouges*.

Niger, *femoribus clavatis rufis*, apice nigris.

7. *Luticornis*, das karolinische Gelbhorn.

Fabric. S. E. p. 197. *Leptura* 9.

Lutea; *thorace lineis duabus*; *elytris fasciis quatuor nigris*.

8. *Sexguttata*, der deutsche Sechstropf.

*Fabric.* S. E. p. 198. *Leptura* 14.

*Nigra; elytris maculis tribus flavis.*

9. *Variegata*, die neuholländische Buntschecke.

*Fabric.* S. E. p. 199. *Leptura* 19.

*Elytris abbreviatis, abdomine atro, fasciis fulvis.*

10. *Dubia*, der Zweifelhafte.

*Scop.* Entom. carn. p. 47. No. 151.

*Tota nigra, sed stria rubra per medium elytri longitudinaliter, a basi ad apicem usque producta.*

An vere diversa a *Sanguinolenta*? an proles hybrida *Melanuræ* et *Vexillatae*?

11. *4-maculata*, der Vierfleck.

*Scop.* Entom. carn. No. 154.

*Nigra, elyro sordide flavescente, maculis 4 nigris.*

12. *Ruficrus*, der Rothschenkel.

*Scop.* Entom. carn. No. 155.

*Fusca; antennis basi, oculis, femoribusque rufis.*

13. *Testacea*, der muschelbraune Afterbockkäfer.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 100. No. 72.

*Abdomine et thorace postice marginato-rubris; elytra testacea, pellucida, attenuata, apice margineque infra medium nigris.*

14. *Fasciata*, die Vierstreife.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1046.* Nigra; *thorace conico, elytris attenuatis, fasciis quatuor, pedibusque flavis.*

*Schaeff.* Icon. t. 39. f. 6.

15. *Verna*,

15. *Verna*, der Frühlingsafterbockkäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1055. Nigra; thorace cylindrico, tibiis anticis fulvis.

Schaeff. Icon. t. 55. f. 9.

16. *Maculicornis*, das Fleckhorn.

de Geer Ins. Tom. V. p. 139. No. 16. *Lepture à antennes tachetées*.

Nigra; elytris testaceo lividis; antennis flavo-maculatis.

17. *Aquatica aenea*, der erzfarbige Wässerafterbock.

de Geer Ins. Tom. V. p. 143. No. 21. *Lepture aquatique bronzée*.

Aenea nitida, femoribus omnibus fere aequalibus.

18. *Aquatica mutica*, der Wässerafterbock mit ungedörnten Hüftbeinen.

de Geer Ins. Tom. V. p. 142. No. 19. *Lepture aquatique à cuisses sans épines*.

Viridi-deaurata nitida, capite cinereo; pedibus rufis; femoribus posticis magnis muticis.

19. *Aquatica fasciata*, der Wässerafterbock mit der langen Purpurstreife.

de Geer Ins. Tom. V. p. 142. No. 20. *Lepture aquatique à bande cramoisi*.

Viridi-deaurata nitida; elytris fascia longitudinali purpurea nitida; femoribus posticis magnis vnidentatis.

20. *Nigripes*, der Schwarzfuß.

de Geer Inf. Tom. V. p. 136. No. 12. *Lepture à pattes noires.*

*Nigra; elytris obscure flavo-tessaceis; pedibus totis nigris.*

II. Mit erhabener Brust und stumpfen Flügeldecken.

1. *Massiliensis*, der kleine portugiesische buntcheckige Afterbock.

Linn. Add. p. 1067. No. 8.

Müllers S. B. S. 243. 3. der kleine Scheck.

2. *Robiniae*, der neuylorkische Robinien-Afterbock.

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 43. No. 43. *Thorace globoso fasciato nigra; elytris fasciis sex flavis, tribus prioribus antrosum arcuatis, posticis vndulatis.*

Drury Inf. Tom. I. t. 41. f. 2.

3. *Pilosa*, der haarichte Afterbock bey Gibraltar.

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 44. No. 44. *Elytris fastigiatis, tota nigra, pilis cinerascentibus confita.*

4. *Nitens*, der amerikanische Schwarzglanz.

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 45. No. 45. *Thorace globoso, abdomineque nigris, flavescenti-tomentosis, nitentibus; elytris truncatis atris fasciis quatuor, latis transversis flavis; pedibus ferrugineis.*

5. *Cantharoides*, der Johannisfliegenartige Afterbock.\*)

Scop.

\* An Linn. Cer. *Cantharinus* No. 82?

*Scop.* Entom. carn. No. 158.

Nigricans; *antennis, thorace rotundato, pedibus-*  
*que fulvis.*

6. *Coerulescens*, der *himmelblaue Afterbock*.

*Scop.* Entom. carn. No. 160.

*Thorax lineolis tribus pallidioribus.*

7. *Ottopunctata*, der *Achtpunkt*.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 101. No. 73.

Tota viridi-coerulescens, *oculis punctisque in sin-*  
*gulo elytro quatuor nigris.*

8. *Cardui*, der *Distelafterbock*.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 101. No. 74.

Nigra; *thorace lineis tribus longitudinalibus rufis;*  
*antennae longae, albido-fasciatae.*

An haec fit Cer. *Cardui Linn.*? dicere non pos-  
sum; caret enim futura elytrorum lineata.

9. *Bilineata*, die *Doppellinie*.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 102. No. 76.

Fusco-nigricans; *thorace lineis binis elytrorum-*  
*que punctis sparsis flavescentibus.*

10. *Coerulea*, der *ganz blaue Afterbock*.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 102. No. 78.

*Coerulea tota; tibiis anticis rufis.*

11. *Squalida*, der *Schmutzafterbock*.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 102. No. 79.

Nigra, *elytris basi et margine interiore testaceis.*

12. *io-punctata*, der *russische Zehnpunkt*.

*Lepech.* Tageb. 2. Th. S. 196. t. 10. f. 2.

*Thorace* subgloboſo, *corpore* atro, *vellere* cano,  
vndique obducto; *elytris* punctis 10 nigris.

13. *Variegata*, der *scheckichte Holzkäfer*.

*Lepech.* Tageb. 2. Th. S. 197. t. 10. f. 4.

*Thorace* subgloboſo; *corpore* subtus villoſo, cano  
*elytris* nigris, punctis 8 atque fasciolis 4 interruptis,  
hamatis albis.

14. *Viridiſcula*, der *Grünling*.

*Lepech.* Tageb. 2. Th. S. 197. t. 10. f. 11.

Tota viridiſcula; *thorace* suborato lineolis duabus  
longitudinalibus obscurioribus dorſo nigro.

15. *Aeruginosa*, der *Roſtafterbock*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1071.

Nigra; *thorace* cylindrico, vndique pilis five squa-  
mulis pallide-virentibus irrorata.

16. *Lineata*, die *Blaßlinie*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1072.

Nigra, villoſa; *thorace* cylindrico; *linea* longitudinali pallida.

17. *Bimaculata*, der *Zweyfleck*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1073.

Rufa; *thorace* cylindrico, *elytris* punctatis, ma-  
cula et striga, vndulata, alba.

*Schaeff.* Icon. t. 158. f. 1.

18. *Vil-*

18. *Villoso-flavo-maculata*, der *wollige Gelbgefleckte*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 211. *Leptura 7.* La *Lepture à corcelet rond et taches jaunes*.

Nigra; *maculis villoso-flavis, thorace globoso*; antennis corpore dimidio brevioribus.

19. *Glabro-maculata*, der *Glattgefleckte*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 211. *Leptura 8.* La *Lepture velours jaune*.

Nigra, *villoso-flava*; *maculis duabus in elytro singulo glabris nigris*.

20. *Rubro-punctata*, der *rothpunktirte Brustschild*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 212. *Leptura 9.* La *Lepture à corcelet rouge ponctué*.

*Nigricans*; *capite thoraceque rubro, punctis nigris*.

21. *Nigro-fasciata*, der *schwarzbandirte Afterbock*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 216. *Leptura 14.* La *Lepture jaune à bandes noires*.

*Villoso-flava*; *elytris lineis tribus transversis nigris*.

22. *Coerulea*, der *blaue Afterbock mit rothen Schenkeln*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 217. *Leptura 16.* La *Lepture bleue*.

*Coerulea*; *tibiis rufis*; *thorace subgloboso*.

23. *Crassipes*, der *Dickschenkel*.

Geoffr. Inf. Tom. V. p. 219. *Leptura 20.* La *Lepture noire à grosses cuisses brunes*.

*Atra*; *femoribus crassis rufis*.

24. *Tabaci*.

24. *Tabacicolor*, der tobacksfarbige Afterbock.

de Geer Inf. Tom. V. p. 139. No. 17. *Lepture couleur de tabac.*

Nigra; *elytris* fusco-testaceis apice nigris, *pedibus* flavis.

Schaeff. Icon. t. 39. f. 5.

25. *Viridi-aurea*, der grüngoldne ausländische Afterbock.

de Geer Inf. Tom. V. p. 145. No. 1. *Lepture verte dorée.* t. 15. f. 1.

Nitida; *thorace* spinoso; *elytris* fasciis binis longitudinalibus nigris; *femoribus* rufis;

26. *Lamda*, der Lamdaholzkäfer.

von Paula Schrank Beytr. zur Naturgesch. S. 67. §. 13. t. 3. f. 13.

Nigra; *elytris* albo trifasciatis.

27. *Ferruginea*, der rostfarbene Holzkäfer.

von Paula Schrank Beytr. zur Naturgesch. S. 68. §. 14. t. 3. f. 14.

Nigra; *elytris* ferrugineis, extrosum late nigris.

28. *Bipartita*, der Holzkäfer mit getheiltem Rückenschild.

von Paula Schrank Beyträge zur Naturgeschichte. S. 68. §. 15.

Nigra; *thorace* ferrugineo; linea nigra longitudinali; *elytris* macula communi ferruginea.

206. GESCHLECHT. *Necydalis; Halbkäfer.*

Müllers Linn. Naturf. 5. B. 1. Th. S. 292. *Bastard-*  
*böcke.*

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 14. *Halbkäfer.*

Sulzers Geschichte der Infekten. S. 47. der *Halb-*  
*käfer.*

— — Kennz. der Inf. S. 89. *Afterholzbock.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 99. 22. der *Af-*  
*terholzbock.*

Eberhards Thiergeschichte S. 204. der *Fliegen-*  
*käfer.*

Börners Samml. I. Th. S. 472. *Afterholzbock.*

Swammerd. B. der N. S. 120. der *Verschlänger.*

Neuter Schauplatz der Natur 1. B. S. 560. *Bastard-*  
*böcke; Afterholzböcke.*

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 572. der *Fliegenkäfer;*  
*Afterholzbock.*

Bomar. Dict. P. VII. p. 341.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 372. \*)

Scopoli Entom. carn. p. 56. \*\*)

Fabric. S. E. p. 208.

de Geer Inf. Tom. 5. p. 146. des *Necydales; Pre-*  
*capricornes.* †)

I. *Halb-*

\*) Des Geoffr. *Necydalis individ.* ist des Linn. *CANTHARIS minima* No. 12. Verschiedene aber der *Linnischen* *Necydal.* finden sich beym Geoffr. unter den *Cicindel.* und *Canthar.* T. I. p. 169. 339.

\*\*) Die meisten Linn. *Necydal.* finden sich auch beym Scop. unter den *Canthar.*

†) Mit Recht sagt dieser genaue Kenner, dass die *Necydal.* zwischen den *Cerambyc.* und *Lepturis* ein Mittelgeschlecht ausmachen.

## I. Halbkäfer mit kürzern Flügeldecken, als der Körper.

1. Major, der größte europäische Halbkäfer.

Müller l. c. S. 293. No. 1. der Riesenbastard.

Onomat. hist. nat. P. 5. pag. 573. der große Afterholzbock.

Fabric. S. E. p. 199. No. 18. LEPTVRA abbreviata.

Schaeff. Elem. t. 88. Fliegenküfer.

— — Icon. t. 10. f. 10. II.

de Geer Inf. Tom. V. p. 148. No. 1. t. 5. f. 1. Nectydale ichneumon.

NECYDALIS (*ichneumonea*) nigra; elytris abbreviatis rufo-fuscis; pedibus rufis; antennis corpore brevioribus.

2. Minor, der kleine europäische Halbkäfer.

Müller l. c. S. 293. No. 2. t. 8. f. 7. der Zwergbastard.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 14. No. 288.

Linné Reise durch Oel. Ueberf. S. 84.

Aespa Vpsal. 1736. p. 38. No. 16.

Cimex longus depresso-griseus, genubus globosis.

Onomat. hist. nat. P. 5. pag. 577. der kleine Afterholzbock.

Fabric. S. E. p. 199. No. 20. LEPTVRA dimidiata.

Müller's Faun. Fridr. p. 22. No. 220.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1081.

Poda Mus. graec. p. 48.

de Geer Inf. Tom. V. p. 151. No. 2. Nectydale capricorne.

NECYDALIS (*cerambooides*) fusca; elytris abbreviatis lineola obliqua alba; capite thoraceque nigris; antennis rufis corpore longioribus.

Schaeff. Icon. t. 95. f. 5.

3. Umbel-

3. *Vimbellatarum*, der *Halbkäfer auf schirmtragenden Pflanzen*.

Müller l. c. S. 294. No. 3. der *Miniatürbastard*.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 15. No. 289. der *Blumenfreund*.

Sulzers Gesch. S. 48. t. 6. f. 1. der *Blumenbewohner*.

Schaeff. Icon. t. 95. f. 4.

Fabric. S. E. p. 199. *Leptura* 21.

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 579. der *Fliegenkäfer der schirmtragenden Blumen*.

II. *Halbkäfer mit spitzigen Flügeldecken, die so lang als der Körper sind*.

4. *Coerulea*, der *himmelblaue Halbkäfer*.

Müller l. c. S. 294. No. 4. der *Bläuling*.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 15. No. 290. der *Bläuling*.

Sulzers Gesch. S. 48. t. 6. f. 2. der *Bläuling*.

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 573. der *blaue Fliegenkäfer*.

Schaeff. Icon. t. 94. f. 7.

Fabric. S. E. p. 209. *Necyd.* 6.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 342. *Cantharis* 3. *La Cantharide verte à grosses tuiffes*.

*Viridi-coerulea*; elytris attenuatis, femoribus posticis globosis.\*)

5. *Atra*, der *schwarze Halbkäfer*\*\*)

Müller l. c. S. 294. No. 5. der *Schwärzling*.

Onomat.

\*) Des Scop. E. C. No. 146. *Nobilis*, ist von der *Flavescente* Linn.

No. 8, oder seiner *Femorata* No. 145. blos in der Farbe verschieden.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Onomat.* hist. nat. P. 5. p. 572. der schwarze Fliegenkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 209. *Necyd.* 3.

6. *Rufa*, der röthliche Halbkäfer.

*Müller* l. c. S. 295. No. 6. der Röthling.

*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 15. No. 291. der Röthling.

*Schaeff.* Icon. t. 94. f. 8.

*Fabric.* S. E. p. 209. *Necyd.* 5.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 220. *Leptura* 22. La Lepure à etuis étranglés.

*Leptura nigra*, *elytris* pedibusque rubescensibus lividis, *coleoptris* attenuatis.

7. *Glaucescens*, der grauliche Halbkäfer.

*Müller* l. c. S. 295. No. 7. der Grauling.

*Füesslings* Verz. S. 15. No. 292. der Grauling.\*)

*Schaeff.* Icon. t. 94. f. 6.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 153. No. 2. t. 15. f. 2. *Necydale vernissée*.

NECYDALIS (*nitida*) nigra; *elytris* subulatis flavis nitidissimis; *abdomine* annulis albis; *femoribus* elavatis.

8. *Flavescens*, der gelbliche Halbkäfer.\*\*)

*Müller* l. c. S. 295. No. 8. t. 6. f. 4. der Gelbling.

*Füesslins*

\*) Obgleich *Linné* Surinam als ihr Vaterland angiebt; so findet sie sich doch auch, nach *Füesslins* Zeugniß, in der Schweiz, wiewohl selten.

\*\*) Diese hält *Linn.* mit des *Scop.* E. C. No. 145. *femorata* für einanderley; *Fabric.* aber S. E. p. 209. No. 7. diese *femor.* *Scop.* für die *Podagraria* *Linn.* No. 9. Allein die *femorata* hat an den Hinterfüßen ganz schwarzgelbliche Hüften; die *Podagraria* aber ist am Ende derselben muschelbraun.

*Füesslins Verz.* S. 15. No. 294. der *Gelbling*.

*Müller's Zool. Dan. Prodri. p. 62.* No. 570.

*THELEPHORVS flavesiensis*, niger, *elytris attenuatis testaceis; femoribus posticis clavatis, arcuatis*.  
*de Geer Ins. Tom. V. p. 155.* No. 4. *Nectydale jaune*.  
*N. flavesiensis*, nigra; *elytris testaceis subulatis; femoribus posticis clavatis*.

9. *Podagraria*, der *Halbkäfer auf der wilden Angelik*.

*Müller l. c. S. 295.* No. 9. der *Angelikbock*.

*Füesslins Verz.* S. 15. No. 295.

*Schaeff. Icon. t. 85. f. 7.*

*Geoffr. Ins. Tom. I. p. 343.* *Canthar. 4.* La *Cantharide fauve à grosses cuisses*.

Nigra; *elytris attenuatis fulvis; femoribus posticis globosiss.*

10. *Simplex*, der *Dünnischenkel.\**)

*Müller l. c. S. 296.* No. 10.

*Füesslins Verz.* S. 15. No. 296.

*Fabric. S. E. p. 210.* *Nectyd. 8.*

11. *Brevicornis*, das *Kurzhorn.\*\**)

*Müller l. c. S. 296.* No. 12. das *Stumpfhorn*.

*Onomat. hist. nat. P. 5. p. 572.* der *Fliegenkäfer mit kurzen Fühlhörnern*.

### *Unabgebildete Halbkäfer.*

#### II. Klasse.

1. No. 5. *Atra*.

2. No.

\*.) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

2. No. 10. *Simplex.*3. No. 11. *Brevicornis.**Neue Halbkäferarten.\*).*

## II. Klasse.

1. *Humuralis*, der *englische Halbkäfer.**Fabric.* S. E. p. 209. *Necyd.* 4.*Elytris subulatis, nigris, basi flavis.**Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 342. *Canthar.* 2. La *Cantharide à bande jaune.**Nigra; elytris attenuatis, antice luteis.*2. *Collaris*, der *amerikanische punktirte Halschild.**Forsteri nov. sp.* Inf. Cent. I. p. 46. No. 46.*Elytris subulatis, atra; thorace bipunctato testaceo, pedibus simplicibus.*3. *Cerambooides*, der *englische kupfergrüne Halbkäfer.**Forst. nov. sp.* Inf. Cent. I. p. 47. No. 47.*Elytris subulatis, viridi-aenea, pedibus simplicibus.*4. *Muralis*, der *Mauernhalbkäfer.**Forst. nov. sp.* Inf. Cent. I. p. 48. No. 48.*Elytris subulatis, fusca, humeris flavis, pedibus simplicibus.*

\*.) Ich könnte dieses Register noch mit verschiedenen *neuen Arten* vermehren, da aber die meisten Schriftsteller sie nicht unter diesem, sondern unter andern Namen, bald *Cantharis*, bald *Leptura*, bald *Cicindela*, bald *Thelephorus* angegeben haben; so will ich sie an gehörigem Ort nicht vergessen, um aller Verwirrung vorzubeugen, die bey diesem, und den folgenden Geschlechtern so schon gross genug ist.

207. GESCHLECHT. *Lampyris; Leuchtkäfer.\*)*

Müllers Linn. Naturs. 5. Th. 1. B. S. 297. *leuchtende Käfer.*

Börners Samml. 1. Th. S. 473. *Johanniswürmchen.*

Eberhards Thiergesch. S. 149. *Leuchtkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. S. 97. *Cantharis, Johanniswürmchen.*

Fürßlins Verz. schweiz. Inf. S. 15. *Scheinkäfer.*

Sulzers Kennz. S. 65. *Cantharis, Scheinwurm; Johanniswürmchen.*

— — Gesch. S. 48. *Scheinkäfer.*

Bankroft N. G. von Guiana. S. 147.

Bresl. Samml. 5. B. 1721. Novemb. Class. IV. Art. VI. p. 492. *Cicindela l. Lampyris; Johannisfliege; Johanniskäferlein.*

— 7. B. 1723. Oktob. Class. IV. Art. 5. pag. 423. *Lichtwürmlein; Lichtfliege; Lampyris.*

— 8. B. 1724. Oktob. Class. IV. Art. 3. p. 404. *Lichtwürmer.*

— 8. B. 1724. Noveinb. Class. IV. Art. 7. §. 2. p. 514. *Cicindelae oder Johanniswürmchen.*

Bonnets Infektol. Uebers. S. 17.

— — Considerer. sur les corps organif. Tom. II. Art. 299. Uebers. S. 103. *Le Ver luisant.*

Lemery Mat. Lex. p. 367.

Merkl. Thierb. p. 556. *Johanniswürmchen; Johannisfliege; Licht- oder Nachtmücke.*

Charlet. Onom. p. 47. *Lampyris.*

Kk 2 Lessers

\*) Die Verwechslung dieses Geschlechtes mit den *Cantharid.* oder *Thelephoris* (Warzenkäfern), *Cicindelis*, und andern mehr, ist so gross, dass man schwerlich zu völliger Gewissheit kommen wird, bevor man nicht alle Synonymen der Alten, Mittleren und Neueren gesammelt, und sorgfältig verglichen hat.

Lesser's Theol. der Inf. p. 305. *Cicindelae*; *Flam-mides*; *Incendulae*; *Luciones*; *Luculae*.

Fabric. Syst. Entom. p. 200. *Lampyris*. p. 202. *Py-rochroa*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 165. *Lampyris*; le *Ver-Lui-sant*. p. 338. *Pyrochroa*; la *Cardinale*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 29. Les *Lampyres*.

Schwenckf. Theriotr. Siles. p. 523. *Lampyris*; *Py-rolampyr*. Aristot. Hesych. *Lampyris alata*: Vlyss. Aldrov. *Cantharis nobiluca*; *Nitidula*, *Nobiluca*; *Cicindela Iunii*. *Luciola Italis*; *Johannisfliege*; *Johanniskäferlein*; *Lichtmücke*; *Nachtmücke*.

Ocelli bituminis nigri modo splendident: Alvis annulosa, multis segmentis divisa, in cuius medio *gut-tulae* *duae* candidae, noctu seu tenebris, ignis modo lucentes, die non item.

Allgem. Magazin der Natur etc. 9. Th. S. 346. *Leuchtender Goldkäfer*; *Feuerkäfer*; *Lichtmücke*; *Cantharis lampyris*.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 579. *Cantharis nobiluca terrefris*, der *Johanniswurm*.

— — — P. 4. p. 647. der *Leuchtkäfer*.

Rivini diss. de Noctu lucentibus 1673.

Ionston hist. nat. Inf. cap. 9. p. 108. t. 16. *Cicindela*, *Johannisfliegen* f. 1. 2. 3. 4. *Cicindela*; *Lampyris*; *Lampouris*; *Pygolampis*;

*Aristoteli Bostrychus*.

*Suidae Pyrolampis*.

*Hesychio Pyrgolampis*; *Pygolampis*.

*Lampedou*; *Spinter*; *Cicindela*; *Nobiluca*; *Niti-dula*; *Noctuvigila*; *Lucio*; *Lucula*; *Luciola*; *Flam-mis*; *Venus*; *Lucernuta*; *Incendula*.

*Katharis mas*.

Scalig. de Subtil. p. 628. Exerc. 194. *Cicindela*; *Lu-cramba*.

*Lyonet*

*Lyonet* Remarqu. sur Lesser Tom. I. p. 94. *Ver-luisant.*

*Swammerd.* R. der N. S. 119. *Nachtmücke; Johanniswürmchen.*

*Adanson* Reise nach Senegall p. 135. 137. *Ver-luisant; Mouche à feu.*

1. *Noctiluca*, der eigentliche *Johanniswurm*.

*Müller* l. c. S. 296. No. 1. t. 6. f. 7-II. der St. *Johanniswurm* (ehedem *Lampyris*; *Lucula*; *Cicindela*.)

*Franz.* *Ver-luisant.*

*Engl.* *Glowworm.*

*Holl.* *Glimworm.*

*Schwed.* *Lysmask.*

*Füesslin* Verz. S. 15. No. 297. der *Scheinwurm*.

*Pontopp.* Nat. Gesch. v. D. S. 207. *Cantharis noctiluca* No. 1. St. *Hans-Orm.* (*Johanniswurm*;) *Fackelfluen*, (*Fackelfliege*).

*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 1045. No. 2. *Cantharis noctiluca*, der längliche schwarzeibige, platte, leuchtende Baumkäfer.

*Bonnets* und anderer etc. Abhandl. aus der Infek-tol. S. 348. *Leuchtwurm.*

*Neue Berlin. Mannichf.* 2. Jahrg. S. 516.

*Onomat. hist. nat.* P. 2. p. 579. der *Johanniswurm*.

— — — P. 4. p. 650. der *Leuchtkäfer der Wacholderwäldchen*. *Noctiluca terrestris*; *Cicendela*; *Cicendela impennis*.

*Fabric.* S. E. p. 200. *Lampyris* 1.

*Leche* nov. spec. pag. 23. 47. *Cantharis mas coleopterus.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 581. *Lampyris noctiluca nigro-fusca*. D. St. *Hans-Orm. Glands-Flie.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 166. *Lampyris* I. t. 2. f. 7.  
Le Ver-luisant à femelle sans ailes.\*)

de Geer Inf. Tom. IV. p. 31. *Lamp.* I. t. 1. f. 19. 20.  
*Lampyre luisante commune.*

L. (*noctiluca-communis*) *oblonga*, supra nigro-fusca, subtus albido-flava.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 699. *Cantharis noctiluca.*

*Philos. Transact.* abridged by Lowthorp. Vol. 2.  
p. 761. t. 10. f. 183. 184. 185. mas.

*Mém. de Mathem. et de Phys.* Tom. 2. p. 261. t. 9.

*Mém. de l'Acad. des Scienc. de Paris* 1766. p. 342.  
t. 10. f. 7. 8. 9.

2. *Corrusca*, der russische braune Leuchtkäfer.\*\*)

*Müller* I. c. S. 300. No. 2. der Schimmerkäfer.

*Onomat.* hist. nat. P. 4. pag. 648. der finnländische  
Leuchtkäfer.

3. *Splendidula*, der Glanzkäfer.

*Müller* I. c. S. 301. No. 3.

*Onomat.* hist. nat. P. 4. p. 651. der Leuchtkäfer mit  
wasserfarbigem durchsichtigen Brustsilde.

*Scop.* Entom. carn. No. 118: *CASSINA noctiluca*,  
Carn. Kerschnitz,

— Annus 5. hist. nat. p. 92. No. 48. †)

*Fabric.*

\*.) Dieses Citatum steht im *Fabric.* pag. 200, nebst den meisten  
Linneischen Citatis bey dessen No. 3. *Splendidula*. Die Syno-  
nymen und Beschreibungen derer vom *Linné* angeführten Schrift-  
steller, im *Geoffr.*, de Geer und der *Faun. Suec.* 2. bey der ge-  
genwärtigen *Noctiluca*.

\*\*) Nicht abgebildet.

†.) *Scop.* hat aber unter den *Noctilucis* eben dergleichen mit  
durchsichtigem Silde über den Augen gefunden, und schlüßt  
daraus,

Fabric. S. E. p. 200. *Lamp.* 2. Oblonga, fusca,  
*clypeo apice hyalino.*

4. *Pyralis*, der amerikanische Feuerkäfer.

Müller I. c. S. 301. No. 4. Feuerkäfer.

Fabric. S. E. p. 200. *Lamp.* 4.

*Clypeo rufo*, medio nigro; *elytris nigris*; marginibus abdomineque albis.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 52. No. 7. t. 17. f. 7.  
*Lampyre Pyrale.*

L. oblonga; *elytris obscure fuscis* margine rufescientibus, abdomine atro, postice flavissimo, pedibus fuscis.

5. *Marginata*, der amerikanische Gelbrand.\*)

Müller I. c. S. 301. No. 5. Gelbrand.

Onomat. hist. nat. P. 4. p. 650. der gerandete Leuchtkäfer.

Fabric. S. E. p. 201. *Lampyris* 5.

6. *Hespera*, der amerikanische Abendstern.

Müller I. c. S. 301. No. 6. das Nachtlicht.

Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 648. der amerikanische Leuchtkäfer.

Fabric. S. E. p. 201. *Lampyris* 6.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 48. No. 1. t. 17. f. 1.  
*Lampyre de Surinam.*

L. (*Surinamensis*) ovata; *elytris fuscis*, macula marginali triangulari flava, abdomine subtus fusco apice flavo.

Kk 4 7. *Ignita*,

daraus, dass diese *Noctiluca* und des Linn. *Splendidula* vielleicht keine verschiedene Arten seyn möchten, welches Fabric. Citata ebenfalls zu beweisen scheinen.

\*) Nicht abgebildet.

7. *Ignita*, die amerikanische Kohle,

*Müller* I. c. S. 302. No. 7. die Kohle.

*Fabric.* S. E. p. 201. *Lampyris* 7.

*de Geer* Inf. Tom. IV. pag. 49. No. 2. t. 17. f. 2.

*Lampyre ignée.*

L. ovata; *elytris* fuscis, *macula marginali* ovata  
flava; *abdomine* subtus *toto* flavo.

8. *Lucida*, der amerikanische blasse Scheinkäfer,

*Müller* I. c. S. 302. No. 8. die Feuergluth.

*Fabric.* S. E. p. 201. *Lampyris* 8.

*Sutzer* Kennz. t. 5. f. 32. *CANTHARIS lucida*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. pag. 51. No. 5. t. 17. f. 5.

*Lampyre brillante*,

L. (*lucida*).

9. *Phosphorea*, der amerikanische Phosphoruskäfer.

*Müller* I. c. S. 302. No. 9. der *Phosphorus*.

*Onomat. hist. nat. P. 4.* pag. 651. der phosphorische

Leuchtkäfer.

*de Geer* Inf. Tom. IV. pag. 51. No. 6. t. 17. f. 6.

*Lampyre phosphorique*.

L. oblonga; *elytris* fuscis, *margine exteriore* flavis,  
*abdomine* atro poslice flavissimo, *pedibus testaceis*.

*Fabric.* S. E. p. 201. *Lamp.* 9.

10. *Mauritanica*, die algierische Lampe.\*)

*Müller* I. c. S. 302. No. 10. die afrikanische Lampe.

*Onomat. hist. nat. P. 4.* pag. 650. der mauritanische

Leuchtkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 202. *Lampyris* 13.

II. Ita-

\*) Nicht abgebildet.

11. *Italica*, der italiänische Leuchtkäfer.

Müller l. c. S. 303. No. 11. die römische Lampe.

Fließins Verz. S. 15. No. 298. der italiänische.

Sulzers Gesch. S. 49. t. 6. f. 3. a. die römische Lampe.

Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 649. der italiänische Leuchtkäfer.

Fabric. S. E. p. 202. *Lampyris* 12.

Mülleri Faun. Fridr. p. 15. No. 143. *CANTHARIS italicica*.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 53. No. 9. t. 17. f. 9. 10.  
*Lampyre d'Italie.*

L. oblonga; elytris nigro-fuscis; thorace rufo;  
macula nigra in medio; capite nigro.

Voyage d'un François en Italie Tom. I. p. 38.

Mém. de l'Acad. des Sciences de Paris 1766. p. 343.  
t. 10. f. 4. 5. 6.

12. *Chinenis*, der chinesische Leuchtkäfer.\*)

Müller l. c. S. 303. No. 12. die Götzenlampe.

Onomatol. hist. nat. P. 4. pag. 648. der chinesische Leuchtkäfer.

13. *Minuta*, der ganz kleine Leuchtkäfer.\*\*)

Müller l. c. S. 303. No. 13. der Funke.

Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 650. der ganz kleine Leuchtkäfer.

14. *Latissima*, der ganz breite guineische Leuchtkäfer.†)

Müller l. c. S. 304. No. 14. die Flamme.

Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 649. der guineische Leuchtkäfer.

Fabric. S. E. p. 203. *Pyrochroa* 5.

Kk 5

15, Ro.

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

† ) Nicht abgebildet.

15. *Roftrata*, der afrikanische geschnäbelte Leuchtkäfer.\*)

Müller l. c. S. 304. No. 15. das glimmende Tocht.

Fabric. S. E. p. 203. *Pyrochroa* 7.

*Roftrum exsertum*, *cylindricum*,

16. *Bicolor*, der zweifarbig afrikanische Leuchtkäfer.\*\*)

Müller l. c. S. 304. No. 16. das Luftfeuer.

Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 648. der zweifarbig Leuchtkäfer.

Fabric. S. E. p. 203. *Pyrochroa* 3.

17. *Sanguinea*, der blutfarbige Leuchtkäfer.

Müller l. c. S. 305. No. 17. die Abendröthe.

Füesslins Verz. S. 15. No. 299. der Blutrothe.

Sulzers Gesch. S. 49. t. 6. f. 4. die Abendröthe.

Frisch Inf. 12. Th. S. 40. 3. Pl. t. 7, No. 2, der blutrothe flache Holzkäfer.

Scop. Entom. carn. No. 19. *CASSIDA sanguinea*.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 578. der rothe glänzende Käfer mit einem schwarzen Fleck auf der Brust. (*Cantharis*).

Abt. *Vpsal*, 1736. p. 19. No. 3. *CANTHARIS elytis ruberrimis*.

Linn. Fauna Suec, ed. 1. No. 587. *Cantharis* etc.

— — — — — ed. 2. No. 704. *CANTHARIS sanguinea*.

Fabric. S. E. p. 202. *Pyrochroa* 2.

Schaeff. Icon. t. 24, f. 1.

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 61, No. 555. *TELEPHORVS sanguineus*.

Scop.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 93, No. 49. LAMP. sanguinea.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 168. Lamp. 3. Le Ver-luisant rouge.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 45. No. 2. t. 2. f. 1. Lampyre rouge à corcelet rouge.

L. (sanguinea) nigra; thorace rubro, maculis quinque nigris; elytris rubris; venis reticulatis.

### 18. Coccinea, der scharlachrothe Leuchtkäfer.

Müller I. c. S. 305, No. 18. die Morgenröthe.

Füessli's Verz. S. 15. No. 300. der Scharlachrothe.

Onomat. hist. nat. P. 4. p. 648. der Leuchtkäfer mit scharlachrothem Bruststück und Flügeldecken.

Schaeff. Icon. t. 90. f. 4.

Fabric. S. E. p. 202. Pyrochroa 1.

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 338. Pyrochroa 1, t. 6. f. 4.  
La Cardinale,

de Geer Inf. Tom. IV. p. 47. Lampyris 4. Lampyre rouge velue.\*)

L. (villosa) nigra; thorace elytrisque villosis rubris, medio thoracis nigro,

### Unabgebildete Leuchtkäfer.

1. No. 2. Corrusca.

2. No. 5. Marginata.

3. No. 10. Mauritanica.

4. No. 12. Chinensis.

5. No.

\*) Diese hält de Geer für die vorige Sanguin. Linn. und hat daher den Geoffr. I. p. 163. Lamp. 3. angeführt.

Nach dem de Geer Tom. V. p. 20. gehören die Cirata des Geoffroy und Schäffer, die Fabric. hieher gesetzt hat, zu Linn. Cantharis peccinicornis No. 20. p. 650.

- 5. No. 13. *Minuta.*
- 6. No. 14. *Latissima.*
- 7. No. 15. *Rofrata.*
- 8. No. 16. *Bicolor.*

*Neue Leuchtkäferarten.*

1. *Pilosa*, der amerikanische haarichte Leuchtkäfer.

*Forster* nov. sp. *Inf. Cent.* 1. p. 49. No. 49.

*Oblonga nigra; thorace sanguineo, lineis duabus longitudinalibus nigris, antennarum articulis tribus extimis pectinatis.*

2. *Obscura*, der feuerländische dunkelschwarze Leuchtkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 200. *Lampyris* 3.

*Nigra, clypeo vtrinque macula rufa.*

3. *Capensis*, der kapensische grüngelbliche Leuchtkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 201. *Lampyris* 10.

*Livida; thorace flavescente; abdomine postice flavissimo.*

4. *Australis*, der neuholländische braungelbliche Leuchtkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 201. *Lampyris* 11.

*Flavicans, capite elytrisque fuscis.*

5. *Reticulata*, der neu-yorkische Leuchtkäfer mit netzförmigen Flügeldecken.

*Fabric.* S. E. p. 203. *Pyrochroa* 4.

*Atra;*

Atra; thoracis margine flavo, *elytris* flavis; fascia apiceque nigris.

6. *Palliata*, der *kapehifische Leuchtkäfer mit den breitesten Flügeldecken*.

*Fabric. S. E. p. 203. Pyrochroa 6.*

*Elytris* coriaceis, *latissimis*, testaceis, apice nigris.

7. *Serraticornis*, das *neuholländische Sägenhorn*.

*Fabric. S. E. p. 203. Pyrochroa 8.*

Nigra; *thorace* *elytrisque rufescentibus*; *elytris* apice nigris; *antennis* valde compressis, *serratis*, nigris.

8. *Hemiptera*, die *Geoffroysche Halbdecke*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 168. Lamp. 2. Le Ver-luisant à demi-fourreaux.*

9. *Nigro-rubra*, der *schwarzrothe Leuchtkäfer*.

*de Geer Inf. Tom. IV. pag. 46. No. 3. Lampyre rouge à corcelet noir.*

Nigra; *thorace* toto nigro; *elytris* rubris; *venis reticulatis*.

10. *Nitens*, der *surinamische glänzende Leuchtkäfer*.

*de Geer Inf. Tom. IV. pag. 50. No. 3. t. 17. f. 3. Lampyre luisante.*

Oblonga; *elytris* pallide-fuscis, macula marginali oblonga fusca, *abdomine* *subtus rufo*, *postice* *flavos segmento* *vnico nigro*.

11. *Maculata*, der gefleckte Leuchtkäfer.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 50. No. 4. t. 17. f. 4.  
*Lampyre tachetée.*

*Ovata testacea; thorace fascia elytrisque macula nigra;*

12. *Pensylvanica*, der pensylvanische Leuchtkäfer mit zweien röthlichen Flecken.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 52. No. 8. t. 17. f. 8.  
*Lampyre de Pensylvanie.*

*Oblonga; elytris pallide-griseo-testaceis; thorace intra marginem nigro: maculis binis rufis.*

Brown Hist. of Jam. p. 431. t. 44. f. 9. a. b. *Pyralis minor subcinerea longa, alis et oculis nigricantibus.*

208. GESCHLECHT. *Cantharis. Warzenkäfer.* \*)

Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 306. St. Johannisfliegen.

Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 15. *Afterscheinkäfer.*

Eberhards Thiergesch. S. 194. *Thelphorus, Warzenkäfer.* S. 197. *Cantharis, Pflasterkäfer.*

Sulzers

\*) *Cantharides* heissen bey den meisten Schriftstellern die sogenannten *spanischen Fliegen*, die Linné ehemals hierunter begrif, nachmals aber unter ein eigenes Geschlecht *Meloë* gebracht hat. Des Geoffr. *Cantharides* und *Proscarabaei*, sind des Linn. *Necydal.* und *Meloë*. Der Herr de Geer hat aus des Linn. *Canthar.* auch ein eigenes Geschlecht mit Namen *Thelephorus* gemacht, und versteht unter seinen *Canthar.* Tom. 5. pag. 1. die *Meloë* Linn. Bey dem ersten ist er dem D. Schüffer Elein. t. 123. gefolgt. In Ansehung der Schriftsteller wird man wohl thun, wenn man immer beyde Geschlechter: *Cantharis* und *Meloë*, vergleicht.

Sulzers Kennz. S. 65. 66.

— — Gesch. S. 49. *Afterscheinkäfer.*

Börners Samml. etc. I. Th. S. 474.

Martini Naturlexicon I. Th. S. 444. 451. *Aeschenbaumskäfer,* (Cantharides).

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 574. der *glänzende Käfer;*  
*Eselkäfer.*

Catholicon C. p. 71. *glänzender Käfer; Eselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 204. *Lymexilon.* p. 205. *Cantharis.*

p. 207. *Malachius.*

Scop. Entom. carn. p. 38. *Cantharis.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 61. *Thelephorus.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 169. *Ciindela.*

de Geer Inf. Tom. IV. p. 57. *Thelephores.*

Ionst. hist. nat. Inf. p. 102. *Cantharis.*

Schwenkfeld. Theriotr. Siles. p. 522. *Cantharis.*

### I. Mit plattem Bruststück.

1. *Sanguinolenta*, der *russische blutrote Afterscheinkäfer.*

Müller l. c. S. 307. No. 1. der *Doppelrand.*

Schröters Abhandlungen etc. I. S. 364. t. 3. f. 6.\*)

### 2. *Fusca,*

Die Verwandlungsgeschichte dieser Insekten ist noch sehr dunkel, und die Larven derselben mehrentheils noch unbekannt. Doch hat der Herr de Geer dergleichen auf dem Schnee gefunden, die aber durch einen starken Sturm, der viele Bäume mit den Wurzeln aus der Erde gerissen, dahin geführet sind. S. Mém. des Inf. Tom. II. Part. I. p. 113. Ueberf. 1. Qu. S. 81. Abhandl. der schwed. Akad. der Wissensch. Ann. 1749. pag. 75. 78.

\*.) Dasselbst findet man auch eine Vergleichung mit einem *Surinamischen*, der mit diesem viel ähnliches hat.

2. *Fusca*, der schwarzbraune Afterscheinkäfer.

Müller I. c. S. 307. No. 2. t. 6. f. 12. der Räuber.

Füesslins Verzeichn. schweiz. Inf. S. 15. No. 301. der schwarzbraune.

Frisch Inf. 12. Th. S. 36. No. 30. 3. Pl. t. 6. f. 5. der schwarzbraune Holzkäfer mit dünnen Flügeln.

Sulzers Gesch. S. 50. \*)

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 577. der glänzende Käfer mit schwarzbraunen Flügeldecken.

Schaeff. Elem. t. 123. f. 1. 2. *Thelephorus*, Warzenkäfer.

— — Icon. t. 16. f. 10. t. 26. f. 9-12.

Scop. Entom. carn. No. 120. Carn. Schuster.

Fabric. S. E. p. 205. *Cantharis*. I.

Raj. Inf. p. 84. No. 29. *Cantharus sepiarius major*, elytris nigricantibus.

Mülleri Faun. Fridr. p. 15. No. 144.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 61. *Thelephorus* No. 556.

Niger, marginibus thoracis lateralibus, abdomineque rufis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 170. *Cicindela* I. t. 2. f. 8. La Cicindele noire à corcelet maculé.

*Elytris nigricantibus; thorace rubro, nigra macula.*

*Ephemera*. Nat. Curios. 1674. obsf. 79.

Akt. Vpsal. 1736. p. 19. No. 2. *Cantharis* elytris fuscis.

de Geer

\*) Diese Art frisst sich einander selbst auf. Sulzer meldet: der Herr de Geer habe die Larven derselben auf dem Schnee gefunden. Die in der Faun. Suec. ed. 2. pag. 201. angeführten Act. Holm. beziehen sich auf das Jahr 1749. In der Uebersetzung beyder Theile des Jahrs 1749 stehen auch des Herrn de Geer Abhandl. von den kleinen schwarzen auf dem Schneewasser angetroffenen Peduren.

de Geer Act. Holm. 1749. p. 77.

— — Inf. Tom. IV. p. 60. *Theleph.* 1. t. 2. f. 12.

*Telephore ardoisé.*

THELEPHORVS (*fusca*), thorace flavo rubro  
macula nigra; *elytris* obscuris cinereo-nigris.

3. *Livida*, die *Bleyfliege*.

Müller l. c. S. 308. No. 3.

Füesslins Verz. S. 15. No. 302. der *Gelbbraune*.

Onomat. heißt. nat. P. 2. p. 578. der *glänzende Käfer mit dem ganz rothen Brustschild*.

Aet. Vpsal. 1736. p. 19. No. 1.

Aet. Nidr. 4. 19. t. 16. f. 9?

Fabric. S. E. p. 205. *Cantharis* 2.

Mülleri Faun. Fridr. p. 15. No. 145.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 566.

*Thelephorus testaceus*, femoribus apice, tibiisque nigris.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 171. *Cicindela* 2. *Cicindele à corcelet rouge*.

Thorace rubro immaculato, genibus posticis nigris.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 70. *Theleph.* 2. *Telephore jaune à corcelet rouge*.

T. (*flavus*); thorace flavo-rufo, *elytris* testaceis, femorum posteriorum apice nigro.

4. *Rufa*, der *Rothschild*.

Müller l. c. S. 308. No. 4.

Schaeff. Elein. t. 123. f. 3.

Mülleri Faun. Fridr. p. 15. No. 146.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 62. No. 564. *Thelephorus rufus*.

Scop. Entom. carn. No. 124. CANTHARIS *fulva*.

*Rufo-ferruginea; thorace fulvo, elytris apice, ocellisque nigris.*

An eadem, quae *Rufa* Linn.?

5. *Obscura*, der *Rostrand*.

Müller l. c. S. 308. No. 5.

Fabric. S. E. p. 205. *Cantharis 3.*

Scop. Entom. carn. No. 121.

Tota *fusca*, sed thoracis abdominisque margo *ruber*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 15. No. 147.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 558.

THELEPHORVS (*obscurus*) *niger*, marginibus thoracis abdominisque lateralibus rufis.

Schaeff. Icon. t. 16. f. 8.

6. *Lateralis*, der *Gelbrand*.

Müller l. c. S. 309. No. 6.

Fabric. S. E. p. 206. *Cantharis 4.*

7. *Aenea*, der *kupfergrüne Warzenkäfer*.

Müller l. c. S. 309. No. 7. der *Kupferfliegenkäfer*.

Füesslins Verz. S. 15. No. 303. der *Kupfergrüne*.

Sulzers Gesch. S. 51. t. 6. f. 5. a. der *Gestirnte*.

Schäffers neuentdeckte Theile an Raupen und Zwey-faltern. Regensb. 1763. S. 26. t. 2. f. 10. 11. *Käfer mit weichen Flügeldecken*.

— — Icon. t. 18. f. 12. 13.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 580. der *grüne glänzende Käfer mit Kupferglanz*.

Fabric. S. E. p. 207. *Malachius 1.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 16. No. 154.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 62. No. 568. *Thelephorus*.

Poda Mus. graec. p. 40.

Schwenkfeld. Theriotr. Siles. p. 521. An *Cantharis formicaria latior?* Ein Goldkäfer in Omeshäufen.

Colore orichalcum refert, subrubescens nonnihil.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 174. *Cicindela* 7. La Cicindele bedeau.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 73. No. 6. t. 2. f. 16. 17. *Telephore verd-bronzé.*

THELEPHORVS (*aeneus*), viridi-aeneus; *elytris extrorsum rubris, capite antice flavo.*

8. *Bipustulata*, der zweyblätterige Afterschein-käfer.

Müller l. c. S. 309. No. 8. die Rothspitze.

Füesslins Verz. S. 15. No. 304. die Rothspitze.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 576. der grüne kupfer-roth glänzende Käfer.

Raj. Inf. p. 101. No. 7. *Cantharis*, vix tres octayas vnciae longa.

Akt. Vpshal. 1736. p. 19. No. 5. *Cantharis* *elytris viridi-aeneis apice rubris.*

Poda Mus. graec. p. 40.

Fabric. S. E. p. 208. *Malachius* 2.

Schaeff. Icon. t. 18. f. 10. II. t. 19. f. 14.

Müller's Faun. Fridr. p. 15. No. 148.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 62. No. 569. *Thelephorus.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 175. *Cicindela* 8. La Cicindele verte à points rouges.

Aeneo-viridis; *elytris* apice rubris.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 75. *Theleph.* 7. *Telephore* *verd à deux points rouges.*

Viridi-aeneus, nitidus; *elytris* apice rubris.

9. *Pedicularia*, das *Afterscheinkäferchen in der Größe einer Laus.*\*)

Müller l. c. S. 309. No. 9. die *Laufeliege*.

Fabric. S. E. p. 208. *Malachius* 3.

10. *Fasciata*, der *rothbandirte Afterscheinkäfer*.

Müller l. c. S. 309. No. 10. der *Rothband*.

Füesslins Verz. S. 15. No. 305. der *Rothband*.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 577. der *glänzende Käfer mit schwarzen Flügeldecken und zweyen rothen Streifen*.

Act. Vpsal. 1736. p. 19. No. 6.

Fabric. S. E. p. 208. *Malachius* 4.

Raj. Inf. p. 102. No. 22. *Cantharis valde exigua*.

Schaeff. Icon. t. 189. f. 3. a. b.

Müller i Zool. Dan. Prodr. p. 61. N. 560. *Thelephorus niger; elytris maculis quatuor rubris*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 177. *Cicindela* 12. La *Cicindèle à bandes rouges*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 76. *Thelephorus* 9. *Telephore à bandes rouges*.

*Thorace obscure-viridi aeneo, elytris nigris; fasciis duabus transversis rubris.*

11. *Biguttata*, der *Zweytropf.*\*\*) )

Müller l. c. S. 310. No. 11. die *Gelbspitze*.

Fabric. S. E. p. 207. *Cantharis* 12.

Müller i Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 561. *Thelephorus niger; elytris apice; abdomine lateribus flavis.*

Act. Nidr. 4. 19.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 176. *Cicindela* 11. La *Cicindèle noire à points jaunes, et corcelet noir*.

*Fusca; elytris apice flavis, thorace fusco.*

de Geer

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 77. *Thelephorus* 10. *Telaphore à deux points jaunes.*

Niger, femoribus flavis; *elytris* apice luteis.

12. *Minima*, das kleinste *Afterscheinkäferchen*.\*)

Müller l. c. S. 310. No. 12. der *Eichenfliegenkäfer*.

Fabric. S. E. p. 207. *Cantharis* 10.

Müller i Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 567. *Thelephorus* *flavus*; *elytris* *nigricantibus*, apice sulphureis.

Abt. Nidr. 3. 16.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 176. *Citindela* 10. La *Cicinelle noire à points jaunes et corcelet rouge*.

Fusca; *elytris* apice flavis, *thorace* rubro nigra macula.

— — — p. 372. *Necydalis* 1. t. 7. f. 2. La *Necydale à points jaunes*.

13. *Cardiacae*, der *Wolfstrap-Afterscheinkäfer*.\*\*)

Müller l. c. S. 310. No. 13. der *Wolfstrapfliegenkäfer*.

Müller i Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 574. *Thelephorus* *aeneo-ater*, *thorace*, *lateribus*; *elytris* apice rubris.

14. *Albicans*, die *Gelbstirn*.†)

Müller l. c. S. 310. No. 14.

L. 3. 15. *Testa-*

\*) Eine Varietät derselben in des Linn. Faun. Suec. 2. No. 204.

B. *Cantharis fusca*; *elytris* apice flavis; *thorace* rufo.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 580. der glänzende Käfer mit braunen, an dem Ende gelben Flügeldecken.

\*\*) Nicht abgebildet. Der Staatsrath Müller rechnet sie zu der zweiten Klasse: Thorace teretiusculo.

†) Nicht abgebildet.

15. *Testacea*, der muschelbraune Afterscheinkäfer.

Müller l. c. S. 310. No. 15. das *Braunschild*.

Füeßlins Verz. S. 15. No. 306. der *bleyfarbichte*.

*Onomat.* hift. nat. P. 2. p. 580. der *schwarze glänzende Käfer mit bleichen Flügeldecken*.

*Fabric.* S. E. p. 207. *Cantharis* II.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 15. No. 149.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 562.

*Thelephorus niger*; *elytris*: thoracis margine laterali, pedibusque luteis.

*Act. Nidr.* 4. 20.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 173. *Cicindela* 6. Variat. b.  
La *Cicindele noire à étuis jaunes*.

*Nigra*; *thoracis* margine flavo, *elytris* pedibusque pallidis.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 71. *Theleph.* 4. *Telephore noir à étuis jaunes*.

*Niger*; *thorace rufescente* macula nigra; *elytris testaceis*; *femoribus nigris* tibiisque flavis.

*Schaeff.* Icon. t. 52. f. 8.

16. *Atra*, der *Mohr*.

Müller l. c. S. 311. No. 16.

Füeßlins Verz. S. 15. No. 307. der *Schwarze*.

*Sulzers Gesch.* S. 51. t. 6. f. 6. der *Mulate*; *Nigricans*.\*)

*Fabric.* S. E. p. 206. *Cantharis* 5.

17. *Pecti*.

\*) Füeßlin hat diese Sulzersche Canth. fragweise bey der Atra angeführt; da sie aber Sulzer selbst nur Nigricans nennt, und der Brustschild brennend roth ist, so zweifle ich, dass sie mit der Atra einerley sey. Ueberdem rechnet er sie zu denen mit Thor. *teretiusculo*.

17. *Pectinata*, das amerikanische Kammhorn.

Müller l. c. S. 311. No. 17. das Kammhorn.

Fabric. App. S. E. p. 824. *LAMPYRIS atra*.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 57. *Lampyris* II. t. 17.  
f. 13. *Lampyre pectinée*.

*LAMPYRIS atra*; antennis *pectinatis*; thorace la-  
teribus flavis, *elytris* striatis reticulatis.

18. *Serrata*, das amerikanische Sägehorn.

Müller l. c. S. 312. das Sägehorn.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 55. *Lamp.* 10. t. 17. f. 12.

*Lampyre dentelée*.

*Lampyris* flavo-testacea; *elytris* striatis reticulatis;  
fasciis tribus nigris, antennis longissimis *serratis* ni-  
gris.

19. *Tropica*, der indianische Afterscheinkäfer un-  
ter dem Wendezirkel.

Müller l. c. S. 312. No. 19. der Wendezirkel.

20. *Pectinicornis*, der Federkamm.

Müller l. c. S. 312. No. 20. t. 3. f. 3. die Feder-  
kammsfliege.\*)

Füsslins Verz. S. 15. No. 308. der Federkamm.

Frisch Inf. 12. Th. S. 38. No. 32. 3. Pl. t. 6. f. 7. der  
größere ziegelrothe Holzkäfer.

Schaeff. Elem. t. 106. f. 1. *Pyrochroa*, Feuerkäfer.

— — Icon. t. 90. f. 4.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 338. *Pyrochroa*; La *Cardi-*  
*nale* t. 6. f. 4.\*\*) Ll 4 de Geer

\*) S. meine Anmerkung bey *Ptinus pectinicornis*.

\*\*) Dieses Citatum findet sich im Fabric. nebst den Schaeff. Icon.  
t. 90. f. 4. bey des Linn. *Lampyris coccinea* No. 18. De Geer  
aber

de Geer Inf. Tom. V. p. 20. *Cardinale* 1. t. 1. f. 14.  
*Cardinale rouge.*

*PYROCHROA (rubra)*, nigra; thorace orbiculato  
 depresso, elytrisque rubris; antennis pedinatis.

## II. Mit rundem Bruststück.

21. *Violacea*, der guineische violette Afterschein-  
 käfer.\*)

Müller l. c. S. 313. No. 21. der *Violettrücken*.

22. *Coerulea*, der himmelblaue Afterschein-  
 käfer.\*\*)

Müller l. c. S. 313. No. 22. der *Blauschatten*.

Fabric. S. E. p. 208. *Necydalis* 2. *coerulescens*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 15. No. 150.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 572.

*Thelephorus coeruleus*, virens; elytris coeruleis;  
 antennis nigris.

Scop. Entom. carn. No. 136.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 76. *Theleph.* 8. *Telephore*  
*bleu-violet*.

*Villosus*, *violaceo-coeruleus*, antennis pedibusque  
 nigris.

23. *Viridissima*, der ganz grünglänzende Afterschein-  
 käfer.

Müller l. c. S. 313. No. 23. das *Seidenwams*.

Füeßlins Verz. S. 15. No. 309.

Fabric. S. E. p. 208. *Necydalis* 1.

Mülleri Faun. Fridr. p. 15. No. 151.

*Geoffr.*

aber rechnet solche zu dem gegenwärtigen Insekt. S. meine  
 Anmerk. bey L. *coccin*.

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 177. *Cicindela* 14. *La Cicindele verdeâtre.*

Viridi-coerulea.

de Geer Inf. Tom. V. p. 15. *Cantharis* 3. t. 1. f. 13.

Viridi-aenea nitida; *antennis nigris; thorace tereti elongato.*

24. *Virescens*, der grünliche Afterscheinkäfer. \*)

Müller l. c. S. 313. No. 24. der Jägerrock.

Füesslins Verz. S. 15. No. 310.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 571. *Thelephorus opacus, elytris subattenuatis.*

25. *Dermestoides*, der speckkäferartige Afterschein-käfer. \*\*)

Müller l. c. S. 314. No. 25. die Käferfliege.

Füesslins Verz. S. 16. No. 311.

Fabric. S. E. p. 204, *Lymexylon* 1.

26. *Navalis*, der Schiffwerftskäfer.

Müller l. c. S. 314. No. 26. der Matrose.

Frisch Inf. 13. Th. S. 24. 3. Pl. t. 20. der schmalen-bige kleine Holzkäfer mit gelben Füßen.

Sulzers Gesch. S. 50.

Berlin. Samml. 8. Th. S. 20-26. f. e. f.

Ll 5 Linn.

\*) Nicht abgebildet.

Vielleicht ist No. 22. 23. 24. eine bloße Varietät von Geoffr. Cicindele verdeâtre No. 14. deren er drey angiebt:

1. Viridis.

2. Coerulea.

3. Viridi-coerulea.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Linn.* Reise durch Westgothl. *Uebers.* S. 152. t. 2. f. 4.  
*Schaeff.* Icon. t. 59. f. 1.

*Fabric.* S. E. p. 204. *Lymexylon* 2.

*Müller* Faun. Fridr. p. 15. No. 152.

### 27. *Melanura*, der *Schwarzschwanz*.

*Müller* I. c. S. 314. No. 27.

*Füesslins* Verz. S. 16. No. 312.

*Fabric.* S. E. p. 206. *Cantharis* 9.

*Raj.* Inf. p. 84. No. 27. *Cantharis sepiarius* elytro-  
rum apicibus nigris.

*Schaeff.* Icon. t. 16. f. 14.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 173. *Cicindela* 5. *La Cicin-*  
*dele à étuis tachetés de noir.* \*)

*Rubra*, *elytris testaceis*, apice nigris.

*Müller* Faun. Fridr. p. 16. No. 153.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 871.

*CANTHARIS (melanura) fulva*, oculis antennis  
apiceque elytrorum nigris.

### Unabgebildete Afterscheinäcker.

#### I. Klasse.

1. No. 9. *Pedicularia*.

2. No. 11. *Biguttata*.

3. No. 13. *Cardiacae*.

4. No. 14. *Albicans*.

#### II. Klasse.

1. No. 22. *Violacea*.

2. No. 23. *Coerulea*.

#### 3. No.

\*) Nach *Fabric.* aber nach *de Geer* Tom. IV. p. 71. No. 3. *Thele-*  
*phorus bimaculatus*. S. unter den neuen No. 14. iste Kl. wozu  
auch von dem *de Geer* Raji Citat. p. 84. No. 27. gerechnet wird.

3. No. 24. *Virescens.*  
 4. No. 25. *Dermestoides.*

### Newe Afterscheinkäferarten.

#### I. Klasse.

Mit platt gedrücktem Brustsilde.

1. *Americana*, der neuyorkische Schwarzfleck.

*Forsteri* nov. sp. Inf. p. 50. No. 50.

*Thorace marginato flavo, macula nigra; elytris flavis versus apicem macula trionali\*) oblonga nigra.*

2. *Bidentata*, der zweyzähnichte Afterscheinkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. pag. 62. No. 563. *Thelaphorus niger; thorace, abdomine, tibiisque rubris.*

3. *Marginata*, der amerikanische Rothrand.

*Fabric.* S. E. p. 206. *Cantharis 6.*

*Thorace marginato, nigra; thoracis elytrorumque marginibus rubris.*

4. *Ruficollis*, der englische Rothhals.

*Fabric.* S. E. p. 206. *Cantharis 7.*

*Atra; thorace abdomineque rufis.*

5. *z-punctata*, der leipziger Zweypunkt.

*Fabric.* S. E. p. 206. *Cantharis 8.*

*Thorace marginato; punctis duobus nigris; elytris testaceis, apice nigris.*

#### 6. Cau-

\*) Die den dritten Theil der Flügeldecken einnimmt.

6. *Caudata*, der *geschwänzte Afterscheinkäfer*.

*Scop. Entom. carn. No. 125.*

Abdomen terminatum *cauda brevi bifida*; circa aquas in vmbrosis.

7. *Marginata*, der *Schwarzrand*.

*Scop. Entom. carn. No. 130.*

Nigra; *elytris fulvis*; margine interno nigris, punctorum impressorum seriebus 9.

8. *Pilosa*, der *Haarichte*.

*Scop. Entom. carn. No. 131.*

Ist nach *Fabric. S. E. p. 62. Anobium 4*, oder *Linn. DER MESTE S. niger No. 28.*

9. *Squallida*, der *schmutzige Warzenkäfer*.

*Scop. Entom. carn. No. 132.*

*Fusca*, *antennis basi tibiisque ferrugineis*.

10. *Flava*, der *gelbliche Warzenkäfer*.

*Scop. Entom. carn. No. 133.*

*Flava*, *culis palporumque articulo vltimo nigris*.

11. *Fraxinea*, der *Aeschenwarzenkäfer*.

*Scop. Entom. carn. No. 134.*

*Nigra*, *elytris subdiaphanis*, *striatis fulvis*.

12. *Serraticornis*, das *Sägenhorn*.

*Scop. Entom. carn. No. 135.*

*Nigra*; *capite*; *thorace orbiculato*; *elytrisque fulvo-rufis*; *antennis totis*, *vel apice uno latere serratis*.

13. *Pallida*, der kleine blasse Warzenkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 173. Cicind. 4. La petite Cicindèle pâle.*

*Elytris testaceis; thorace rubro immaculato; genuibus omnibus rubris.*

14. *Bimaculatus*, der Zweygefleckte.

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 71. Teleph. 3. Telephore à élytres jaune à extrémité noire.\*)*

*Flavo-rufus; elytris testaceis apice nigris.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 565. Telephorus rufus; elytris testaceis, apice nigris.*

15. *Niger*, der Schieferfarbige.

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 72. Teleph. 5. Petit Telephore ardoisé.*

*Thorace flavo-rubo; capite elytrisque nigris; pedibus totis flavis.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 172. Cicindela 3. La petite Cicindèle noire.*

*Elytris nigricantibus; thorace rubro immaculato; genubus omnibus rubris.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. THELEPHORVS parvulus No. 578.*

*Flavus; oculis fronteque nigris, elytris nigricantibus.*

16. *Pensylvanica*, der pensylvanische Warzenkäfer.

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 78. Telephore (exot.) de Pensylvanie. t. 17. f. 15.*

*Thorace, elytrisque rufo-flavis, macula oblonga nigra in singulo elytro, antennis pedibusque nigris.*

II. Klasse.

\* Den hierbey vom Herrn de Geer citirten *Rajus* und *Geoffroy* findet der Leser nach *Fabric.* bey *Canth. Lina. Melania* No. 27.

## II. Klasse.

*Mit rundlichem Brustschild.*

1. *Fimbriata*, der weißgesäumte russische Warzenkäfer.

*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 264. t. 16. f. 8.

*Cantharis*, corpore atro; *elytris albo-fimbriatis* cum linea alba longitudinali intermedia in singulo hemelytro.

2. *Parva viridis*, der kleine russische Warzenkäfer.

*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 314. t. 16. f. 11.

*Elytris* ad apicem maculis duabus flavis rhombeis.

3. *Lignosa*, der Warzenkäfer im Eichenholz.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 16. No. 155.

*Thorace marginato corporeque nigro; elytris testaceis.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 579.

*Thelephorus* (*thorace teretiusculo*) niger; *elytris pedibusque luteis.*

4. *Pulla*, der rothbraune Waldwarzenkäfer.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 16. No. 156.

*Tota atra; thorace marginato; antennis longitudo corporis.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 577.

*THELEPHORVS* (*pullus*) *thorace teretiusculo; nigro-coeruleus; pilosus.*

5. *Lutea*, der leimfarbige Warzenkäfer.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 16. No. 157.

*Thorace teretiusculo; corpore atro; elytris luteis, apice nigris.*

*Mülleri*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 870.

*CANTHARIS lutea*, subtus atra, supra fulva, elytrorum apicibus nigris.

6. *Sericæa*, der seidenglänzende Warzenkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 573. *Thelephorus viridisimus*, *elytris attenuatis*, *divaricatis*.

7. *Arbustorum*, der Strauchwarzenkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 575. *Thelephorus viridi-aeneus*, *ore apiceque elytrorum rubris*.

8. *Plumbea*, der Bleyfahle.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 576. *Thelephorus nigro-aeneus*, *pilosus*, *tibiis rufis*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 179. *Cicindela* 17. La Cicindèle bronzée.

*Plumbeo-cuprea*; *tibiis pallidis*, *abdomine subrotundo*.

9. *Quadripunctata*, der Vierpunkt.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 580. *Thelephorus testaceus*, *fronte punctis quatuor*; *thorace macula nigris*.

10. *Spadicea*, der Muschelbraune.

*Scop.* Ent. carn. No. 137.

*Nigra*; *elytris testaceis*, *pellucidis*, *pilosis*.

11. *Fulvicollis*, der Brauhals.

*Scop.* Ent. carn. No. 138.

*Nigra*; *thorace fulvo*; *elytris fuscis*.

12. *Rufi-*

12. *Rufiventris*, der Rothbauch.

*Scop.* Ent. carn. No. 139.

*Thorax rufescens*, linea dorsali longitudinali nigra; abdomen rufum.

13. *Vestulata*, der Rostrand.

*Scop.* Ent. carn. No. 140.

Nigra; thorace rufo, linea dorsali nigra; *elytris nigricantibus*, interno margine ferrugineo.

14. *Tenebricosa*, der Düstere.

*Scop.* Entom. carn. No. 141.

Nigricans; *femoribus anticis ferrugineis*.

15. *Sericosa*, der Seidenglanz.

*Scop.* Entom. carn. No. 142.

Fusca et sericeo prostrato brevi *villo* ubique adspersa; antennis basi femoribusque basi rufis.

16. *Parva*, das kleine Warzenkäferchen.

*Scop.* Entom. carn. No. 143.

Aeneo-fusca, villosa, *antennis elytro duplo brevioribus*.

17. *Rubro-nigra*, der Rothschwarze.

*Geoffr.* Ins. Tom. I. p. 177. *Cicindela* 13. La Cicindele verte à corcelet rouge.

*Viridis*; thorace rubro immaculato.

18. *Plumbeo-nigra*, der bleyfahle Schwärzling.

*Geoffr.* Ins. Tom. I. p. 178. *Cicindela* 15. La Cicindele plombée.

19. *Vil-*

19. *Villoso-cinerea*, der *aschgraue wolllichte*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 178. *Cicindela* 16. La *Cicindele cendrée*.

20. *Plumbeo-cuprea*, der *bleyfahle kupferfarbige*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 179. *Cicindela* 17. La *Cicindele bronzée*.

*Tibiis pallidis; abdomine subrotundo.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 576. THELEPHORVS *plumbeus*, *nigro-aeneus*; *pilosus*; *tibiis rufis*.

### 209. G E S C H L E C H T. Elater; *Spring schnellkäfer.\*)*

Müller Linn. Naturf. 5. B. 1. Th. S. 315. *Springkäfer*; griech. Notopeda; franz. Taupin; holl. Kniptorren, Springkevers.

Börners Samml. I. Th. S. 474. *Springkäfer*.

Eberhards Thiergesch. S. 196. *Springkäfer*.

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 98. der *Springkäfer*.

Sulzers Kennz. S. 67. *Springkäfer*.

— — Gesch. S. 51. *Schnellkäfer*.

Pontopp. N. G. v. D. S. 208. norw. Smälder (Knaller); *Springkäfer*.

Füeßlins schweiz. Inf. S. 16. *Schnellkäfer*.

### Onomat.

\*) Die Art, wie diese Käfer das *Schnellen* und den *Sprung* verrichten, hat Herr Sulzer in seiner Gesch. S. 52. beschrieben. Linné sagt: *Elateris Larvae etiamnum latent*; die neuesten Erfahrungen aber beweisen, dass sie im *faulen Holze*, besonders in fauler Holzerde, die man in den Gärten rotten lässt, leben, wo auch zuweilen noch die Käfer, am häufigsten aber auf den Blumen und niedrigen Obst- ingleichen auf alten Weidenbäumen gefunden werden.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. pag. 716. der *Springkäfer*;  
*Heuschreckenkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 210. *Elater*.

*Scop.* Entom. carn. p. 91. *Elater*.

*Abt.* Nidr. III. 357.

— Helvet. II. 250.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 129. *Taupin*; *Elater*.

*de Geer* Inf. T. IV. p. 138. *Taupin*; *Scarabé à ressort*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 59. 61. *Spring-Basse*;  
*Smaeller*; *Smelder* nom. gen.

1. *Flabellicornis*, das *indianische Fächerhorn*.\*)

*Müller* l. c. S. 316. No. 1. der *Wedeler*.

*Fabric.* S. E. App. p. 824.

2. *Speciosus*, der *schöne indianische weiß und schwarzgefleckte Springkäfer*.\*\*) )

*Müller* l. c. S. 317. No. 2. der *Springer*.

*Fabric.* S. E. p. 210. No. 1. *Elater albus*, nigro-maculatus.

3. *Oculatus*, das *amerikanische Schwarzauge*.

*Müller* l. c. S. 317. No. 3. t. 6. f. 13. das *Schwarzauge*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 723. der *an seinem Brust-schild mit zwey kleinen schwarzen Augen versehene Springkäfer*.

*Schröters* Abhandl. I. S. 330. t. 2. f. 1.

*Fabric.* S. E. p. 210. No. 2. *Thorace oculis duobus atris, corpore nigro, albo-maculato*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. pag. 159. exot. 1. t. 17. f. 28.  
*Taupin à deux taches en œil*.

*Elater niger*; *thorace maculis binis ovatis villofis aterrimis*.

4. *Nocti-*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

4. *Noctilucus*, der amerikanische leuchtende Springkäfer.

Müller l. c. S. 318. No. 4. die Studierlampe.

Fermins Beschr. der Kol. Surinam. 2. Th. S. 284. die große leuchtende Fliege?

Adans. Reis. nach Senegall. Märt. Uebers. S. 136. pp.

Bankrofts Naturg. von Guiana. S. 146. Feuerfliege.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 722. der bey Nacht leuchtende Springkäfer.

Lesser Theol. der Inf. S. 306. brasiliische Lichtmücke; Lichtkäfer; Cocojus; Cucujo; Memoa; Kephalolampis.

Nieremb. H. N. Lib. 13. c. 3.

Ionston hist. nat. de Inf. p. 107. cap. 8. de Cocujo. t. 16. Cocujo A. B.

Aldrov. de Inf. lib. 4. c. 7. f. 491.

Catholicon A. p. 89. Acudia C. 381. Cocujas.

Fabric. S. E. p. 210. No. 3.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 160. Exot. No. 2. t. 18. f. 1.

*Taipin luisant.*

Elater fuscus, thoracis lateribus, macula flava glabra convexa nitida.

Mém. de l' Acad. des Scienc. de Paris 1766. pag. 339. t. 10. f. 1. 2. 3.

5. *Phosphoreus*, der amerikanische phosphorisirende Springkäfer.

Müller l. c. S. 318. No. 5. die Nachtkerze.

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 724. der phosphorescirende Springkäfer.

Fabric. S. E. p. 210. No. 4.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 161. Exot. 3. t. 18. f. 2. *Taipin phosphore.*

Fusco-castaneus; thorace postice maculis duabus flavis glabris; antennis pedibusque rufo-fuscis.

Mm 2

6. *Porca-*

6. *Porcatus*, der amerikanische Furchenflügel.\*)

Müller l. c. S. 319. No. 6. der Afterflügel.)

Fabric. S. E. p. 211. No. 8. *Viridi-aeneus*; elytris fulcatis, fulcis villoso-albis.

7. *Ligneus*, der amerikanische holzbraune Springkäfer.\*\*)

Müller l. c. S. 319. No. 7. der Holzspringer.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 725. der Springkäfer mit ausgerandeten und hinten zugespitzten Flügeldecken.

Fabric. S. E. p. 211. No. 6.

8. *Striatus*, der surinamische gestreifte Springkäfer.†)

Müller l. c. S. 319. No. 8. der Zotenafter.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 726. der Springkäfer mit bartigem After.

9. *Bipustulatus*, die Blutblätter.††)

Müller l. c. S. 320. No. 9. der Blutpunkt.

Fabric. S. E. p. 215. No. 36.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 136. No. 15. Le Taupin noir à taches rouges.

Niger; elytrorum basi maculis rubris.

10. *Brunneus*, die Braundecke.†††)

Müller l. c. S. 320. No. 10.

### Fließlins

\*) Dieser Springkäfer wird künftig in des Herrn D. Martini allgem. Gesch. der Natur der Furchenflügel heissen.

Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

†††) Nicht abgebildet.

*Füesslins* Verzeichn. schweiz. Inf. S. 16. No. 313. der *Braune*.

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 719.* der *Springkäfer mit eisenfarbnen Flügeldecken*.

*Fabric. S. E. p. 214.* No. 28.

*Thorace rufo, medio nigro. —*

II. *Syriacus*, der *syrische Springkäfer mit zwei weissen Streifen*.\*)

*Müller l. c. S. 320.* No. 11. der *Syrer*.

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 725.* der *syrische Springkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 212.* No. 17.

12. *Cruciatus*, der *Kreuzträger*.

*Müller l. c. S. 320.* No. 12.

*Füesslins* Verzeichn. schweiz. Inf. S. 16. No. 314. der *Kreuzträger*.

*Sulzers Gesch.* S. 53. t. 6. f. 10. der *Gekreuzte*.

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 720.* der *mit einem Kreuz versehene Springkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 212.* No. 16.

*Mülleri Faun. Fridr.* p. 16. No. 158.

— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 59. No. 531.

*Niger*; *thorace abdomineque vtrinque rubro; elytris fulvis; cruce nigra*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 133.* No. 6. *Le Taupin porte-croix*.

*Thorace nigro, circulo rubro; elytris fulvis; cruce nigra*.

*de Geer Inf. T. IV. p. 149.* No. 9. *Taupin porte-croix*.

*Pedibus rufis; thorace nigro, lateribus rubro; elytris fulvis; cruce maculisque binis nigris*.

Mm 3 13. *Linea-*

\*.) *Nicht abgebildet*.

13. *Linearis*, der schmale Springkäfer.*Müller* l. c. S. 320. No. 13. der Streifschilde.*Pontopp.* N. G. v. D. S. 208. t. 16.*Onomat.* hist. nat. P. 3. pag. 721. der linienförmige Springkäfer.*Fabric.* S. E. p. 213. No. 20.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 16. No. 159.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 552.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 154. No. 17. *Taupin variable.*

*Elater (variabilis)*; thorace rufo; capite corpore que nigris, elytris mari flavis; feminae fuscis flavo marginatis.

14. *Ruficollis*, der Rothhals.*Müller* l. c. S. 321. No. 14. der Rothkragen.*Fließlins* schweiz. Inf. S. 16. No. 316. die Rothbrust.*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 47. der schwarze rothbrü stige Springkäfer.

— — — P. 3. p. 725.

*Acta Vpsal.* 1736. p. 19. No. 3. *Attelabus oblongus niger, collari testaceo.**Schaeff.* Icon. t. 31. f. 3.*Fabric.* S. E. p. 214. No. 27. Niger, thorace postico rubro, nitido.\*)*Raj.* Inf. pag. 92. No. 8. *Scarabaeus elytris nigris, scapulis rubris.**Geoffr.*

\**) Fabric.* citirt hierbey des *Scop. gramineum* No. 290. da doch derselbe den Unterschied von dem *Ruficollis* ausdrücklich anzeigt, und hinzusetzt: *Ill. Linn. Faun. Suec. ed. 2.* No. 724. (diese ist aber bey *Rufic.* angeführt) *minime nostrum indicat.* v. unter den *neuen* No. 16.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 132. No. 5. Le Taupin noir à corcelet rouge.\*)*

*Elater niger; thorace rubro.*

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 153. No. 16. Taupin à collier rouge.*

*Thorace rubro, nitido, antice nigro; elytris corporeaque nigris.*

15. *Lineatus*, der *Schrebersche lineirte Springkäfer.*\*\*) )

*Müller l. c. S. 321. No. 15. das Rostral.*

*Füesslins schweiz. Inf. S. 16. No. 317.*

16. *Mesomelus*, der *Springkäfer mit einer schwarzen Mitte.*†)

*Müller l. c. S. 321. No. 16. der Gelbaster.*

*Füesslins schweiz. Inf. S. 16. No. 318.*

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 721. der auf der Mitte seiner Brust schwarze Springkäfer.*

*Fabric. S. E. p. 214. No. 25.*

17. *Aterrimus*, der *ganz schwarze Springkäfer.*††)

*Müller l. c. S. 321. No. 17. der Punktirer.*

*Füesslins schweiz. Infekt. S. 16. No. 319. der Kohlschwarze.*

*Fabric. S. E. p. 211. No. 9.*

*Thorace atro, nitido; elytris nigris, striatis.*

Mm 4

*Mülleri*

\*) Obgleich *de Geer* und *Linn.* den *Geoffr.* bey diesem angeführt haben; so macht doch *Fabric. S. E. p. 214. No. 26.* aus dem *Geoffroyschen* einen neuen: *thoracicum*, der dem *Ruficollis* nahe kommt, aber etwas grösser ist. S. unter den *neuen No. 5.*

\*\*) Nicht abgebildet. †) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

*Müller* Faun. Fridr. p. 16. No. 160.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 535.

Ater; thorace opaco; pedibus fuscis. *Variat* antennis tarsisque rufis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 136. No. 13. Le *Taupin en deuil*.\*)

*Totus niger* nitidus.

### 18. *Castaneus*, der *kastanienbraune* Springkäfer.

*Müller* l. c. S. 322. No. 18. der *Braunrock*.

*Fießlins* schweiz. Inf. S. 16. No. 320. der *Kastanienfarbe*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 719. der *kastanienfarbne* Springkäfer.

*Poda* Mus. graec. p. 41. No. 1.\*\*) )

*Aet. Nidr.* IV. p. 21.

*Schaeff.* Icon. t. 2. f. 6. t. 11. f. 9. t. 31. f. 4.

*Müller* Faun. Fridr. p. 16. No. 161.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 534.

*Gronev.* Mus. 2. No. 482.

*Fabric.* S. E. p. 213. No. 18.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 132. No. 4. Le *Taupin à corcelet velouté*.†)

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 153. No. 15. *Taupin jaune à antennes barbues*.

### Elater

\*) Nach dem *de Geer* T. IV. p. 151. No. 12. *Linn.* No. 33. *Niger*. v. No. 28.

\*\*) Dies ist eigentlich der, den *Poda* meynt; aber nicht des *Linn.* pectinic. No. 32. wie *Scop.* Entom. carn. No. 286. ange- merkt hat.

†) Hiervon zwei Varietäten:

1. *Elytris flavescensibus*, apice nigris.

2. *Elytris rubescensibus*, apice nigris.

*Elater (flavo-pechinicornis) thorace fusco pilis rufis; elytris flavis apice nigris, corpore subtus nigro; antennis pectinatis.*

19. *Livens*, der grüngelbe Springkäfer.

Müller l. c. S. 322. No. 19. der Blaurock.

Füesslins schweiz. Inf. S. 16. No. 321.

Fabric. S. E. p. 213. No. 19.\*)

Schaeff. Icon. t. II. f. 8.

Müller. Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 543.

20. *Ferrugineus*, der schwedische rostfarbige Springkäfer.

Müller l. c. S. 322. No. 20. der Pompadur.

Füesslins Verz. S. 16. No. 321. der Rostfarbe.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 720. der an seinem Leibe ganz und gar eisenfarbne Springkäfer.

Schaeff. Icon. t. 19. f. 1.

Fabric. S. E. p. 211. No. 7.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 130. No. 1. t. 2. f. 4. Le Tau-pin rouge.

Thorace, elytrisque rubris.

21. *Sanguineus*, der blutrote Springkäfer.

Müller l. c. S. 322. No. 21. die Hoftrauer.

Füesslins Verz. S. 16. No. 322. der Blutrote.

Sulzers Gesch. S. 53. t. 6. f. 9. der Rothrock.\*\*)

Min 5 Schaeff.

\*) Wo er vermutlich durch einen Druckfehler *lucens* heißt.

\*\*) Das vom *Liuné* beygefügte Citatum: Schaeff. Icon. t. 2. f. 6. hat Füesslin zu seinem *nenen* No. 323. a. *Elater Scopoli* No. 289. gesetzt; allein ob bey diesem letzteren Sulzers Gesch. t. 2. f. 6. richtig angeführt sey, zweifle ich fast, weil daselbst ausdrücklich l. c. auf *Linn.* No. 21. *Sanguin.* verwiesen ist.

*Schäffer* s neuentdeckte Theile etc. S. 26. t. 2. f. 9. der hellrothe Springkäfer.

— — Elem. t. 60. f. 2.

— — Icon. t. 11. f. 8. 9. (alleg. *Müller*o).

— — — t. 31. f. 7. fem. (cit. *Füßl.* et *Sulzero*).

*Poda* Mus. graec. p. 41.

*Fabric.* S. E. p. 214. No. 29.

*Ater, elytris sanguineis.*

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 725. der *blutrothe Springkäfer*.

*Müller* Faun. Fridr. p. 16. No. 162.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 532.

*Niger, elytris rubris.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. pag. 131. No. 2. Le *Taupin à étuis rouges*.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 151. No. 13.

*Niger, elytris rubris.*

## 22. *Balteatus*, der *gegürtelte Springkäfer*.

*Müller* l. c. S. 323. No. 22. t. 6. f. 14. der *Gürtel-springer*.

*Füesslins* Verz. S. 16. No. 323. b.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 719. der *Springkäfer mit schwarzen und röthlichen Flügeldecken*.

*Fabric.* S. E. p. 215. No. 30.

*Akt. Nidr.* IV. 22.

*Müller* Faun. Fridr. p. 16. No. 163.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 542.

*Niger; elytris, antice denudatis, rubris.*

*Schaeff.* Icon. t. 31. f. 5. (test. *Füßl.*)

— — — t. 77. f. 2. (— de *Geer*).

de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 152. No. 14. | *Taupin à ceinture*.

*Niger, elytris antice dimidiato-rufis, postice nigris.*

23. *Marginatus*, der Schwarzrand.*Müller* I. c. S. 323. No. 23.*Füesslins Verz.* S. 16. No. 324.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 721. der Springkäfer mit einem dunklen Brustschild, und mit schaaklichten Flügeldecken, die an ihrem Rand überall schwarz sind.

*Fabrit.* S. E. p. 213. No. 24.*Aet.* *Nidr.* III. 16. Uebers. p. 357. t. 6. f. 6.*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 60. No. 548.

*Rufo-fuscus; pedibus elytrisque flavis; margine suturaque fuscis.*

Variat margine elytrorum minus fusco; thorace pubescente, et aliis longior elytris immaculatis.

24. *Sputator*, der Spritzer.\*)*Müller* I. c. S. 323. No. 24.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 725. der Springkäfer mit schwarzen Fühlhörnern und Füßen.

*Fabrit.* S. E. p. 215. No. 31.*Schaeff. Icon.* t. 19. f. 5.*Mülleri Faun. Fridr.* p. 17. No. 162.*— — Zool. Dan. Prodr.* p. 61. No. 553.

*de Geer Inf. Tom. IV.* p. 151. No. 11. *Taupin brun à pattes jaunes.*

*Elater (fuscus flavipes), capite thoraceque nigris; elytris rufo-fuscis, pedibus flavis, antennis rufis.*

25. *Obscurus*, der dunkelbraune Springkäfer.*Müller* I. c. S. 323. No. 25. der Nachschatten.*Füesslins Verz.* S. 16. No. 326.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 723. der dunkle Springkäfer.

*Aet.*

\*) Dieser Käfer hat die Eigenschaft, wenn man ihn plagt, dass er knirscht, und eine Feuchtigkeit aus dem Munde spritzt.

*Ast. Nidr. IV. 24. t. 16. f. 10?*

*Fabric. S. E. p. 213. No. 21.*

*Piceus; thorace elytrisque obscure nigris.*

*Müller. Faun. Fridr. p. 17. No. 165.*

— — *Zool. Dán. Prodr. p. 60. No. 546.*

*Fuscus; thorace elevato; elytris striato-punctatis, intervallis rugolosis.*

Variat corpore nigro et fusco, glabro vel pubescente, supra opaco, vel subnitente; elytris castaneis, lividis, fuscis vel nigris; antennis fuscis et rufis.

**26. *Tristis*, der Trauer springküfer.**

*Müller l. c. S. 324. No. 26. das Trauernkleid.*

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 726. der traurige Springküfer.*

*Fabric. S. E. p. 213. No. 23.*

*Schaeff. Icon. t. 194. f. 1.*

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 158. No. 20. Taupin à future noire.*

*E. (lineatus), thorace nigro; margine flavo-fusco; elytris pallide flavo-fuscis; futura nigra.*

**27. *Fasciatus*, die weisse Wasserwelle.\*)**

*Müller l. c. S. 324. No. 27. die Wasserwelle.*

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 720. der mit einem weißen Band versehene Springküfer.*

*Fabric. S. E. p. 212. No. 12.*

*Scop. Entom. carn. No. 281.*

*Niger, opacus; thorace fulco medio, elytro fascia vndata, albida.*

**28. *Mu-***

\*) Nicht abgebildet.

28. *Murinus*, der mausfarbige Springkäfer.

*Müller* l. c. S. 324. No. 28. die *Wasserwolke*.

*Füesslins Verz.* S. 16. No. 327. der *Mausfarbige*.

*Onomatol.* hist. nat. P. 3. p. 722. der *mausfarbene Springkäfer*.

*Schaeff.* Icon. t. 4. f. 6.

*Fabric.* S. E. p. 211. No. 10.\*)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. pag. 135. No. 10. *Le Taupin gris-de-fouris*.

*Niger*; *elytris villoso-murinis*.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 150. No. 10.

*Taupin à tarses roux.*\*\*)

E. (*rufipes*), *nigro-fuscus*; *maculis nebuloso-vilosus*, *viridi-griseis*; *plantis rufis*.

29. *Tessellatus*, der gewürfelte Springkäfer.

*Müller* l. c. S. 324. No. 29. der *Hanswurst*.

*Füesslins Verz.* S. 16. No. 328.

*Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 725.* der *gewürfelte Springkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 211. No. 11.

*Scop. Ent. carn.* No. 282. *ELATER thoracicus.*†)  
(alleg. *Fabric.*)

*Schaeff.* Icon. t. 4. f. 7.

*Müller*

\*) Nach *Fabric.* ist es *Geoffr.* No. 10.

\*\*) Nach *dé Geer* des *Geoffr.* No. 8. p. 134. Tom. I. *Le Taupin brun nebulueux*, welchen *Linn.* mit seinem *Niger* No. 33. für einerley hält, wobey aber *de Geer* des *Geoffr.* No. 13. *en deuil* angeführt hat, den *Fabric.* zu *Linn.* No. 17. *aterrimus* setzt. Es scheinet also *Linn. niger* und *aterrimus* einerley mit *Geoffr.* N. 13. *en deuil* zu seyn.

†) *Scop.* sagt nur: conf. *Elat. tessell.* L. hält ihn also nicht mit demselben völlig für einerley. v. unter den neuen No. 12.

*Müller* Faun. Fridr. p. 17. No. 166.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 547.

*Villoso-murinus*; *antennis tarisque rufis*. (*Schaeff.*  
Icon. t. 4. f. 6. 7.)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 135. No. 9. (alleg. *Fabric.*)  
*Le Taupin à plaques velues.*

Niger, *villoso-vndulatus*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. pag. 148. No. 7. *Taupin à ongles roux.*

E. (*rufo-vnguiculatus*), *fusco aeneus nitidus*; *maculis villofisis viridi-griseis*; *antennis nigris*; *vnguis rufis*.

### 30. *Germanus*, der *Teutsche*.\*)

*Müller* l. c. S. 324. No. 30.

*Fließlins* Verz. S. 17. No. 329.

### 31. *Aeneus*, der *kupferfarbige Springkäfer*.

*Müller* l. c. S. 325. No. 31. der *Kupferschild*.

*Fließlins* Verz. S. 17. No. 330. der *Kupferfarbige*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. pag. 719. der *kupferfarbne*  
*Springkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 212. No. 13.\*\*)

*Müller* Faun. Fridr. p. 17. No. 167.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 549.

*Coerulefcenti-aeneus*; *thorace viridi*; *vnguis pedum rubris*.

Pedes in *mare nigri*, in *foemina ferruginei*.

*Act. Nidr.* III. *Uebers.* p. 358. t. 4. f. 6.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 149. No. 8. *Taupin cuivreux à pattes rousses.*

E. (*aeneus*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) *Fabric.* hat zwar dabey *Scop.* E. *nitens* No. 279. angeführt,  
worans aber *Fließlin* No. 325. einen neuen gemacht hat. v. No. 10.

E. (*aeneus rufipes*) *viridi-aeneus*, seu *violaceus nitidus*; *pedibus fulvis*.

32. *Pectinicornis*, der *Springkäfer mit kammförmigen Fühlhörnern.* \*)

Müller l. c. S. 325. No. 32. der *Kopfkamm*.

Füesslins Verz. S. 17. No. 331. das *Kammhorn*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 724. der *strahlförmige Springkäfer*.

Akt. Vpsal. 1736. p. 15. No. 3. *Notopeda nigro-aenea, antennis simplicibus. (femina.)*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 541.

*Aeneo-viridis; antennis nigris.*

Schaeff. Icon. t. 2. f. 5. t. 5. f. 36. (alleg. *Müller*).

Acta Nidr. V. 23.

Fabric. S. E. p. 212. No. 14.

Raj. Inf. p. 92. No. 7. SCARABAEVS *antennis articulatis septimus.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 133. No. 7. Le *Taupin brun euvreux.*

Fusco-viridi aeneus.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 145. No. 2. t. 5. f. 3. *Taupin bronzé à antennes barbues.*

E. (*aeneo-pectinicornis*) *viridi aeneus obscurus nitidus; antennis pectinatis.*

33. *Niger*, der *schwarzbraune Springkäfer*.

Müller l. c. S. 325. No. 33. der *Schwarzrock*.

Füesslins Verz. S. 17. No. 333.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 722. der *ganz schwarze Springkäfer.*

Raj.

\*) Der vom Linné hierbey angeführte *Pedaische* ist nicht dieser; sondern der *castanens* No. 18.

*Raj. Inf.* p. 92. No. 1. *Scarabaeus artennis articulatis prius, maxime vulgaris.*

— — — No. 2. — *antennis articulatis tertius.*

*Aet. Vpsal.* 1736. p. 15. No. 4. *Notopeda atra, antennis simplicibus.*

— — — — No. 5. *Notopeda fusca, antennis simplicibus.*

*Müller* Faun. Fridr. p. 17. No. 168.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 536. *Niger, nitidus, pubescens.*

*Variat thorace vndique pubescente, striis elytrorum subpunctatis, et vnguis rubris; haec iterum pedibus fuscis, margine et apice abdominis rufis.*

*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 136. No. 13. *Le Taupin en deuil.* (alleg. *de Geer.*)

*Elater totus niger nitidus.\**

*de Geer Inf.* Tom. IV. p. 151. No. 12. *Taupin noir.*

*Elater totus ater nitidus.*

*Schaeff. Icon.* t. 174. f. 4.

34. *Minutus*, das ganz kleine Springkäferchen.\*\*) *Springkäferchen.* *Minutus*.

*Müller* l. c. S. 325. No. 34. der *Kleinspringer*.

*Onomat. hist. nat. Part. 3. pag. 721.* der ganz kleine Springkäfer.

*Fabric. S. E.* p. 215. No. 33.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 554.

35. *Pulchellus*, das Solandrische Gelbfüßchen.†) *Gelbfüßchen.* *Pulchellus*.

*Müller* l. c. S. 325. No. 35. der *Gelbfuß*.

*Füeslins Verz.* S. 17. No. 332.

*Fabric. S. E.* p. 215. No. 34.

36. *Tetra-*

\*) v. No. 17. LINN. *aterrimus*.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

36. *Tetraestichon*, der afrikanische Springkäfer mit vier Reihen gelber Punkte.\*)

Müller l. c. S. 326. No. 36. die Punktstirn.

37. *Buprestoides*, der Stinkkäferartige Springkäfer.\*\*)

Müller l. c. S. 326. No. 37. der Stinkspringer.

38. *Dermestoides*, der Speckkäferartige Springkäfer.†)

Müller l. c. S. 326. No. 38. der Kleinspringer.

### Unabgebildete Springkäfer.

1.	No.	1.	<i>Flabellicornis.</i>
2.	No.	2.	<i>Speciosus.</i>
3.	No.	6.	<i>Porcatus.</i>
4.	No.	7.	<i>Ligneus.</i>
5.	No.	8.	<i>Striatus.</i>
6.	No.	9.	<i>Bipustulatus.</i>
7.	No.	10.	<i>Brunneus.</i>
8.	No.	11.	<i>Syriacus.</i>
9.	No.	15.	<i>Lineatus.</i>
10.	No.	16.	<i>Mesomelus.</i>
11.	No.	17.	<i>Aterrimus.</i>
12.	No.	27.	<i>Fasciatus.</i>
13.	No.	30.	<i>Germanus.</i>
14.	No.	34.	<i>Minutus.</i>
15.	No.	35.	<i>Pulchellus.</i>
16.	No.	36.	<i>Tetraestichon.</i>
17.	No.	37.	<i>Buprestoides.</i>
18.	No.	38.	<i>Dermestoides.</i>

*Neue*

\*.) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

## Neue Springkäferarten.

1. *Socialis*, der gesellschaftliche Springkäfer.

*Linn.* Add. p. 1067. No. 9.

*Fuscus; antennis elytrorumque marginibus ferrugineis.*

*Müllers Suppl. B. S. 244. 39.* der *Gesellschafter.*

2. *Fuscipes*, der ostindische Braunfuß.

*Fabric.* S. E. p. 211. No. 5.

*Ater; antennis pedibusque fuscis.*

3. *Cupreus*, der englische kupferfarbige Springkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 212. No. 15.

*Rufo-aeneus; elytris dimidiato-flavis.*

4. *Flavipes*, der amerikanische Gelbfuß.

*Fabric.* S. E. p. 213. No. 22.

*Thorace obscure-nigro; elytris striatis, fuscis, pedibus testaceis.*

5. *Thoracicus*, der englische Rothschild.

*Fabric.* S. E. p. 214. No. 26. \*)

*Niger; thorace toto rufo.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 132. No. 5.* Le *Taupin noir à corcelet rouge.*

6. *Striatus*, der schwedische gestreifte Springkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 215. No. 32.

*Niger; elytris fuscis, lineatis.*

7. *Festi-*

\*) *Fabric.* frägt hierbey: An mera varietas E. *ruficollis* Linn.?

No. 14. S. No. 14.

Von des *scop. thoracico* No. 282. verschieden. S. No. 29.

7. *Festivus*, der aegyptische kleine Staats-Springkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 215. No. 35.

*Thorace ferrugineo; elytris atris, fasciis duabus flavis.*

8. *Luscus*, der amerikanische Springkäfer mit zwey schwarzen Augen auf dem Brustschild.

*Fabric.* S. E. App. p. 824. 2-3.

*Thorace ocellis binis atris; corpore nigro, immaculato.*

9. *Sanguinolentus*, der blutig eingesäumte Springkäfer.\*)

*Fr. Paula von Schrank* Beyträge zur Naturg. S. 69.

§. 16. t. 3. f. 15.

*Ater; elytris sanguineis, margine interiori macula ovata magna atra communi.*

10. *Nitens*, der glänzende Springkäfer.

*Scop.* Ent. carn. No. 279. \*\*)

*Totus nitens, aeneus, subtus fusco-viriscens; pedibus aeneis elytris striatis.*

*Füeßlins Verz.* S. 16. No. 325.

11. *Serraticornis*, das Sägehorn.

*Scop.* Ent. carn. No. 280.

*Fuscus, abdomine supra pedibusque fulvis.*

No 2. 12. *Tho.*

\*) Keine Spielart des E. *sanguin.* Linn.

\*\*) *Aeneum LINN. dicereim, si pedes essent sanguinei.*

12. *Thoraticus*, der *Eckshield.* \*)

*Scop. Ent. carn. No. 282.*

*Fuscus, albidis punctulis variegatus; thorace angulis posticis exstantibus obtusis.*

13. *Montanus*, der *Bergspringkäfer.*

*Scop. Entom. carn. No. 283.*

*Villosum, niger, nitens; antennis basi, tibiisque fulvis.*

*Füesslins Verz. S. 17. No. 334.*

14. *Advena*, der *seltene braungestreifte Springkäfer.*

*Scop. Ent. carn. No. 288. \*\*)*

*Niger; elytris testaceis, fasciis binis latis, castaneis.*

15. *Istriacus*, der *istriisch-oesterreichische Springkäfer.*

*Scop. Ent. carn. No. 289.*

*Niger; thorace elytrisque rubris.*

*Füesslins Verz. S. 16. No. 323. a. †) Scopolis Schnellkäfer.*

16. *Gramineus*, der *Graspringkäfer. ††)*

*Scop. Ent. carn. No. 290.*

*Niger; thorace vtrinque fulvo.*

17. *Ferrugineus*, der *rostfarbige Springkäfer.*

*Scop. Ent. carn. No. 291.*

*Caput fuscum; thorax, corpus pedesque ferruginei. Elytrum testaceum; apice fasciaque fuscis.*

18. *Deg-*

\*) v. No. 29. *Tessellatus.*

\*\*) *Proximus Elat. Syriaco Linn.*

†) v. No. 21. *Sanguinens.*

††) v. No. 14. *Ruficollis.*

18. *Degener*, der *abartende Springkäfer*.*Scop.* Entom. carn. No. 292.*Niger*; *aureis punctis*, variegatus, *thorace postice edentato*.19. *Subfuscus*, der *bräunliche Feldspringkäfer*.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 17. No. 169.*Thorace nigro*; *elytris rufo-fuscis*, *punctis striatis*, *abdomine rufo*.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 538.

*Niger*; *elytris fuscis*; *abdomine rubro*.*Variat* totus pubescens, *abdomine toto rubro*.20. *Siaelandicus*, der *Glanzschild*.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 17. No. 170.*Thorace nitido*; *elytris aeneis*; *punctis striatis*; *nebula maculatis*.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 550.

*Purpureo-aeneus*; *pilis griseis vndeque adpresso*.21. *Sexmaculatus*, der *Sechsleck*.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 17. No. 171.*Thorace nigro*; *margine elytrisque testaceis*, *maculis sex subfuscis glabris*.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 544.

*Niger*, *obscurus villo griseo*; *pedibus fuscis*.22. *Badius*, der *braungraue Springkäfer*.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 17. No. 172.*Thorace abdomineque nitido nigro*; *elytris striatis*, *pedibusque castaneis*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 540.

*Niger*; *elytris*, *antennis pedibusque castaneis*.

*Variat* corpore nitido, thorace subtus abdominalis que apice et lateribus rufis: *alia varietas* thorace toto rufo, elytrorum sutura nigra.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 147. No. 5. t. 5. f. 19.  
*Taupin brûn à corps court.*

ELATER (*obtusus*), corpore obtuso subtus nigro; thorace nigro; elytris fuscis griseo-villoso; antennis rufis.

23. *Pullus*, der schwarzbraune Springkäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 537.

Niger, nitidus, pubescens, elytris punctatis; pedibus brunneis.

24. *Chrysomelinus*, der chrysomelenartige Springkäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 539.

Niger; thorace rubro sulcato; elytris tarsisque flavis.

25. *Lugubris*, der Trauerspringkäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 545.

Supra ater, opacus, subtus niger.

26. *Flavipes*, der Gelbfuß.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 551.

Rufus, pubescens; pedibus luteis.

27. *Tuberculatus*, der höckrige Springkäfer.

Pontopp. N. G. v. D. S. 208. No. 13. t. 16.

Magnitudine *peletiunicornis*, totus niger, opacus; thorax in medio ex duobus tuberculis gibbus; elytra laevissime striata; plantis ferrugineis.

28. Ameri-

28. *Americanus*, der amerikanische schwarzglänzende Springkäfer.

Gronov. Mus. 2. p. 153. No. 481.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 719.

29. *Gracilis*, der amerikanische hagere Springkäfer.

Gronov. Mus. No. 478.

*Testaceus*; *thorace capiteque linea longitudinali*  
*macula laterali atra*; *elytris laevissimis, margine atris*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 720.

30. *Viridi-aeneus*, der kupferfarbige Springkäfer aus Guinea.

Gronov. Mus. 2. p. 153. No. 476.

*Thorace subpubescente; antennis nigris; elytris*  
*striatis.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 727.

31. *Maximus*, der amerikanische größte Springkäfer.

Sulzers Gesch. S. 52. t. 6. f. 7.

*Totus niger; vbiue aureo pulvere conspersus,*  
*squamulis Papilionum aequante; antennis ferratifor-*  
*mibus; caput breve; oculis nigris; thorace magno,*  
*antice rotundato, postice lato, duobus angulis exstan-*  
*tibus.*

32. *Latus*, der schweizerische breite Springkäfer.

Sulzers Gesch. S. 53. t. 6. f. 8.

*Thorace elytrisque viridi-coerulescentibus; capite*  
*ventreque metallico, punctis excavatis; antennis gra-*  
*cilibus ferratiformibus; elytris lati, arcuatis, aureo-*  
*coerulescentibus, longitudinaliter fulcatis.*

Füesslins Verz. S. 16. No. 315. der Breite.

33. *Rubro-marginatus*, der Rothrand in der jaisischen Steppe.

*Lepech.* Tageb. I. Th. S. 311. t. 16. f. 12.

*Elater niger*; thorace marginibus rubris; elytris ad suturam lineis duabus longitudinalibus flavis interruptis.

34. *Auratus*, der chinesische goldene Springkäfer.

*Drury* Inf. II. p. 65. t. 35. f. 3.

*Capite; thorace; elytrisque aureo-viridibus; pedibus nigris.*

35. *Nigro-flavus*, der schwarzgelbe Springkäfer.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 131. No. 3. Le Taupin à étais jaunes, et corcelet lisse.

*Niger; elytris flavis.* *Variat*

1. *elytris omnino flavis,*
2. *elytris flavis apice nigris,*
3. *elytris testaceo-fuscis.*

36. *Bicolor*, der zweifarlige Springkäfer.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 135. No. 11. Le Taupin bédau.

*Niger; elytris fuscis, singulo fascia longitudinali fulva.*

*Raj.* Inf. p. 78. No. 13. *Scarabaeus minor longe et angusto corpore; elytris bicoloribus e fulvo et nigro, saltatrix.*

37. *Brunneus*, die braune Flügeldecke.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 136. No. 12. Le Taupin noir à étais bruns.

*Niger; elytris fuscis.*

38. *Rufipes*, der Rothfuß.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 136. No. 14. *Le Taupin noir à pattes fauves.*

Niger, pedibus rufis.

39. *Clavatus*, das Keulhorn.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 137. No. 16. *Le Taupin à antennes en masse.*

*Fuscus*; antennis serrato-clavatis.

40. *Rufus*, der Fuchs.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 144. No. 1. t. 5. f. 18. *Taupin roux.*

Totus rufus; oculis nigris.

41. *Fuscus major*, der große Braune.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 146. No. 3. *Grand Taupin brun.*

Nigro-fuscus nitidus, pedibus fusco-castaneis; ab domine supra rubente.

42. *Fuscus minor*, der kleine Braune.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 147. No. 4. *Petit taupin brun.*

Elongatus; capite thoraceque nigris; elytris obscure fuscis; pedibus antennisque fuscis.

43. *Inaequalis*, der ungleiche Brustschild.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 148. No. 6. *Taupin à corcelet inegal.*

Niger; maculis villosis griseis; elytris scabris, thorace cavitatibus impressis.

44. *Vundulatus*, der gewässerte Springkäfer.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 155. No. 18. t. 5. f. 26.  
*Taupin à bandes ondées noires.*

*Griseo-murinus villosus; elytris fasciis tribus undulatis transversis nigris.*

45. *Nigro-maculatus*, der Schwarzgefleckte.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 158. No. 19. *Taupin à corcelet tacheté.*

*Capite nigro; thorace rufo; maculis tribus oblongis nigris; elytris pallide fuscis.*

46. *Aeneo-niger*, der erzfarbige Schwarze.

de Geer Inf. T. IV. p. 159. No. 21. *Taupin bronzé.*

*Nigro-viridi-aeneus nitidus; pedibus nigris.*

47. *Piceus*, der pensylvanische Pechschwarze.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 162. exot. No. 4. t. 18. f. 3.  
*Taupin couleur de poix.*

*Totur ater, nitidus; elytris laevissimis.*

48. *Lividus*, der pensylvanische Bleyfahle.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 162. exot. No. 5. t. 18. f. 4.  
*Taupin livide.*

49. *Flavipes*, der surinamische Gelbfuß.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 163. exot. No. 6. t. 18. f. 5.  
*Taupin à pattes fauves.*

*Nigro-fuscus; pedibus antennisque flavo-testaceis.*

50. *Maculatus*, der surinamische Gefleckte.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 163. exot. No. 7. t. 18. f. 6.  
*Taupin tacheté.*

*Obscure-testaceus; thorace antice nigro; singulo elytro maculis binis irregularibus nigris.*

210. G E S C H L E C H T. Cicindela; Sandkäfer;  
Sandläufer.\*)

*Strals. Magaz.* I. B. S. 234. *Glimmerkäfer.*

*Müllers L. N. S.* 5: Th. I. B. S. 327. *Sandläufer;*  
*holl. Zandloopers.*

*Börners Samml.* etc. I. Th. S. 461. *Zangenkäfer.*

*Eberhards Thiergeschichte.* S. 194. *Zangenkäfer.*

*Beckmanns Anfangsgr.* der N. H. S. 98. Th. 18. der  
*Zangenkäfer; leuchtende Käfer.*

*Sulzers*

\*) Verschiedene unter den *Alten*, als *Mouffet*, verstehten darunter die *Cantharides*, worinn ihnen einige *Nencre*, als *Geoffroy*, gefolget sind. Man muss sie daher mit *seinen Cicindelis* nicht verwechseln, welches die *Canthar.* Linn. oder des SCHAEFF. und DE GEER *Thelephori* sind.

*Sulzer* nennt sie in seinen *Kennzeichen* noch *leuchtende Käfer*, welche Eigenschaft aber ihnen gar nicht zukommt: richtiger hat er sie in seiner Geschichte *Sandkäfer* genannt.

Von ihrer *Oekonomie* sagt LINN. *Cicindelae insectorum Tigrides veloces; larvae etiamnum latent*, worinn ihn Hr. M. Börner beypflichtet; allein nach *Sulzers Gesch.* S. 54. ist nunmehr bekannt:

I. dass sich diese Insekten als Käfer, oder in ihrem vollkommenen Zustande, mehrentheils in wilden, trockenen, steinischen, und hauptsächlich *sandlichen* Orten aufhalten, und rechte privilegierte *Insektenräuber* sind;

2. die *Larven* aber, als lange, weisse, weiche, sechsbeinige Würmer, in runden, tiefen, cylindrischen Löchern unter der Erde stecken. Wenn sie hungrig sind, steigen sie herauf, und lauren in dem runden Loche, woren ihr mit einem Schild bedeckter Kopf akkurat passt, auf ein vorüberlaufendes Insekt, welches sie mit ihren Zangen fassen, und in die Höhle herunterziehen, worinn sie sich auch in Käfer verwandeln. Wenn man diese Käfer zwischen die Finger nimmt, geben sie, wie die *Carabi*, einen braunen Saft von sich. Diese letztern begreift auch *Geoffr.* nebst den *Cicindelis* unter seinen *Empredikus*.

- Sulzers* Kennz. S. 69. leuchtender Käfer.  
 — — Gesch. S. 53. Sandkäfer.  
*Pontopp.* N. G. v. D. S. 208. XIV. *Cicindela*.  
*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 17. Glimmkäfer.  
*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 854. das leuchtende Käfer-  
 geschlecht.  
*Schaeff.* Elem. t. 43. Zangenkäfer.  
*Comment.* Lips. Dec. I. Vol. V. 607. IV. 580. III. 216.  
 V. 606.  
*Fabric.* S. E. pag. 224. *Cicindela*. p. 227. *Elaphrus*  
 (die kleinern dieser Art).  
*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 210.  
*Scop.* Entom. carn. p. 57.  
*Müller* (Ott. Fr.) Faun. Fridr. p. 17.  
 — — Zool. Dan. Prodr. pag. 79. *Skov-Tigger*,  
 nom. gen. *Bobbe*. A Ph. I. 407.  
*Catholicon* C. p. 325. Glimmerkäfer; Glanzkäfer;  
 leuchtende Käfer.  
*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 137. *Bupreste*.  
*de Geer* Inf. Tom. IV. préf. VI. p. 108. *Cicindeles*.  
*Bom.* Dict. III. p. 160.

### I. *Campestris*, der Feldläufer.

- Müller* l. c. S. 328. No. 1. t. 6. f. 15. der *Courier*.  
*Füesslins* Verz. S. 17. No. 335. der *Courier*.  
*Pontopp.* N. G. v. D. S. 208. No. 1.  
*Sulzers* Kennz. t. 5. f. 37.  
*Neuer Schauplatz der Nat.* 2. B. S. 272.  
*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 856. der grüne leuchtende  
 Käfer mit weißen Flecken auf den Flügeldecken.  
*Schaeff.* Icon. t. 34. f. 8. 9.  
*Aß.* Nidr. III. p. 358.  
*Fabric.* S. E. p. 224. No. 1.  
*Müller* Faun. Fridr. p. 17. No. 173.  
 — — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 862.

*Geoffr.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 153. *Buprestis* 27. Le *Véloours vert à douze points blancs.*

BUPRESTIS *inauratus*, supra viridis; *coleoptris punctis* 12 albis.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 113. No. 1. t. 4. f. 1. *Cicindele champêtre.*

*Viridis nitida; elytris singulis punctis sex albis.*

2. *Hybrida*, der gefleckte Sandkäfer.

Müller l. c. S. 328. No. 2. der *Läufer.*

Füeßlins Verz. S. 17. No. 336. der *Läufer.*

Schaeff. Icon. t. 35. f. 10.

Fabric. S. E. p. 224. No. 2.

*Mülleri* Zool. Dau. Prodr. p. 80. No. 863.

Supra fusco-viridis; elytris fascia vndulata; lunulisque quatuor albis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 155. *Buprestis* 28.\* Le *Bupreste à broderie blanche.*

B. *inauratus*, supra fusco-viridis, *coleoptris fasciis sex* vndulatis albis.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 115. No. 3. t. 4. f. 8. *Cicindele tachetée.*

*Maculata*, supra viridi-grisea nitida, *subtus* viridi-aurea; elytris singulis fascia lunulisque duabus albis.

3. *Capensis*, der kapensische Sandkäfer.

Müller l. c. S. 328. No. 3. der *afrikanische Bothe.*

Sulzers Gesch. S. 54. t. 6. f. 11. der *Kapläufer.*

Fabric. S. E. p. 225. No. 5.

4. *Gen.*

\* alleg. de Geer; nach Fabric, aber No. 8. *sylvatica.*

4. *Germanica*, der *deutsche Sandkäfer*.\*)*Müller* l. c. S. 329. No. 4. der *Postknecht*.*Füeßlins Verz.* S. 17. No. 337. der *Postknecht*.*Fabric.* S. E. p. 225. No. 6.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 155. *Bupr.* 29. Le *Bupreste vert à six points blancs*.*B. inauratus*, supra *fusco-viridis*, *coleoptris punctis sex albis*.5. *Virginica*, der *virginische Sandkäfer*.\*\*) )*Müller* l. c. S. 329. No. 5. die *Estaffette*.*Fabric.* S. E. App. p. 825.6. *Carolina*, der *karolinische Sandkäfer*.*Müller* l. c. S. 329. No. 6. der *Fußgänger*.*Fabric.* S. E. p. 226. No. 13.*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 120. *exot.* No. 2. t. 17. f. 24.  
*Cicindele de la Caroline*.7. *Aequinoctialis*, der *surinamische Sandkäfer*.†)*Müller* l. c. S. 329. No. 7. der *Wanderer*.*Fabric.* S. E. p. 226. No. 14.8. *Sylvatica*, der *Waldsandkäfer*.*Müller* l. c. S. 329. No. 8. t. 6. f. 16. der *Waldjäger*.*Schröters Abhandl.* I. Th. S. 340. t. 2. f. 5. der *kleine Zangenkäfer*.††) *CICINDELA sylvatica surinamensis*.*Onomat.*\*) *Nicht abgebildet.*\*\*) *Nicht abgebildet.*†) *Nicht abgebildet.*††) Die vom Herrn D. Schröter angeführte *Schäffersche Elem.* t. 43.  
hat *Linné* bey No. 2. *hybrida*.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 855. der schwarze leuchtende Käfer mit weissen Flecken.

*Akt. Vpsal.* 1736. p. 19. No. 1. *Cicindela atra*, punctis quatuor fasciaque albis.

*Pet. Gaz.* p. 77. t. 50. f. 5. *Cantharis chusan.* viridis, elegantissime variegatus.

*Fabric.* S. E. p. 224. No. 3.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 155. *Bupr.* 28. \*)

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 114. No. 2. t. 4. f. 7. *Cicindela des forêts.*

Supra nigra, subtus viridis nitida; *elytris* singulis fascia punctisque tribus albis.

9. *Maura*, der algierische Sandkäfer. \*\*)

*Müller* l. c. S. 330. No. 9. der Tiger.

*Fabric.* S. E. p. 226. No. 15.

10. *Riparia*, der Ufer sandkäfer.

*Müller* l. c. S. 330. No. 10. der Ufersteiger.

*Füesslins Verz.* S. 17. No. 339. Strandläufer.

*Sulzers Gesch.* S. 55. t. 6. f. 13. der Gestadekäfer.

*Linn.* Reisen durch Oeland. *Uebers.* S. 133.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 857. der grüne kupferglänzende leuchtende Käfer mit breiten vertieften Punkten auf den Flügeldecken.

*Akt. Vpsal.* 1736. pag. 19. No. 3. *Cicindela aenea;* punctis excavatis.

*Schaeff.* Icon. t. 86. f. 4.

*Fabric.*

\*) alleg. *Fabric.* nach *de Geer* aber No. 2. *hybrida*.

\*\*) Nicht abgebildet.

Schwerlich möchte die im *Fermín* II. 284. beschriebene leuchtende Fliege diese *CICINDELA maura*; eher *ELATER noctilucus* seyn.

*Fabric.* S. E. p. 227. *Elaphrus* 1.

*Müller* Faun. Fridr. p. 18. No. 174.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 864.

Aeneo-fusca; *elytris* scarificatis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 156. *Bupr.* 30. *Le Bupreste à mammelons.*

B. viridi-aeneus; *elytris* punctis latis excavatis mammillosis.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 117. No. 4. t. 4. f. 9. *Cicindele de rivage.*

Viridi-aenea; maculis rotundis, excavatis griseo-viridibus.

## II. *Flavipes*, der *Gelbfuß*.\*)

*Müller* l. c. S. 330. No. 11. der *Bothenschild*.

*Füeßlins* Verz. S. 17. No. 340. der *Gelbfuß*.

*Fabric.* S. E. p. 227. *Elaphrus* 2.

*Müller* Faun. Fridr. p. 18. No. 175.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 868.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 119. No. 6. *Cicindele à pattes jaunes.*

Capite, thoraceque viridi-aeneis, *elytris* pallide fusca, nigro-maculatis, antennis pedibusque flavescentibus.

## 12. *Rupestris*, der *Felsensandkäfer*.\*\*)

*Müller* l. c. S. 330. No. 12. der *Felsenkletterer*.

*Fabric.* S. E. p. 227. *Elaphrus* 3.

## 13. *4-maculata*, der *Vierfleck*.†)

*Müller* l. c. S. 331. No. 13. der *Expresse*.

*Müller* Faun. Fridr. p. 18. No. 176.

## 14. *Aqua-*

\*.) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†.) Nicht abgebildet.

14. *Aquatica*, der *Wasserfersandkäfer*.\*)

Müller I. c. S. 331. No. 14. *Wasserschwimmer*.

*Acta Vpsal.* 1736. p. 19. No. 26. *Cicindela miniima aurea laevis*.

Fabric. S. E. p. 227. *Elaphrus* 4.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 355. der kupferglänzende ganz glatte Stinkkäfer; der kleine goldfarbige Stinkkäfer.

Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 177.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 865.

Nigra, nitida; supra fusco-aenea; *elytrorum* striis aequaliter distantibus; pedibus rufo-fuscis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 157. *Bupr.* 31. Le *Bupreste à tête canelée*.

B. fusco-aeneus; capite profunde striato; *elytrorum* stria prima remotissima.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 118. No. 5. *Cicindele à tête canelée*.

C. *striata*, aenea, nitidissima, capite striato; *elytris* dimidio striatis punctatis: intus laevibus.

*Unabgebildete Sandkäfer.*

1. No. 4. *Germanica*.\*

2. No. 5. *Virginica*.

3. No.

\*) Ich habe sie lieber den *Wasserfersandkäfer* nennen wollen, weil Herr de Geer mit Recht zweifelt, dass sie sich wirklich im Wasser aufhalten sollte.

\*\*) Dass der sel. Müller geglaubt habe muss: alle vom Linn. angeführte Schrebersche Insekten, aus dessen nov. sp. Inf. Haiae 4. 1759, wären gestochen, abgebildet und illuminirt, erhelet dataus, weil er die *german.* Linn. Schreb. obscurior. No. 5. in dem, des 6. B. 2. Th. beygefügten Verzeichniß unter den *illuminirten* aufgeführt hat, welches der Augenschein widerlegt.

3. No. 7. *Aequinoctialis.*
4. No. 9. *Maura.*
5. No. 11. *Flavipes.*
6. No. 12. *Rupestris.*
7. No. 13. *4-maculata.*

### *Neue Sandkäferarten.*

1. *Interrupta*, der *Sierra Leonische Sandkäfer.*

*Fabric.* S. E. p. 225. No. 4.

*C. elytris fuscis puncto baseos; fastiis tribus interruptis, lineolaque apicis flavis.*

2. *Tuberculata*, der *neuseeländische zweihöckrige Sandkäfer.*

*Fabric.* S. E. p. 225. No. 7.

*Thorace fusco, bituberculato; elytris fusco viridi-que variis; margine tridentato, albo.*

3. *Vnipunctata*, der *amerikanische Einpunkt.*

*Fabric.* S. E. p. 225. No. 8.

*Subpurpurascens, labio elytrisque puncto albo.*

4. *Sexpunctata*, der *malabarische Sechspunkt.*

*Fabric.* S. E. p. 226. No. 9.

*Viridi-aenea; elytrorum disco obscuriore, punctis tribus albis.*

5. *Sexguttata*, der *virginische Sechspunkt.*

*Fabric.* S. E. p. 226. No. 10.

*Viridis, nitida; elytris punctis tribus marginalibus, albis.*

6. *Catena,*

6. *Catena*, die ostindianische Punktkette.

*Fabric.* S. E. p. 226. No. 11.

*Viridi-aenea*; *elytris albidis, punctis sex viridibus, concatenatis.*

7. *Marginata*, der virginische Weißrand.

*Fabric.* S. E. p. 226. No. 12.

*Viridis*; *elytris margine fascia vndata, punctisque duobus albis.*

8. *Semipunctata*, der hallische halbpunktierte Sandkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 227. *Elaphrus* 5.

*Aeneus*, *nitidus*; *elytris punctatis, dorso glaberrimo.*

9. *Tristis*, der Drury'sche schwarze Sandkäfer.

*Fabric.* S. E. App. p. 825. 3-4.

*Nigra*; *elytris macula media flava.*

10. *Littorea*, der aegyptische Ufersandkäfer.

*Forstkähl Descr. Animal.* p. 77. t. 24. A.

*Violaceo-aenea*; *elytris lunulis quatuor, cum margine confluentibus, albis.*

11. *Sexmaculata*, der russische sechsgefleckte Glanzkäfer.

*Lepech.* Tageb. II. Th. S. 203. t. 10. f. 12.

*Capite virescente; thorace rubro; elytris testaceis; maculis sex nigris.*

12. *Austriaca*, der oesterreichische Glanzkäfer.

*Fr. von Paula Schrank* Beytr. zur N. G. S. 69. §. 17.

Oo 2

*Viridis;*

*Viridis*; pectore abdominalisque basi subtus rubro-aeneis; *elytris marginē aureo* tenuissimo, punctis aliquot albis.

13. *Literatus*, der bündtische Gelehrte.

Sulzers Gesch. S. 55. t. 6. f. 12.

*Thorace*, capite pedibusque metallicis albo-villo-fisis; *elytris cupreis coeruleo-punctatis*, striis argenteis, litteris aequantibus.

Füesslins Verzeichn. S. 17. No. 338. *Arenaria, Sandläufser.*

14. *Danica*, der dänische messingfarbige Sandläufser.

Müller's Faun. Fridr. p. 18. No. 178.

Orichalcica; dorso speculifero.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 865.

Nigra, supra fusco-aenea; *elytrorum* striis lateribus remotis; dorso speculifero.

15. *Punctata*, der punktirte Sandkäfer.

Müller's Faun. Fridr. p. 18. No. 179.

Subaenea; *elytris* nitidis; punctis plurimis albis.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 867.

Nigra, supra subaenea; *elytris* striatis, punctis impressis quatuor; *pedibus* flavo-fuscis.

16. *Lacteola*, der Milchrand.

Pallas Reis. I. Ausz. App. No. 41.

Magnitudo et nitor *hybridae*; *elytra* margine laterali vndique late lacteo. E Lacu *Inderiensi*.

Müllers Suppl. B. S. 245. t. 15.

17. *Atrata*,

17. *Airata*, der ganz schwarze Sandläufer.

Pallas Reis. I. Ausz. App. No. 42.

Magnitudo et forma germanicae. Tota quanta sine  
vullo nitore atra.

Müllers S. B. S. 245. t. 16. der Trauerrock.

18. *Coerulea*, der sibirische himmelblaue Sandläufer.

Pallas Reis. II. App. No. 65.

Magnitudo *Sylvaticae*; os album; reliqua corpo-  
ris tota coerulea.

Müllers S. B. S. 245. t. 17. das Weißmaul.

19. *Gracilis*, der dünne schmale Sandläufer.

Pallas Reis. II. App. No. 66.

Omnibus congeneribus gracilior; fusco-nigra tota  
et subaenea. In arenis ad Schultam.

Müllers S. B. S. 246. t. 18. der Schmalbauch.

20. *Chinenis*, der chinesische Sandkäfer.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 119. exot. No. 1. t. 17. f. 23.

*Cicindele chinoise.*

Capite corporeque subtus coeruleo-violaceis niti-  
dis; elytris viridibus: maculis nigris punctisque qua-  
tuor albis.

Da Geoffroy die *Carabos* und *Cicindelas* Linn. un-  
ter ein Geschlecht, nämlich unter seine *Buprestides*  
gebracht hat; so fürchtete ich zu fehlen, wenn ich  
darunter die neuen *Cicindelas* heraussuchen wollte.  
Bey den *Carabis* aber werde ich sie lieber zusammen  
nehmen.

211. G E S C H L E C H T. *Buprestis*; *Stinkkäfer*;  
*Gleißkäfer*\*) *Schaarbuyter*; franz. Richard.

*Müllers* Linn. *Naturs.* 5. Th. 1. B. S. 332. *Stinkkäfer*.  
*Holl.* Agret-Torren.

*Börners Samml.* I. Th. S. 475. *Stinkkäfer*.

Beck-

\*) Des GEOFFR. *Buprestides* sind, wie schon erinnert worden, des LINN. *Carabi* und *Cicindelae*.

*Skopoli* nennt diese *Linn. Bupr. Mordellas*, und versteht unter seinen eigenen *Buprest.* des LINN. *Chrysomelas*.

Sonst heißtt auch noch eine kleine rothe Art schwimmender Wassermilben (*Reitläuse*), die dem Vieh, wenn es sie verschluckt, schädlich seyn sollen, *Bupreste*, wohin z. E. LINN. *Acarus aquaticus* gehört.

Schwerlich ist es auszumachen, ob dieses das nämliche Insekt sey, welches die Alten *Bupristis*, auch *Budapi* genennt, und behauptet haben, dass es dem Hornvieh, wenn es solches verschlücke, eine Entzündung verursäche.

Der Name *Stinkkäfer* schickt sich besser für die *Coprides* (Mistkäfer), *Silphas* (Todtengräber) und *Carabos* (Erdkäfer), welche an sich selbst übel riechen, als für diese, welche gar keinen Geruch von sich geben, sondern, vorzüglich die grossen ausländischen, mit so prächtigen Farben geziert sind, dass ihre Flügeldecken zum Kopfputz des amerikanischen Frauenzimmers angewendet werden. Daher der holländische Name *Agret-Torren*. Ich würde sie lieber P R A C H T K A E F E R nennen.

Die Käfer selbst gehören unter die selteneren Geschlechter, und wohnen meistens in Morästen und schlammichtigen Gegen- den. Von ihrer Verwandlung weiss man noch zur Zeit gar nichts, und was man als wahrscheinlich vermuthet, ist dieses: dass sich auch ihre Larven im Schlamm aufhalten.

*Aldrov.* et *Ionst.* *Bruprestides*, v. *Ionst.* hist. Ins. p. 106. t. 16.  
 scheinen die *Cimices person.* Linn. die stinkenden Baumwanzen;  
*Qualster* zu seyn. cf. *Hanovs Seltenh.* der Nat. I. p. 350. *Bu-  
 prestis, Baumwanze.*

*Beckmannis* Anfangsgr. der N. H. S. gen. 19. *Stinkkäfer,*

*Eberhards Thiergesch.* S. 196. §. 28. *Stinkkäfer.*

*Lessers Theol.* der Inf. S. 71. §. 43. 1.

An *Qualsters*, oder *Erdhühnerchen?* *Buprestes.*  
Swammerd. p. 107.

*Sulzers Kennz.* S. 71. *Stinkkäfer.*

— — Gesch. S. 55. der *Gleißkäfer.* Le *Richard.*

*Füesslins Verz. schweiz.* Inf. S. 17. *Gleißkäfer.*

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 208. *Stinkkäfer.*

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 352. *Stinkkäfer.*

*Catholicon* B. p. 419. *Bupreste;* *Stinkkäfer.*

*Lemery* p. 19. 3.

*Bomar.* Dict. II. p. 220.

*Charlet.* Onom. pag. 47. The *Burn-Cow;* *Burft-Cow.*

*Fabric.* S. E. p. 216. *Buprestis.*

*Brünnichii Entom.* p. 54. D A N. *Bobbe.*

*Scop.* Entom. carn. p. 60. *Mordella.*

— Ann. 5. hist. nat. p. 104.

*Müller's Faun.* Fridr. p. 18. *Buprestis.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. *Buprestis.*

*Linn. Faun. Suec.* ed. 2. p. 212. *Buprestis.*

*Geoffr. Inf. Tom. I.* p. 123. *Cucujus;* Le *Richard.*

*de Geer Inf. Tom. IV.* p. 122. Dés *Buprestes.*

### I. ELYTRIS FASTIGIATIS.

*Mit bauchigen Flügeldecken, welche dachförmig  
gegen einander in die Höhe steigen.* \*)

i. *Gigantea*, der größte ausländische Prachtkäfer.  
(der Riese.)

O o 4

Müller

\*) Ich würde lieber sagen: mit hinten gespitzten Flügeldecken.

Müller I. c. S. 333. No. 1. t. 7. f. 1. der *Goldharnisch*.

Fabric. S. E. p. 216. No. 2.

Seba Mus. 3. t. 84. f. 12.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 134. exot. No. 1. *Bupreste glauca*.

*Viridi-aenea*, nitidissima; *elytris rugoso-fuscatis*; *thorace maculis binis nigro-aeneis*.

Sloane Hist. of Jam. Tom. II. p. 210. t. 236. f. 13.  
*Cantharis maxima*.

Grew Mus. pag. 165. t. 13. *The great Gogle Eyed Beetle*.

Scop. ann. 5. hist. nat. p. 104. No. 84. *MORDELLA gigantea*.

*Elytra lineata*, et *punctis confluentibus*, *scrobiculata*.

2. *8-guttata*, der *Achttropf*.

Müller I. c. S. 334. No. 2. der *Fleckenschild*.

Pallas Reisen I. p. 26. Ausz. I. p. 14.\*)

Lepechins Tageb. II. Theil, S. 200. t. 10. f. 5. 6.  
pag. 201.\*\*)

Schaeff. Icon. t. 31. f. 1.

Fabric. S. E. p. 220. No. 23.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 126. *Cucujus 2. Le Richard à points blancs*.

*Viridi-aeneus*; *punctis quatuor impressis albis*.

Leche nov. Ins. Spec. p. 21. No. 42.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 132. No. 5. t. 4. f. 20. *Buprestis à points blancs*.

B. (*albo-*

\*) Bey Kaminka schwärzte an allen liegenden Fichtenstämmen die sonst höchstseltene *BUPRESTIS octoguttata* herum.

\*\*) *Varietas B. 8-guttatae minor 6-guttata*;

— B. *Nigerrima tota*. An *Varietas praecedentis*?

B. (*albo-punctata*) coeruleo-violacea nitida; *thoracis* lateribus albis; *elytris* striatis; *maculis* quinque albis.

II. ELYTRIS VERSVS APICEM SERRATIS.

Mit Decksschilden, die hinten an der Spitze gezähmt sind.

3. *Ignita*, der ostindianische goldglühende Prachtkäfer.

Müller l. c. S. 335. No. 3. die Feuergluth. (Bey den Einwohnern *Dias*; *Giao*; *Lanibao*; *Salibat*.)

Sulzers Gesch. S. 56. t. 6. f. 14.\*)

Fabric. S. E. p. 217. No. 9.

4. *Strigata*, der ostindianische Schmalbauch.\*\*)

Müller l. c. S. 335. No. 4. der Schmalbauch.

5. *Sternicornis*, das ostindianische Brusthorn. a.

Müller l. c. S. 336. No. 5. das Brusthorn.

Fabric. S. E. p. 218. No. 12. †)

*Elytris* serrato-tridentatis; *viridibus*; *punctis* cincereis impressis, *sterno* porrecto, conico.

de Geer Ins. T. IV. p. 136. exot. No. 2. t. 17. f. 25.  
Bupreste à pointe.

B. *viridi-aurata*; *elytris* fusco castaneis, ferrato-tridentatis; *thorace* punctato; *sterno* porrecto.

Grew Mus. pag. 166. t. 13. The thick Gogle-Eyed Beetle. Carabus orientalis crassus.

Oo 5

Sloane

\*) Nach Sulzers Gesch. S. 57. das Weibchen von B. *rimaculata* No. 16.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Fabric. hat hieraus zwei besondere Arten gemacht.

*Sloane Hist. of Jam.* Tom. II. p. 110. t. 236. f. 8.  
*Cantharis major*; *capite et thorace cavitatibus donatis*;  
*elytris laevibus.*

b. *Chrysis*, der *Goldglanz*.

*Fabric.* S. E. p. 218. No. 13.

*Elytris ferrato-tridentatis, castaneis; sternuo-conico porrecto.*

*Simillimus Sternicorni*; *dissert tamen elytris totis castaneis, immaculatis, laevibus. Subtus viridivarea, immaculata.*

6. *Mariana*, der *maryländische Prachtkäfer*.

*Müller l. c. S. 336. No. 6. der Maryländer.*

*Onomat. hist. nat. P. 2. p. 354. der braune Stinkkäfer mit Goldflecken.\*)*

*Petiv. Gaz. t. 2. f. 2.*

*Fabric. S. E. p. 219. No. 15.*

*Schaeff. Icon. t. 49. f. 1. (all. Fabric.)*

*de Geer Ins. Tom. IV. p. 128. No. 1. t. 4. f. 18. Bupreste mariane.*

B. nitida, supra fusco-aenea, subtus rubro-cuprea;  
*elytris rugosis postice dehiscentibus.*

7. *Chrysostigma*, der *Goldpunkt*.

*Müller l. c. S. 336. No. 7.*

*Füesslins*

\*) In der *Onom. hist. nat. l. c.* ist dieser mit dem folgenden No. 7. *Chrysostigma* verwechselt, und zu diesem, die vom *Linn.* zu dem *Chrysost.* gesetzte Beschreibung aus dessen *Faun. Suec.* ed. 1. No. 556. gesetzt, und zugleich *Petiv.* citirt worden; aber aus der in der *Faun. Su.* ed. 1. No. 557. befindlichen, und vom *Linné* selbst diesem B. *marijan.* beygefügten Beschreibung, hat man p. 355. einen besondern gemacht, und den *aschfarbigen, graubeglänzenden Stinkkäfer* genennet.

Füesslins Verz. S. 17. No. 341. der Goldpunkt.

Schaeff. Elem. t. 31. f. 1. 2.

Fabric. S. E. p. 219. No. 18.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 125. *Cucujus* 1. Le Richard à fossettes.

Aureus; *elytrorum* fossulis quatuor impressis nitentibus.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 129. No. 3. *Bupreste* à points dorés.

B. fusca; *elytris* singulis maculis tribus rubro-aureis impressis; *abdomine* subtus viridi-aureo; *margine* purpureo nitido.

### 8. *Rustica*, der Bauer.

Müller l. c. S. 337. No. 8.

Füesslins Verz. S. 17. No. 342.

Lepachins Tageb. I. S. 232. der Baurenstinkkäfer.

Schaeff. Icon. t. 2. f. 1.

Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 354. der grüne Stinkkäfer.

Act. Vpsal. 1736. pag. 19. No. 4. *Cicindela* aenea; *elytris* striatis.

Fabric. S. E. p. 221. No. 28.

*Elytris* emarginatis, striatis, obscure aeneis.

Poda Mus. graec. p. 43. *Bupr.* I.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 126. *Cucujus* 3. t. 2. f. 2. Le Richard doré à stries.

Viridi-auratus, oblongus; *thorace* punctato; *elytris* striatis.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 130. No. 4. t. 4. f. 10. *Bupreste* azuré.

B. (*violacea*), viridi-aenea, seu coeruleo-nitida; *elytris* striatis.

## III. ELYTRIS INTEGRIS.

*Mit Deckshilden, deren Rand rings umher  
glatt ist.*

9. *Austriaca*, der österreichische Prachtkäfer.\*)

Müller l. c. S. 337. No. 9. der Oesterreicher.

Fabric. S. E. p. 221. No. 26.

*Elytris integris, sulcatis, aeneis, capite thorace-  
gue viridibus.*

Scop. Ent. carn. No. 187. MORDELLA gigantea.

10. *Aurulentus*, der karolinische Goldrand.\*\*)

Müller l. c. S. 337. No. 10. der Goldrand.

11. *Tenebrionis*, der schwarze mehlkäferähnliche  
Prachtkäfer.

Müller l. c. S. 338. No. 11. der Schwarze.

Sulzer's Gesch. S. 57. t. 6. f. 16. der Schwarze.

Fabric. S. E. p. 221. No. 29.

*Atra, elytris integris, truncatis; thorace variolo-  
so, dilatato.*

12. *Fascicularis*, der kapensische Bürstenschild.

Müller l. c. S. 338. No. 12. t. 7. f. 2. der Bürstenschild.

Fabric. S. E. p. 220. No. 24.

13. *Hirta*, der kapensische Rauhrücken.†)

Müller l. c. S. 338. No. 13. der Rauhrücken.

Fabric. S. E. p. 221. No. 25.

14. *Rubi*,

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

14. *Rubi*, der *Brombeer-Prachtkäfer*.\*)

Müller l. c. S. 339. No. 14.

Fabric. S. E. p. 221. No. 30.

15. *Nitidula*, der *Glanzschild*.

Müller l. c. S. 339. No. 15.

Füesslins Verz. S. 17. No. 343:

Schaeff. Icon. t. 50. f. 7.

Müller i Faun. Fridr. p. 18. No. 180.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 526.

16. *Bimaculata*, der *ostindianische Doppelspiegel*.

Müller l. c. S. 339. No. 16. t. 7. f. 3. der *Doppel-spiegel*.

Sulzers Gesch. S. 57. t. 6. f. 15. das *Männchen* zu

B. *ignita* No. 3.

Fabric. S. E. p. 222. No. 31.

17. *9-maculata*, der *afrikanische Neunfleck*.

Müller l. c. S. 339. No. 17. der *Gelbfleck*.

Sulzers Gesch. S. 57. t. 6. f. 17. *Gelbfleck*.

Fabric. S. E. p. 223. No. 44.

*Elytris integerrimis*, *nigris*; *maculis* *tribus* *flavis*.

18. *Trifinis*, der *indianische Prachtkäfer*, mit *zehn-punktiertem Bauche*.\*\*)

Müller l. c. S. 340. No. 18. der *Schmutzschild*.

Fabric. S. E. p. 222. No. 32.

19. *Aenea*, der *kupferfarbige Prachtkäfer mit grünen narbigen Punkten auf den Flügeldecken*.†)

Müller l. c. S. 340. No. 19. das *Messing**schild*.

20. *Cuprea*,

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

20. *Cuprea*, der *indianische kupferfarbige Pracht-käfer.* \*)

Müller l. c. S. 340. No. 20. das *Kupferschild.*

Fabric. S. E. p. 222. No. 33.

Scop. Entom. carn. No. 191. *MORDELLA cuprea.*

Pod. Mus. graec. p. 43.

21. *Nobilis*, der *indianische Edelmann.* \*\*)

Müller l. c. S. 340. No. 21. der *Junker.*

Fabric. S. E. p. 222. No. 34.

22. *4-punctata*, der *Vierpunkt.* †)

Müller l. c. S. 340. No. 22. der *Brustpunkt.*

Füesslins Verz. S. 17. No. 344. *Brustpunkt.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 356. der *schwarzbraune Stinkkäfer.*

Fabric. S. E. p. 222. No. 35.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 527.

Atra; *thorace punctis quatuor transversim impressis.*

de Geer Ins. Tom. IV. pag. 134. No. 8. *Bupreste à points enfoncés.*

B. subviridi - nigra; *thorace punctis quatuor impressis.*

23. *Minuta*, der *kleine erzfarbige Glattschild.* ††)

Müller l. c. S. 341. No. 23. das *Miniaturschild.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 528.

*Minuta?* nigro - aenea; *thorace subtrilobo; elytris fasciis vndulatis, villoso-argenteis.*

24. *Minuta,*

\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

24. *Minuta (ovato-nigra)*; der kleine schwarze Eysförmige.\*).

Müller l. c. S. 341. No. 24. *Contrabilis*, das Ey.

25. *Viridis*, der grüne Birkenprachtkäfer.

Müller l. c. S. 341. No. 25. der grüne Birkennager.

Füesslins Verz. S. 17. No. 345. der Grünling.

Schaeff. Icon. t. 67. f. 9.

Fabric. S. E. p. 223. No. 39.

Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 181.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 529.

Aeneo-virescens; *elytris linearibus, corpore elongato.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 127. *Cucujus* 5. Le Richard vert allongé.

Viridi-cupreus, laevis oblongus.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 133. No. 6. t. 5. f. 1. *Bupreste verd allongé.*

B. viridis nitida; *corpore elongato; elytris linearibus scabris integerrimis.*

26. *Atra*, der Schrebersche schwarze Prachtkäfer.\*\*)

Müller l. c. S. 341. No. 26. der schwarze Birkennager.

Fabric. S. E. p. 223. No. 40.

27. *Festiva*, der afrikanische Staatsprachtkäfer.†)

Müller l. c. S. 342. No. 27. die Braut.

Fabric. S. E. p. 223. No. 41.

28. *Linea-*

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

† ) Nicht abgebildet.

28. *Linearis*, der sehr schmale amerikanische Pracht-käfer.

*Müller* l. c. S. 342. No. 28. die *Parallele*.

*de Geer* Ins. Tom. IV. p. 137. exot. No. 3. t. 17. f. 26.  
*Bupreste noir allongé*.

*B. linearis oblonga*, nigro-aenea, cinereo-maculata;  
*elytris carinatis*; *thorace rugoso*, postice trilobo.

29. *Granularis*, das *Körnchen*.\*)

*Müller* l. c. S. 342. No. 29. das *Kleinkorn*.

*Onomat. hist. nat. P. 2. p. 356.* der *dunkelkupferfarbige Stinkkäfer*.

### *Unabgebildete Pracht-käfer.*

#### II. Klasse.

1. No. 4. *Stricta*.

#### III. Klasse.

1. No. 9. *Austriaca*.
2. No. 10. *Aurulentus*.
3. No. 13. *Hirta*.
4. No. 14. *Rubi*.
5. No. 18. *Trifinis*.
6. No. 19. *Aenea*.
7. No. 20. *Cuprea*.
8. No. 21. *Nobilis*.
9. No. 22. *4-punctata*.
10. No. 23. *Minuta*.
11. No. 24. *Minuta* (ovato-nigra).
12. No. 26. *Atra*.
13. No. 27. *Festiva*.
14. No. 29. *Granularis*.

NEUE

\*) Nicht abgebildet.

## NEUE PRACHTKÄFERARTEN.

## I. Mit hinten zugespitzten Flügeldecken.

1. *Manca*, der portugiesische halbverguldete Pracht-käfer.

Linn. Add. p. 1067. No. 10. *Aurata*; *thoracis lineis duabus elytrisque fuscis.*

Müllers Suppl. B. S. 247. 2. a. *Aurata*, der Goldbauch.

2. *Vnidentata*, der Bankische Einzahn.

Fabric. S. E. p. 216. No. 1.

*Elytris vnidentatis aeneis; margine aureo.*

3. *Vittata*, die indianische Goldbinde.

Fabric. S. E. p. 216. No. 3.

*Elytris bidentatis, punctatis; lineis elevatis quatuor, viridi-aeneis, vitta lata, aurea.*

4. *Fastuosa*, die amerikanische Goldnaht.

Fabric. S. E. p. 216. No. 4.

*Elytris truncatis, bidentatis, variolosis, viridibus; futura aurea.*

5. *Punctatissima*, der afrikanische Vielpunkt.

Fabric. S. E. p. 217. No. 5.

*Elytris bidentatis, cupreis; punctis violaceis numerosis.*

6. *Decora*, der americanische zierliche Prachtkäfer.

Fabric. S. E. p. 217. No. 6.

*Elytris truncatis, bidentatis, viridibus; vitta coerulecente; marginibusque aureis.*

7. *Lurida*, der amerikanische Schwarzgelbe.

*Fabric.* S. E. p. 217. No. 7.

*Elytris bidentatis, obscura; ano tridentato.*

8. *Striata*, der pensylvanische gestrichete Pracht-käfer.

*Fabric.* S. E. p. 217. No. 8.

*Elytris truncatis, subbidentatis, cupreis; lineis elevatis quatuor.*

9. *Lineata*, der amerikanische lineirte Pracht-käfer.

*Fabric.* S. E. p. 217. No. 10.

*Elytris truncatis, subtridentatis, nigro-aeneis; vittis duabus ferrugineis.*

10. *Ocellata*, der indianische Augenspiegel.

*Fabric.* S. E. p. 218. No. 11.

*Viridi-nitens; elytris tridentatis; maculis duabus aureis, ocellarique flava.*

11. *Bicolor*, der amerikanische Zweyfarbige.

*Fabric.* S. E. App. p. 825. 1-2.

*Elytris acuminatis, viridi-aeneis; maculis flava; pedore abdomineque flavis.*

12. *Varicornis*, das Scheckhorn.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 530.*

*Nigricans, villosus; thorace vtrinque lobato; elytris acutis.*

13. *Acuminata*, der Spitzflügel.

*de Geer Inf. Tom. IV. pag. 133. No. 7. Bupreste à etuis pointus.*

*B. (acuminata) nigris; elytris punctatis pone acuminatis; thorace laevi.*

II. Mit Deckshilden, die an der Spitze gezähnelt sind.

1. *Depressus*, der americanische Plattschild.

Linn. Mant. p. 533.

*Elytris* subferratis, aeneo-ferrugineis, nervoso-punctatis; *thorace depresso*.

Sloan hist. p. 206. t. 237. f. 9.

*Scarabaeus minor e viridi nigricans, alarum vaginis striatis.*

Müllers Suppl. B. S. 247. 8. a. der gedruckte Stinkkäfer.

2. *Splendida*, Schröters surinamischer Prachtkäfer.

Schröters Abhandl. über verschiedene Gegenst. der N. G. I. p. 335. t. 2. f. 3.

Subtus totus aureo-viridis; *elytris* castaneis fusco-testaceis, nitidis, apice subferratis. Pedum femora nitide-coerulea, crura tarsiique testacea.

3. *Depressa*, der morgenländische Forstkählische platte Prachtkäfer.

Fabric. S. E. p. 219. No. 14.

*Elytris* ferratis, sulcatis, *corpore depresso*, obscuro.

4. *Farinosa*, der neuholändische bestäubte Prachtkäfer.

Fabric. S. E. p. 219. No. 16.

*Elytris* ferratis, viridibus, sulco abbreviato suturali impresso; *corpus* aeneum, *polline ferrugineo* adspersum.

5. *Porcata*, der Forstkählische morgenländische gefurchte Prachtkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 219. No. 17.

*Elytris ferratis, porcatis; thorace angulato; corpore fusco, nitido.*

6. *Impressa*, der *indianische Dreypunkt*.

*Fabric.* S. E. p. 220. N. 19.

*Elytris ferratis aeneis; punctis tribus impressis.*

7. *Ornata*, der *pensilvanische Weißfleck*.

*Fabric.* S. E. p. 220. No. 20.

*Elytris ferratis, obscuris, albo maculatis.*

8. *Cylindrica*, der *Forskählische morgenländische Walzenprachtkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 220. No. 21.

*Elytris ferratis, striatis; corpore cylindrico, nigro.*

9. *Variegata*, der *russische Schwarz- und weiße-schekte Prachtkäfer*.

*Lepechinus* Tageb. I. p. 232. t. 17. f. 7.

*Atra; thorace albo - et nigro variegata.*

10. *Serraticornis*, das *Sägehorn*.

*Scop.* Entom. carn. No. 189. *M O R T E L L A serraticornis*; tota punctata, supra punctis prominulis; corpore cylindraceo colore metallico; elytris apice serrulatis.

11. *Cupreo-maculatus*, der *Drury'sche virginische Kupferfleck*.

*Drury* Ins. Tom. I. p. 66. t. 30. f. 3.

*Thorace lato, fusco-cupreo punctato; elytris ferratis atris, cupreo-maculatis, futura metallica.*

12. *Flavo-punctata*, der Gelbpunkt.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 129. No. 2. *Bupreste à taches jaunes.*

Nigra; thorace margine flavo; elytris punctis ab domineque subtus maculis flavis quadruplici ordine.

III. Mit Decksschilden, deren Rand rings herum glatt ist.

1. *Scabra*, der *indianische hökrichte Prachtkäfer*.

Fabric. S. E. p. 220. No. 22.

*Elytris integris; fronte sulcato; corpore scabro, aureo.*

2. *Splendens*, der *chinesische Goldrand*.

Fabric. S. E. p. 221. No. 27.

*Elytris integris, viridibus; margine omni aureo, lineisque tribus elevatis.*

3. *Cruciata*, der *neuholländische Prachtkäfer mit dem schwarzen Kreuz*.

Fabric. S. E. p. 222. No. 36.

*Elytris integerimis, aureis, punctis duobus, cruciisque postica nigris.*

4. *Biftriata*, der *parisische Zweystrich*.

Fabric. S. E. p. 222. No. 37.

*Elytris integris, obscuris; thorace aureo; striis duabus nigris.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 127. *Cucujus* 4. t. 2. f. 3.  
Le Richard rubis.

*Cucujus aeneus; elytris fuscis, thorace rubro; fasciis fuscis.*

5. *Laeta*, der *hallische hellgrüne Prachtkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 223. No. 42. *Elytris integris, linearibus, viridibus; capite thoraceque aureis.*

6. *Cyanea*, der *hallische hellblaue Prachtkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 223. No. 43.

*Elytris integerrimis, rugosis; corpore cyaneo.*

7. *Fuliginosa*, der *englische rostfarbige haarichte Prachtkäfer*.

*Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 51. No. 51.*

*Elytris integerrimis, sublinearibus, glabris, pilosis; thorace deflexo; corpore fuliginozo.*

8. *Marginata*, der *dänische Gelbrand*.

*Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 182.*

*Elytris integerrimis nigris; margine flavo.*

9. *Nigra*, der *dänische Mohr*.

*Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 183.*

*Thorace elytrisque nigris; abdomine subtus tenuitoſo-albo.*

10. *Rosacea*, der *Skopolische Blumenprachtkäfer*.

*Scop. Entom. carn. No. 190. MORDELLA rosacea; thorax pone marginatus; elytra marginata, apice rotundata. Abdomen supra aeneo-fuscum.*

11. *Hungarica*, der *ungarische Prachtkäfer*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 104. No. 85.*

*Mordella viridissima, subtus, fronte et thoracis lateribus aurato-rubris.*

12. *Nebu-*

12. *Nebulosa*, der *neblichte ungarische Prachtkäfer*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 104. No. 86.*

*Supra nigra; subitus albicans; elytra albidis tenuissimis striis et punctulis nebulosa.*

13. *Pygmaea*, der *surinamische Zwerp*.

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 137. exot. No. 4. t. 17. f. 27.*

*Bupreste nain.*

*Nigra, nitida; elytris coeruleo-violaceis nitidissimis.*

14. *Variolaris*, der *inderiensische Warzenschild*.

*Pallas Reis. I. Ausz. App. No. 9.*

*Totus nigro-aeneus; thorax scaberrimus.*

*Müllers S. B. S. 248. t. 30. a. der Warzenstinker.*

15. *Tatarica*, der *tatarische Prachtkäfer*.

*Pallas Reis. I. Ausz. App. No. 10.*

*Magnitudo B V P R. marianae, sed brevior, crassifior et obtusior congenibus omnibus. Subitus aeneus; supra nigrior.*

*Müllers S. B. S. 248. t. 31. der tatarische Stinkkäfer.*

16. *Aurata*, der *Goldrücken*.

*Pallas Reis. II. App. No. 45.*

*Magnitudo B. ignitae, sed latior. Corpus viridi auratum, nitidissimum. Elytra obtusa, integerrima, decem striata, cupreo-viridula.*

*Müllers S. B. S. 249. t. 32. der Goldrücken.*

17. *Picta*, der *gemahlte Prachtkäfer*.

*Pallas Reis. II. App. No. 46.*

*B. octoguttatae subaequalis, sed latior. Corpus atque thorax nitidula, aenea. Elytra violaceo-nigra, maculis symmetricis flavescensibus picta.*

*Müllers S. B. S. 249. t. 33. das Mahlerschild.*

212. GESCHLECHT. *Dytiscus*; *Wasserkäfer*;  
*Tauchkäfer*.\*).

Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 343. *Wasserkäfer*;  
holl. Water-Torren.

Von andern *Hydrophili*; *Dytici*; *Gyrini*.

Eberhard's Thiergesch. S. 193. *Dyticus*; *Schwimmkäfer*. S. 195. *Hydrophilus*, *Wasserkäfer*.

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 99. gen. 20.  
der *Wasserkäfer*, *Dytiscus*.

Hanous Seltenh. der N. I. S. 646. von den *Wasserkäfern*. p. 352.

Derhams phys. Theol. S. 591.

Lessers Theol. der Inf. S. 70. o. *Wasserkäfer*; *Hydrocanthari*.

Wochenblatt für Kinder. VI. p. 16.

Pontopp. N. G. v. D. pag. 209. gen. 16. *Dytiscus*;  
*Vand-Kalve*; *Wasserkäfer*.

Börners

\*) Von diesem Geschlecht giebt es vielerley Arten, darunter der Herr Staatsr. Müller Zool. Dan. Prodr. p. 69. sq. sehr viele *neue* entdecker hat. Ihre Naturgeschichte ist bekannt. Wir wollen nur dreyerley bemerken:

1. Das *Falsche*: dass die *Larven* dieser Käfer die *Füsse auf dem Rücken* haben sollen (*Onomat. hist. nat.* pag. 671. Börners Samml. I. pag. 476.), welches aber Lyon. sur Lesser Tom. II. p. 54. 55. gründlich widerlegt hat. S. *Neue Berlin. Mannigf.* 4. Jahrg. 166. Woche p. 145.

2. Das *Zweifelhafte*: ob nur die *Männchen* an den Vorderfüßen die *Kniescheiben* mit den Kläbebläschen zum Ansaugen auf dem glatten Rücken des Weibchens haben, da der Herr Staatsrath Müller viele Männchen auch *ohne* dieselben gefunden hat. S. *Naturforscher 7. St.* p. 99. *Zool. Dan. Prodr.* p. 70. 71.

3. Das *Besondere* in der Struktur ihrer *Kniescheiben*: *Neue Berlin. Mannigf.* 1. Jahrg. S. 81. ff. und *Gefünnste*, oder *Verwandlungshülsen*. S. Lyonet sur Lesser Tom. I. p. 300. *Neue Berlin. Mannigf.* 3. Jahrg. p. 729.

Börners Samml. I. S. 476. *Wasserkäfer*; *Dytiscus*.  
Frisch Inf. II. S. 26. ff.

Füesslins Verzeichn. schweiz. Inf. S. 17. *Dytiscus*;  
*Tauchkäfer*.

Sulzers Kennz. S. 72. *Wasserkäfer*.

— — Gesch. S. 58. *Tauchkäfer*.

Olaffs Reise d. Isl. I. p. 319. d. *Brunkluka*; *Dytiscus*.  
Bresl. Samml. ann. 1719. Novemb. Cl. IV. Art. IX.  
p. 593. *Wasser- oder Fischkäfer*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 668. *Dytiscus*; *Hydrocanthus*; *Scarabaeus aquaticus*; *Wasserkäfer*.

Catholicon D. p. 416. *Dytiscus*; *Wasserkäfer*.

Commentar. Lips. Dec. I. Vol. V. p. 607.

Fabric. S. E. p. 228. *Hydrophilus*. p. 230. *Dytiscus*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 215.

Scop. Entom. carn. p. 96.

Müller Faun. Fridr. p. 18.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 68. seq. *Hydrophilus*;  
*Dytiscus*.

Swammerd. B. d. N. p. 120. 136. *Hydrocanthari*.

Ionst. hist. Inf. p. 100. *Hydrocanthari*; *Scarabaei aquatici*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 180. *Hydrophilus*. L'Hydrophile. p. 185. *Dyticus*; le *Ditique*.

de Geer Inf. Tom. IV. préf. VIII. No. 51. 52. p. 365.  
des *Hydropiles*. p. 381. des *Ditisques*.

Brünnichii Entom. p. 56. Dan. *Vandkalv*.

### I. Mit durchblätterten Fühlhörnern.

1. *Piceus*, der große schwarze *Tauchkäfer*.\*)

Müller loc. cit. S. 344. No. 1. t. 7. f. 4. der große  
Schwimmer.

Pp. 5

Füess-

\*) Wenn man diese Käfer in etwas tiefe mit Wasser gefüllte Gefäße setzt, und ihnen Mehl giebt, kann man sie lange erhalten.

Sobald

Füeßlins Verz. S. 17. No. 346. der *Pechschwarze*.

Frisch Inf. 2. Th. S. 26. t. 6. der *große ganz schwarze Wässerkäfer*.

Sulzers Gesch. S. 58. t. 6. f. 18. der *große Schwimmer*.

Schaeff. Elem. t. 71. *Hydrophilus*.

— — Icon. t. 33. f. 1. 2.

Lyonet Notes sur la Theol. des Inf. de Lesser. T. I. p. 158. t. 12. 13. 15. Tom. II. p. 55. 56. 57.

*Neue berlin. Mannigf.* 3. Jahrgang. S. 129. 4. Jahrg. p. 145. ff.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. pag. 699. der *große ganz schwarze Wässerkäfer*.

Gronov. Mus. 2. p. 164. No. 549.

Petiv. Gazoph. t. 74. f. 11. *Hydrocantharus maximus striatus*.

Fabric. S. E. p. 228. *Hydroph. 1.*

Niger; *sterno canaliculato, postice spinoso*.

Müller's Faun. Fridr. p. 19. No. 184.

*Antennis perfoliatis; corpore piceo laevi acuminato*.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 653. HYDROPHILVS *piceus*.

Niger; *antennis fuscis. Store-Vand-Torbist*.

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 182. *Hydroph. 1. t. 3. f. 1.*

*Le grand Hydrophile.*

Niger; *elytris fulcatis; antennis fuscis*.

de Geer Inf. T. IV. p. 371. *Hydroph. 1. t. 14. f. 1. 2.*

*Hydrophile à antennes rousses.*

HYDROPHILVS (*ruficornis*), niger, *capitulo antennarum rufo; elytris laevibus; abdomine postice acuminato*.

## 2. Cara-

Sobald es Abend wird, fliegen sie heraus, und geben im Fluge einen so tiefen Ton, dass man glaubt, in der Ferne ein Orgelwerk zu hören.

2. Caraboides, der laufkäferartige Wässerkäfer.

Müller l. c. S. 346. No. 2. der kleine Schwimmer.

Füesslins Verz. S. 17. No. 347. der Laufkäferartige.

Frisch Inf. 13. Th. pag. 24. No. 25. 3. Pl. t. 21. der glänzende schwarze Wässerkäfer der mittlern Größe.

Röselfs Infektenbel. II. B. Wasserinf. I. Kl. S. 25. t. 4.

f. 1. 2. der schwarze Wässerkäfer von mittlerer Größe.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 678. der schwarze Wässerkäfer mit einer runderhabenen Oberfläche.

Schaeff. Icon. t. 53. f. 10.

Fabric. S. E. p. 228. *Hydrophilus* 2.

Niger, nitidus; *elytris* substriatis.

Raj. Inf. 95. No. 7. *Hydrocantharis aquaticus*, niger, subrotundus.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 183. *Hydroph.* 2. *L'Hydrophile noir picoté*.

Niger; *elytrorum* punctis per strias digestis; *antennis* nigris.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 376. *Hydroph.* 2. *Hydrophile à antennes noires*.

H. (*Nigricornis*) niger; *capitulo antennarum* nigro; *elytris* laevibus; *abdomine* postice rotundato.

Müller's Faun. Fridr. p. 19. No. 185.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 68. *Hydroph.* No. 654.

Niger, nitidus; *antennarum* caule luteo.

3. Scarabaeoides, der kolbenkäferartige Wässerkäfer. \*)

Müller l. c. S. 346. No. 3. der Segler.

Füesslins

\*) Bey uns selten, sagt Füesslin; also hat er ihn nicht als eine Varietät des vorigen angesehen. Mithin kann es auch nicht noch einmal eben derselbe Röselfsche seyn, den Linné bey diesem und dem vorigen angeführt hat.

Nicht abgebildet.

Füeßlins Verz. S. 18. No. 348. der Kolbenkäferartige.

*Fabric.* S. E. p. 228. *Hydroph.* 4.

Niger; *elytris striatis; pedibus piceis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 85. No. 26. *Le Scarabé noir des marais.*

*SCARABAEVS piceus.*

#### 4. *Fuscipes*, der Braunfuß.

*Müller* l. c. p. 346. No. 4. der *Taucher.*

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 688. der *Wasserläufer mit dunkeln Füßen.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 655. *Hydroph.*  
*Variat totus niger, palpis et tarsis fuscis.*

*Schaeff.* Icon. t. 8. f. 10.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 184. *Hydroph.* 4. *L'Hydrophile noir strié.*

Niger; *elytris striatis; pedibus fuscis.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 377. *Hydroph.* 3. *Hydrophile à pattes brunes.*

Niger; *capitulo antennarum nigro; elytris striatis;*  
*pedibus fusco-castaneis.*

#### 5. *Luridus*, der grüngelbe Tauchkäfer.

*Müller* l. c. S. 347. No. 5. die *Nymphe.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 656.

*HYDROPHILVS lividus; capite aeneo; thorace*  
*vtrinque flavo; elytris striatim punctatis; maculis,*  
*abdomineque nigris.*

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 52. No. 52.

*DYTISCUS lividus; antennis perfoliatis; capite,*  
*thorace, elytris et pedibus lividis; ventre nigro.*

*Fabric.* S. E. p. 229. *Hydrophilus 7.*

*Elytris striatis; corpore cinereo-fusco.*

*Geoffr.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 184. Hydroph. 5. L'Hydrophile fauve.\*)*

*Hydrophilus fulvus.*

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 378. Hydroph. 4. t. 15. f. 1. 2. Hydrophile brun.*

*HYDROPHILUS fuscus; corpore convexo supra fusco, subtus nigro; capitulo antennarum oblongo; elytris striatis.*

## II. Mit borstenförmigen Fühlhörnern.

6. *Latissimus*, der breiteste Wasserkäfer.

*Müller l. c. S. 347. No. 6. der Breitflügel.*

*Fließlins Verz. S. 18. No. 350. der Breitschild.*

*Frisch Inf. II. p. 33. No. 8. t. 7. f. 1. 2. der große schwarze Wasserkäfer mit dem gelben Saum.*

*Sulzers Gesch. S. 59. t. 6. f. 19. der Breitflügel.*

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 689. der große Wasserkäfer mit dem gelben Saum.*

*Akt. Vpsal. 1736. p. 14. No. 1. *Dytiscus maximus*; elytris margine prominentibus.*

*Fabric. S. E. p. 230. *Dytiscus* 1.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 661. *DYTICVS latissimus niger, marginibus luteis; elytris dilatatis, glabris.**

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 390. *Dytiscus* 1. *Grand Ditisque large.**

*D. Nigro-fuscus; thorace margine flavo; elytrorum marginibus dilatatis, linea transversa flava.*

7. *Marginalis*, der Gelbsaum.

*Müller l. c. S. 347. No. 7. t. 7. f. 5. 6. 7. der Gelbsaum.*

*Fließlins*

\* ) Dies ist Müllers *Obscurus* v. Zool. Dan. Prodr. No. 657. S. unter den neuen I. Kl. No. 9.

*Füesslins* Verz. S. 18. No. 351. a. der *Gelbsaum*. (das *Männchen des Semistr.*)

*Derhams* Phys. Theol. 8. B. 4. K. p. 915. No. 2.

*Lessers* Theol. der Inf. S. 273.

*Neue berlin. Mannigf.* 1. Jahrg. S. 81. ff. \*) f. 1. 2. 3.

*Röfels* Infektenbel. II. Wasserinf. I. Kl. pag. I. t. I. f. 9. II. der *Wasserwurm mit dem großen linsenförmigen Kopf*, und desselben wunderbare *Verwandlung* zum *Wasserkäfer*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 691. der *schwarze Wasserkäfer mit einem gelben Brustschild und Flügeldeckenrand*.

*Schaeff.* Icon. t. 8. f. 8.

*Raj.* Inf. p. 93. No. 1. *Hydrocantharus nostras*.

*Fabric.* S. E. p. 230. *Dytiscus 3.*

*Niger; thoracis marginibus omnibus; elytrorumque exteriori flavis.*

*Scop.* Entom. carn. No. 294. \*\*)

*Fuscus, feticornis; thorace luteo margine cincto; elytris margine exteriore flavis.*

*Poda* Mus. graec. p. 43.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 19. No. 186.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 663. †)

*Flavicans; supra nigro-virescens, marginibus thoracis omnibus, elytrorumque extimis flavis.*

*Geoffr.*

\*) Am angezogenen Orte ist aus Versehen *D. latissimus* gesetzt worden. Eigentlich aber ist es dieser *marginalis*, dessen Knie-scheibe daselbst beschrieben ist.

\*\*) Der R. *Skopoli*, wie auch der Staatsrath *Müller* haben ihn am richtigsten beschrieben. Denn das *Niger* ohne Einschränkung passt gar nicht.

†) Letzterer sagt: *Hujus invidua patellis pedum primorum destituta et instruxta invenio; hinc D. semistriatus, quod volunt autores, vix femina marginalis est.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 186. Dyticus 2. Le Ditique noir à bordure.*

Niger, margine coleoptrorum; thoracisque flavo.  
de Geer Inf. Tom. IV. p. 391. *Dyt. 2. t. 16. f. 2. Mas*  
*Grand Ditisque à bordure complete.*\*)

D. (toto

\*) Die Patellen oder Kniescheiben der Männchen hat der Herr de Geer so wenig, als der sel. Rösel recht genau beobachtet; sonst würden ihnen die artigen gestielten birnförnigen Körperchen in der Höhlung des Schäffelkens nimmermehr verborgen geblieben seyn. Denn die sind es eben, die an ihren Stielen durch einen gleichen Druck niedergedrückt werden, und insgesamt mit ihren Fläschen oben eine gerade Fläche, wie ein nasses Leder, formiren, wodurch das Ansaugen an dem glatten Rücken des Weibchens, an den Fischen, und an andern Körpern im Wasser, ungemein befördert wird. S. Kleemanns Anm. zur neuen Ausgabe des Rössels bey der Beschreibung dieses Käfers. S. 8.

Noch eine besondere Merkwürdigkeit an diesen Käfern. Das zweyte Gelenke am zweyten Paar Füsse von Fußblatt an gerechnet, ist ebenfalls inwendig flachhohl, und mit unzähligen Klebebläschen angefüllt, die aber eine ganz andere Struktur, als die ersten haben. Eine Bemerkung, die ich dem genauen Beobachter, dem Herrn Leibarzt Wagler zu Braunschweig zu danken habe. Sie finden sich auch nur bey dem Männchen.

Beyde Organen verdienen eine nochmalige genauere Untersuchung und Abbildung. Man muss aber dazu keine aufgetrocknete, sondern im Weingeist conservirte Käfer nehmen, oder am besten lebendige, die leicht zu haben sind. Denn bey diesen zeigt sichs offenbar, dass die beyden strahlenförmigen Sonnen oder Muskeln, wie man sie nennen will, bey dem Anfange der Knieschneibe nicht rundlich erhaben, sondern wahre vertiefte hohle Schäffelchen sind. Durch die Lupe erscheinen die gestielten Kolben als vertiefte hohle Punkte, welches Rösseln betrogen hat. Schon die schwächste Linse des Kompositi zeigt ihre wahre Gestalt.

D. (*toto marginalis*), nigro-fuscus nitidus; thorace vndique elytrorumque margine flavis; elytris feminae (*semistr.*) sulcatis.

8. *Semistriatus*, der halbgestreifte Wasserläufer.

Müller l. c. S. 347. No. 8. der Halbstreich.

Füesslins Verz. S. 18. No. 352. b.\*)

Rössels II. B. Wasserins. I. Kl. t. I. f. 10.

Frisch Inf. II. p. 35. t. 7. f. 4. \*\*)

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 704. der halbgestreifte Wasserläufer.

Schaeff. Icon. t. 8. f. 7.

Müller Faun. Fridr. p. 19. No. 188.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 665. †)

*Flavi-*

\*) Unstreitig, sagt Herr F. das Weibchen des *marginalis*, indem ich sie fast immer mit einander gesehen habe.

\*\*) Obgleich Linné, Füesslin und Fabric. hierbey obiges Citatum des Frisch angeführt haben; so hat doch der Herr Staatsrath Müller daraus eine eigene Art gemacht. S. Zool. Dan. Prodr. No. 666. D. *semisulcatus*. S. unter den neuen 2. Kl. No. 21.

†) Von diesem sowohl, als dem *semisulcato* heißt es daselbst: pedes primores absque patellis reperi.

Ein *Semistriatus* hatte in meinem Kasten über drey Jahr gelegen. Im Jänner dieses Jahrs bey ziemlicher Kälte sahe ich einmal nach, und fand hin und wieder Staubhäufchen unter einigen Mistkäfern und Silphen, welches gemeinlich eine Anzeige ist, dass ein Dermestes oder Ptinus darinn logirt. Bey genauerer Nachsicht fand ich, dass dieser Semistr. ganz weiss, wie mit Schimmel, überzogen war, und die Staubhäufchen von ihm herrührten. Unter der Lupe regten sich die letztern, und bestanden aus einem Gewühle von *Acaris Dysent.* Linn. womit auch der ganze Käfer bedeckt war. Also eine neue Art von Insektenfeinden der Kabinete. Diese Milben sollen auch sehr gut skeletiren.

*Flavicans*; supra niger; marginibus thoracis omnibus; elytrorumque extimo flavis; fulcis (*striis*) viginti dimidiatis.

Fabric. S. E. p. 231. *Dytiscus* 5.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 187. *Dit.* 3. t. 3. f. 2. Le *Disque demi-silloné*.

*Elytris* striis viginti dimidiatis.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 391. *Dyt.* 2. t. 16. f. 1. *Femina.*

9. *Striatus*, der *Queerstrich*.

Müller l. c. S. 348. No. 9.

Fabric. S. E. p. 231. *Dytiscus* 7.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 773.

Ater; elytris gilvis, transversim striatis; *margine* flavo.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 399. *Dyt.* 5. t. 15. f. 16. *Disque à stries transverses.*

D. (*transverse striatus*) supra nigro-fuscus, subitus niger; elytris transverse subtilissime striatis.

10. *Fuscus*, der *Braune*.\*)

Müller l. c. S. 348. No. 10. die *Brunette*.

11. *Cinereus*, der *Ashgrau*.

Müller l. c. S. 348. No. 11. t. 7. f. 8. 9. der *Gelbfleck*.

Füsslins Verz. S. 18. No. 352. a. (das *Männchen* von D. *fulcatus* No. 13.)

Rössels H. B. Wasserinf. 1. Kl. p. 17. t. 3. f. 6. 8. der kleinere *Wasserwurm mit dem langen Hals, und seine Verwandlung zum Wasserläufer*. (das *Männchen*.)

*Onomat.*

\*) Nicht abgebildet.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 683. der *afchgraue Wässerkäfer mit einem gelben Flügeldeckenrand, und einem gelben Queerfleck auf dem Brustschild.*

Schaeff. Icon. t. 90. f. 7. *Mas.*

*Act. Nidr.* IV. 25. t. 16 f. II.

Fabric. S. E. p. 231. *Dytiscus* 9.

Müller Faun. Fridr. p. 19. No. 187.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 667.

Nigricans; *thoracis* medio; *margineque omni; elytrorumque extimo flavis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 188. *Dit. 4. Le Ditique à corcelet à bandes.*

Cinereus; *margine coleoptrorum flavo; thoracis medietate flava.*

de Geer Inf. Tom. IV. p. 397. *Dit. 4. Ditisque à corcelet à bandes.*

D. (*fasciatus*); *elytris fuscis; thorace fulvo: fasciis duabus transversis nigris latere connatis; abdomine subtus fulvo lineis nigris.*

12. *Sticticus*, der *afrikanische punktirte Wässerkäfer.* \*)

Müller l. c. S. 348. No. 12. das *Merkmal.*

Fabric. S. E. p. 232. *Dytiscus* 10.

13. *Sulcatus*, der *gefurchte Wässerkäfer.*

Müller l. c. S. 348. No. 13. das *Rippenschild.*

Füeßlins Verz. S. 18. No. 352. b. (das *Weibchen von No. 11.-cinereus.*)

Frisch Inf. XIII. p. 13. t. 7. eine *Mittelart gelbsäumter Wässerkäfer.*

Röfels II. B. Wasserinf. I. Kl. t. 3. f. 7. (das *Weibchen des cinerei.*)

*Onomat.*

\*) Nicht abgebildet.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 705. der *gefurchte Wässerkäfer.*

Schaeff. Elem. t. 59. *Schwimmkäfer.*

— — Icon. t. 3. f. 3. (*Femina*).

Fabric. S. E. p. 231. *Dytiscus* 6.

Müller. Faun. Fridr. p. 19. No. 189.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 667.\*)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 189. *Dit.* 5. Le *Ditique sillonné.*

*Elytris sulcis decem longitudinalibus; thoracis medietate flava.*

de Geer Inf. Tom. IV. p. 397. No. 4.

#### 14. *Erythrocephalus*, der *Rothkopf.*\*\*)

Müller k. c. S. 349. No. 14.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 688. der *Wässerkäfer mit röthlichem Kopf und Füßen.*

Fabric. S. E. p. 233. *Dytiscus* 18.

Ovato-oblongus; capite pedibusque rufis.

Müller. Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 776.

Niger; capite pedibusque rufis. Variat margine elytrorum exteriore rufo, ac elytris pubescentibus.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 404. *Dit.* 12. *Ditisque à tête rouuse.*

#### Qq 2 15. *Macu-*

\*) Der Staatsrath Müller sagt daselbst: der unsterbliche Rösel habe den Streit entschieden, dass No. 11. *cinerous* das Männchen, zu No. 13. *sulcatus*, als dem Weibchen sey, und setzt hinzu: Quotquot ego elytris glabris vidi, patellis instruebantur, quos vero elytris sulcatis, absque patellis vidi sunt. Ein neuer Beweis, dass doch mehrentheils die Männchen aller Arten mit diesen sonderbaren Organen an den Vorderfüßen versehen sind.

\*\*) Nicht abgebildet.

15. *Maculatus*, der *Weißfleck*.\*)*Müller* l. c. S. 349. No. 15.*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 691.* der *gesleckte Waffer-käfer*.*Gronov. Mus. 2. No. 554.**Fabric. S. E. p. 233. Dytiscus 17.**Niger; thorace nigro; fascia pallida, elytris albo-nigroque variis.**Mülleri Faun. Fridr. p. 19. No. 192.**— — Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 775.**Flavicans; capite thoraceque postice; sriis maculisque elytrorum nigris.*16. *Ferrugineus*, der *Rostfarbige*.\*\*) )*Müller l. c. S. 349. No. 16.* der *Rostbuckel*.*Füeßlins Verz. S. 18. No. 353.* der *Rostfarbene*.17. *Bipustulatus*, die *Zweyblätter*.†)*Müller l. c. S. 349. No. 17.* der *Punktnacken*.*Fabric. S. E. p. 232. Dytiscus 12.**Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 672.**Ater; antennis palpisque ferrugineis. Variat pedibus totis piceis, punctisque binis ferrugineis in capite juxta thoracem; haec pluribus communia sunt.*18. *Ovatus*, der *Eyrunde*.*Müller l. c. S. 350. No. 18.* die *Rothbrüst*.*Füeßlins Verz. S. 18. No. 354.* der *Eyrunde*.*Fabric. S. E. p. 233. Dytiscus 22.**Caput et thorax picea, aut minus nigra. Subtus ferrugineus.**Geoffr.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 191. *Dyt. 10. Le Ditiqüs sphérique.* (alleg. Müller et de Geer.)

*Ovatus fuscus; capite thoraceque rubicundis.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 777.

*DYTISCVS grossus, subglobosus, rufus; oculis nigris.\*)*

de Geer Inf. T. IV. p. 402. *Dyt. 9. t. 15. f. 17. 18. 19.*

*Ditisque sphérique.*

*DYTISCVS (Sphaericus) rufo-fuscus, corpore ova-to gibbo.*

19. *Palustris, der Sumpf schwimmkäfer.\*\*)*

Müller l. c. S. 350. No. 19. der *Sumpfpatscher.*

Fabric. S. E. p. 233. *Dytiscus 21.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 19. No. 190.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 774.

20. *Vliginosus, der Rußrücken.†)*

Müller l. c. S. 350. No. 20.

Fließlins Verz. S. 18. No. 355.

Scop. Ent. carn. No. 296.

*Caput rufum; oculis et macula lunata postica nigri coloris, cavitate caput spectante. Elytrum fuscum, punctatum: margine exteriore ferrugineo. Nihilo major GYRINO natatore.*

Fabric. S. E. p. 232. *Dytiscus 15.*

Qq 3

Müller

\*) Hierbey frägt der Staatsr. M. An D. *ferrugineus, ovatus, minutus* Linn. ? *Variat elytris fuscis, nitidis, ac rufis, opacis.*

Bey dieser Gelegenheit merke ich an, dass in Müllers Prodr. von p. 70. nach No. 677. die folgenden Numern durch einen Druckfehler in ganz falscher Ordnung fortgehen, wodurch sich der Leser im Nachschlagen und Vergleichen nicht wolle irre machen lassen.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 19. No. 191.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 675.

Ater; antennis pedibus elytrorumque *margine extimo* flavo. *Variat* margine thoracis exteriore lutescente.

21. *Bimaculatus*, der französische Zweyfleck.\*)

*Müller* l. c. S. 350. No. 21. der Deckfleck.

22. *Granularis*, das Kornschwimmerchen.\*\*)

*Müller* l. c. S. 350. No. 22. das Kornschild.

*Fabric.* S. E. p. 234. *Dytiscus* 24.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 769.

23. *Minutus*, der kleine Schwimminkäfer.

*Müller* l. c. S. 351. No. 23. das Punktsschild.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 696. der gar kleine Was-  
serkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 234. *Dytiscus* 26.

Flavescent; *elytris* fuscis; *margine* flavo, macu-  
lato.

*Geoffr. Inf.* Tom. I. p. 191. *Dyt.* 12. (alleg. *de Geer.*)

*Le Ditique strié à corcelet jaune.*

Cinereus; *capite* nigro; *thorace* luteo; *elytris* ni-  
gro-maculatis, punctato-striatis.

*de Geer Inf.* Tom. IV. p. 404. *Dyt.* 18. t. 16. f. 9.

*Ditisque strié à corcelet roux.*

*DYTISCVS (ruficollis) rufus;* *elytris* striatis fla-  
vo-griseis, maculis nigris.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 787.

*D. Curculinus* flavicans; *thorace* punctato; *elytris*  
pallidis nigro-maculatis, striato-punctatis.

*Unab-*

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Unabgebildete Wässerkäfer.

I. Klasse.

1. No. 3. Scarabaeoides.

II. Klasse.

1. No. 10. *Fuscus.*
2. No. 12. *Sticticus.*
3. No. 14. *Erytrocephalus.*
4. No. 15. *Maculatus.*
5. No. 16. *Ferrugineus.*
6. No. 17. *Bipustulatus.*
7. No. 19. *Palustris.*
8. No. 20. *Vliginosus.*
9. No. 21. *Bimaculatus.*
10. No. 22. *Granularis.*

NEUE WÄSSERKÄFERARTEN.

I. Mit durchblätterten Fühlhörnern.

1. *Lateralis*, der amerikanische Gelbrand.

*Fabric.* S. E. p. 228. *Hydroph.* 3.

*Niger*, nitidus; *thoracis elytrorumque marginibus flavis.*

2. *Orbicularis*, der rundliche Wässerkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 229. *Hydroph.* 5.

*Subrotundus*; *corpo glabro*, atro.

3. *Collaris*, das amerikanische Halsband.

*Fabric.* S. E. p. 229. *Hydroph.* 6.

*Niger*, ore; *thoracis lateribus lineisque elytrorum ferrugineis.*

4. *Bipunctatus*, der *upsalische Zweypunkt*.*Fabric. S. E. p. 229. Hydroph. 9.**Thorace atro; margine griseo; elytris fuscis; puncto postico albido.*5. *Dermestoides*, der *speckkäferartige Wasserkäfer*.*Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 53. No. 53. Antennis perfoliatis; haemisphaerico-ovatus, luridus, capite thoraceque nigris. Habitat in Anglia inter Lemnam in aquis stagnantibus.\**)6. *Rufus*, der *braunrothe Wasserkäfer*.*Scop. Entom. carn. No. 298.**Antennae clavatae. Elytra laevissima obscuriora; margine exteriore albido binis dentibus antice instructo.*7. *Pusillus*, das *Wasserhühnchen*.*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 658.**Hydrophilus, niger; elytris laevissimis; antennis tarisque fuscis.*8. *Punctatus*, der *Geoffroische punktirte*.*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 184. Hydroph. 3. L'Hydrophile lisse à points.**Niger; elytris laevibus, dense punctatis..**Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 659. HYDROPHILUS Pilula.**Ater, supra nitidus, dense punctatus.*9. *Obscu-*

*\*) Diesen, und Linn. D. granularem, et minutum, hab' ich in meinen Gegenden oft in meinen mit Meerlinzen gefüllten Gläsern gefunden. Ihre Kunst zu schwimmen ist bewundernswürdig. Gegen Abend geben sie einen besondern Ton von sich.*

9. *Obscurus*, der dunkelgrün-gelbliche.

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 657.

*Hydrophilus*; *lividus*, *abdomine nigro*; *elytris nitidis*, *confertim punctatis*.\*)

II. Mit borstenförmigen Fühlhörnern.

1. *Roeselii*, Rösels Tauchkäfer.

*Rösels* Infektenbel. II. B. *Wasserinf.* I. Kl. S. 9. t. 2.  
der *Wasserwurm mit dem breiten Rückenstreif*, ohne  
*Schwanzspitzen*, nebst dessen Verwandlung zum *Wasserkäfer*.

Füsslins Verz. S. 18. No. 349.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 673. der *oberhalb grüne*,  
*und unten ockergelbe Wasserkäfer*.

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 664.

*Virens*; *flavicans*; *supra obscure virens*; *margine thoracis elytrorumque extimo flavo*.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 396. *Dyt. 3. Grand Ditique à bordure laterale*.

D Y T I S C U S (*laterali-marginalis*) *supra viridi-niger*, *subtus rufus*; *capite thoracis marginibus elytrorumque flavo-marginatis*.

Schaeff. Elem. t. 7.

Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 185. *Dyt. 1. Le Ditique brun à bordure*.

Fuscus; *margine coleptrorum thoracisque flavo*.

2. *Vundulatus*, der wellenförmig gemahlte Wasserkäfer.

Qq 5

Franz

\*) Hierbey hat der Staatsr. M. des Geoffr. *Hydroph.* 5. pag. 184.

Tom. I. angeführt, der vom de Geer bey Linn. D. *Luridus* No. 5. citirt ist.

Des Müllers HYDROPH.? *chrysomelinus* Prodr. No. 660. ist bey Linn. *CHRYSONELLA minuta* No. 50. beschrieben.

Franz von Paula Schrank Beyträge zur Naturgesch.  
S. 70. §. 18.

*Antennis setaceis, niger; elytris ad basin fascia undulata abrupta ferruginea.*

*Fabri. S. E. p. 232. Dyt. 14. Hermanni. Gibbus; elytris fascia undata baseos ferruginea. In aquis flagnantibus Alsatiae.*

3. *Sterno-muticus*, der zeylonische schwarze Wassertkäfer mit einem abgestutztem Brustbein.

*Gronov. Mus. 2. p. 164. No. 552.*

*D. niger; thorace elytrorumque margine flavo; sterno mutico.*

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 699.*

4. *Rubro-bimaculatus*, der Gronovische zweyfach rothgefleckte Kopf.

*Gronov. Mus. 2. p. 164. No. 555.*

*Dytiscus niger, laevis; antennis setaceis ferrugineis; capite postice rubro-bimaculato.*

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 699.*

5. *Punctatus*, der Skopolische Wassertkäfer mit punktirten Flügeldecken.

*Scop. Entom. carn. No. 295.*

*Niger, seticornis; thoracis margine toto lineaque media transversa, frontisque linea trigona, rufis; elytris testaceis, subpellucidis: postice fascia abrupta, punctisque plurimis atris.*

6. *Minimus*, das kleinste Wassertkäferchen.

*Scop. Entom. carn. No. 297.*

*Statura CHRYSONELAE Nemorum, ovatus, niger; elytris apice lineisque tribus albidis.*

*Füesslins Verz. S. 18. No. 356.*

7. *Gla-*

7. *Glaber*, der *englische glatte Wässerkäfer*.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 55. No. 55.

*Antennis setaceis compressis, fuscis; elytris glabris, ventre pedibusque ferrugineis.*

8. *Nebulosus*, der *englische neblichte Wässerkäfer*.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 56. No. 56.

*Lividus, nigro-nebulosus; antennis pedibusque ferrugineis, ventre atro; margine ferrugineo.*

9. *Exsoletus*, der *englische verblaßte Wässerkäfer*.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 57. No. 57.

*Antennis setaceis, lividus; antennis, capite, thorace, abdomine, pedibusque pallidis.*

10. *Costalis*, die *surinamische Brauntreife*.

*Fabric.* S. E. p. 230. *Dytiscus* 2.

*Niger; capitis fascia; thoracis margine; elytrorumque stria costali ferrugineis.*

11. *Limbatis*, der *chinefische gesäumte Wässerkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 230. *Dytiscus* 4.

*Niger; thoracis elytrorumque margine exteriore flavo.*

12. *Lanio*, der *maderische Blutpunkt*.

*Fabric.* S. E. p. 231. *Dytiscus* 8.

*Niger, ore verticis punctis duobus, thoracisque marginibus rufis; elytris fuscis.*

13. *io-punctatus*, der *neuholländische Zehnpunkt*.

*Fabric.* S. E. p. 232. *Dytiscus*.

*Ater, glaber; elytris punctis albis quinque.*

14. *Cinctus*, der amerikanische gegürtelte Wässerkäfer.

*Fabric. S. E. p. 232. Dytiscus 13.*

*Capite thoraceque flavis; elytris nigris; margine omni albo.*

15. *Irroratus*, der amerikanische bethauete Wässerkäfer.\*)

*Fabric. S. E. p. 233. Dytiscus 16.*

*Testaceus, nigro irroratus; capite petioreque nigris.*

16. *Varius*, der patagonische gescheckte Wässerkäfer.

*Fabric. S. E. p. 233. Dytiscus 19.*

*Thorace rufo; elytris striis numerosissimis approximatis, nigris cinereisque variegatis.*

17. *Depressus*, der schwedische platte Wässerkäfer.

*Fabric. S. E. p. 233. Dytiscus 20.*

*Thorace ferrugineo; punctis duobus baseos nigris; elytris fuscis, ferrugineo-maculatis.*

18. *Signatus*, der patagonische Zeichenwässerkäfer.

*Fabric. S. E. p. 234. Dytiscus 23.*

*Niger; capite thoraceque rufis; signaturis nigris.*

19. *Lineatus*, der elsassische lineirte Wässerkäfer.

*Fabric. S. E. p. 234. Dytiscus 25.*

*Ferrugineus; coleoptris fuscis; lineis quatuor flavescientibus.*

20. *Am-*

\*.) v. No. 32. MÜLL. *rufidus*?

20. *Amplissimus*, der sehr breite und ansehnliche Wassertkäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 662.

Niger; marginibus luteis; elytris dilatatis, sulcatis.

21. *Semisulcatus*, der halbgefurchte Frischwasserkäfer. (v. No. 8.)

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 666.

Fuscus, supra niger; margine thorace elytrorumque extimo flavo, sulcis viginti dimidiatis.

Frisch Inf. II. p. 35. t. 7. f. 4.

22. *Transversalis*, die gelbe Queerstreife.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 668.

Niger; thorace vtrinque fasciaque antica; elytris margine, lineaque transversa baseos flava.

Pontopp. D. Atlas I. t. 29.

— — N. G. v. D. p. 209. No. 14. *Transversalis*.

Antennis setaceis; caput postice nigrum; thorax anteice et ad latera ferrugineus, postice vna cum elytris niger; elytrorum margo exterior flavescens, linea concolor *transversalis* ante basin elytrorum, abrupta in medio dorso.

23. *Cinctus*, der Gelbgürtel.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 669.

Niger; margine extimo thoracis et elytrorum flavo.

Individua simillima patellis instructa et destituta cepi.

24. *Bipunctatus*, der Zweypunkt.

Mülleri Faun. Fridr. p. 20. No. 194.

Niger; elytris acuminatis glabris apice bipunctatis.

Mülleri

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 670.

Niger; *pedibus punctisque* duobus apice *elytrorum ferrugineis*.

25. *Lacustris*, der *Morastkäfer*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 671.

*Flavicans*; *margine thoracis flavo*; *elytris punctis sparsis*.

26. *Piceus*, der *Pechschwarze*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 673.

Niger; *corpore subtus marginaque thoracis elytrorumque ferrugineo*.

27. *Foetidus*, der *stinkende Wässerkäfer*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 674.

*Ferrugineus*; *supra niger*; *margine thoracis elytrorumque extimo flavo*.

28. *Comma*, das *Comma*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 676.

*Flavicans*, *supra nigro-aeneus*, *margine exteriore lineolaque elytrorum lutescente*.

29. *4-punctatus*, der *Vierpunkt*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 677.

*Ferrugineus*; *elytris nigris*, *fascia*, *macula*, *punctisque quatuor albis*.

*Variat striis quatuor punctatis*, in singulo elytro, *piloque griseo*, e quovis puncto procumbente.

30. *Biocellatus*, das *Zweyauge*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 768.\*)*

Rufus; *elytris aeneis*, in longitudinem albo-maculatis.

31. *Bilineatus*, die *Zweylinie*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 770.*

Niger; *antennis tarsisque rufis*.

32. *Roridus*, der *gelbliche schwarz bethouete Wassertkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 771.*

Flavus; *thorace macula media*; *elytris atomis nigris irroratus*.\*\*)

Specimen cum *patellis*, et aliud absque iisdem dedit experientiss. *Askow*.

33. *Impressus*, der *Eingedrückte*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 772.*

Nigro-aeneus nitidus; *antennis, pedibus, punctisque duobus*, apice elytrorum ferrugineis.

34. *Punctatus*, der *Gelbpunkt*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 780.*

Ovatus, rufus; *thoracis medio nigro*, *elytris fulcis*; margine inferiore *punctoque baseos flavis*.

35. *Cimicoides*, der *wanzenartige Wassertkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 781.*

Virens; *elytris virescentibus*, margine inferiore et maculis albis.

36. *Velox*,

\*) Hier geht die *Verwirrung in den Numern* an. v. No. 18. Linn.

\*\*) Aller Wahrscheinlichkeit nach des FABRIC. *irroratus* No. 15.

36. *Velox*, der *geschweinde Wässerkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 73. No. 783.  
*Ovatus rufus; elytris striis octo fuscis.*

37. *Parvulus*, der *Kleinling*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 73. No. 784.

*Niger; thorace antice flavo; elytris sulco abrupto;*  
*pedibus piceis.*

38. *Ruffrons*, die *Rothstirn*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 73. No. 785.

*Niger; thorace vtrinque; elytris basi lateribusque*  
*flavis; capite pedibusque rufis.*

*Att. Nidr. IV.* p. 26. t. 16. f. 12.?

39. *Punctulatus*, der *mattpunktirte Wässerkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 73. No. 786.

*Rufus; elytris luteis disco macula communi nigra,*  
*sinuata.*

40. *Pusillus*, das *Brunnenkäferchen*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 73. No. 788.

*Ovatus niger; antennis basi pedibusque ferrugi-*  
*neis; elytris absque punctis.*

1 An *Brunnikluka*. Isl. R. 688. d?

*Olaffs R. Ueberf. I.* p. 319. d.

*Dytiscus e nigro brunneus, extremo abdominis al-*  
*bido.*

41. *Quadripustulatus*, die *Vierblätter*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 73. No. 789.

*Niger; elytris maculis quatuor flavis, pedibus*  
*rufis.*

42. *Lineatus*, der *Lineirte*.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 790.

Ater, supra flavicans; thorace postice, elytris striis maculisque nigris.\*)

43. *Ater*, der ganz schwarze *Wasserkäfer*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 189. *Dytiscus* 6. Le *Ditique en deuil*.

Totus niger, laevis.

Schaeff. Icon. t. 8. f. 9.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 401. *Dytiscus* 8. *Ditisque tout noir*.

D Y T I S C U S (*ater*); corpore convexo nigro toto; pedibus antennisque rufo-fuscis.

44. *Nigro-maculatus*, der *Schwarzfleck*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 189. *Dytiscus* 7. Le *Ditique fauve à taches noires*.

Fulvus; maculis sparsis nigris.

45. *Cristato-marginatus*, der *Federbuschränd*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 190. *Dytiscus* 8. Le *Ditique à bordure panachée*.

Fuscus; elytris antice et externe flavis.

46. *Nigro-fuscus*, der *Schwarzbraune*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 190. *Dytiscus* 9. Le *Ditique noir à étuis bruns*.

Ater; elytris fuscis.

Müller

\*) Der Staatsrath Müller hat die *Dytiscos* von den *Hydropilis* abgesondert, und in zwei Klassen getheilet: 1. *Sentellatos*; 2. *exsentellatos*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 782. *DYTISCVS RUFIPES*. \*)

Ovatus ater; *pedibus antennarumque* basi ferrugineis; *elytris* punctatis subpubescentibus.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 568.

*Supra fuscus, subitus ater.*

— — — ed. 2. p. 216. *Variatio semistriata:* No. 772. b.

Est inter *minores*, totus laevissimus; *Apex sterni* bifurcus, obtusus.

47. *Gilvus*, der wachsgelbe Wässerkäfer.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 191. *Dytiscus* II. Le *Ditique aux yeux noirs*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 778.

*Flavicans*; capite thoraceque virente; *elytris* obscure laevibus.

48. *Quadrivaculatus*, der Vierfleck.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 192. *Dytiscus* 13. Le *Ditique panaché sans stries*.

*Niger*; *thorace* flavo; *elytris* laevibus, maculis limboque luteis.

49. *Vnistratiatus*, die Einstreife.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 192. *Dytiscus* 14. Le *Ditique à une seule strie*.

*Niger*; *elytris* maculis et limbo luteis; *stria unica*.

50. *Clavicornis*, das Keulhorn.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 193. *Dytiscus* 15. Le *Ditique à grosses antennes*.

*Fuscus*;

\*) Er fragt nur, ob es dieser *Geoffr.* sey.

Fuscus; capite thoraceque fulvo, antennis subclavatis, scutello nullo.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 402. *Dyt. 10. Ditisque à antennes en massie.*

D. (*clavicornis*) viridi-griseus; antennis *subclavatis*; abdomine subtus nigro-fusco.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 779.

D. (*crafficornis*), fulvus; antennis *subclavatis*; elytris fuscis.

51. *Bilineatus*, die *Degeerische Zweylinie*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 400. *Dytisc. 6. Ditisque à corcelet roux bordé de noir.*

Elytris fuscis; corpore subtus fulvo, thorace fulvo; linea dupli nigra.

52. *Semi-niger*, der *Hals-schwarze*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 401. *Dytisc. 7. Ditisque noir en dessous.*

Thorace elytrisque obscure fuscis, rufo-marginatis; corpore subtus toto nigro.

53. *Griseo-striatus*, der *Graugestreifte*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 403. *Dytisc. 11. Ditisque noir à rayes grises.*

Niger, supra maculis striisque griseis; pedibus rufo-fuscis.

54. *Hyalinus*, der *Durchsichtige*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 406. *Dytisc. 14. Ditisque transparent.* t. 15, f. 21, 22, 23.

Virescens; elytris *hyalinis* maculis lateralibus albidis.

213. G E S C H L E C H T. *Carabus*; *Lauf-Renn-käfer.*<sup>\*)</sup>

*Müllers L. N. S.* 5. Th. I. B. S. 352. *Erdkäfer*;  
*holl.* Aard-Torren.

*Börners*

**\*)** Nach Sulzers Meynung könnte dies wohl am ersten der Alten *Buprestis* gewesen seyn, weil diese Käfer einen stinkenden, braunen und sehr scharfen Saft von sich geben, der leicht in dem Magen des Viehes, das dergleichen verschlucht hätte, eine Entzündung verursachen könnte.

Ihre Oekonomie betreffend: so sind von ihren Larven kaum die Hälfte bekannt. Sie wohnen in faulem Holz, im Moos, und unter der Erde, und sind sowohl als die Käfer die größten *Insektenräuber* und *Raupeñöder*.

Die Käfer halten sich mehrentheils an der Erde auf, und laufen sehr geschwind. Einige sind geflügelt, andere ungeflügelt, wornach sie der Herr de Geer eingetheilet hat. Des Ritters Eintheilung in grosse und kleine ist eben nicht die bequemste. Geoffroi hat seine *Buprestides* (*Carabos et Cicindelas* Linn.) in drey Familien eingetheilet:

1. *Thorace cordato*, capite latiore; elytris angustiore.
2. *Thorace*, capite elytrisque angustiore.
3. *Thorace capite latiore*, elytrorum latitudine.

*Müllers* Eintheilung ist vielleicht die *beste*:

1. *Thorace quadrato*: antice et postice subaequali.
2. *Thorace cordiformi*: postice angustiore.
3. *Thorace triangulari*: postice latiore.
4. *Thorace orbiculato*.

Uebrigens sind diese Käfer, da sie sich gemeinlich in der Erde, unter den Steinen, und an feuchten Oertern aufhalten, der Milbenplage sehr unterworfen. Auch fressen sie einander selbst auf. Der Zweykampf des *Sycophanta* und *Crepitans*, besonders die Art des letztern, sich zu vertheidigen, ist eine der possirlichsten. Diese Käfer sind wieder ein Leckerbissen für verschiedene Vögel, Mäuse, Kröten, sonderlich für die *Eidechen*.

Börners Samml. I. Th. S. 477. *Laufkäfer; Erdkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 99. gen. 21. *Erdkäfer.*

Eberhards Vers. einer Thiergeesch. S. 193. §. 215. *Laufkäfer.*

Gleditsch Forstwiss. II. S. 1513. No. 3. der *Laufkäfer; Rennkäfer: große und kleine Harzkäfer;* *Carabus.*

Glaßer von schädlichen Raupen der Obstbäume. S. 73. *Rambkäfer; Raupenjäger.* S. 136. *Raupentödende Käfer.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 210. *Erdkäfer: Fütl. Skovtiggere.*

Sulzers Kennz. S. 75. *Erdkäfer, Chasseur des Chenilles. Ream.*

— — Gesch. S. 60. der *Laufkäfer; Le Chasseur des Chenilles.*

Oloffs Reisen durch Isl. I. p. 319. e. *Jarnsmidur.*

Neuer Schauplatz der Natur. II. B. pag. 666. *Erdkäfer.*

Füeßlins Verz. schweiz. Inf. S. 18. *Laufkäfer.*

Brunnichii Entom. p. 54. *Dan. Skovtigger.*

Comment. Lips. Dec. I. Vol. 3. p. 216. Vol. V. p. 606.

Catholicon C. p. 89. der *Erdkäfer; der Raubkäfer; Buprestis Autorum.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 615. *Erdkäfer.*

Fabrie. S. E. p. 235. *Carabus.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 217. *Carabus.*

Scop. Entom. carn. p. 85. *Carabus.*

Müller. Faun. Fridr. p. 20. *Carabus.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 75. *Carabus.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 137. *Buprestis.*

de Geer Inf. Tom. IV. préf. I. No. 40. pag. 82. Des *Carabes.*

## I. Große Erdkäfer.

1. *Coriaceus*, der lederartige Laufkäfer.\*)

Müller l. c. S. 353. t. 7. f. 10. der Lederkäfer.

Füesslins Verz. S. 18. No. 357. der Lederartige.

Pontopp. N. G. v. D. p. 210. t. 16.

— — — Atlas Dan. I. t. 29.

Ast. Nidr. III. 20. Uebers. p. 359.

Schaeff. Icon. t. 36. f. 1. (all. Füessl.)

— — — t. 141. f. 1. (cit. Müll. et de Geer.)

Fabric. S. E. p. 235. No. 1.

Müller's Faun. Fridr. p. 20. No. 195.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 803.

*Ater; elytris rugosis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 141. *Buprestis* 1. Le *Bupreste noir chagriné*.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 9. No. 4. *Carabe noir chagriné*.

2. α. *Granulatus*, der körnerichte Laufkäfer.\*\*)

Müller l. c. S. 353. No. 2. die Körnerwarze.

Füesslins Verz. S. 18. No. 358. der Galonirte.

Pontopp. N. G. v. D. p. 210. No. 2.

Sulzers Gesch. p. 62. t. 7. f. 2. der Galonirte.

Schaeff. Icon. t. 18. f. 6. t. 156. f. 4.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 616. der schwarze Erdkäfer mit erhöhten Punkten und Streifen auf den Flügeldecken.

Fabric. S. E. p. 238. No. 14.

*Apterus, nigricans; elytris aeneis, striatis, interjectis punctis elevatis, longitudinalibus.*

Scop.

\*) Non - atatus; Ungeflügelt.

\*\*) Ungeflügelt.

Scop. Entom. carn. No. 263.\*)

Poda Mus. graec. p. 45. No. 4. (non Hortensis.)

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 143. Bupr. 3. Le Bupreste galonné.

*Buprestis niger; elytris aeneis, convexe punctatis striatisque.*

de Geer Ins. Tom. IV. p. 88. No. 2. *Carabé à points convexes.*

C A R A B U S *subapterus*, supra viridi-aeneus; subtus niger; elytris tuberculis elongatis triplici ordine: sulcis elevatis.

Müller Faun. Fridr. p. 20. No. 197.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 805.

Niger, supra aeneus; elytris convexe striatis: interiectis tuberculis elongatis, triplici serie.

Variat basi antennarum et femoribus ferrugineis, utraque iterum articulis tarforum anticorum dilatatis (an maris?) spongiosis, ac elytris apice erosis.

β. Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 620. der schwarze Erdkäfer mit grünlichen Flügeldecken, und erhöheten Punkten und Streifen auf denselben.

γ. Onomat. hist. nat. P. 2. 619. der schwarze Erdkäfer mit kupferfarbigen Flügeldecken und erhabenen Punkten, und Streifen auf denselben.\*\*) )

R r 4 3. Hor-

\*) Mirum sane, fagt Skopoli, quod Ill. *Linn.* punctorum elytri quidem; linearum vero elevatartim iisdem interpositarum, membrinerit nihil.

\*\*) Bey diesen Variationen hat der Ritter der Streifen oder Zwischenlinien zwischen den Punkten gedacht.

3. *Hortensis*, der Goldschmidt.\*)

Müller l. c. S. 353. t. 7. f. 12, No. 3. der *Hohlpunkt*;  
holl. Goudsimid, (*Goldarbeiter*).

Fließlins Verz. S. 18. No. 359. der *Hohlpunkt*.

Olaffs Reisen durch Isl. I. p. 319. *Isl. Gullsimidur*.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 623. der *purpurfarbige auf schwarz stachende Erdkäfer mit tiefen Punkten und Streifen auf den Flügeldecken*.

Raj. Inf. 96. No. 2. *Cerambyx purpurea punctata*.

Acta Vpsal. 1736. p. 19. No. 1. *Carabus niger; elytris sulcatis punctatis*.

Schaeff. Icon. t. II. f. 3.

Fabric. S. E. p. 237. No. 7.

Müller's Faun. Fridr. p. 20. No. 198.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 808.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 90. No. 5. t. 3. f. 1. *Carab noir à points dorés*.

**CARABVS (striatus) niger; elytris striatis mar-**  
**gine violaceis; punctis aureis excavatis, triplici serie.**

4. *Leucophthalmus*, das *Weißauge*.

Müller l. c. S. 354. No. 4.

Fließlins Verz. S. 18. No. 360.

Akt. Nidr. IV. p. 28.

Lift. scar. angl. p. 390. No. 23. *Scarabaeus ex toto niger*.

Fabric. S. E. p. 240. No. 23. *Apterus, ater; elytris striatis*.

Müller's Faun. Fridr. p. 20. No. 199.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 822.

Niger; thorace lineolis quatuor posticis excavatis.

Schaeff. Icon. t. 18. f. 2.

Onomat.

\*.) Ungefügelt.

*Onomat. hist. nat. P. 2. p. 617.* der schwarze Erdkäfer mit gestreiften Flügeldecken.

*Geoffr. Ins. Tom. I. p. 146.* *Bupr. 7.* Le Bupreste tout noir.

Ater; *elytro singulo striis octo laevibus; pedibus nigris.*

de Geer Ins. Tom. IV. p. 96. No. 12. *Carabe' noir canelé.*\*)

CARABVS (*nigro-striatus*) *alatus totus niger nitidus; elytris striatis.*

5. *Clatratus*, der gegitterte Laufkäfer.\*\*) )

Müller I. c. S. 354. der Gitterkäfer.

Füesslins Verz. S. 18. No. 361.

Fabric. S. E. p. 238. No. 15.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 806.

Niger; *elytris sulcis tribus: punctis excavatis aeneis.*

6. *Nitens*, der glänzende Laufkäfer. †)

Müller I. c. S. 354. No. 6. t. 7. f. II. der Erdglänzer.

Füesslins Verz. S. 18. No. 362.

Sulzers Gesch. S. 62. t. 7. f. 3. der Erdglänzer.

*Onomat. hist. nat. P. 2. p. 625.* der grüne Erdkäfer mit stumpf eingekerbten Flügeldecken ohne Punkte, und rostfarbigen Füßen und Fühlhörnern.

Aet. Vpfat. 1736. pag. 19. No. 3. *Carabus viridis; elytris sulcatis laevibus.*

Schaeff. Icon. t. 51. f. I. (all. Füessl.)

Poda Mus. graec. p. 45.

Fabric. S. E. p. 239. No. 17.

*Apterus; elytris porcatis, scabris, viridibus; margine aureo.*

Rr 5

Mülleri

\*) Nach dem DE GEER geflügelt.

\*\*) Ungeflügelt.

†) Ungeflügelt.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 807.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 91. No. 6. *Carabé doré*.

**C A R A B V S** (*aureus*) apterus; capite thoraceque aureis; corpore subtus nigro; *elytris* viridi-aeneis, *margine* aureis; *sulcis* elevatis nigris.

*B.* Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 219. No. 785. *Carabus niger*; *elytris* viridibus obtuse sulcatis; *pedibus antennisque* nigris.

*Raj.* Inf. 96. No. 6. *Cerambyx dorso in longas rugulas diviso, omnium pulcherrimus*.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 620. der schwarze Erdkäfer mit grünen, stumpf eingekerbten Flügeldecken, und schwarzen Füßen und Fühlhörnern.

7. *Auratus*, der goldne Laufkäfer.\*)

*Müller* I. c. S. 355. No. 7. der Goldkäfer.

*Füesslins* Verz. S. 18. No. 363. Vulgo Goldkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 238. No. 12.\*\*)

*Müller* Faun. Fridr. p. 20. No. 200.

*Frisch* Inf. XIII. p. 25. No. 27. t. 23. †) der schwarze Erdkäfer mit dem gesäumten herzförmigen Halschild. (alleg. *Müller*).

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 142. *Bupr.* 2. t. 2. f. 5. Le *Bupreste doré et sillonné à larges bandes*.

Viridis; *elytris* obtuse sulcatis, non punctatis; *pedibus antennisque* ferrugineis.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 104. No. 1. exot. t. 7. f. 20. *Carabé sillonné*.

## C A R A -

\*) Ungeflügelt.

\*\*) *Fabric.* hat zu diesem das bey dem vorigen angeführte *Schaaff. citatum* gesetzt.

†) Vom *Linné* bey dem folgenden *V. oluceo* angeführt, worinn *Fabric.* und *Füesslin* gefolget sind.

C A R A B V S (*fulcatus*), *apterus viridi-aeneus nitidus*; *antennis pedibusque rufis, abdomine nigro, elytris fulcatis.*

8. *Violaceus*, der *violette Laufkäfer*.\*)

Müller l. c. S. 355. No. 8. die *Goldleiste*; holl. der *Kupferschmidt*.

Füesslins Verz. S. 18, No. 364.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 624. der *blaulicht schwarze Erdkäfer mit glatten gerunzelten Flügeldecken*.

Schaeff. Icon. t. 3. f. 1. t. 88. f. 1.

Act. Nidr. IV. 29.

Act. Vpsal. 1736. p. 19. No. 3. *Carabus nigricans laevis*.

Fabric. S. E. p. 236. No. 2.

- *Alatus, niger; thoracis elytrorumque marginibus violaceis.*

Lift. Scar. angl. 389. 22. *Scarabaeus maximus, ex viola nigricans.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 810.

Niger; *thorace subviolaceo; elytris laeviusculis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 144. *Bupr. 4. Le Bupreste azuré.*

*Ruprestis totus, nigro-violaceus; elytris dense striatis.*

de Geer Inf. Tom. IV. p. 89. No. 3. *Carabé azuré.*

C A R A B V S *apterus aeneo-niger nitidus; thorace subviolaceo; elytris punctis minutissimis excavatis tripli ordine.*

9. *Cephalotes*, der *herzförmige Halschild*.\*\*) )

Müller l. c. S. 355. No. 9. der *Blechschmidt*.

Füesslins

\*) Linné und Fabric. geben ihn als *geflügelt*, der Herr de Geer aber mit Recht, als *ungeflügelt* an. \*\*) *Ungesflügelt.*

Füeßlins Verz. S. 18. No. 365.

Frisch Inf. XIII. p. 25. No. 26. t. 22. der schwarze Erdkäfer mit dem herzförmigen Halschild.

Sulzers Gesch. t. 7. f. 4. \*)

Schaeff. Icon. t. II. f. I.

Fabric. S. E. p. 240. No. 22. *Apteris*, ater, laevisimus; *thorace* orbiculato, convexo.

Müller's Faun. Fridr. p. 20. No. 201.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 834.

Niger, laevis; *thorace* oblongo, postice coarctato.

10. 10-guttatus, der kapensische Zehntropf. \*\*)

Müller l. c. S. 356. No. 10. der Milchtropf.

Fabric. S. E. p. 236. No. 3.

II. *Inquisitor*, der Raupenjäger. †)

Müller l. c. S. 356. No. 11.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 366. der Raupenjäger.

Gleditsch Forstwiß. II. p. 794. No. 8. der Aufpasser.

Fabric. S. E. p. 239. No. 18. *Alatus*.

Müller's Faun. Fridr. p. 20. No. 202.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 835.

Viridis; *elytris* aeneis rugose striatis; *punctis* tripli serie; *pedibus* *antennisque* nigris.

*Variat* supra totus niger marginè *elytrorum* viridi.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 145. *Bupr.* 6. Le *Bupreste* *quarré couleur de bronze antique*.

*Bupre-*

\*) Obgleich Sulzer und Füeßlin bey dieser t. 7. f. 4. des *Lin.*

*Spinipes* No. 20. anführen; so halte ich doch den Sulzerschen wegen des vorgestreckten Halschildes für den *Cephalotes*.

Denn das nomen specificum: *Spinipes*, wie Müller erinnert Prodr. p. 79. No. 852. kommt sehr vielen dieser Art zu.

\*\*) Ungeflügelt. — Unabgebildet.

†) Geflügelt.

*Buprestis* totus e fusco - viridi cupreus; *elytris* latis, singulo striis sexdecim.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 94. No. 9. *Carabé inquisiteur.*

CARABVS alatus supra aeneo-fuscus, subtus vi-  
ridi-aureus; *elytris* striatis margine aeneis, punctis  
excavatis triplici ordine.

Rolander Act. Ac. Suec. 1750. p. 292. Tab. 7. f. 3.

12. *Sycophanta*, der *Puppenräuber.* \*)

Müller I. c. S. 357. No. 12. t. 7. f. 13.

Füesslins Verzeichn. S. 19. No. 367. der *Puppen-  
räuber.*

Sulzers Gesch. pag. 60. 62. t. 7. f. 1. der *Puppen-  
räuber.*

Glaeser von schädlichen Raupen p. 74.

Berlin. Magaz. 3. B. S. 5. ff. der *größte europäi-  
sche goldgrüne Baumkäfer.*

Schaeff. Icon. t. 66. f. 6.

Fabric. S. E. p. 239. No. 20. *Alatus*, violaceo-ni-  
tens; *elytris* aureis, striatis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 144. *Bupr.* 5. Le *Bupreste*  
*quarré couleur d'or.*

Nigro-violaceus; *elytris* latis aeneis e viridi pur-  
pureis, singulo striis sexdecim.

de Geer Inf. T. IV. p. 105. No. 2. t. 17. f. 19. *exot.*  
*Carabé Sycophage.*

CARABVS alatus nitens; *thorace* *femoribusque*  
violaceis; *elytris* viridibus striatis; *abdomine* viridi-  
aureo.

## II. Kleine

\*) Geflügelt.

## II. Kleine Erdkäfer.

13. *Bruprestoides*, der prachtkäferartige Laufkäfer.\*)

Müller l. c. S. 358. No. 13. der Erdflinker.

Füesslins Verz. S. 19. No. 368.

14. *Fastigiatus*, der kapensische Laufkäfer mit zugespitzten Flügeldecken.\*\*)

Müller l. c. S. 14. No. 14. der Dachkäfer.

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 283. Dachkäfer.

15. *Lividus*, der grüngelbe Laufkäfer.†)

Müller l. c. S. 358. No. 15. der Blaßrücken.

16. *Marginatus*, der Rothrand.

Müller l. c. S. 359. No. 16.

Füesslins Verz. S. 19. No. 369.

Pontopp. N. G. v. D. p. 210. t. 16.

— — Atl. Dan. I. t. 29.

Fabric. S. E. p. 245. No. 51.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 162. Bupr. 41. Le Bupreste vert à bordure.

*Viridis, pedibus elytrorumque margine exteriore pallide testaceis.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 845.

17. *Complanatus*, der spanische Plattschild.††)

Müller l. c. S. 359. No. 17.

Fabric. S. E. p. 242. No. 33.

*Thorace orbiculato, rufus; elytris fasciis duabus nigris.*

18. *Crepis*.

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

† ) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

18. *Crepitans*, der *Bombardierkäfer*.\*)

Müller I. c. S. 359. der — — — — —

Füesslins Verz. S. 19. No. 370. der *Platzkäfer*.

Sulzers Gesch. S. 60.

Neuer Schauplatz der Nat. II. p. 666.

Rom. Dict. II. p. 158. *Le Bombardier*.

Schaeff. Icon. t. II. f. 13. (alleg. *Füessl.* sed *Fabric.* t. 10. f. 13.)

Rolander Act. Holm. 1750. pag. 292. t. 7. f. 2. *Circindela* etc.

*Fabric.* S. E. p. 242. No. 35.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 151. *Bupr.* 19. *Le Bupreste à tête, corcelet, et pattes rouges et étois bleus.*

*Capite, thorace, pedibusque rubris; elytris coeruleo-nigris.*

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 103. No. 22. t. 3. f. 18. *Carabé pétard.*

*CARABVS alatus ferrugineus, thorace angusto; elytris cinereo-nigris.*

*Schwed.* *Skiut-fluga;* *Mouche, qui tire.*

19. *Am-*

\*) *Geflügelt.*

In Frankreich unter den Steinen, wie auch in Schweden zu Hause. Seine Art, sich gegen seine Feinde, den *Sycophanta* und *Inquisitor* zu vertheidigen, ist merkwürdig. Wenn er verfolgt wird, und nicht mehr entwischen kann, legt er sich, wie tot, nieder. Sobald nun sein Verfolger den Hals aufsperrt und zuschnappen will, lässt er ihm aus dem After einen blauen unangenehmen Dunst mit einem platzenden Geräusch in den Hals fahren, worüber solcher erschrickt und zurückfährt. Mittlerweile gewinnt der kleine Schalk Zeit, sich aus dem Staube zu machen. Ein gleiches soll er thun, wenn man ihn mit einer Stecknadel unter den Flügeldecken kürzelt.

19. *Americanus*, der amerikanische Rostfuß.\*)*Müller* l. c. S. 360. No. 19. der Amerikaner.*Fabric.* S. E. p. 242. No. 34.*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 107. exot. No. 3. t. 17. f. 21.*Carabé américain.**Alatus niger; thorace, antennis pedibusque ferrugineis; genibus nigris; elytris striatis.*20. *Spinipes*, der Stachelfuß.\*\*)*Müller* l. c. S. 360. No. 20.*Füeßlins* Verz. S. 19. No. 371.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 20. No. 203.*— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 852.**Niger; elytris aeneis; tibiis anticis, medio incisis.**A Carabo Spinipede scor. diversus est, an etiam a Carabo Linn.?*21. *Cyanocephalus*, der Blaukopf.†)*Müller* l. c. S. 361. No. 21.*Füeßlins* Verz. S. 19. No. 372.*Onomat. hist. nat. P. 2. p. 618. der Erdkäfer mit blauem Kopf und Flügeldecken, und rother Brust.**Schaeff. Icon. t. 10. f. 14. (alleg. *Fabric.* sed *Füeßl.* t. II. f. 14.)**Fabric. S. E. p. 245. No. 53.**Raj. Inf. 89. No. 1. *Cantharis* elytris et capite coeruleis, scapulis croceis.**Mülleri* Faun. Fridr. p. 21. No. 204.*— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 856.**Geoffr.*

\*) Geflügelt.

\*\*) v. No. 9. *Cephalotes*. Ist dieser nicht derjenige, den Sulzers Gesch. t. 7. f. 4. vorgestellt hat; so ist er nicht abgebildet.

†) Geflügelt.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 149. *Bupr.* 16. *Le Bupreste bleu à corcelet rouge.*

*Buprestis capite elytrisque coeruleis; thorace rubro.*  
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 100. No. 17. t. 3. f. 17. *Carabé tête-bleue.*

*Alatus, capite elytrisque viridi-coeruleis; thorace pedibusque ferrugineis.*

### 22. *Melanocephalus*, der *Schwarzkopf.*\*)

*Müller* l. c. S. 361. No. 22.

*Füesslins* Verz. S. 19. No. 373. der *Schwarzkopf.*

*Olaffs* Reisen durch Isl. I. p. 320.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. pag. 618. der *Erdkäfer mit schwarzem Kopf und Flügeldecken und rother Brust.*

*Actr.* Nidr. III. p. 22. Uebers. p. 360.

*Fabric.* S. E. p. 245. No. 52.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 831.

*Ferrugineus; capite, elytris, abdomineque nigris.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. pag. 162. *Bupr.* 42. *Bupreste noir à corcelet rouge.*

*Buprestis niger; thorace, antennis pedibusque ferrugineis.*

de *Geer* Inf. IV. p. 93. No. 8. *Carabé tête-noire.*

*Apterous, niger, nitidus; elytris laevibus; antennis pedibusque flavo-testaceis.*

### 23. *Vaporariorum*, der *Gewächshauslaufkäfer.*\*\*) )

*Müller* l. c. S. 361. No. 23. der *Wintergärtner.*

*Füesslins* Verz. S. 19. No. 374.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 617. der *schwarze Erdkäfer mit grauen Flügeldecken gegen der Brust.*

*Fabric.*

\*) Nicht abgebildet. Ungeflügelt.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 247. No. 61.

Thorace; elytris antice margineque, antennis pedibusque ferrugineis.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 850.

*Nigricans*; antennis, thorace, pedibus, elytris que antice ferrugineis.

#### 24. *Latus*, der Breitbuckel.\*)

*Müller* l. c. S. 362. No. 24.

*Füeßlins Verz.* S. 19. No. 375. *Breitbuckel.*

*Akt. Nidr.* III. p. 23. *Uebersf.* p. 361.

*Schaeff.* Icon. t. 194. f. 7.

*Fabric.* S. E. p. 244. No. 44.

*Niger*; elytris striatis, crenatis, antennis pedibusque ferrugineis.

*Müller* Faun. Fridr. p. 20. No. 196.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 854.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 101. No. 18. *Carabé large.*

*Alatus*, niger, nitidus; elytris striatis; pedibus antennisque rufis.

#### 25. *Ferrugineus*, der Glattrücken.\*\*)

*Müller* l. c. S. 362. No. 25.

*Fabric.* S. E. p. 244. No. 46.

*Ferrugineus*; elytris striatis, obscurioribus.

*Müller* Faun. Fridr. p. 21. No. 205.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 855.

*Thorace glaberrimo.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 162. *Bupr.* 43. *Le Bupreste fauve.*

*Buprestis ferrugineo-lividus*, elytris punctato-striatis.

*de Geer*

\*) Geflügelt.

\*\*) Geflügelt. Nicht abgebildet.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 101. No. 19. *Carabé fauve.*  
*Alatus* flavo-griseus nitidus; oculis nigris; elytris  
 striatis.

26. *Germanus*, die *Violetspitze*.

Müller I. c. S. 362. No. 26.

Füesslins Verz. S. 19. No. 376.

Schaeff. Icon. t. 31. f. 13.

27. *Vulgaris*, der *gemeine Laufkäfer*.\*)

Müller I. c. S. 362. No. 27. der *Pöbelkäfer*.

Füesslins Verz. S. 19. No. 377.

Olaffs Reis. durch Isl. I. p. 319. *Färnsmidur*.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 622. der *schwarze auf Kupfer stechende Erdkäfer mit schwarzen Fühlhörnern und Füßen*.

Ast. Nidr. III. p. 24. Uebers. p. 361.

Schaeff. Icon. t. 18. f. 2.

Fabric. S. E. p. 244. No. 42.

Mülleri Faun. Fridr. p. 21. No. 206.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 858.

Niger; *supra* nigro-aeneus; *antennis* basi fulvis; *tibiis* piceis.

*Variat* ater totus; *antennis* basi fulvis; *pedibus* piceis; *hic* iterum *pedibus* totis luteis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 158. Bupr. 33. *Le Bupreste bronzé à deux points enfoncés*.

*Buprestis* fusco-aeneus; *elytris* striatis, punctis duobus impressis.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 97. No. 14. *Carabé vulgaire*.

*Alatus*; *supra* viridi-aeneus, nitidus; *subtus* niger; *pedibus* *antennisque* nigris.

Ss 2

28. *Coeruleus*

\*) Geflügelt.

28. *Coerulescens*, der Blaurücken.*Müller* l. c. S. 362. No. 28.*Füeßlins Verz.* S. 19. No. 378. der Bläuling.

*Onomat. hist. nat.* P. 2. pag. 624. der kupferfarbige Erdkäfer mit sechs vertieften Punkten auf den Flügeldecken und rothen Füßen.

*Act. Vpsal.* 1736. p. 20. No. 8. *Buprestis capite nigro, collari, elytrisque nigro-aeneis.*

*Schaeff. Icon.* t. 18. f. 3. 4.*Fabric.* S. E. p. 243. No. 39.*Nigro-coerulescens; elytris striatis.**Mülleri Faun.* Fridr. p. 21. No. 207.— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 78. No. 838.*Viridi-coeruleus; antennis basi tibiisque rufis.*29. *Cupreus*, der Kupferrücken.\*)*Müller* l. c. S. 363. No. 29.*Füeßlins Verz.* S. 19. No. 379. der Kupferfarbige.*Mülleri Faun.* Fridr. p. 21. No. 208.— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 76. No. 815.*Niger, supra aeneus; antennis basi rubris.*

*Variat* punctis tribus in elytro singulo inter striam secundam et tertiam impressis; *alia* varietas puncto unico in secunda stria.

*Fabric.* S. E. p. 243. No. 40.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 161. *Bupr.* 40. Le *Bupreste perroquet*. (teste *Fabric.*)

*Totus viridi cupreus; antennis nigris.*

— — — p. 160. No. 36. Le *Bupreste rossette* (all. *de Geer*).

*Infra niger; supra nigro-aeneus, thorace lato.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 97. No. 13. t. 3. f. 15. *Carabé rossette.*

*Alatus,*

\* ) Geflügelt.

*Alatus*, supra viridi-aeneus; subtus niger; antennis basi rufis.

30. *Piceus*, der *Pechrücke*.\*)

*Müller* l. c. S. 363. No. 30.

*Fabric.* S. E. p. 241. No. 29.

*Thorace* obcordato; *antennis tibiisque piceis*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 21. No. 209.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 818.

*Schaeff.* Icon. t. 18. f. 9.

31. *Velox*, der *Strandjäger*.\*\*) )

*Müller* l. c. S. 363. No. 31.

*Fabric.* S. E. p. 247. No. 57.

Nigricans; *antennis pedibusque pallidis; elytris obtusissimis*.

32. *Multipunctatus*, der *Vielpunkt*.†)

*Müller* l. c. S. 363. No. 32. der *Punktträger*.

*Fabric.* S. E. p. 245. No. 48.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 853.

Nigro-aeneus; *elytris punctis impressis inaequalibus*.

33. *2-punctatus*, der *Zweypunkt*.††)

*Müller* l. c. S. 363. No. 33. der *Druckpunkt*.

*Fabric.* S. E. p. 249. No. 69.

Aeneus; *antennis nigris; tibiis pallidis*.

34. *4-pustulatus*, die *Vierblätter*.†††)

*Müller* l. c. S. 364. No. 34. die *Gelbblätter*.

Ss 3 . . . . . 35. 6-pun-

\*) Ungeflügelt.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

†††) Nicht abgebildet.

35. *b-punctatus*, der Sechspunkt.\*)*Müller l. c. S. 364. No. 35. der Langpunkt.**Füesslins Verz. S. 19. No. 380. der Sechspunkt.**Onomat. hist. nat. P. 2. p. 622. der goldglänzende Erdkäfer mit himmelblauem Kopf und Brust, und purpurfarbenen Flügeldecken.**Act. Vpsal. 1736. pag. 20. No. 6. *Buprestis capite collarique coeruleo; elytris rubro-aeneis.***Schaeff. Icon. t. 66. f. 4.**Mülleri Faun. Fridr. p. 21. No. 210.**Fabric. S. E. p. 245. No. 30.**Capite, thoraceque viridibus; elytris cupreis.**Bauhon, ballon. p. 212. f. 4. CANTHARIS auricolor.**Geoffr. Inf. Tom. I. p. 149. *Bupr.* 14. Le Bupreste à étuis cuivreux.***Buprestis nitens; capite thoraceque viridi; elytris cupreis punctulis duodecim.***de Geer Inf. Tom. IV, p. 99. No. 16. Carabé à six points.***Alatus; capite thoraceque viridi-aureis; elytris rubro-aeneis: punctis sex impressis.**36. *Meridianus*, der Mittagskäfer.\*\*)*Müller l. c. S. 364. No. 36. der Meridian.**Fabric. S. E. p. 247. No. 62.**Müller Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 836.**Niger; elytrorum basi, sutura, pedibusque testaceis.*37. *Testaceus*, der muschelbraune Laufkäfer.†)*Müller l. c. S. 365. No. 37. der Glattflügel.**Onomat.**\*) Gefügelte.**\*\*) Nicht abgebildet.**†) Nicht abgebildet.*

*Onomat. hist. nat. P. 2. p. 623.* der bleiche muschelfarbige Erdkäfer mit klebrichten Flügeldecken.

*Fabric. S. E. p. 248.* No. 68.

*Capite thorace que ferrugineis, elytris testaceis.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 153.* No. 25. Le Bupreste fauve à tête noire.

*Testaceus; capite nigro.*

38. *Vstulatus*, der Brandflügel.\*)

*Müller l. c. S. 365.* No. 38.

*Onomat. hist. nat. P. 2. p. 619.* der schwarze Erdkäfer mit einem ablangen eisenfarbigen Flecken hinten an den Flügeldecken, und auf beyden Seiten.

*Fabric. S. E. p. 248.* No. 66.

*Thorace nigro; elytris obscuris, pallido-bifasciatis.*

*Müllerl Zool. Dan. Prodr. p. 78.* No. 844.

*Niger; elytris fuscis; maculis quatuor, pedibusque flavis.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 151.* *Bupr. 20.* Le Bupreste quadrille à corcelet rond et etuis striés.

*Niger; thorace ovato, nigro, elytris striatis; maculis quatuor lividis.*

39. *Crux major*, der große Kreuzkäfer.

*Müller l. c. S. 365.* No. 39. der Großkreuz.

*Füsslins Verz. S. 19.* No. 381. Großkreuz.

*Neuer Schauplatz der Nat. 2. B. S. 247.*

*Fabric. S. E. p. 246.* No. 55.

*Thorace orbiculato, rubro; coleoptris truncatis, rubris; cruce nigra.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 150.* *Bupr. 18.* Le Chevalier rouge.

Ss 4

Niger;

\*) Nicht abgebildet.

Niger; *thorace* pedibusque rubris, *elytris* rubris;  
*cruce nigra.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 79. No. 861.

Niger, pubescens, *maculis elytrorum quatuor* fulvis.

40. *Crux minor*, der kleine Kreuzkäfer.

*Müller l. c. S. 366. No. 40.* der Kleinkreuz.

*Füesslins Verz. S. 19. 382. Kleinkreuz.*

*Sulzers Gesch.* S. 63. t. 7. f. 6.

*Schaeff. Icon.* t. 18. f. 8. t. 41. f. 13, 14.

*Fabric. S. E. p. 246. No. 56.*

*Thorace* orbiculato, rufo; *coleoptris* apice nigris;  
*macula rufa.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 76. No. 813.

Niger, glaber; *thorace*, *pedibus* *elytrorumque* *basi*  
*et apice* *luteo-rufis.*

41. *4-maculatus*, der Vierfleck.

*Müller l. c. S. 366. No. 41.* die Weißblätter.

*Pontopp. N. G. v. D. p. 210.*

— — Atl. Dan. I. t. 29.

*Fabric. S. E. p. 248. No. 64.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 75. No. 811.

Luteus; *thorace* rufo; *elytris* elongatis, testaceis;  
*maculis* *quatuor* *albis.*

*Geoffr. Inf. Toin. I. p. 152. Bupr. 21. Le Bupreste*  
*quadrille à corcelet plat, et étuis lisses.*

Niger; *thorace* *plano ferrugineo*, *elytris* *laevibus*;  
*maculis* *quatuor* *lividis.*

42. *Atricapillus*, das Schwarzköpfchen.\*)

*Müller l. c. S. 367. No. 42.*

*Fabric.*

\*) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 248. No. 67.

*Thorace rotundato, rufo; elytris obtusis, testaceis,  
capite atro.*

43. *Truncatellus*, der *Stutzflügel.*\*)

*Müller l. c. S. 367. No. 43.*

### *Unabgebildete Laufkäfer.*

#### I. Klasse.

I. No. 10. *10-guttatus.*

#### II. Klasse.

1. No. 13. *Buprestoides.*
2. No. 14. *Fastigiatus.*
3. No. 15. *Lividus.*
4. No. 17. *Complanatus.*
5. No. 20. *Spinipes.*
6. No. 22. *Melanocephalus.*
7. No. 23. *Vaporariorum.*
8. No. 25. *Ferrugineus.*
9. No. 31. *Velox.*
10. No. 32. *Multipunctatus.*
11. No. 33. *2-punctatus.*
12. No. 34. *4-pustulatus.*
13. No. 36. *Meridianus.*
14. No. 37. *Testaceus.*
15. No. 42. *Atricapillus.*
16. No. 43. *Truncatellus.*

S & 5

*Neue*

\*) Nicht abgebildet.

## NEUE LAUFKAEFERARTEN.

## I. Große.

1. *Intricatus*, der Laufkäfer mit verwickelten Streifen auf den Flügeldecken.\*)

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 217. No. 780.

Violaceo-niger; *elytris intricatis elevato-striatis punctatisque*.

Pontopp. N. G. v. D. p. 210. No. 10. t. 16.

— — Atl. Dan. I. t. 29.

Müller i Zool. Dan. Prodr. p. 75. N. 804.

*Elytris intricato-striatis punctatisque*.

In Syst. Linn. deest.

2. *Punctato-fulcatus*, die Punktfurche.

Müller l. c. S. 357. unter No. 12. t. 7. f. 14.

*Thorace rubro-cupreo; elytris viridibus, punctato-viridi-nitentibus sulcis. Variatio Sycophantae.*

3. *Nemoralis*, der Waldlaufkäfer.

Müller i Faun. Fridr. p. 21. No. 211.

*Elytris aeneis; lineolis intricatis subrugosis; punctis cavis triplici serie.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 809.

Niger, *elytris aeneis, rugosulis etc.*

4. *Serrator*, der Kahirische Zahnrund.

Forskahl Descript. Animal. p. 77. No. 4. *Magnus; apterus.*

*Coleoptris ovatis, subplanis, pone truncatis, nigris; maculis inaequalibus albis.*

In

\*) Skop. No. 264. ist ungewiss, ob dieses sein *Catenulatus* sey.

In Desertis Kahirinis rario. Sui generis pulcherrimus. Elytrorum margines subtiliter dentati, qui bus, dum femora postica velocissime affricat, mirum magnumque producit strepitum.

5. *Rubicundus*, der russische Erdkäfer mit röthlichen Flügeldecken.

*Lepesch.* Tageb. II. S. 195. t. 10. f. 1. *russ.* Szeimljánoi Shuk.

*Apterus*, subtus niger; thorace violaceo; elytris rubicundis, futura, atque marginibus albis.

6. *6-guttatus*, der indianische Sechstropf.

*Fabric.* S. E. p. 236. No. 4.

*Apterus*; thorace postice angustato; elytris laevibus, atris, punctis duobus griseis.

7. *4-guttatus*, der kapensische Vier tropf.

*Fabric.* S. E. p. 236. No. 5.

*Apterus*; thorace postice attenuato, elytris sulcatis, atris; maculis duabus griseis remotis.

8. *Tabidus*, der kapensische schäbichte Laufkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 237. No. 6.

*Apterus*; thorace postice angustato, ater; elytris rugoso-sulcatis.

9. *Calidus*, der amerikanische dreyreihiche Goldpunkt.

*Fabric.* S. E. p. 237. No. 8.

*Apterus*; niger, elytris crenato-striatis; punctisque aureis, excavatis, triplici serie.

10. *Retusus*, der patagonische aufgestumpfte Erzpunkt.

*Fabric.* S. E. p. 237. No. 9.

*Apterus; elytris striatis, virescentibus; punctis ae-*  
*neis, excavatis, triplici serie, basi retusis.*

11. *Maderae*, die maderische Stumpfriegeldecke.

*Fabric.* S. E. p. 237. No. 10.

*Apterus; ater; elytris basi retusis.*

12. *Convexus*, der teutsche convexe Laufkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 238. No. 11.

*Apterus; ater, convexus, laevis; thorace postice*  
*emarginato.*

13. *Suturalis*, die Feuerländische Goldnaht.

*Fabric.* S. E. p. 238. No. 13.

*Apterus; elytris striatis, viridibus; sutura aurea.*

14. *Porcatus*, der neuholändische tiefgefurchte Laufkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 239. No. 16.

*Apterus; ater; elytris striatis, apice granulatis.*

15. *Scrutator*, der virginische Spion.

*Fabric.* S. E. p. 239. No. 19.

*Alatus; elytris striatis, viridibus, punctis triplici*  
*serie; thorace cyaneo; margine reflexo, inaurato.*

16. *Catenulatus*, Skopolis Kettenlaufkäfer.

*Scop.* Entom. carn. No. 264.

*Elytrum*

*Elytrum* porcatum; striis tribus punctorum elevatum, (in qualibet 15-16), quibus interjacent tres aliae striae elevatae scabriusculeae.

*Fließlin's Verz.* S. 19. No. 383.

17. *Aeneo-punctatus*, der schwedische Erzpunkt.

de Geer Inf. T. IV. p. 87. No. 1. t. 3. f. 12. *Carabé bronzé à points dorés*.

*Apterus*; supra viridi-aeneus obscurus; subtus niger; *elytris punctis* excavatis aureis, quadruplici ordine; *falcis* elevatis.

## II. Kleine Laufkäfer.

1. *Bimaculatus*, der ostindische Zweyfleck.

Linn. Mant. p. 532.

Niger; fascia communi flava interrupta, *antennis pedibusque testaceis*.

Fabric. S. E. p. 243. No. 36.

Niger; capite; thoraci maculis duabus, *elytrisque punto baseos fascia media ferrugineis*.

Sulzers Gesch. S. 62. t. 7. f. 5. der Zweyfleck.

Müllers Suppl. B. S. 250. 44. der Zweyfleck.

2. *Bimaculatus*, der Degerische Zweyfleck.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 102. No. 20. *Carabé à deux taches jaunes*.

CARABVS (*bimaculatus*) *alatus*, supra niger, subtus flavus; *elytris* maculis binis, *pedibus antennisque flavis*.

An Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 840. C. *bimaculatus*?

Niger; capite, thorace, *elytrisque viridibus*; *macula baseos pedibusque fulvis*.

An

An Scop. Ent. carn. No. 274. *Bimaculatus?*

Niger, villosus; *elytri gutta* baseos palpis, antennis, basi, tibiisque rufis.

3. *Bimaculatus*, der *Müllersche Zweyfleck*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 849.

*Nigro-coeruleus*; *elytris* flavis; *macula* didyma, fuscata.

4. *Minimus*, der *Müllersche kleinste Laufkäfer*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 21. No. 212.

*Thorace* subnigro; *pedibus*, *antennis* *elytrisque* *striatis* fuscis.

In *Herbario* meo; vix *pediculi* magnitudine.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 833.

5. *Dorsalis*, der *dänische Grünfleck*.

*Pontopp.* Atl. D. I. t. 29.

— — N. G. v. D. p. 211. t. 16.

*Br.* Inf. Siae. p. 29.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 846.

*Flavus*; *elytris* *striatis*; capite, thorace, *maculaque* apicis *elytrorum* *viridi*.

6. *4-guttatus*, der *dänische Viertropf*.

*Pontopp.* N. G. v. D. p. 211. t. 16.

*Capite*, *thoraceque* *coeruleo* *nitido*, *pedes* et *basis* *antennarum* *ferruginei*; *elytra* *fusca*, *singula* *maculis* *2* *albis*, *quarum* *vna* *ad* *basin*, *altera* *ad* *apicem*.

7. *Marginatus*, der *Interische gerändelte Laufkäfer*.

*Pallas* Reis. I. App. No. 39.

Inter

*Inter mediocres major.* Subtus ater; *pedibus testaceis*; *supra obscure viridis*; *elytra striata*; *margine laterali griseo-lutescente*. Circa lacum Interiensem.

Müllers Suppl. B. p. 250. t. 45. der Randkäfer.

8. *Pictus*, der gemalte Laufkäfer.

Pallas Reis. I. App. No. 40.

E mediocribus valde *depressus*. *Thorax testaceo-rufus*. *Caput cum antennis testaceum*. *Pedes pallide grisei*; *elytra subtiliter striata-grisea*. — In campis aridissimis sub *cadaveribus* torrefactis.

Müllers Suppl. B. p. 230. t. 46. der Eckfleck.

9. *Sericenus*, der amerikanische grüne Sammetkopf.

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 58. No. 58.

*Alatus ater*; *capite, thorace et elytris viridi-nitentibus*; *antennis pedibusque rufis*.

10. *Lineatus*, der nordamerikanische lineirte Laufkäfer.

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 59. No. 59.

*Niger*, *thorace ferrugineo*; *elytris griseis*, *futurae linea communi*, *alteraque in singuli elytri medio nigra*; *ante apicem desinente*, *pedibus griseis*; *tarsis nigris*.

Fabric. S. E. p. 244. No. 45. *Lineola*.

*Thorace subaequali*, *ferrugineus*; *elytris lineola nigra*. In *America septentrionali*.

11. *Striatulus*, der patagonische Strichlaufkäfer.

Fabric. S. E. p. 240. No. 24.

*Niger*; *thoracis basi vtrinque puncto impresso*; *elytris striatis medio glabris*.

12. *Caliginosus*, der amerikanische düstere Laufkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 240. No. 25.

Ater; thorace quadrato, laevi, antennis piceis.

13. *Arenarius*, der cambrische Sandlaufkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 241. No. 26.

Pallidus; elytris maculis duabus dorsalibus atris.

14. *Bicolor*, der amerikanische Zweyfarbige.

*Fabric.* S. E. p. 241. No. 28.

Supra niger; subtus ferrugineus.

15. *Femoralis*, die afrikanische Rothhüfte.

*Fabric.* S. E. p. 241. No. 30.

Capite thoraceque aeneis; elytris striatis, obscurioribus; femoribus rufis.

16. *Madidus*, der englische gewässerte Laufkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 241. No. 31.

Thorace postice vtrinque impresso, niger; femoribus rufis. Corpus atrum, quasi humore inundatum.

17. *Interruptus*, der morgenländische unterbrochene Laufkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 242. No. 32.

Ater; thorace, postice rotundato, abdomineque remotis.

18. *Spinibarbis*, der englische Dorrrücken.

*Fabric.* S. E. p. 243. No. 37.

Thorace orbiculato, cyaneus; ore antennis tibiisque rufis-dorso spinis ciliato.

19. *Pili-*

19. *Pilicornis*, das *englische Borstenhorn*.

*Fabric.* S. E. p. 243. No. 38.

*Thorace rotundato; elytris striatis punctisque impressis; antennis pilosis.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 147. *Bupr.* 10. Le *Bupreste à six points ensorcés*.

*Nigro-viridis; elytro singulo striis octo, punctis tribus impressis.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 860. *Seticornis*.

*Niger; elytris aeneis striato-punctatis; antennis setiferis.*

20. *Carnifex*, das *Feuerländische Blutmaul*.

*Fabric.* S. E. p. 244. No. 41.

*Alatus, viridi-aeneus; antennis pedibusque rufis; thorace angustato; ore ferrugineo.*

21. *Azureus*, der *leipziger himmelblaue Laufkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 244. No. 43.

*Cyaneus; antennis pedibusque rubris.*

22. *Pallens*, der *dresdner blasse Laufkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 244. No. 47.

*Pallidus; elytris striatis.*

23. *Aeneus*, der *leipziger kupferfarbige Garten-Laufkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 245. No. 48.

*Subaeneus; elytris punctis vagis plurimis impressis.*

24. *Flexuosus*, der *ostindische Eckfleck*.

*Fabric.* S. E. p. 246. No. 54.

*Niger; elytris ferrugineis; macula media sinuata, punctoque apicis, nigris.*

25. *Rufescens*, der *englische Fuchs*.

*Fabric.* S. E. p. 247. No. 58.

*Thorace rotundato, ferrugineus, vertice anoque nigris.*

26. *2-pustulatus*, die *englische Zweyblätter*.

*Fabric.* S. E. p. 247. No. 59.

*Thorace orbiculato; elytrisque nigris; maculis duabus rufis.*

27. *Lunatus*, der *englische Mondfleck*.

*Fabric.* S. E. p. 247. No. 60.

*Thorace orbiculato, rufo; elytris flavis: maculis tribus nigris.*

28. *Comma*, das *amerikanische Comma*.

*Fabric.* S. E. p. 248. No. 63.

*Niger; thorace fusco; elytris griseis; macula linearis nigra.*

29. *4-guttatus*, der *englische Viertropf*.

*Fabric.* S. E. p. 248. No. 65.

*Thorace rotundato, atro; elytris nigris; punctis quatuor albis.*

30. *Sex-pustulatus*, die *ostindische Sechsblätter*.

*Fabric.* S. E. App. p. 825. — 36-37.

*Rufus; elytris nigris; punctis sex rubris.*

31. *Elegans*, der *Skopolische zierliche Laufkäfer*.

*Scop.* Entom. carn. No. 269.

*Thorax longitudine sua elytri latitudinem non superans, pone et antice aequae latus. Pedes rufi; corpus alatum.*

32. *Metallicus*, der metallfarbige Laufkäfer.

*Scop.* Ent. carn. No. 270.

Supra aeneus nitens; thorace lateribus conniventibus, vt in *Scarabaeis*; antennis basi fulvis.

33. *Cordatus*, der Herzchild.

*Scop.* Entom. carn. No. 271.

*Thorax* vere obcordatus.

*Füesslins Verz.* S. 19. No. 384.

34. *Iunceus*, der Binsenlaufkäfer.

*Scop.* Ent. carn. No. 272.

Statura vulgaris, sed *thorax* pone angustior, eodemque modo constructus, vt in *Granulato*.

*Füesslins Verz.* S. 19. No. 385.

35. *Marginatus*, der Braunrand.

*Scop.* Ent. carn. No. 275.

*Caput et thorax* aeneo-viridis coloris; *elytrum* testaceum; margine toto, fasciaque fuscis.

36. *Salicinus*, der Sahlweidenlaufkäfer.

*Scop.* Ent. carn. No. 276.

Niger, punctatus; *elytris* fuscis striatis; antennis pedibusque ferrugineis.

37. *Arenarius*, der Skopolische Sandlaufkäfer.

*Scop.* Ent. carn. No. 277.

Aeneo-fuscus; *thorace* subrotundo, pone dentato; *pedibus* rufis.

*Füesslins Verz.* S. 19. No. 386.

38. *Rufescens*, der kleine Fuchs.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 108. No. 103. Fusco-rufus; parvus; *thorace* rotundato; *elytris* striatis.

39. *Lucidus*, der ungarische glänzende Laufkäfer.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 108. No. 104.*

Niger, nitens, parvus; *elytris pedibusque testaceis.*

40. *Fenestratus*, der Fensterfleck.

*Müller Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 812.*

Niger; *elytris fuscis; maculis obliquis flavis, fenestratis.*

41. *Punctatus*, der punktirte Laufkäfer.

*Müller Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 814.*

Niger; *tibiis tarsisque piceis; elytris punctis impressis, serie flexuosa.*

42. *Rufipes*, der Müllersche Rothfuß.

*Müller Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 816.*

Niger; *elytris aeneis; pedibus antennisque fulvis.*

43. *Virens*, der Grünling.

*Müller Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 817.*

Niger, *supra aeneo-viridis.*

*Schaeff. Icon. t. 18. f. 4.*

44. *Nigricans*, der Schwärzling.

*Müller Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 819.*

Ater; *elytris, antennis, palpis pedibusque piceis.*

45. *Agilis*, der Läufer.

*Müller Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 823.*

Piceus; *capite, thorace elytrisque striatis, nigris.*

*Act. Nidr. IV. 32.*

46. *Coeru-*

46. *Coeruleus*, der *Himmelblaue*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 77. No. 827.

Niger; *elytris cyaneis*; *antennis*, *palpis pedibusque fulvis*.

47. *Similis*, die *gestreifte etwas punktierte Flügeldecke*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 77. No. 828.

Niger; thorace postice vtrinque excavato; *elytrorum striis subpunctatis*.

48. *Obscurus*, der *dunkelbraune Laufkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 77. No. 829.

Niger; *elytris pedibusque obscure testaceis*.

49. *Aestivus*, der *Sommerlaufkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 77. No. 832.

Flavus; *capite ferrugineo*; *thorace elytrisque nigris*.

50. *Flexilis*, der *Gedrehete*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 78. No. 837.

Flavicans; *capite nigro*; *elytris lividis*.

*A&N. Nidr.* IV. 30.

51. *Laevis*, der *Glatte*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 78. No. 841.

Aeneus; *capite thoraceque viridi*; *elytris cupreis absque punctis*; *pedibus piceis*.

52. *6-punctatus*, der *Müllersche Sechspunkt*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 78. No. 842.

Niger; *supra aeneus*; *elytris punctis tribus longitudinaliter impressis*; *pedibus piceis*.

53. *Vernalis*, der Frühlingslanfkäfer.*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 847.Niger; *antennis*, *palpis pedibusque flavis*; *elytris striato-punctatis*.54. *Pullus*, der Bräunling.*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 848.Niger; *elytris striatis*; *pedibus piceis*.55. *Ater*, der ganz Schwarze,*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 851.Niger; *elytris striatis*; *vnguis subferrugineis*.56. *Atro-rufus*, der Schwarzfuchs.*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 857.Ater; *subtus rufus*; *elytris mollibus*.*Act. Nidr.* IV. 31.57. *Oricalcicus*, der Messingglanz.*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 859.Pallide *flavus*; *supra aeneus*.58. *Rufipes*, der Geoffroische Rothfuß.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 146. *Bupr.* 8. *Le Bupreste noir à pattes rougeâtres*.Niger; *elytro singulo striis obso punctatis*; *pedibus ferrugineis*.*Fabric.* S. E. p. 241. No. 27. *Ruficornis*.Ater; *elytris sulcatis*, *laevibus*; *antennis pedibusque rufis*.*Lister Scar. Angl.* 390. 24.*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 843. *Cursor*.Niger; *antennis pedibusque ferrugineis*; *elytris striato-punctatis*.59. *Ruf-*

59. *Ruficornis*, das Müllersche Rothhorn.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 147. *Bupr.* 9. Le *Bupreste noir à pattes jaunes*.

*Niger*; *elytro singulo striis octo laevibus*; *pedibus lividis*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 826.

*Ruficornis*; *niger*, *glaber*; *elytris striatis*; *antennis*, *palpis*, *pedibusque fulvis*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 95. No. 10. *Carabé noir à antennes rousses*.

*Alatus*, *niger*; *antennis rufis*; *pedibus*, *corpore que subtus fusco-castaneis*; *elytris striatis*.

60. *Viridi-punctatus*, der grünpunktirte Laufkäfer.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 147. *Bupr.* 11. Le *Bupreste vert pointillé à huit stries et pattes fauves*.

*Viridis*, *punctatus*; *elytro singulo striis octo*; *pedibus pallidis*.

61. *Viridi-nitidus*, der Grünglanz.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 148. *Bupr.* 12. Le *Bupreste vert lisse, à huit stries et pattes fauves*.

*Elytro singulo striis octo*; *pedibus pallidis*; *punctis tribus impressis*.

62. *Viridi-fulvus*, der Grüngelbe.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 148. *Bupr.* 13. Le *Bupreste à étoiles vertes et bruns*.

*Viridis*; *elytro singulo striis octo*, *pedibus*, *elytro-rumque antica parte et margine fulvis*.

63. *Viridi-cupreus*, der Kupferschild.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 149. Bupr. 15. Le Bupreste à corcelet cuivreux.*

Nitens; capite elytrisque viridibus; thorace cupreo; punctulis duodecim.

64. *Nobilis*, der rare fontainebleauische schwarze Ritter.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 150. Bupr. 17. Le Chevalier noir.*

Niger; thorace atro; elytris rubris, cruce nigra.

65. *Striato-quater-maculatus*, der Vierfleck mit gestreiften Flügeldecken.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 152. Bupr. 22. Le Bupreste quadrille à corcelet plat brun, et étais striés.*

Niger; thorace plane ferrugineo; elytris striatis; maculis quatuor lividis.

66. *Nigro-thoraticus*, der Vierfleck mit schwarzem Halschilde.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 152. Bupr. 23. Le Bupreste quadrille, à corcelet plat et noir, et étais striés.\*)*

Niger; thorace plane nigro; elytris striatis; maculis quatuor lividis.

67. *8-maculatus*, der Achtfleck.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 153. Bupr. 24. Le Bupreste noir à huit taches fauves.*

Niger; elytris striatis; maculis octo lividis.

68. *Minu-*

\*.) Diese beyden No. 65. und 66. sind von des Linn. 4-maculata No. 41. sehr wenig verschieden. Der erste in den gestreiften Decksschilden; der zweete im schwarzen Halskragen.

68. *Minutulus*, der *Geoffroische Kleine*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 153. Bupr. 26. Le Bupreste noir sans stries.*

*Totus niger, laevis.*

69. *4-punctatus*, der *Geoffroische Vierpunkt*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 157. Bupr. 32. Le Bupreste à quatre points enfoncés.*

*Cupreo-viridique variegatus, punctis quatuor impressis; pedibus pallidis.*

70. *Tenebrioides*, der *mehlkäferartige Laufkäfer*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 159. Bupr. 34. Le Bupreste paresseux.*

*Ater; thorace lato; elytrorum striis punctatis.*

71. *Latus*, der *Breitschild*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 159. Bupr. 35. Le Bupreste verdet.*

*Totus viridis; thorace lato.*

72. *Niger*, der *Trauerlaufkäfer*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 160. Bupr. 37. Le Bupreste en deuil.*

*Totus niger; thorace lato laevi; elytrorum striis laevibus.*

*Müller Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 820.*

*Ater; opacus; palpis antennisque fulvis; tibiis tarsisque ferrugineis.*

73. *Nigro-sericeus*, der *schwarze Sammetkäfer*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 160. Bupr. 38. Le Bupreste noir velouté.*

*Ater, subvillosum; antennis pedibusque ferrugineis.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 825.

*Pubescens*, niger, tomentosus; *elytris* striatis; *antennis*, *palpis*, *pedibusque* fulvis.

74. *Fuscipes*, der *Braunfuß*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 161. *Bupr.* 39. *Le Bupreste noir à pattes brunes*.

Ater, laevis; *pedibus* antennarumque basi ferrugineis.\*)

75. *Rufipes*, der *Degeerische Rothfuß*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 96. No. II. *Carabé brun à pattes rouges*.

*Alatus*, fuscus; *elytris* striatis; *corpore* subtus rufescente; *pedibus antennisque* ferrugineis.

*Schaeff.* Icon. t. 18. f. 7.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 830? *Fulvus*, totus flavus, nitidus; *elytris* striatis.

76. *Varius*, die *Buntschecke*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 98. No. 15. *Carabé bronzé*.

*C. aeneus*; *alatus*; *corpore* ovato brevi supra nigro aeneo, subtus nigro; thorace convexo; *elytris* laevibus; *antennis* basi rufis.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 824. *Varius*, niger; *elytris* striatis; *antennis* basi rubris.

77. *4-punctatus*, der *Degeerische Vierpunkt*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 102. No. 21. *Carabé à quatre points*.

*Alatus*, niger nitidus; *elytris* substriatis; *punctis quatuor* impressis.

78. *Pensyl-*

\*) Hier sind die übrigen *neuen Buprestides* des *Geoffr.* nachgeholt worden, wie ich bey den *Cicindelis* versprochen hatte.

78. *Pensylvanicus*, der *pensylvanische rothbraune Laufkäfer*.

de Geer Ins. T. IV. p. 108. exot. No. 4. t. 17. f. 22.  
*Carabé de Pensylvanie.*

*Rufo-fuscus; capite obscuro; antennis, pedibus corporeque subtus testaceis; elytris striatis.*

214. G E S C H L E C H T. *Tenebrio; Mehlkäfer;*  
*Schlupfkäfer.\*)*

Müllers L. N. S. 5. B. 1. Th. S. 367. *Mehlkäfer.*

Börners

\*) Die Larven dieser Käfer halten sich im Mehl, im Holz, und wie die Käfer selbst auch in Löchern der Erde, an dunkeln Orten in Küchen, Kellern, Speisekammern und in Mühlen, in den Beckerhäusern, und besonders im Auskehricht auf. Man darf des Sommers nur in einem düstern Winkel der Hausflur, oder einer Speisekammer, etwa 14 Tage ein Häufchen Kehricht liegen lassen; so findet man gewiss welche darinnen. Die Käfer haben einen schleichenden Gang, und wandeln in der Finsterniss. Man könnte sie füglich auch *Schattenkäfer* nennen.

Verschiedene Schriftsteller haben einige Chrysomelas, Silphas, Carabos und Dermestides *Linn.* zu diesem Geschlecht gerechnet. So ist nach *Fabric.* S. E. p. 117. No. 5. Chrys. *Linn. Sulphurea* des *Geoffr. Tenebria Intea*; Tom. I. pag. 351. No. 11. Eben derselbe p. 94. nennt *Linn. TENEBR. laevigat.* No. 29. *CHRYSOMELAM tenebricosam*. Nach dem *de Geer T. V.* p. 32. ist sein *TENEBRIÖ variolosus* des *Linn. ATTELABVS Ceramboides* p. 621. No. 12. Ferner dessen *TENEBRIÖ rugosus* p. 43. des *Linn. SILPNA rugosa* p. 571. No. 16. Ferner dessen *TENEBRIÖ villosus* p. 44. *Linn. CHRYSOMELA birta* pag. 602. No. 119. Ferner dessen *TENEBRIÖ hirticornis* pag. 47. des *Linn. HISPA muticus* p. 604. No. 4. und *DERMESTES clavicornis* Faun. Suec. ed. 2. No. 413. Ferner dessen *TENEBRIÖ Boleti* p. 49. des *Linn. CHRYSOMELA Boleti* p. 591. No. 36. und des *Geoffr. DIAPERIS* Tom. I. p. 337. No. 1. t. 6. f. 3. Endlich dessen *TENEBRIÖ Surinamenis* p. 54. des *Linn. DERMESTES Surinamenis* p. 565. No. 29.

*Börners Samml. etc.* I. S. 477. *Mehlkäfer.*

*Eberhards Thiergesch.* S. 197. *Mehlkäfer.*

*Beckmanns Anfangsgr.* der N. H. S. 95. gen. II.

### *Hauschabe.*

*Hanous Seltenh.* der N. I. S. 341. No. 2.

*Sulzers Kennz.* S. 91. *Hauschabe.*

— — Gesch. S. 63. *Schlupf-Schliefkäfer:*

*Pontopp.* N. G. v. D. p. 211.

*Füeßlins Verz. schweiz.* Inf. S. 19. *Schlupfkäfer.*

*Lessers Theol.* der Inf. p. 109. f. *Mehlkäfer* p. 89. 283.

*Brünnichii Entom.* p. 49. *Tenebrio;* dän. *Skrubbe.*

*Comment. Lips.* Dec. I. Vol. V. p. 608.

*Schwenkfeld Theriotr.* Silef. p. 555. *Scarabaeoli pistinarii;* *Mehlkäfer;* *Mühlkäfer.* *Hesych.* Mylakrides, Mylakriae; *Diosc.* Silph. artokopeíoon.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 224.

*Scop.* Entom. carn. p. 81.

— Ann. 5. hist. nat. p. 108.

*Bomar.* Dict. des Anim. XI. 218.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 74.

*Fabric.* S. E. p. 249. *Scarites;* p. 250. *Sepidium;* p. 251. *Pimelia;* p. 253. *Scaurus;* p. 254. *Blaps;* p. 255. *Tenebrio;* p. 257. *Helops;* p. 258. *Erodius.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 345. *Tenebrion.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. préf. XI. No. 57. Tom. V. p. 29. Des *Tenebrions.*

*Jonston* hist. nat. Inf. p. III. t. 16.

*BLATT A mollis, molendinaria, foetida.* (*Molitor et mortifag.* Linn.)

### I. Geflügelte.

1. *Gigas*, der *surinamische Riese.*

*Müller* l. c. S. 368. No. 1.

*Sulzers Gesch.* S. 64. t. 7. f. 7. der *Bergriesse.*

2. *Moli-*

2. *Molitor*, der europäische Müllerkäfer.\*)

Müller l. c. S. 368. t. 8. f. 1. 2.

Füesslin's Verz. S. 19. No. 387. der Müller.

Börniers Samml. I. pag. 478. In den Häusern der Becker und Müller.

Frisch Inf. 3. Th. S. 1. t. 1. Von dem gelben Mehlwurm und dem schwarzen Käfer daraus.\*\*)

Sulzers Gesch. S. 63. der Müller.

Pontopp. N. G. v. D. S. 211. Bilde.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 45. *Attelabus ater*, oblongus depresso, die schwarze Pfützenwanze.†)Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 547. *Mordella antennarum* etc.

Schwenkfeld Theriotr. Siles. p. 513. *BLATTA frumentacea*; *Sitophagus*, *Blatta mollis* Dalechamp. Ein Mehlwurm. In *pistrinis* et apud *pistores* in *fariua*. *Luscinae* has *avidissime* legunt, quibus facile capiuntur. *A morbis familiaribus* eas liberant.

Schaeff. Icon. t. 66. f. 1. (teste Fabric. Füesslin et de Geer).††)

Fabric. S. E. p. 255. *Tenebrio* 2.Oblongus, piceus; *elytris* striatis.

Raj.

\*) Schwenkfeld wusste schon, dass die Larven dieses Käfers ein Leckerbissen der Nachtigallen wären, und dass sie solche, wie die Hühner die Spinnen, um sich von gewissen Krankheiten zu kuriren, überaus gern frässen.

\*\*) Linné hat Frischens 4. Th. und Geoffr. I. p. 34. t. 6. unrichtig angeführt. Im letztern muss es pag. 349. No. 6. heißen. Ich habe angemerkt, dass alle Linn. Druckfehler und Unrichtigkeiten in Fabric. S. E. stehen geblieben.

†) Im 2ten Theile der Onomat. hist. nat. heißen die *Mordellae* noch Pfützenwanzen.

††) Nach Müller's Zool. Dan. Prodr. pag. 74. No. 792. ist dieser Schäffersche *Ten. culinaris* Linn. No. 5.

*Raj.* Inf. p. 4. *Larva.* Vermis farinarius.

*Müller* Faun. Fridr. p. 21. No. 213. *Totus niger.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 794.

Ater; *elytris* punctis distantibus striatis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. pag. 349. No. 6. Le *Tenebrion à neuf stries lisses.*

Atra, oblonga; *elytris* striis novem laevibus.

de Geer Inf. Tom. V. p. 34. No. 3. t. 2. f. 4. *Tenebrion de la farine.*

*Alatus,* nigro-fuscus, *subtus* castaneus; *corpo* oblongo; *elytris* striatis.

### 3. *Chalybeus*, der guineische Stahlmehlkäfer.

*Müller* l. c. S. 369. No. 3. der guineische Stahlkäfer.

*Fabrit.* S. E. p. 255. *Tenebrio* 3.

de Geer Inf. Tom. V. p. 53. exot. No. 4. t. 13. f. 11.

*Tenebrion verd-cuivreux.*

*Aeneus;* alatus, niger; *elytris* striato-punctatis, aeneis, coeruleoscentibus.

### 4. *Mauritanicus*, der algierische Zahnschild.

*Müller* l. c. S. 369. No. 4.

de Geer Inf. Tom. V. p. 52. exot. No. 2. t. 13. f. 9.

*Tenebrion maure.*

*Alatus,* nigro-fuscus nitidus; *elytris* punctato-striatis; *thoracis* marginibus antice posticeque, dente angulatis.

### 5. *Culinaris*, der Küchengaßt.

*Müller* l. c. S. 370. No. 5.

*Füesslins* Verz. schweiz. Inf. S. 19. No. 389. der Küchengaßt.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 546. *Mordella ferrugineo-rufa* etc.

*Müller*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 74. No. 792.

*Oblongus, ferrugineus; elytris striatis.* \*)

6. *Barbarus*, der afrikanische Tellerschild. \*\*)

*Müller l. c. S. 370.* der Afrikaner.

7. *Fosfor*, der Sandgräber.

*Müller l. c. S. 370. No. 7.* der Hügelgräber.

*Füesslins Verz. S. 19. No. 390.* der Gräber.

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 962.* *Fosfor* (*Tenebrio*)  
der Schattenkäfer mit gespaltten Pfoten.

*Fabric. S. E. p. 249.* *Scarites* 3. *Arenarius*.

*Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 543.* *Mordella rufa*,  
tibiis anticis dentatis.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 74. No. 793. Niger,  
antennis pedibusque rufis.

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 350.* No. 1. t. 13. f. 1. 2.

*Attelabe laboureur.*

ATTELABVS (*Fosfor*), niger nitidus; *elytris* sul-  
catis; *tibiis* anticis palmato-spinosis. †)

### 8. Cur-

\*) Derselbe hat No. 797. noch einen *Cutinarem* angeführt: Fer-  
rugineus; *elytris* striatis. Vermuthlich nur eine Abänderung  
des ersten. Nach ihm ist dies der Schäffersche Icon. t. 66. f. 1.  
und nicht *Molitor* No. 2. Mithin ist dieser auch abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Der Herr *de Geer* hat l. c. bewiesen, dass er nicht unter die  
*Tenebriones*, sondern *Attelabos* gehöre.

Bey dem *Geoffr. Inf. T. I.* p. 347. No. 2. t. 6. f. 6. kommt  
auch ein *Sabulosus* vor, der aber ungeflügelt ist, und dieser  
wohl nicht seyn mögte. S. unter den neuen 2. Kl. No. 14.  
3. Kl. No. 1.

8. *Cursor*, der *Stubenläufer*.<sup>\*)</sup>*Müller* l. c. S. 370. No. 8.*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 531. *Cursor* (*Tenebrio*) der *Läufer*.*Fabric.* S. E. p. 249. *Scarites* 4.*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 798.*Fucus*; *thorace* oblongo, *tricarinato*, *rugoſo*, *vtrinque denticulato*; *elytris* *substriatis*.9. *Erraticus*, der *Schwärmer*.<sup>\*\*)</sup>*Müller* l. c. S. 371. der *Streifer*.10. *Pallens*, der *muschelfahle mit schwarzen Augen*.<sup>\*\*\*)</sup>*Müller* l. c. S. 371. No. 10. *Blaßrücken*.*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 531.*Carabus pallide testaceus*, *oculis nigris*.11. *Depressus*, die *schwedische Plattbrust*.<sup>†)</sup>*Müller* l. c. S. 371. No. 11. die *Plattbrust*.12. *Minutus*, das *upsalische kleine Mehlkäferchen*.<sup>††)</sup>*Müller* l. c. S. 371. No. 12. die *Mignatur*.*Fabric.* S. E. p. 250. *Scarites* 6.*Clavicornis*, *piceus*; *antennis clavatis*.13. *Quisquilius*, der *Kehrichtkäfer*.<sup>†††)</sup>*Müller* l. c. S. 372. das *Rostmaul*.*Fabric.* S. E. p. 238. *Helops* 8.*Niger*; *antennis pedibusque ferrugineis*.II. *unge*<sup>\*)</sup> Nicht abgebildet.<sup>\*\*) Nicht abgebildet.</sup><sup>\*\*\*) Nicht abgebildet.</sup><sup>†) Nicht abgebildet.</sup><sup>††) Nicht abgebildet.</sup><sup>†††) Nicht abgebildet.</sup>

II. *Ungeflügelte.*

14. *Gigas*, der *spanische Riese*.

Müller l. c. S. 372. No. 14.

Sulzers Gesch. S. 64. t. 7. f. 9. der *spanische Riese*.

Fabric. S. E. p. 254. *Blaps* 1.

Nigra; thorace rotundato; elytris laevibus, obtusis.

15. *Mortisagus*, der *Todtenprophet*.\*)

Müller l. c. S. 372. No. 15. t. 8. f. 3. der *Stinker*.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 332. der *Stinker*.

Sulzers Kennz. t. 7. f. 52. (all. *Füeßlin*, also nicht nach dem LINN. *Molitor*.)

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 216. BLATTA foetida, die *Häuschabe*.

Frisch Inf. XIII. p. 27. No. 29. t. 25. der *schwarze stinkende Erd- und Mistkäfer*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 822. Suec. Skrobbæ.

It. Oel. p. 62. *Tenebrio primus*.

Schaeff. Elem. t. 124. f. 1. *Tenebrio*, *Mehlkäfer*.

— — — Icon. t. 37. f. 6. (alleg. *Füeßlin*, Fabric. et de Geer).

— — — t. 60. f. 13. (cit. Fabric. et Müllero).

Dal. pharm. p. 91. *Blatta officinarum*.

Lift. loqu. p. 388. No. 21. *Scarabaeus e toto niger, minime nitens, foetidus?*

Raj. Inf. 90. No. 12. *Scarabaeus major, totus niger; abdomine longo; elytris veluti caudatis*.

Schwenkfeld Theriotr. Silef. p. 513. *Blattæ foetidae; Silpha foetens*, σπονδύλη, Nonn. *Erdschaben*.

Insectum odore invisum, acuta clune, Cimicum modo putidum —

Fabric.

\*) Forstähl Descr. Animal. p. 79. No. 10. frägt bey seinem *Polychrestus*: An *mortisagus*? S. unter den neuen 2. Kl. No. 9.

*Fabric. S. E.* p. 254. *Blaps* 3.

*Atra; coleoptris mucronatis, laevibus.*

*Poda* Mus. graec. p. 47.

*Scop.* Entom. carn. No. 252.

*Niger, apterus; elytris latere inflexis et abdomen itidem tegentibus, acuminatis; acumine trigono.*

*Müller's Faun. Fridt.* p. 21. No. 214.

*Apterus; coleoptris mucronatis.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 799.

*Niger; elytris punctatis, apice mucronatis.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 346. No. 1. Le *Tenebrion lisse à prolongement.**

*Atra, aptera; coleoptris laevibus, pone acuminatis.*  
*de Geer Inf. Tom. V. p. 31. No. 1. *Tenebrion à etuis en pointe.**

*Acuminatus, apterus, coleoptris pone acuminatis.*

16. *Grossus*, der afrikanische dicke genervte Mehlkäfer.\*)

*Müller* l. c. S. 373. No. 16. der *Nervenschild.*

17. *Muricatus*, der spanische Stachelschild.\*\*)

*Müller* l. c. S. 373. No. 17. der *Stachelschild.*

*Fabric. S. E.* p. 251. *Pimelia* 4.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 352.?* (all. *Fabric.*). Le *Tenebrion canelé.*

*Atra; aptera, rotundata; elytris sulcis tribus elevatis.*

18. *Gibbus,*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet. Forstähl Descr. Animal. pag. 80. No. 12. frägt bey seinem *Alexandrinus*: An *muricatus* Linn.? S. unter den *ninen* 2. Kl. No. 11.

18. *Gibbus*, der höckrige Mehlkäfer.

Müller l. c. S. 373. No. 18.

Fabric. S. E. pag. 240. No. 22. CARABVS cephalotes. β.

Scop. Ent. carn. No. 253. *Ventrifusus*.

Nigricans; apterus; elytris apice deflexis connatis; abdomine ovato, turgido.

Parum differt a Linn. *gibbo*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 800.

de Geer Ins. Tom. IV. p. 51. exot. No. 1. t. 13. f. 8.

*Tenebrium convexe*.*Apterus niger laevissimus; thorace orbiculato; elytrisque valde elevatis convexis.*19. *Coeruleus*, der himmelblaue Mehlkäfer.

Müller l. c. S. 373. No. 19. der Blauling.

Fabric. S. E. p. 257. *Helops* I.— — *elytris striatis*.20. *Rofratus*, der Geschnäbelte.\*)

Müller l. c. S. 373. No. 20. der Schnabelbohrer.

Fabric. S. E. p. 240. No. 21.

CARABVS apterus; elytris laevibus, nigris; thorace angustiori; capite angustissimo.

*Elytra deflexa*, vti in *Tenebriónibus*.21. *Collaris*, der afrikanische Dickhals.\*\*)

Müller l. c. S. 373. No. 21. der Dickhals.

Fabric. S. E. p. 252. *Pimelia* II.

Nigra; elytris laevibus etc.

Vv 2

22. *Angu-*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

22. *Angulatus*, der aegyptische gewinkelte Mehlkäfer.\*)

Müller l. c. S. 374. No. 22. die Eckfläche.

An Fabricii S. E. p. 252. *Pimelia* 6 *angulata*?

*Elytris* spinosis; *linea* elevata laterali, *serrata*.

Lepechins Tageb. I. pag. 262. h. T E N E B R I O  
angulatus, die viereckigte Hauschabe am Ufer des Lawla.

23. *Linearis*, der schwedische schmale Mehlkäfer.\*\*)

Müller l. c. S. 374. No. 23. die Linie.

24. *Spinosus*, die Stachelbrust.†)

Müller l. c. S. 374. No. 24.

Fabric. S. E. p. 252. *Pimelia* 8.

*Thorace* marginato; *marginibus* antice posticeque  
*spinosis*; *elytris* striis elevatis, laevibus.

25. *Caraboides*, der laufkäferartige Mehlkäfer.

Müller l. c. S. 374. No. 25. der Bastardkäfer.

Füeßlins Verz. S. 20. No. 394.

Sulzers Kennz. t. 7. f. 53. *Talpa* (all. Füeßl.)

Frisch Inf. XIII. p. 25. No. 26. t. 22. der schwarze  
Erdkäfer mit dem herzförmigen Halschild. (alleg.  
Geoffr. I. pag. 265. No. 19. et Linn. Faun. Suec. ed. 2.  
No. 825.)

Schaeff. Elem. t. 1. f. 6. (all. Füeßl.)

Fabric. S. E. p. 256. *Tenebrio* 8.

— — *elytris* striatis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 64. No. 5. (all. Fabric.)

*Platycerus* fuscus; *elytris* striatis.

Geoffr.

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

† ) Nicht abgebildet.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 265. Chrysomela* 19. *La Chrysomèle à un seul étui.*

Atro-purpurea; elytris coadunatis; alis nullis.\*)

*Müller Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 801.*

*de Geer Inf. Tom. IV. p. 97. No. 7. t. 3. f. 13. Carabé noir à etuis collés.*

*CARABVS coadunatus, apterus, niger totus; corpore ovato brevi; elytris coadunatis scabriusculis.*

26. *Silphoides*, der *todtengräberartige mauritanische Mehlkäfer.*\*\*)

*Müller l. c. S. 375. No. 26. der Bastardtodtengräber.*

27. *Rugosus*, der *Runzelschild.*\*\*\*)

*Müller l. c. S. 375. No. 27.*

28. *Variabilis*, der *französische Hochpunkt.*†)

*Müller l. c. S. 375. No. 28. der Hochpunkt.*

29. *Laevigatus*, der *afrikanische Glattschild.*††)

*Müller l. c. S. 376. No. 29. der Glattschild.*

Vv 3 Fabric.

\* ) *Geoffr.* hat selbst bey dieser seiner *Chrysom.* 19. *Linn. Faun. Suec.* ed. 1. No. 595. (die der Ritter hier bey dem *Caraboides* citirt), ingleichen *Frisch* 13. p. 25, t. 22. angeführt. *Fabric.* aber S. E. p. 94. glaubt: es sey diese *Geoffr. Chrysomèle* des *LINN.* *Tenebrio laevigatus* No. 29. den er l. c. *CHRYSMELA* *tenebricosam* nennt. Der Leser kann sich doch nun einigermaßen in dieser Verwirrung finden.

†) *Forskahl Descr. Anim.* p. 79. No. 7. frägt bey seinem *Tenebr. laevis*: An *Caraboides*? S. unter den *nenen 2.* Kl. No. 6.

\*\*) *Nicht abgebildet.*

\*\*\*) *Nicht abgebildet.* S. unter den *neuen 3.* Kl. No. 10.

†) *Nicht abgebildet.* ††) *Nicht abgebildet.*

*Fabric.* S. E. p. 94. *Chrysomela* I.

*Tenebricosa*, ovata, aptera, atra; antennis pedibusque violaceis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 265. No. 19. (alleg. *Fabric.* v. *Linn.* T. *carab.* No. 25.)

30. *Latipes*, der afrikanische Breitfuß.\*)

*Müller* l. c. S. 376. No. 30. der Breitfuß.

31. *Tibialis*, der afrikanische Plattfuß.\*\*)

*Müller* l. c. S. 376. No. 31. der Plattfuß.

32. *Femoralis*, der Dickschenkel.†)

*Müller* l. c. S. 376. No. 32.

33. *Striatulus*, die spanische Strichdecke.††.

*Müller* l. c. S. 377. No. 33. die Strichdecke.

### I. Geflügelte unabgebildete.

1. No. 6. *Barbarus*.

2. No. 8. *Cursor*.

3. No. 9. *Erraticus*.

4. No. 10. *Pallens*.

5. No. 11. *Depressus*.

6. No. 12. *Minutus*.

7. No. 13. *Quisquilius*.

### II. Unabgebildete ungeflügelte.

1. No. 16. *Grossus*.

2. No. 17. *Muricatus*.

Vv 3

3. No.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

3. No. 20. *Rofstratus.*
4. No. 21. *Collaris.*
5. No. 22. *Angulatus.*
6. No. 23. *Linearis.*
7. No. 24. *Spinosus.*
8. No. 26. *Silphoides.*
9. No. 27. *Rugosus.*
10. No. 28. *Variabilis.*
11. No. 29. *Laevigatus.*
12. No. 30. *Latipes.*
13. No. 31. *Tibialis.*
14. No. 32. *Femoralis.*
15. No. 33. *Striatulus.*

## NEUE MEHLKÄFERARTEN.

## I. Geflügelte.

I. *Lanipes*, der *Wollfuss*.

*Linn.* Mant. p. 533.

*Alatus*, aeneus; *elytris* subbifido-mucronatis; plan-tis subtus hirsutis.

*Fabric.* S. E. p. 257. *Helops* 2.

*Aeneus*; *elytris striatis*, acuminatis.

*Scop.* Entom. carn. No. 255.

**A E N E V S**, (*apterus*), superne aeneus; *elytris* mu-cronatis, striatis; *manibus mediis* rufo villo barbatis.\*)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. pag. 349. No. 5. *Le Tenebrium bronzeum*.

Nigro-cuprea; *elytro* singulo striis octo; *coleoptris* pone acuminatis.

*Füeßlins Verz.* S. 19. No. 388.

Vv 4 2. *Vir-*

\*) *Skopoli* gibt ihn doch für ungeflügelt aus.

2. *Viridis*, der amerikanische *Drurische Grünling*.

*Drury* Inf. Tom. II. p. 64. t. 34. f. 5.

TENEBRI<sup>O</sup> *femoratus*, *alatus*; *totus viridis*; *capite parvo*, *depresso*, *gibbosō-quadrato*; *elytris laevibus*, *crenatis*; *femoribus crassis*.

*Sulzers Gesch.* S. 64. t. 7. f. 8. der *Grüne*.

3. *Buparius*, (*maxillosus*), der *gibraltarische Schlupfkäfer mit hervorstehenden Kinnladen*.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 61. No. 61.

*Alatus*, *ater*, *glaber*; *thorace lunato*; *maxillis validis*, *dentatis*, *longitudine capitis*.

4. *Tristis*, der *Skopolische Trauerschlupfkäfer*.

*Scop.* Entom. carn. No. 256.

*Alatus*, *niger*, *subopacus*, *totus punctis excavatis variolosus*.

5. *Pomonae*, der *Schlupfkäfer auf den Obstbäumen*.

*Scop.* Ent. carn. No. 257.

*Alatus*, *supra piceus*, *infra niger*; *elytris striatis: striis elevatis quinis*.

*Larvae duo tresve*, *reticulo laxo tectae*, *latent in folio convoluto*.

6. *Capreae*, der *Sahlweidenschlupfkäfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 258.

*Alatus*, *testaceo thorace et elytris*, *alibi niger*; *thorace punctis impressis*.

*Füeßlins Verz.* S. 19. No. 391.

7. *Flavus*, der gelbe Schlupfkäfer auf den schirmtragenden Pflanzen.

*Scop.* Ent. carn. No. 260.

*Alatus*, totus flavus, oculis nigris.

8. *Boleti*, der Schlupfkäfer auf den Baumschwämmen.\*)

*Scop.* Ent. carn. No. 261.

*Alatus*, ferrugineus; *elytris nigris*; *margine vndeque ferrugineo*.

9. *Aestivus*, der Sommerschlupfkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 795.

*Alatus*, niger; *palpis pedibusque flavis*.

10. *Striatus*, der Strichafteter.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 796.

*Alatus*, niger; *abdomine subtus dense striato*.

11. *Festinans*, der schwedische Flüchtlings.

*Müllers Suppl.* B. p. 252. t. 13. a.

*Magnitudine pediculi*; *alatus*, totus niger, glaber; *thorace ferrugineo Cicindeloïde*; *femoribus clavatis.*\*\*)

12. *Globosus*, die russische Hauschabe mit kuglicher Brust.

*Lepechins* Tageb. II. p. 209. t. II. f. 34.

*Alatus*, ater; *thorace globoſo*, *scabris lineis duabus elevatis*.

Vv 5 13. *Incur-*

\*) Conf. CHRYSOM. Linn. *Boleti* p. 591. No. 36.

\*\*) Linnæus, sagt Herr M. aber wo?

13. *Incurvatus*, die ausgebogene Hauschabe.

*Lepechins* Tageb. II. p. 210. t. II. f. 25.

*Alatus*, totus, piceus; elytris striatis, medio transversaliter impressis.

14. *Arundinaceus*, das *Forskähliche Schlupfkäferchen im Nilrohr*.

*Forskähl* Descr. Anim. etc. p. 78. No. 5. \*) t. 24. f. B.

*Alatus*; obscure ferrugineus, villosus; antennarum tribus extimis articulis orbiculatis, majoribus, pallidioribus.

15. *Laevi-*

\*) Descriptio ope Microscopii facta. Weil die Stelle so wichtige Nachrichten enthält, will ich sie hersetzen:

In Insulis Niloticis *Kahira* reperi initio Iunii 1762 in culmo *Arundinis niloticae*, inter corticem et medullam, farinam nigro-bruneam, in qua paulo profundius *Vermiculi albi* hababant, *Tenebrioni* hujus, sine dubio *Larvae*, et pulveris illius architecti. Quo altius descendebatur, eo durior, pallidior, magisque cohaerens farina inventa est, donec demum in infimo caule manebat medulla adhuc alba et intacta. Haec enim arundo pulpa repletur albida, quae vero jam in summitate culmi, cortice delapso extravasata, arida, sinuosa protumuit. Media pars simili modo exarida vndosis pliis corrugabatur, quarum sinu haerebat ista farina.

Suspicio spicas segetum effici nigras et quasi adustas ejusdem bujus Insecti, vel haud ab simili arrosione; illas quippe agreditur eo tempore, quo in culmo adhuc demersae sunt, vbi plus pabuli invenit, quam in segetibus ipsis, quarum medulla culni parcius est, corticique adhaerent. Fieri ergo potest, ut sementum hac farina, et latente in illa Insectorum progenie inquinatum, terrae dum committitur, noxam lata vicinia diffundat. Si res ita se habeat, animal istud inter nocenissima, et hanc ob causam maxime notanda numerabitur. Minima saeppe Insecta gravissimam inferunt perniciem.

15. *Laevi-otto-striatus*, der glatte Achtstrich.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 348. No. 4.\*). Le *Ténébrion à huit stries lisses*.

Nigro-fusca, ovata; *elytro singulo striis otto laevibus*.

16. *Nigro-laevis*, der Schwarzglatte.

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 351. No. 8. Le *Ténébrion noir lisse*.

Nigra, tota laevis; *coleoptris pone rotundatis*.

17. *Fulvo-villosus*, der Braungelbrauche.

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 351. No. 9. Le *Ténébrion fauve velu*.

Tota ferruginea, *subvillosa*.

18. *Fulvo-laevis*, der Braungelglatte.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 351. No. 10. Le *Ténébrion fauve lisse*.

Tota ferruginea *laevis*.

19. *Lignarius*, der Holzschlupfkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 38. No. 4. t. 2. f. 15.  
*Ténébrion du bois*.

*Alatus*; thorace cavitatibus duabus; *elytris violaceis s. rufis*; *antennis pedibusque ferrugineis*.

20. *Lardarius*, der Speckschlupfkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 45. No. 7. t. 2, f. 25. 26.  
*Ténébrion du lard*.

*Alatus*;

\*) Da Geoffr. ausdrücklich sagt, wenn ein Tenebr. *apterus* ist; so glaub' ich, dass diejenigen, bey denen ers nicht sagt, *geflügelt* sind.

*Alatus*; oblongus flavo-fuscus, oculis nigris; elytris striis punctatis.

21. *Montanus*, der *Bergschlupfkäfer*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 108. No. 102.*

*Totus ater; alatus; elytris opacis.*

II. *Ungeflügelte.*

1. *Vncinus*, der *spanische Hüfthaken*.

*Forsteri nov. sp. Inf. p. 60. No. 60.*

*Apterous*, niger; thorace marginato, subaequali; elytris striato-punctatis, angulatisque; femoribus anticus clavatis, maximis, biuncinatis.

2. *Buprestoides*, der *Skopolische prachtkäferartige Schlupfkäfer*.

*Scop. Entom. carn. No. 254.*

*Apterous*, atro coeruleo-scens, punctatus; capite deflexo; thorace lato, pone rotundato.

3. *Buprestoides Irtinenis*, der *Pallas'sche Flugsand-schlupfkäfer*.

*Pallas Reis. II. App. No. 44.*

Magnit. *Eosforis*, ovalis depresso-ovalis, apterus, ater, glaber; clypeus convexus, utrinque marginatus; elytra connata laevissima; in arenis fluvialibus ad Irtin.

*Müllers Suppl. B. p. 253. t. 35.* der *Erdmehlkäfer*.

4. *Leucogrammus*, die *Weißschrift*.

*Pallas Reis. II. App. No. 43.*

*Apterous*; ater, nitidulus, ovatus, subtus gibbus; forma et magn. Ten. *muricato* simillimus; clypeus punctis prominulis scaberrimus; elytra coalita.

*Müllers Suppl. B. p. 253. t. 34.*

5. *Aegy-*

5. *Aegyptius*, der *aegyptische Stumpfsschild*.

*Forskahl* Descr. Animal. p. 78. No. 6.

*Apterous*; thorace subrotundo, antice et pone truncato; elytris obsolete punctatis; striis tribus elevatis, laevibus dorso planiusculo.

6. *Laevis*, der *alexandrinische glatte Krautschlupfkäfer*.\*)

*Forskahl* Descr. Animal. p. 78. No. 7.

*Apterous*, nitens; thorace suborbiculato, marginato; elytris laevibus marginatis.

7. *Hispidus*, der *kahirische Stachelschlupfkäfer*.\*\*)

*Forskahl* Descr. Animal. p. 79. No. 8.

*Apterous*; totus supra setis hispidus; thorace teretiusculo.

8. *Vulgaris*, der *Feldschwärmer*.

*Forskahl* Descr. Animal. p. 79. No. 9.

*Apterous*; ater; elytris latere carinatis, singulis serie tuberculorum dupli; thorace planiusculo, pone spinoso; margine acuto.

9. *Polychrestus*, der *Arzneischlupfkäfer*.†)

*Forskahl* Descr. Animal. p. 79. No. 10.

*Apterous*; elytris mucronatis, singulis striis novem elevatis.

10. Co-

\*) cf. LINN. *Caraboid.* No. 25.

\*\*) cf. 3. Kl. No. 7.

†) cf. Linn. *mortisagum* No. 15.

Obs. 1) *Foeminae Turcarum liberae atque servientes albae artem saginandi invenerunt in his *Tenebriónibus*; dum tres quovis mane et vespere butyre coctos comedunt simul cum liquamine.*

Obs. 2.)

10. *Cothurnatus*, der Stelzfuß.*Forskål* Descr. Animal. p. 80. No. 11.*Apterus*, niger; *thorace* laevi, vtrinque antice vni-dentato; *elytris* tuberculatis, striis 2. elatis.11. *Alexandrinus*, der alexandrinische Frühlings-schlupfkäfer.\*)*Forskål* Descr. Animal. p. 80. No. 12.Niger; *thorace* spina vtrinque obtusa, antice gibbo supra caput; *coleoptris* obtusis, striis 4 aculeatis.12. *Spinosus*, die Stacheldecke.*Forskål* Descr. Animal. p. 80. No. 13.*Apterus*, niger; *thorace* teretiusculo; *elytris* margine laterali ferratis singulis striis tribus *spinosis*, inter-jectis *tuberculis* acutis.13. *Agricola*, der Ackermann.*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 108. No. 101.Rufescens; *thorace* capiteque nigris.14. *Sabu-*

Obs. 2.) Contra *Aurum dolorem*. *Tenebriones* aliquot coque cum oleo puro: huius 2 aut 3 guttulas auri infunde; prompta medicina, vixque tribus vicibus repetita curat.

Obs. 3.) Contra *Morsum scorpionis*. *Tenebriones* 4 vel 5 vi-vos, hoc enim palmarium est, in aquae copia sufficienti coque operte, spatio  $\frac{1}{3}$  horae. Sic decoctum obtinetur colore rubi-cundo et sapore *Coffeae*. Scorpione laesus bibat scyphulam vnam vel alteram, vulnerique *Tenebrionem dissectum* imponat: praesentissimo auxilio dolor avertitur, qui in his oris intensissi-mus esse solet per 24 horas, postea sponte cessat; rarissime enim *Scorpionis morsus lethalis* est.

\*) cf. LINN. *muricatum* No. 17.

14. *Sabulosus*, der *Sandschlupfkäfer*.\*)

*Geoffr. Ins. Tom. I. p. 347. No. 2. t. 6. f. 6. Le Tenebrio ride.*

*Atra; aptera; coleoptris rugosis, pone acuminatis.*

*Füesslins Verz. S. 20. No. 393.*

15. *Strio-punctatus*, der *Geoffroische Strichpunkt*.

*Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 348. No. 3. Le Tenebrio on à stries jumelles.*

*Nigra; aptera; elytrorum striis octo punctatis per paria dispositis.*

III. *Neue Schlupfkäfer aus Fabric. S. E. wobey aber nicht angegeben ist, ob sie geflügelt, oder ungeflügelt sind.*

1. *Subterraneus*, der *amerikanische Erdwühler*.\*\*) *Scarites 1.*

*Fabric. S. E. p. 249. Scarites 1.*

*Ater; pedibus anticis palmato-digitatis; capite fulcato.*

2. *Cyaneus*, der *neuholländische himmelblaue Schlupfkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 249. Scarites 2.*

*Glaberrimus; antennis pedibusque nigris.*

3. *Arabs*, der *arabische Sägeschild*.

*Fabric. S. E. p. 250. Scarites 5.*

*Niger; thorace serrato; antennis pedibusque testaceis.*

4. *Tricuspidatus*, der *arabische dreygespitzte Brustschild*.

*Fabric.*

\*) cf. LINNÆUS Fosfor. No. 7.

\*\*) Ibid.

*Fabric. S. E. p. 250. Sepidium 1.*

*Thorace tricuspidato; corpore griseo.*

5. *Cristatus*, der *aegyptische Federbuschschild*.

*Fabric. S. E. p. 250. Sepidium 2.*

*Thorace tricuspidato, cristato; corpore variegato.*

6. *Striatus*, die *indianische braunrothe gestreifte Flügeldecke*.

*Fabric. S. E. p. 251. Pimelia 1.*

*Atra, glabra; elytris striis quatuor rufis.*

7. *Hispidus*, der *arabische Stachelschlupfkäfer*. \*)

*Fabric. S. E. p. 251. Pimelia 2.*

*Atra; corpore muricato, hispido.*

8. *Longipes*, der *arabische Langfuß*.

*Fabric. S. E. p. 251. Pimelia 3.*

*Atra; elytris connatis, muricatis, pedibus longioribus.*

9. *Scaber*, die *kapensische Hökerdecke*.

*Fabric. S. E. p. 251. Pimelia 5.*

*Atra; elytris scabris; antennis pedibusque fuscis.*

10. *Rugosus*, die *orientalische Runzeldecke*. \*\*)

*Fabric. S. E. p. 252. Pimelia 7.*

*Thorace scabro; elytris rugosis, antice angustioribus.*

11. *Refle-*

\*) cf. 2. Kl. No. 7.

\*\*) cf. LINN. *rugosus* No. 27.

11. *Reflexus*, der orientalische Schlupfkäfer mit zurückgebogenen Schildrändern.

Fabric. S. E. p. 252. *Pimelia* 9.

*Thorace marginato; marginibus reflexis; elytris muricatis; linea laterali carinata, laevi.*

12. *Carinatus*, der französische Schlupfkäfer mit drey erhabenen Linien auf den Flügeldecken.

Fabric. S. E. p. 252. *Pimelia* 10.

*Nigra; thorace orbiculato; elytris lineis elevatis tribus, laevibus.*

13. *Glaber*, die orientalische Glattdecke.

Fabric. S. E. p. 253. *Pimelia* 12.

*Thorace rotundato; elytris glaberrimis.*

14. *Angustatus*, der orientalische hinten verengte Halschild.

Fabric. S. E. p. 253. *Pimelia* 13.

*Glabra; thorace postice angustato, elytris acuminatis.*

15. *Orbiculatus*, der orientalische Tellerschild.

Fabric. S. E. p. 253. *Pimelia* 14.

*Glabra; thorace orbiculato; elytris acuminatis;*

16. *Atratus*, der aegyptische Mohr.

Fabric. S. E. p. 253. *Scaurus* 1.

*Totus ater; glaber; thorace suborbiculato; plano, punctato; elytris connatis, obtusis, striato-punctatis.*

17. *Sulcatus*, die orientalische gefurchte Flügeldecke.

Fabric. S. E. p. 254. *Blaps* 2.

*Coleoptris mucronatis, sulcatis.*

18. *Excavatus*, der madraspataische Hohlpunkt.

*Fabric.* S. E. p. 254. *Blaps* 4.

*Thorace postice angulato; elytris excavato-punctatis, acutiusculis.*

*Petiv. Gazoph.* t. 92. f. 14.

*Att. Angl.* 271. 861. No. 13.

19. *Serratus*, der afrikanische Sägefuß.

*Fabric.* S. E. p. 255. *Tenebrio* 1.

*Ater, glaber; elytris striatis; tibiis posticis serratis.*

20. *Atratus*, der nordamerikanische Schwärzling.

*Fabric.* S. E. p. 256. *Tenebrio* 4.

*Oblongus, ater; elytris sulcatis, accutiusculis.*

21. *Abbreviatus*, der indianische Hökerkopf.

*Fabric.* S. E. p. 256. *Tenebrio* 5.

*Ovatus, ater; elytris striatis; capite tuberculato.*

22. *Cornutus*, der smirnaische zweygehörnte Hals-schild.

*Fabric.* S. E. p. 256. *Tenebrio* 6.

*Thoracis marginibus crenatis angulisque prominulis; thorace bicorni.*

23. *Sanguinipes*, der neuholändische Rothfuß.

*Fabric.* S. E. p. 256. *Tenebrio* 7.

*Ater; antennis pedibusque sanguineis.*

24. *Serratus*, der englische gezackte Schlupfkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 257. *Helops* 3.

*Niger; digitis ferrugineis, palpis porrectis.*

25. *Eque-*

25. *Eques*, der *brasiliische Ritter*.

*Fabric.* S. E. p. 257. *Helops* 4.

Ater; *elytris* fascia abbreviata, aurea.

26. *Rufipes*, der *neuholländische Rostfuß*.

*Fabric.* S. E. p. 258. *Helops* 5.

Niger; *elytris*, antennis pedibusque ferrugineis.

27. *Luridus*, der *brasiliische Grüngelbliche*.

*Fabric.* S. E. p. 258. *Helops* 6.

Ater; *pedibus* fuscis.

28. *Ater*, der *leipziger ganz schwarze Schlupfkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 258. *Helops* 7.

Ater; *elytris* striatis.

29. *Gaber*, der *kleine schwarze europäische Kehrichtschlupfkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 258. *Helops* 9. *Ater, laevis*.

30. *Gibbus*, der *arabische Buckel*.

*Fabric.* S. E. p. 258. *Erodius* 1.

*Gibbus*, ater; *elytris* lineis elevatis tribus.

31. *Planus*, der *arabische Flache*.

*Fabric.* S. E. p. 259. *Erodius* 2.

Ater; *elytris* linea elevata, vñica.

32. *Minutus*, das *kleine orientalische Schlupfkäferchen*.

*Fabric.* S. E. p. 259. *Erodius* 3.

Ater; *elytris* laevissimis.

215. GESCHLECHT. *Meloë*; der *Afterkäfer*;  
*Maywurmkäfer*.\*)

*Müllers Linn. N. S. 5. B. 1. Th. S. 378. Maykäfer.*  
*holl. Mey-Torr.*

*Börners Samml. I. p. 478. Maywurm.*

*Eberhards Thiergesch. p. 203. §. 230. der Mayen-*  
*wurmkäfer.*

*Beckmanns Anfangsgr. der N. H. p. 95. der May-*  
*wurm.*

*Füeßlins Verz. schweiz. Inf. S. 20. der Afterkäfer.*

*Sulzers Kennz. S. 92. Maywurm.*

— — Gesch. S. 65. der *Mayenkäfer*; *le Proscarabé*.

*Neuer Schauplatz der Natur 3. B. S. 123. der May-*  
*wurm; Meloë.*

*Schäffers weichschaalichter Kronen- und Keulenkäf-*  
*fer. 4. Regensb. 1763. p. 2. Maywurm.*

*Swammerd. B. der N. p. 119. spanische Fliegen oder*  
*Goldkäfer.*

*Onomat. hist. nat. P. 5. p. 148. Meloë.*

*Ionston hist. nat. Inf. p. 99. Proscarabaeus; Pingui-*  
*culus; Anticantharus; Oleocantharus; Meloë; Ver-*  
*mis majalis. Tab. XV.*

*Bomar. Diction. IX. p. 335.*

*Comment. Lipf. Dec. I. Vol. V. p. 608.*

*Cathol. Litt. E. p. 221.*

*Pon-*

\**) Linné* hat dieses Geschlecht von den *Cantharidibus* abgesondert,  
und die eigentlichen *spanischen Fliegen* (*Mel. vesicator.*) dazu  
gerechnet.

Diese Insekten finden sich im Frühjahr auf den Wiesen, und  
im Grase; daher man sie auch *Graskäfer* nennen könnte. Sie  
haben vorzügliche *Arzneykräfte*. Der Name *Maykäfer* ist dem  
*SCARAB.* *Melotontha* gar zu eigen; daher mögte für dieses  
Geschlecht *Maywurmkäfer* oder *Mayling* wohl der bequemste  
seyn.

Pontopp. N. G. v. D. p. 211.

Brünnichii Entom. p. 50. 51. Dän. Oliebille.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 227.

Scop. Entom. carn. p. 59.

— Ann. 5. hist. nat. p. 103.

Fabric. S. E. p. 259. Meloë; p. 260. Lytta; p. 261.

Mylabris; p. 262. Cerocoma.

Mülleri Faun. Fridr. p. 22.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 96.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 339. Cantharis; p. 356. Noxotus; p. 357. Cerocoma; p. 377. Meloë, Proscarabé. de Geer Inf. Tom. V. p. 1. Des Cantharides.

### I. Ungeflügelte mit abgekürzten Flügeldecken.

1. *Proscarabaeus*, der Zwitterkäfer.\*)

Müller I. c. S. 379. No. 1. t. 8. f. 4.

Füsslins Verz. S. 20. N. 395. der Wiesen- und Feld-  
asterkäfer.

Sulzers Kennz. t. 7. f. 54.

— — Gesch. p. 65. t. 7. f. 10. Zwitterkäfer.

Franz von Paula Schrank Beytr. zur N. G. S. 72.

M E L O E *Proscarabaeus*.\*\*)

Schaeff. Elem. t. 82. Mayenwurmkäfer.

Lessers Theol. der Inf. p. 69. a. der Mayling; May-  
käfer; Maywurm; *Proscarabaeus*; *Oleocantharus*;  
p. 283. u. Maywürmer; p. 370. x. *Scarabaeus majalis*,  
*undiosus*.

Derrh. Physicoth. 8. B. 4. Kap. p. 920. No. 8. *Hemi-  
coleopteri*.

Frisch Inf. VI. p. 14. t. 6. f. 5. vom Majenwurm.

Xx 3

Onomat.

\*) Dies ist eigentlich der Alten *Proscarabaeus* und *Anticantharus*.

\*\*) In Ungarn so gross als ein Schröter.

*Onomat. hist. nat.* P. 5. 149. der *Maywurm*; *Maywurmkäfer*; *Scarabé onctueux de Marechauz.*

*Hoefnag.* Inf. 2. t. 9.

*Charlet.* Onom. p. 46. The *Oyl-Beetle, Oyl-Clock.*

*Geoffr. mat. med.* VI. p. 554-557. *Anticantharus.*

*Lift. Goed.* No. 120. *Audax femella; Devoratrix.*

*Schwenfeld Theriotr.* Siles. p. 554. *Scarabaeus unctuosus; Scarabaeus majalis; Cantharis unctuosa;* Ein Schmalzkäfer; Erdkäfer; Meyländer; Mayling; Meyeurin.

*Catholicon E.* pag. 221. *Proscarabaeus; Escarbot; Scarabée onctueux.*

*Poda Mus. graec.* p. 47.

*Fabric.* S. E. p. 259. *Meloë I.*

*Lift. Scar.* anglic. 392. No. 27.

*SCARABAEVS mollis, e nigra viola nitens.*

*Schroed. pharm.* 5. p. 345. *CANTHARVS unctuosus.*

*Müller Faun. Fridr.* p. 22. No. 216.

— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 96. No. 1079. *Dan. Olin-Biller.*

*Proscarabaeus atro-violaceus.*

*Variat elytris rugosulis et absque rugis; capite et thorace plus minus punctatis; thoraceque postice marginato, vel absque margine.*

*Geoffr. Inf. Tom. I.* p. 377. *Meloë I. t. 7. f. 4.* Le *Proscarabé.* — *Scarabé onctueux.*

*de Geer Inf. Tom. V.* p. 3. *Cantharis I. t. f. I. Fominia. Cantharide Proscarabé.*

*CANTHARIS (Proscarabaeus) aptera, violaceo-nigra.*

*Drury Inf. Tom. I. préf.* p. 8. *Oil-Beetle.*

2. *Majalis*, die zweite Art des *Maywurms*, mit röthlichen Ringen.

*Müller l. c. S. 380. No. 2.* der *Maywurm.*

*Füesslius*

Füeßlins Verz. S. 20. No. 396. *Maywurm.*

Pontopp. N. G. v. D. p. 211. t. 16.

— — Atl. Dan. I. t. 29.

Fr. von P. Schrank Beytr. zur N. G. p. 73.

Frisch Inf. VI. p. 14. t. 6. f. 4. Ein *Weiblein von den grünlichen und Goldfarben.*

Schaeff. Icon. t. 3. f. 5. (all. *Füeßl.*)

Fabric. S. E. p. 259. *Meloë* 2.

Mülleri Faun. Fridr. p. 22. No. 215.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1080.

Niger; segmentis abdominis *dorso rubris.*

## II. Geflügelte mit ganzen Deckshilden.

3. *Vesicatorius*, die eigentliche spanische Fliege.\*)

Müller I. c. S. 380. No. 380. t. 8. f. 6. die spanische Fliege; (*Blasenzieher*).

Füeßlins Verz. S. 20. No. 397. die spanische Fliege.

Lessers Theol. der Inf. p. 70. m. spanische Fliegen oder Käfer: CANTHARIDES Aldrovandi; p. 283. d; p. 310. e; p. 379. f; p. 473. ff.

Eberhards Thiergesch. p. 197. §. 221. die sogenannte spanische Fliege; der Pflasterkäfer; *Cantharis*.

Merkliens Thierr. p. 687.

Börners Stadt- und Landwirthsch. II. p. 287.

Preuß. Sammler I. pag. 460. spanische Fliegen in Preußen.

Neuer Schaupl. der Nat. 3. B. p. 123. spanische Fliegen.

Neue Berlin. Mannichfalt. 3. Jahrg. p. 50.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 343. die große spanische Fliege; p. 891. No. 3; p. 937. No. 6; p. 949. No. 2. CANTHARIS officinalis; p. 1509. No. 7. der Laub- und Graskäfer; spanische Fliege.

\*) Der Franzosen *Cantharide*; *Mouche d'Espagne*.

Sulzers Kennz. t. 7. f. 55. *Maywurm.*

Swammerd. B. der N. pag. 119. *spanische Fliegen;*  
*Goldkäfer.*

Charlet. Onomast. p. 47. *spanish Flies.*

Geoffr. mat. med. VI. p. 349-369.

Lemery Mat. Lex. 226.

Bomar. Dict. des An. II. p. 355.

Catholicon. C. p. 71. *Cantharide. vulgo CANTHARIS officinarum; ein kleiner grüner glänzender giftiger Käfer.*

Poda Mus. graec. p. 47.

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 154. *Mouche Cantharide;*  
*Mouche d'Espagne;* *spanische Fliegen;* *spanische Mücken.*

Schwenkfeld Theriotr. Silef. pag. 520. *Cantharis;*  
*Musca viridis Hispanica;* *Eine spanische Mücke;* *Fliege;* *meiländischer Käfer;* *Goldwürmlein.*

Schaeff. Elem. t. 33. *Meloë vesicat.;* *Cantharis;* *Pflasterkäfer.*

— — Icon. t. 47. f. 1.

Müller Faun. Fridr. p. 22. No. 217.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 869.

*CANTHARIS vesicatoria,* *viridissima nitens;* *capite postice gibbo;* *antennis nigris.* *Dan. Spansk.-Fluc.*

Fabric. S. E. p. 260. *Lyssa I.*

*Viridis;* *antennis nigris.*

Commentar. Lips. Dec. I. Vol. V. 607. Suppl. 176.  
V. 425.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 341. No. 1. t. 6. f. 5. *La Cantharide des boutiques.*

*Viridi-aurata;* *antennis nigris.*

de Geer Inf. Tom. IV. p. 12. No. 2. t. 1. f. 9. *Cantharide vesicatoire.*

*CANTHARIS (vescatoria), alata, viridi-aurea*  
*nitidissima;* *antennis nigris.*

*Forstenii*

*Forstenii* disquis. medica, *Cantharidum historiam* naturalem, chemicam et medicam exhibens. Argentor. 8. 1776.

Bernh. *Albini* Diss. de *Cantharidibus*. Francof. 1686.

Ioh. Dan. *Geyeri* Thargelus etc. — discursus de *Cantharidibus c. fig.* Lips. 1687.

de *Muralto* de *Cantharide viridi* χλωροχρύσω. Misc. N. C. Ann. 1683. p. 46.

*Stenzelii* Diss. de *cantharidibus prosperae adversaeque valetudinis auctoribus*; von *spanischen Fliegen*.

4. Witt. 1740.

*Wedelii* Diss. de *Cantharidibus*. Ienae 1717.

*Groenvelt* de tuto *Cantharidum* in medicina usu interno. 8. Lond. 1698.

*Whitaker* Diss. de *Cantharidibus*. Lugd. Bat. 1718.

*Drury* Inf. Tom. I. préf. p. 9.

*Linn.* Amoen. acad. Vol. VI. p. 132.

4. *Syriacus*, die syrische grünlich blaue Flügeldecke.\*)

*Müller* l. c. S. 381. No. 4. der *Syrier*.

*Lepechins* Tageb. I. p. 221. *spanische Fliegen* (*syrische Landsleute*) auf dem *Schlingbaum*. (*Spiraea crenata*.)

5. *Cichorii*, der Zichorienafterkäfer.

*Müller* l. c. S. 381. No. 5. der *Zichorienkäfer*.

*Füßlins* Verz. S. 20. No. 398. *M E L O E fasciatus*, der *bandirte Afterkäfer*.\*\*) fig. I. a, b, c, d, e.

*Sulzers* Gesch. p. 66. t. 7. f. II. der *Zichorienkäfer*; a das *Weibchen*.

Xx 5

*Lepe-*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Diese haben die Alten stets unter *Meloë* verstanden. *Füßlin* selbst hält alle seine Exemplare für einerley Gattung.

*Lepetchin's* Tageb. I. p. 202. die *wegwarten-spanischen Fliegen.*

*Onomat. hist. nat. P. 5.* p. 152.

*Fabric. S. E. p. 261.* *Mylabris* 2.

*Nigra; elytris flavis; fasciis tribus nigris.*

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 103.* No. 83.\*)

*Niger; elytris flavis; apice et fasciis duabus nigris.*

*Gronov. Gazoph. 622.*

*Linn. Amoen. acad. Vol. V. p. 252.* t. 3. f. 188. 5.

— — — — — *Vol. VI. p. 137.* No. 4.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 17.* No. 2. t. 13. f. 2. *Cantharide de la Cichorée.*

*CANTHARIS (Cichorii); alata, nigra, hirsuta;*  
*elytris fasciis tribus transversis flavis; antennis clava-*  
*tis, longitudine thoracis.*

6. *4-punctatus*, der *Vierpunkt.*\*\*)

*Müller l. c. S. 382.* No. 6. der *Mondfleck.*

*Onomat. hist. nat. P. 5.* p. 153.

7. *Capensis*, der *kapensische Sechsleck.*†)

*Müller l. c. S. 382.* No. 7. der *Hottentot.*

*Fabric. S. E. p. 261.* *Mylabris* 3.

8. *Chrysomeloides*, der *surinamische chrysomelen-*  
*artige Ackerkäfer.*††)

*Müller l. c. S. 382.* No. 8. das *Bastardgoldhähnchen.*

9. *Bima-*

\**) Scop.* macht gegen den Linneischen Beysatz in seiner Beschrei-  
bung: *antennis clavatis*, die gegründete Erinnerung: *Antennae*  
*clavatae referunt ad genus Attelabi.* S. unter den *nenen No. 21.*

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

9. *Bimaculatus*, der Zweyfleck.*Müller* l. c. S. 382. No. 9. das *Punktum*.*Onomat. hist. nat.* P. 5. p. 151.*Fabric.* S. E. p. 127. *Apalus* 1.*de Geer* Ins. Tom. 5. p. 23. No. 2. t. 1. f. 18. CAR-  
DINALE à deux points noirs.

*PYROCHROA (bimaculata) nigra, thorace orbiculato depresso; elytris fulvis puncto nigro; anten-  
nis simplicibus.*

10. *Afer*, der afrikanische Rothschild.\*)*Müller* l. c. S. 383. No. 10. der *Barbar*.11. *Algirus*, der *Algierer mit muschelbraunen  
Flügeldecken*.\*\*)*Müller* l. c. S. 383. No. 11. der *Algierer*.*Sulzers Gesch.* p. 66. t. 7. f. 12. der *Algierer*.12. *Schaefferi*, Schäffers weichschaalichter Kronen-  
und Keulenkäfer.*Müller* l. c. S. 383. No. 12. der *Kronenkäfer*.*Füesslins Verz.* S. 20. No. 399. *Schäffers Afterkäfer*.*Schäffers weichschaalige Kronen- und Keulenkäfer*.

1763. (Abh. von Ins. II. 289.)

*Lepechins Tageb.* I. p. 202.*Sulzers Gesch.* pag. 66. t. 7. f. 13. b. c. der *Kolben-  
käfer*.*Onomat. hist. nat.* P. 5. p. 154.*Schaeff. Icon.* t. 53. f. 8. 9.*Fabric.* S. E. p. 262. *Cerocoma* 1.*Geoffr.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) An *Algira Linn.*? frägt *Pallas* in seinen Reisen II. App. No. 51.  
S. unter den *neuen 2. Kl.* No. 3. *Clematides*.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 358. t. 6. f. 9. La Cerocome;*  
*Cerocoma; Federbuschkäfer.*  
*de Geer Inf. Tom. V. p. 3.*

13. *Martii*, der *Markusafterkäfer*. \*)

*Müller l. c. S. 383. No. 13. der Markusläufer.*  
*Onomat. hist. nat. P. 5. p. 152.*

14. *Monocerus*, das *Einhorn*.

*Müller l. c. S. 384. No. 14.*

*Füesslins Verz. S. 20. No. 400. das Einhorn.*

*Onomat. hist. nat. P. 5. p. 153.*

*Catholicon A. p. 596. der einhörnige Meyowurm.*

*Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 639.*

**A T T E L A B U S monoceros.**

*Fabric. S. E. p. 158. Notoxus 2.*

*Thorace in cornu supra caput protenso.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 356. t. 6. f. 8. Notoxus.*

15. *Floralis*, der *Blumenmaywurm*. \*\*)

*Müller l. c. S. 384. No. 15. der Blumenlecker.*

*Onomat. hist. nat. P. 5. p. 152.*

*Fabric. S. E. p. 126. Lagria 12.*

*Nigra; thorace ferrugineo.*

16. *Antherinus*, der *Blüthenmaywurm*. †)

*Müller l. c. S. 384. No. 16. der Blüthensauger.*

*Onomat. hist. nat. P. 5. p. 151.*

*Fabric. S. E. p. 126. Lagria II.*

*Nigra; elytris fasciis duabus ferrugineis.*

*Unab-*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

## Unabgebildete Maywurmkäfer.

## II. Klasse.

1. No. 4. *Syriacus.*
2. No. 6. *4-punctatus.*
3. No. 7. *Capensis.*
4. No. 8. *Chrysomeloïdes.*
5. No. 10. *Afer.*
6. No. 13. *Marci.*
7. No. 15. *Floralis.*
8. No. 16. *Antherinus.*

## NEUE MAYWURMKAFFERARTEN.

## II. Geflügelte mit ganzen Flügeldecken.

1. *Gouani*, das kleine schwarze französische Maywurmkäferchen.

Linn. Add. p. 1068. No. 11.

*Alatus*, ater; *elytris fascia apiceque sanguineis.*

Müllers Suppl. B. p. 255. 17. der Schwarzkäfer.

2. *Pectinatus*, Lepechins Federkamm.

Lepechins Tageb. II. p. 200. u. t. II. f. 26. Eine spanische Fliege mit federigen Fühlhörnern.

M E L O E *antennis pectinatis*; *corpo atrato*; *fronte rubra.*

3. *Clematides*, der Waldreben-Maywurmkäfer.<sup>\*)</sup>

Pallas Reis. II. App. No. 51.

Forma simillima *Vescator*. Caput, thorax, artus chalybeato-atra, nitida; *elytra* dilute testacea vel grisea immaculata, mollissima.

Müllers Suppl. B. p. 257. t. 23.

4. Tri-

<sup>\*)</sup> v. Linn. No. 11. *Algiricus.*

4. *Trifascis*, das *kaspische Dreyband*.*Pallas Reisen II. App. No. 52.*

Magnitudo fere M. *Schaefferi*, et similior *Cichorii*; antennae subclavatae; *corpus* totum virescente chalybeum, sericeum, cano-lanuginosum; *elytra* griseo-pallida.

*Versus mare Caspium.**Müllers Suppl. B. p. 258. t. 24.*5. *Ocellata*, die *kaspische Augendecke*.*Pallas Reis. II. App. No. 53.*

Duplo major praecedente; *corpus* cano-lanuginosum, nigrum; *pedes* testacei; *caput*, thoraxque lanugine cano-flavescente colorata; *elytra* nigro-punctata; *puncta* pallide marginata; hinc *oculos* referunt.

*Versus mare Caspium.**Müllers Suppl. B. p. 358. t. 25. das Mayauge.*6. *Festiva*, der *geschmückte Maywurmkäfer am Irtis*.*Pallas Reis. II. App. No. 53.*

*Pulcherrima*; antennae tenues, *caput*, *thorax*, *corpus* cyaneo-atra, nitida, lanugine fusca; *elytra* subcompressa, modo coccinea.

*Müllers Suppl. B. p. 359. t. 26. der Rosenkäfer.*7. *Lutea*, der *irtische leimfahle Maywurmkäfer*.*Pallas Reis. II. App. No. 54.*

Magnitudo *Syriaci*, atra-lanuginosa; *elytra* ventricosa, subcompressa, intense lutea: ad Irtin.

*Müllers Suppl. B. p. 259. t. 27. der gelbe Maykäfer.*8. *Atrata*, der *schwärzliche Maywurm*.*Pallas Reis. II. App. No. 55.*

Magni-

Magnitudo *Trifascidis*; tota aterrima; *elytra* fascia versus apicem undulata; *antennae* subclavatae.

Müllers Suppl. B. pag. 260. t. 28. der *geschwärzte Maykäfer*.

9. *Vralensis*, der *uralische Maywurmkäfer*.

Pallas Reis. II. App. No. 56.

Magnitudo vix *Muscae carnar.* Tota atra, parum nitida, sed laevis et glaberrima; forma *Proscarabaei*, sed *elytra* longiora.

Müllers S. B. p. 360. t. 29. der *uralische Maykäfer*.

10. *Erytrocephalus*, der *wolgaische Rothkopf*.

Pallas Reis. I. App. No. 46.\*)

Magnitudo *Vesicator*. Niger, subtus canus; caput rubrum; oculis, macula verticis, ore antennisque nigris.

Müllers Suppl. B. p. 255. t. 18.

11. *Fenestrata*, der *jaikische Maywurmkäfer mit gegitterten Flügeldecken*.

Pallas Reis. II. App. No. 47.

Facies *Cantharidis*; corpus mediocre, totum glabrum, testaceo-pallidum; thorax depresso; *elytra* grisea; *antennae* filiformes.

Ad *Jaikum inter flores*.

Müllers Suppl. B. p. 256. t. 19. der *Fensterkäfer*.

12. *Quadrivittata*, der *Vierfleck*.

Pallas Reis. II. App. No. 48.

Nigra, glabra, solo pettore pubescente. *Elytra* griseo-lutea, nigra bimaculata; maculae subquadrate; *antennae* filiformes.

Müllers Suppl. B. p. 256. t. 20.

13. *Necy-*

\*) v. No. 17.

13. *Necydalea*, der afterbockartige Maywurm.

*Pallas* Reis. II. App. No. 49.

*Nigra tota, praeter elytra intense rubra; abdomine paulo breviora.*

Omnes praecedentes *oleum odoratum exsudant.*

*Müllers Suppl. B. p. 256. t. 21.* der *Maybock.*

14. *Sibirica*, der sibirische Feldmaywurmkäfer.

*Pallas* Reis. II. App. No. 50.

*Corpus totum atrum, vix nitidum, glaberrimum, Vesicator. subaequale. Caput rubrum, oculis, ore, antennis nigris.*

*Müllers Suppl. B. p. 257. t. 22.* der *Sibirier.*

15. *Cinereus*, der aschgraue amerikanische Maywurmkäfer.

*Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 62. No. 62. Alatus, cinereus; antennis elytrisque atris, margine cinereis.*

16. *Cinnaberinus*, der Skopolische zinnoberrote Maywurmkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 186.*

*Elytra et caput vtrinque; thorax superne rubra; oculi, antennae, thorax subtus, abdomen totum, pedesque nigri.*

17. *Rufidorsum*, der wiener Rothrücken.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 103. No. 81.*

*Coeruleus, alatus; dorso rufo, nitido.*

18. *Erytrocephalus*, der Skopolische Fuchskopf.\*)

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 103. No. 82.*

*Niger; capite rufo.*

19. *Mare*

\* ) An Pall. *Erytrocephalus?* No. 9.

19. *Marginatus*, der kapensische Aschränd.

Fabric. S. E. p. 260. *Lytta* 2.

Atra; *elytrorum marginibus cinerascentibus*.

20. *Vittatus*, der amerikanische gelbbandirte Maywurmkäfer.

Fabric. S. E. p. 260. *Lytta* 3.

*Elytris nigris; marginibus vittaue flavis.*

21. *Atratus*, der amerikanische ungefleckte ganz schwärze Maywurmkäfer.

Fabric. S. E. p. 260. *Lytta* 4.

Atra, *immaculata*.

22. *Fasciatus*, die indianische Gelbstreife.

Fabric. S. E. p. 261. *Mylabris* 1.\*)

Nigra; *elytris fascia media flava*.

23. *3-maculatus*, der Morgenländische.

Fabric. S. E. p. 261. *Mylabris* 4.

Nigra; *coleoptris flavis, fasciaque punctoque communi fuscis*.

24. *Nitidula*, der englische grünglänzende Maywurmkäfer.

Fabric. S. E. App. p. 826. 1-2.

*Lytta viridi-aenea; elytris testaceis.*

25. *Immaculata*, der ungefleckte indianische Maywurmkäfer.

Fabric. S. E. App. p. 826. 1-3.

*Mylabris atra; elytris testaceis, immaculatis.*

26. *Subvittata*.

\*) v. Linn. M. Cicerii No. 5.

26. *Subvillosus*, das gelbliche rauche Maywurm-käferchen.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 343. *Cantharis* 5. La Cantharide jaune veloutée.

*Flavescens, subvillosa; elytris attenuatis.*

27. *Flavo-elytratus*, die gelbe Flügeldecke.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 344. *Cantharis* 6. La Cantharide noire à étuis jaunes.

*Subvillosa, nigra; elytris flavis, extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.*

28. *Nigro-acuminatus*, die Schwarzspitze.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 344. *Cantharis* 7. La Cantharide fauve avec la pointe des étuis noire.

*Testacea; elytris apice nigris.*

29. *Formicarius*, der ameisenartige Maywurm-käfer.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 344. *Cantharis* 8. La Cantharide fourmi.

*Fusca; elytris antice; thoraceque elongato rubris.*

30. *Pensylvanicus*, der schwarze pensylvanische Maywurmkäfer.\*)

de Geer Inf. Tom. V. p. 16. exot. No. 1. t. 13. f. 1.  
*Cantharide de Pensylvanie.*

*Alata nigra tota.*

## 216. GE-

\* In der Rezension des *Fabric.* S. E. in *Beckmanns phys. oekon. Bibl.* 7. B. 2. St. p. 288. heifst es: „Wir glauben, dass sich dies Geschlecht erweitern liesse, indem wir welche besitzen, die durch die stahlblaue oder schwarze Farbe, durch die Flügelscheiden, die den Leib entweder ganz oder zur Hälfte bedekken, durch das Verhältniss des Bruststücks, und die Gestalt der Fühlhörner, sich unterscheiden.“

216. GESCHLECHT. *Mordella; Erdflohkäfer.\*)*

Müllers L. N. S. 5. B. 1. Th. S. 385. *Erdflöhe.*

Börners Samml. I. p. 460. *Erdfloh;* p. 478. *Pflanzenkäfer; Erdfloh.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. p. 95. gen. 12. *Erdfloh.*

Eberhards Thiergesch. p. 197. §. 221. No. 5. der *Flohkäfer.*

Yy 2 Sutzers

\*) Diese Insekten heissen bey den meisten Schriftstellern auch *Erdflöhe*. Ob sie aber wohl den jungen Pflanzen ebenfalls Schaden thun; so sind es doch die *eigentlichen Erdflöhe*, die wahre Plage der Gärtner, *CHRYSOMELAE saltatoriae oleraceae* Linn. No. 51. nicht. Sie sind auch *viel seltener* als diese, und ihre *Larven* sowohl, als ihre ganze *Verwandlung* ist noch unbekannt.

Man hüte sich ja, dasjenige Insekt, was die Alten *Mordella* nennen, mit diesem für einerley zu halten. Jenes gehöret zum *Wanzengeschlecht.* S.

Ionston. hist. nat. Inf. p. 40. Cap. VI. de *Orfodacna* (GАЗАЕ *Mordella*. Aldrov. Inf. lib. II. c. 13.) et *Cimicibus sylvestribus*. et p. 112. Cap. XI. *Forficula Priscis Mordella*. Schwenfeld Theriotr. Silef. p. 544. *ORSODACNA* Arift. *Mordella*; ein *Eyterfliege, Blatterbeißer* (*Pustulas puerorum appetens*).

Andere verstehen dadurch die *Wassernymphen*, oder *Libellas*. S. Swammerdamms B. der N. p. 90. *Mordella* oder *Orfodacna*, Adr. *Innii* die Mouffer *Libella*, Aldrov. aber *Perla* nennt. Holl. Rainbout, Scarboud, Nayer, Puystebyter (in Deutschland *Züngherchen, Schittebold, Grasmetze*). S. Lessers Theol. der Inf. p. 68. in. *Mordellae, Orfodacnae, Blatterbeißer*. Holl. *Puystebyters, Rombouts.*

Eine solche ist auch unstreitig die *Mordella*, davon Loewenk. in epist. physiol. XXXV. p. 342. behauptet, dass sie 25088 Augen habe.

Wie Linné selbst einige *Tenebriones, Attelabos, Chrysomelas* und *Cimices* wieder unter die *Mordellas* gebracht hat: davon S. Onomat. hist. nat. P. 5. p. 245. 246. 247.

- Sulzers Kennz.* S. 77. *Erdfloß; Kohlfresser.*  
 — — *Gesch.* S. 67. der *Erdfloßkäfer*; la *Mordelle*.  
*Füesslins Verz.* schweiz. Inf. S. 21. *Erdfloßkäfer*.  
*Neuer Schaupl.* der N. 2. B. p. 665. *Erdflöhe*.  
*Onomat.* hist. nat. Part. 5. pag. 244. der *Floßkäfer*;  
*Erdfloß*.  
*Bomar.* Dicht. des An. VII. p. 155.  
*Schwenkf.* Theriotr. Silef. p. 550. *Pulex terrestris*,  
*Erdfloß*.  
*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 228.  
*Müller* Faun. Fridr. p. 22.  
 — — Zool. Dan. Prodr. p. 84.  
*Fabric.* S. E. p. 262.  
*Brünnichii* Entom. p. 51. *Jordloppe*.  
*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 353. La *Mordelle*.  
*de Geer* Inf. Tom. V. p. 27. *Mordelle*.

1. *Paradoxa*, der *Erdfloßkäfer mit gerieftem Brustschild*.\*)

- Müller* l. c. S. 385. die *Brustrinne*.  
*Onomat.* hist. Nat. P. 5. pag. 247. der *große Floßkäfer*.  
*Fabric.* S. E. p. 262. No. 2.

2. *Aculeata*, der *Stachelfloßkäfer*.

- Müller* l. c. S. 386. No. 2. t. 8. f. 5. der *Stachelfloß*.  
*Füesslins Verz.* S. 21. No. 404. *Stachelfloßkäfer*.  
*Pontopp.* N. G. v. D. p. 211. t. 16.  
*Lepechins Tageb.* II. p. 209. t. 10. f. 15. der *fleckichte Erdfloß*.

*Mordella aterrima; elytrorum punctulis 12 argenteis, uno in aculeum definente. An Varietas aculeatae?* *Linn.*

*Sivam-*

\*.) Nicht abgebildet.

*Swammerd.* B. der N. p. 120. Ein Käferchen, dessen Schwanz mit einer Stachel.

*Onomat.* hist. nat. P. 5. p. 244. der Flohkäfer mit dem Stachel.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 22. No. 218.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 917.

*Schaeff.* Icon. t. 127. f. 7.

*Fabric.* S. E. p. 263. No. 5.

*Ano aculeato;* corpore atro immaculato.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 353. No. 1. t. 6. f. 7. La *Mordelle noire à pointe*.

*Atra, caudata, vnicolor.*

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 28. No. 1. *Mordelle à tarière.*

*Poda* Mus. graec. p. 47.

### 3. *Humeralis*, die *Gelbschulter.* \*)

*Müller* l. c. S. 386. No. 3. die *Gelbseite.*

*Onomat.* hist. nat. P. 5. p. 246. der Flohkäfer mit gelben Schultern.

*Fabric.* S. E. p. 264. No. 9.

*Atra; ore, lateribus thoracis pedibusque flavis.*

### 4. *Frontalis*, die *Gelbstirn.* \*\*)

*Müller* l. c. S. 386. No. 4.

*Füesslins* Verz. S. 21. No. 405. *Gelbstirn.*

*Onomat.* hist. nat. P. 5. p. 246. der Flohkäfer mit der gelben Stirn.

*Fabric.* S. E. p. 264. No. 10.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 915.

*Atra; fronte, antennarum basi, pedibusque anticis flavis.*

Yy 3

5. Tho-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

5. *Thoracica*, die *Gelbbrust*.\*)*Müller* l. c. S. 386. No. 5.*Fleißlins Verz.* S. 21. No. 406. *Gelbbrust*.*Onomat. hist. nat. P. 5. p. 248.* der *Flohkäfer mit gelber Brust*.*Fabric. S. E. p. 264.* No. II.*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84.* No. 916.

Nigra; capite, thorace pedibusque flavis.

6 *Flava*, der *schwefelgelbe Erdflohkäfer*.\*\*)*Müller* l. c. S. 386. No. 6. der *Schwefelkäferfloh*.*Onomat. hist. nat. P. 5. p. 245.* der *gelbe Flohkäfer*.*Fabric. S. E. p. 264.* No. 12.*Mülleri Faun. Fridr. p. 22.* No. 219.— — *Zool. Dan. Prodr. p. 84.* No. 918.*Unabgebildete Erdflohkäfer.*1. No. 1. *Paradoxa*.2. No. 3. *Humeralis*.3. No. 4. *Frontalis*.4. No. 5. *Thoracica*.5. No. 6. *Flava*.*Neue Erdflohkäferarten.*1. *Testacea*, der *englische muschelbraune Erdflohkäfer*.*Forsteri nov. sp.* Inf. Cent. I. p. 63. No. 63.*Capite nigro; thorace fusco; in floribus Crataegi Oxyacanthae.*2. *Melanopa*, der *Forstersche Schwarzfuß*.*Forsteri nov. sp.* Inf. Cent. I. p. 64. No. 64.*Nigra; elytris, thorace, capite, pedibusque testaceis.*3. *Fasciata*,

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

3. *Fasciata*, die englische Schwarzbinde.*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 65. No. 65.*Atra; elytris testaceis, apice nigris; fasciaque nigra* in medio.4. *Clavicornis*, das englische Keulhorn.*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 66. No. 66.*Picea tota; antennis clavatis; in floribus Rhei-Rhabarbari.*5. *Perlata*, der graubündtenische Perlenpunkt.*Sulzers Gesch.* p. 67. t. 7. f. 14.*Nitide-nigra; subpilosa; thorace postice perlato-marginato; elytro singulo quatuor maculis perlatis.**Füeßlins Verz.* S. 21. No. 402.6. *Bicolor*, der zweifarbig Erdflohkäfer.*Sulzers Gesch.* p. 67. t. 7. f. 15.*Capite nitide-nigro; ore rubro; antennis fulvis; thorace pedibusque anticis rufis; elytris nigris.*An varietas rara M. *Thoracicae Linn.*?*Füeßlins Verz.* S. 21. No. 403.7. *Tricuspidata*, der jaikische Erdflohkäfer mit dreygespitzter Brust.*Lepechins Tageb.* I. p. 311. b. t. 19. f. 8. Eine besondere Art Erdflöhe auf dem Korispernum.*Corpore flavo; elytris punctis tribus nigris; lamina abdominali cyanea; thorace postice tricuspidato.*8. *Ferruginea*, das ostindianische Kammhorn.*Fabric.* S. E. p. 262. No. 1.

*Antennis pectinatis; rufa, pectore, ano pedibusque nigris.*

9. *Pectinata*, das amerikanische Kaminhorn.

*Fabric. S. E. p. 263. No. 3.*

*Antennis pectinatis; rufa; elytris nigris.*

10. *Sex-maculata*, der amerikanische Sechsleck.

*Fabric. S. E. p. 263. No. 4.*

*Atra; thorace ferrugineo; elytris testaceis; maculis tribus nigris.*

11. *8-punctata*, der nordamerikanische Achtpunkt.

*Fabric. S. E. p. 263. No. 7.*

*Ano aculeato; elytris nigris; punctis quatuor flavis, primo lunato.*

12. *Abdominalis*, der teutsche Gelbaster.

*Fabric. S. E. p. 264. No. 8.*

*Ano aculeato; nigra; thorace abdomineque fulvis.*

13. *Fasciata*, die Geoffroische Goldbinde.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 353. No. 2. La Mordelle veilloutée à pointe.*

*Atra, caudata; fasciis villoso-aureis.*

*Fabric. S. E. p. 263. No. 6.*

*Ano aculeato; nigra; elytris fasciis duabus cinnereis.*

14. *Rufipes*, der Rothfuß.

*Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 355. No. 5. La Mordelle brune à pattes fauves.*

*Fusca; pedibus ferrugineis.*

217. G E S C H L E C T. *Staphylinus; Raubkäfer.\*)*

*Müllers* L. N. S. 5. B. I. Th. S. 387. *Raubkäfer.*

*Börners* Samml. I. p. 479. *Raubkäfer.*

*Beckmanns* Anfangsgr. der N. H. pag. 96. gen. 13.  
*Raubkäfer.*

*Eberhards* Thiergesch. p. 203. §. 229. *Raubkäfer.*

*Glaeser* von schädl. Raupen p. 74. *Raupentödter.*

*Sulzers* Kennz. p. 86. *Raubkäfer.*

— — Gesch. p. 67. *Raubkäfer; le Staphylin,*

*Schäffers* neuuentdeckte Theile etc. p. 24.

*Fließlins* Verz. schweiz. Inf. p. 21. *Raubkäfer.*

*Brunnichii* Entom. p. 51. *Dan. Rovbille.*

Y y 5 Scop.

\*) Diese Infekten und Käfer heissen bey vielen Schriftstellern:  
z. E. durchgehends in den *Aetis Vpsal. Forficulae.*

Sie gehören unter die gefrässigsten *Raubinsekten*, und ihre Larven wohnen unter der Erde. Wenn man im Winter Blumen-töpfe in der Stube hat, und sie begießt; so kommen lauter kleine weisse *Staphylinenlarven* auf die Oberfläche.

Die Käfer beissen gewaltig, dass es schmerzt. Sie haben hinten am Schwamme zween fischblasenähnliche Theile, die sie zur Wehr herausstrecken, wenn sie in Gefahr sind. S. *Schäffers* neuuentdeckte Theile etc. S 25.

*Linné* hat keine Eintheilung derselben gemacht; der sel. Müller aber theilt sie ein 1. in Raubkäfer von mittlerer Grösse, 2. in kleinae Raubkäfer. Von der erstern 7; von der zwoten Art 19 Arten beym Linné, und der Staatsrath Müller in vier Klassen, nach der Gestalt des *Halschildes.*

1. *Thorace aequali; postice et antice aequali latitudine;*

2. *Thorace postice latiore;*

3. *Thorace postice angustiore;*

4. *Thorace cylindraceo.*

Verschiedene Arten, als der *Murinus*, *Erythropterus* sind im Pferdemist anzutreffen; aber in einer ganz andern Absicht als die *Scarabaei stercorarii*: nämlich blos denen darinn befindlichen Insekten nachzuspüren.

*Scop.* Entom. carn. p. 99.

— Ann. 5. hist. nat. p. 109.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 230.

*Müller* Faun. Fridr. p. 23.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 97.

*Fabric.* S. E. p. 264. *Staphylinus.* p. 267. *Oxyporus.*  
p. 268. *Paederus.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 359. Le *Staphylin.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. préf. IV. No. 36. p. 9. Des  
*Staphylins.*

*Ionston.* hist. nat. Inf. p. 127. Artic. VIII. de *Staphy-*  
*lino* t. XVII.

### 1. *Hirtus*, der *haarichte Raubkäfer*.

*Müller* l. c. S. 388. No. 1. der *Bärenräuber*.

*Füeßlins* Verz. S. 21. No. 407. der *Haarichte*.

*Schäffers* neuentdeckte Theile etc. S. 25. t. 2. f. 12.  
a, a. der *raue halbgeflügelte Raubkäfer*.

— — Icon. t. 36. f. 6.

*Sulzers* Gesch. p. 69. t. 7. f. 16. der *Bärenräuber*.

*Acta Vpsal.* 1736. p. 15. No. 1. *Forficula hirsuta*,  
nigra, nitida; capite, collo, cinguloque ventris flavis.

*Fabric.* S. E. p. 264. *Staphylinus* 1.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1091.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. pag. 363. No. 7. Le *Staphylin*  
*Bourdon*.

*Niger villosus*; capite thorace anoque *pilis fulvo-*  
*aureis*.

*de Geer* Inf. T. IV. p. 20. No. 5. *Staphylin bourdon*.

*STAPHYLINVS (bombylius) hirsutus*, niger; ca-  
pite, thorace abdominisque apice viridi-flavis nitidis.

### 2. *Murinus*, der *mausefahle Pferdemist-Raubkäfer*.

*Müller* l. c. S. 388. No. 2. der *Misträuber*.

*Füeßlins* Verz. S. 21. No. 408. *Mausefarbiger*.

*Fabric.*

*Fabric.* S. E. p. 265. *Staphylinus* 2.

*Müller* Faun. Fridr. p. 23. No. 221.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1115.

Cinereo-nebulosus, pubescens; *punctis nigris*.

*Scop.* Entom. carn. No. 302.

*Fimetarius*, villosus, *cinerascens*; nigro-nebulosus.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 362. No. 6. *Le Staphylin velouté*.

Villosus; *e fusco cinereoque viridi-tessellatus*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 12. No. 1. t. 1. f. 1. *Staphylin velouté pointu*.

Villosus; griseo-fusco virescens, nigro-nebulosus; *abdomine conico, maculis nigris*; capite maximo.

3. *Maxillosus*, der Raubkäfer mit großen Kinnlappen.\*)

*Müller* I. c. S. 388. No. 3. t. 8. f. 8. der *Großkiefer*.

*Füesslins* Verz. S. 21. No. 409. *Großkiefer*.

*Act. Vpsal.* 1736. p. 15. No. 2. 3. *Forficula collaris* nigro; *elytris nebulosis*.

*Müller* Faun. Fridr. p. 23. No. 222.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1114.

**S T A P H Y L I N V S** *balteatus* niger, pubescens, fasciis cinereis.

*Isl.* Joetun-Oxe; Jaette-Stoud.

*Schaeff.* Icon. t. 80. f. 1. (alleg. *Müller*).

— — — t. 20. f. 1. (all. *de Geer*).\*\*)

*Act.*

\*) Das von *Linn.* *Fabric.* und *Füessl.* hierbey angeführte Citatum des *Geoffr.* I. p. 360. No. 1. t. 7. f. 1. ist falsch, und gehört zu des Staatsr. M. *olens* Prodr. No. 1090, oder zu des *de Geer major* Tom. IV. p. 17. No. 3. wohin auch die vom *Linn.* hierbey citirte Schriftsteller *Rajus* und *Mouffet* gehören. S. unter den neuen No. 19.

\*\*) Des *Schaeff.* Icon. t. 20. f. 1. hat *Füesslin* bey seinem *neuen Fasciatus* No. 410. angeführt.

*Aet. Nidr.* III. 25. *Uebers.* p. 362.

*Iter Isl.* 688. c.

— — *Uebers.* I. p. 319. c. *Joetun-Oexe; Riesen-*  
*ochse.*

*Fabric.* S. E. p. 265. No. 3.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 362. No. 5. (alleg. *de Geer*).

Le *Staphylin* *nebuleux*.

Niger; *elytris abdomineque cinereo-nebulosis.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. pag. 18. No. 4. t. 1. f. 7. 8.

*Staphylin à bande tendrée.*

*STAPHYLINVS (balteatus)*, niger, nitidus; *ab-*  
*domine* *subtus* *elytrisque fascia transversali griseo-ci-*  
*nerea*; *punctis* *nigris.*

*Gronov.* *Zooph.* p. 173. No. 630.

*Staphylinus ater*; *elytris fascia cinerea transverfa*  
*lata lobata.*

#### 4. *Erytropterus*, der *Rothflügel*.

*Müller* l. c. S. 389. No. 4.

*Füßlins Verz.* S. 21. No. 411. *Rothflügel.*

*Frisch* Inf. V. p. 49. No. 25. t. 25. Ein *kurzflüglicher*  
*Raubkäfer mit seinem Zangenwurm.*

*Aet. Nidros.* III. p. 404. t. 4. f. 8. *Uebers.* p. 362.

*Aetia Vpsal.* 1736. p. 15. No. 6. *Forficula collari ni-*  
*gro*; *ventre atro*; *elytris testaceis.*

*Poda Mus.* graec. p. 48.

*Mülleri Faun.* Fridr. p. 23. No. 223.

— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 97. No. 1092.

Niger, opacus; *elytris pedibusque rufis.*

*Fabric.* S. E. p. 265. *Staphyl.* 5.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 364. No. 9.

Le *Staphylin à étuis couleur de rouille*.

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 21. No. 6. *Staphylin à*  
*étuis roux.*

5. *Politus*, der polirte glatte Raubkäfer.

Müller l. c. S. 390. No. 5. der Polirer.

Fließlins Verz. S. 21. No. 412. der Polirte.

Akt. Nidr. III. 27. Uebers. p. 363.

Acta Vpsal. 1736. pag. 16. No. 7. *Forficula collaris nigro; ventre atro; elytris coerulefcentibus.*

Schaeff. Icon. t. 39. f. 12.

Fabric. S. E. p. 266. *Staphylinus 7.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 23. No. 224.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1108.

Niger; capite thoraceque nitidis, pruinitatis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 361. No. 3. (alleg. de Geer).

Le petit *Staphylin noir*.

Ater; extremo antennarum articulo subglobofo; elytris thorace brevioribus.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 22. No. 7. *Petit Staphylin noir.*

Niger nitidus; antennis obscure fuscis; abdomine elongato.

6. *Rufus*, der Raubkäfer mit rothbraunen Fühlhörnern.

Müller l. c. S. 390. No. 6. das *Wedelfühlhorn*.

Acta Vpsal. 1736. p. 15. No. 8. *Forficula collaris testaceo; elytris ventreque testaceis; apicibus nigris.*

Schaeff. Icon. t. 35. f. 3. (all. Fabric.).

— — — t. 85. f. 3. (all. de Geer et Müll.).

Poda Mus. graec. p. 49.

Fabric. S. E. p. 267. *Oxyporus 1.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1116.

Niger; antennis, thorace abdomineque antice rufis; elytris basi pedibusque flavis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 370. No. 22. Le *Staphylin jaune à tête, etuis, et anus noirs.*

Flavus; capite, elytris abdomineque pone nigris.

de Geer

de Geer Inf. Tom. IV. p. 24. No. 10. t. 1. f. 11. 12.  
*Staphylin roux à extrémités noires.*

*Capite; elytrorum abdominisque posticis nigris.*

7. *Lunulatus*, der *Halbmond.* \*)

Müller l. c. S. 390. No. 7.

Fabric. S. E. p. 268. *Oxyporus* 2.

Flavus; *elytris nigris; basi apiceque pallidis.*

Müller Faun. Fridr. p. 23. No. 225.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1104.

Flavus; *capite, antennarum, elytrorumque medio; abdominis postico nigris.*

8. *Riparius*, der *Uferraubkäfer.*

Müller l. c. S. 391. No. 8. der *Uferräuber.*

Füesslins Verz. S. 21. No. 413. der *Gesellige.*

Schaeff. Icon. t. 71. f. 3.

Scop. Entom. carn. No. 308. *S T A P H Y L I N V S gregarius.*

Caput; *elytra, abdominis apex, femora apice, nigro-coeruleo colore tincta gerit, alibi fulvus.*

Fabric. S. E. p. 268. *Paederus* 1.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1125.

Rufus; *elytris coeruleis; capite abdomine femorumque apice nigris.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 369. No. 21. Le *Staphylin rouge à tête noire, et étuis bleus.*

de Geer Inf. Tom. IV. p. 28. No. 14. t. 1. f. 18. *Staphylin des rivages.*

9. *Obtusus*, der *kleine abgeflüpfte Raubkäfer.* \*\*)

Müller l. c. S. 391. No. 9. der *Stumpf.*

Füesslins

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Füesslins Verz. S. 21. No. 414.

Fabric. S. E. p. 266. *Staphylinus* 10.

Testaceus; *elytris antice anoque nigris.*

10. *Lignorum*, der *Raubkäfer in faulem Holz.*\*)

Müller l. c. S. 391. No. 10. der *Holzdieb.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1120.

11. *Silphoides*, der *todtengräberartige Raubkäfer.*\*\*) )

Müller l. c. S. 391. No. 11. der *Gräberräuber.*

12. *Subterraneus*, der *Raubkäfer in Kellern.*\*\*\*)

Müller l. c. S. 392. No. 12. der *Kellerräuber.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1111.

Niger; *elytris macula oblonga, subferruginea.*

13. *Flavescens*, der *schwarze Raubkäfer mit gelblichen Flügelrändern.*†)

Müller l. c. S. 392. No. 13. der *Gelbrand.*

Fabric. S. E. p. 266. *Staphylinus* 9.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1113.

14. *Elongatus*, der *Langschild.*††)

Müller l. c. S. 392. No. 14.

Fabric. S. E. p. 268. *Paederius* 2.

15. *2-guttatus*, der *gelbbraune Zweytropf.*†††)

Müller l. c. S. 392. No. 15. das *Großauge.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1124.

#### 16. 2-pu-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

Oft an feuchten Weinfässern im Keller.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

†††) Nicht abgebildet.

16. *z-pustulatus*, die *rostfarbige Zweyblätter.* \*)

*Müller* l. c. S. 393. No. 16. der *Rostpunkt.*

*Füesslins Verz.* S. 21. No. 416. *Rostpunkt.*

*Fabric.* S. E. p. 266. *Staphylinus* II.

17. *Cantharellus*, der *aftertscheinküferartige Raubkäfer.* \*\*)

*Müller* l. c. S. 393. No. 17. der *Fliegenräuber.*

18. *Littoreus*, der *Strandraubküfer.* \*\*\*)

*Müller* l. c. S. 393. No. 18. der *Strandräuber.*

19. *Sanguineus*, der *Blutflügel.* †)

*Müller* l. c. S. 393. No. 19.

*Akt. Vpfal.* 1736. pag. 15. No. 12. *Forficula nigra;*  
*elytris sanguineis.*

20. *Caraboides*, der *laufkäferartige Raubkäfer.* ††)

*Müller* l. c. S. 393. No. 20. der *Gelbschild.*

*Fabric.* S. E. p. 267. *Staphyl.* 18.

*Flavus; immaculatus.*

*de Geer* Inf. T. IV. p. 25. No. 12. *Staphylin fauve.*

*STAPHYLINUS (fulvus) rufo-flavus, postice niger; elytris pedibusque testaceis; antennis longitudo-*  
*nine corporis.*

21. *Chrysomelinus*, der *blattkäferartige Raubkäfer.* †††)

*Müller* l. c. S. 394. No. 21. das *Räuberhähnchen.*

*Füesslins Verz.* S. 21. No. 417.

*Akt. Nidr.* III. 28. *Uebers.* p. 364.

*Fabric.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

†††) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 267. *Staphil.* 16.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1105. Niger; thorace elytrisque fulvis; pedibus luteis.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. pag. 368. No. 18. Le *Staphylin* couleur de paille.

(v. *Chrysom.* Linn, No. 21.)

22. *Flavipes*, der gelbfüßiche Raubkäfer.\*)

*Müller* l. c. S. 394. No. 22. der Gelbfuß.

*Filiegins* Verz. S. 21. No. 418.

*Act. Nidr.* III. 34? (all. *Müll.*)

*Müller* Faun. Fridr. p. 23. No. 226.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1099.

*Fabric.* S. E. p. 268. *Oxyporus* 3.

Niger; elytris tibiisque fuscis.

23. *Fuscipes*, der Braunfuß.\*\*)

*Müller* l. c. S. 394. No. 23.

*Fabric.* S. E. p. 266. *Staphyl.* 12.

Ater; elytris pedibusque testaceis.

24. *Rufipes*, der Rothfuß.

*Müller* l. c. S. 394. No. 24.

*Abhandl. der schwed. Akad. der Wissenschaft.* 30. Th. p. 191. t. 4. f. 1.

*Act. Nidr.* III. 29. *Uebers.* p. 364.

*Act. Vpsal.* 1736. p. 15. No. 10. *Forficula tota atra.*

*Müller* Faun. Fridr. p. 23. No. 227.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1098.

Niger; elytris thorace duplo longioribus brunneis; pedibus flavis.

*Maris et foeminae nulla differentia.*

*Geoffr.*

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 367. No. 15. *Le Staphylin noir à corcelet lisse et bordé.*

*Niger; thorace marginato laevi, pedibus rufis.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. p. 24. No. 11. t. 1. f. 14. *Staphylin noir à grands étuis.*

*Ovatus glaber niger nitidus, pedibus rufis; elytris amplis, abdominis apice truncato.*

*Fabric.* S. E. p. 267. *Staphyl.* 17.

25. *Piceus*, der pechschwarze Raubkäfer.\*)

*Müller* l. c. S. 394. No. 25. die *Pechdecke.*

*Fabric.* S. E. p. 267. *Staphyl.* 20.

*Niger; thorace depresso; lineis elevatis tribus.*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1094.

*S T A P H Y L I N V S (sulcatus) niger; thorace sulcato; elytris fuscis; pedibus pallidis.* St. *piceus LINN.?*

26. *Boleti*, der Raubkäfer in den Löcherschwämmen.

*Müller*, l. c. S. 395. No. 26. der *Schwammläufiger.*

*Scop.* Entom. carn. No. 305.

*Fuscus; antennis lividis aut ferrugineis; elytra marginata; abdomen superne villosum.*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1093. *Fuscus; capite nigro; elytris, antennis, pedibusque lividis.*

*de Geer* Inf. Tom. IV. pag. 26. No. 13. t. 1. f. 15. *Staphylin de l'Agaric.*

*Fuscus; antennis pedibusque flavo-lividis pallidis.*

### *Unabgebildete Raubkäfer.*

1. No. 7. *Lunulatus.*

2. No. 9. *Obtusus.*

3. No. 10. *Lignorum.*

4. No. 11. *Silphoides.*

5. No.

\*) Nicht abgebildet.

5. No. 12. *Subterraneus.*
6. No. 13. *Flavescens.*
7. No. 14. *Elongatus.*
8. No. 15. *2-guttatus.*
9. No. 16. *2-pustulatus.*
10. No. 17. *Cantharellus.*
11. No. 18. *Littoreus.*
12. No. 19. *Sanguineus.*
13. No. 20. *Caraboides.*
14. No. 21. *Chrysomelinus.*
15. No. 22. *Flavipes.*
16. No. 23. *Fuscipes.*
17. No. 25. *Piceus.*

### Neue Raubkäferarten.

1. *Buphthalmos*, der großäugigste Raubkäfer.\*)

*Fr. von Paula Schrank* Beytr. zur N. G. p. 72. §. 21.  
Niger, immaculatus; oculis magnis exsertis.

2. *Spinipes*, der Stachelfuß.

*Pontopp.* N. G. v. D. p. 211. No. 9. t. 16.

Totus niger; exceptis marginibus elytrorum omnibus; pedes testacei, tibiis spinosis; magnitudo cimicis leptocephalii.

3. *Tataricus*, der große tatarische Raubkäfer.

*Pallas Reis.* II. App. No. 74.

*E maximis europaeis; sed gracilis, longus, glaber-*  
*rimus totus. Caput thorace latius, ovatum. Forci-*  
*ipes insignes simplices. Thorax cylindraceus; elytra*  
*subtilissime punctata; totus ater, nitidulus; alae albidae.*

Ad lacum salsum *Inderiensem.*

*Müllers S. B.* p. 261. t. 7. a. der tatarische Räuber.

Zz 2 4. *Fascia*

\* ) v. No. 27.

4. *Fasciatus*, der *bandirte Raubkäfer*.

*Füesslins Verz.* S. 21. No. 410.

*Sulzers Kennz.* t. 7. f. 49. *Anonymous.*

*Nigro-cyaneus; elytra seminigra, et semi-argentata.*  
*Schaeff. Icon.* t. 20. f. 1. (v. No. 3. *maxillos.* LINN.)

5. *Oculatus*, der *neuholländische Raubkäfer mit zwey großen gelben Augenflecken am Kopfe*.

*Fabric.* S. E. p. 265. *Staphylinus* 4.

*Ater, nitidus; capite utrinque macula fulva.*

6. *Erythrocephalus*, der *neuholländische Fuchskopf*.

*Fabric.* S. E. p. 265. *Staphyl.* 6.

*Ater; capite rufo; elytris violaceis.*

7. *Hypnorum*, der *englische Raubkäfer mit braun gerändeltem Halschilde.*

*Fabric.* S. E. p. 266. *Staphyl.* 13.

*Ater, laevis; thoracis lateribus elytris pedibusque testaceis.*

*Paulo minor Fuscipede.*

8. *Merdarius*, der *englische Kothraubkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 266. *Staphyl.* 14.

*Ater; thorace, elytris pedibusque rufis.*

9. *Atricapillus*, das *englische Schwarzköpfchen*.

*Fabric.* S. E. p. 267. *Staphyl.* 15.

*Thorace rufo; elytris fuscis; puncto baseos marginaque postice albis.*

10. *Rugosus*, die *englische Runzeldecke*.

*Fabric.* S. E. p. 267. *Staphyl.* 19.

*Niger; thorace elytrisque rugosus.*

11. *Ophthalmicus*, das *Fleckauge in den Wäldern.*

*Scop.* Entom. carn. No. 300.

*Atro-coeruleus*, punctatus; oculis macula pallidior lunulata suffusa.

12. *Fulvipes*, der *Waldraubkäfer mit braungelblichen Füßen.*)

*Scop.* Entom. carn. No. 301.

*Atro-coeruleus*; *palpis pedibusque fulvis.*

13. *Clavicornis*, der *Raubkäfer mit keulförmigen Fühlhörnern unter der Birnbaumrinde.*

*Scop.* Entom. carn. No. 303.

*Niger*; *antennarum articulis tribus vltimis crassioribus*; *pedes rufi.*

14. *Brassicae*, der *Kohlräubkäfer.*

*Scop.* Ent. carn. No. 309.

*Ferrugineus*; *capite et corpore nigris*; *antennae extorsum crassiores*, *villosoe*; *elytra punctata.*

15. *Arnicae*, der *Raubkäfer auf dem Wolferley.*

*Scop.* Ent. carn. No. 310.

*Niger*; *thorace antennisque ferrugineis*; *pedibus testaceis.*

16. *Hellebori*, der *Raubkäfer auf der Nieswurz.*

*Scop.* Ent. carn. No. 311.

*Niger*; *elytris, antennis pedibusque ferrugineis.*

17. *Fosfor*, der *schemnitische Raubkäfer in den Grubenschwämmen.*

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 109. No. 105.

*Fusco-rufus*; *elytris apice pedibusque rufis.*

18. *Subterraneus*, der Bergmann.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 109. No. 106.

*Coerulescens*, villosus; *tarsis rufis*.

*In Cuniculis Fodinarum ad ligna.*

19. *Olens*, der größte und riechende Raubkäfer.\*)

*Mülleri Faun.* Fridr. p. 23. No. 228.

*Olens*; totus niger; *capite thoraceque scabriuscule*.  
*Maximus*, *maxilloso enim duplo major*.

— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 97. No. 1090.

*Olens*; ater, opacus; antennis decrescentibus.

*Geoffr. Inf. Tom. I.* p. 360. No. 1. t. 7. f. 1. *Le grand Staphylin noir lisse.*

*Ater*; *extremo antennarum articulo lunulato*.

*de Geer Inf. T. IV.* p. 17. No. 3. *Grand Staphylin noir*.

*Major*; niger totus; *alis rufescentibus*; *abdomine elongato planiusculo*.

*Raj. Inf.* p. 109. No. 1. *STAPHYLINVS major*,  
totus niger.

*Mouffet Inf.* p. 197.

20. *Niger*, der schwarze kleine Raubkäfer auf dem Felde.

*Mülleri Faun.* Fridr. p. 23. No. 229.

*Totus niger*; *capite thoraceque nitido*, non punctato. *Vix magnitudine capitis praecedentis*.

— — *Zool. Dan. Prodr.* p. 98. No. 1109.

21. *Marginatus*, der Müllersche gerändelte Hals-schild.

*Mülleri Faun.* Fridr. p. 23. No. 230.

*Niger*; *thorace fascia laterali pedibusque rufis*.

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 97. No. 1100.

*Niger*;

\*) Also keinesweges des LINN. *maxillefus* No. 3.

Niger; *thoracis* margine, *pedibusque* flavis; *elytris* glaucis.

*Aet. Nidr.* IV. 13.

An *Fabric. S. E.* p. 266. *Staphyl.* 8.?

Ater; *thoracis* lateribus *pedibusque* flavis.

22. *Cursor*, der *Müllersche Läufer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 97. No. 1095.

Niger; *thorace* depresso; *litura dupliciti*; *elytris* *pedibusque* flavis.

23. *Minor*, das *kleine schwarze Raubkäferchen mit leimfahlen Füßen*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 97. No. 1096.

Niger, glaber; *elytris* pallide fuscis; *pedibus* luteis.

24. *Agarici*, der *Blätterschwammraubkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 97. No. 1097.

Luteus; *capite nigro*; *abdomine rufo*.

25. *Latus*, der *breite Raubkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 97. No. 1101.

Niger; *elytrorum* summo margine postico, *pedibusque* flavis.

26. *Penetrans*, der *Eindringer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 97. No. 1102.

Niger; *antennis*, *elytris* *pedibusque* castaneis.

27. *Vernalis*, der *Frühlingsraubkäfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 98. No. 1103. Fulvus; *elytris* antice, *abdomineque* postice nigris; medio rufo.

Facies St. *Chrysomelini*.

28. *Marginalis*, die *Müllersche gelbe Afterspitze*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 98. No. 1107.

Zz 4 Niger;

Niger; thoracis marginibus; elytris, pedibus, apiceque abdominis flavis.

29. *Fusti-cornis*, das Fuchshorn.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1112.

Niger; capite, thoraceque nitidis; elytris margine inferiore; antennisque lividis.

30. *Floreus*, der Blumenraubkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1117.

Niger; thorace convexo, punctulato; elytris pedibusque flavis.

31. *Fraeticornis*, das Bruchhorn.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1118.

Linearis, niger; antennis pedibusque fuscis; infimo antennarum articulo atro.

32. *Formicarius*, der ameisenartige Raubkäfer.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1119.

Linearis, niger; infimo antennarum articulo atro.

*Variat* rufus 1. capite abdomeque nigris 2. capite, thorace abdomeque nigris; 3. capite, thorace, elytris abdomeque nigris.

33. *Punctatus*, der Müllersche Punktirte.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1121.

Atro-coeruleus; femoribus testaceis.

*Aet.* Nidr. IV. 36.

34. *Striatus*, der gestrichte Halschild.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1122.

Ater; thorace punctato et striato.

*Aet.* Nidr. IV. 35.

35. *Glaber*,

35. *Glaber*, die *Glattdecke*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 364. No. 10. Le *Staphylin noir à étuis fauves et lisses*.

Niger; nitens; *pedibus elytrisque laevibus testaceis*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1106. Niger; *antennis, pedibus elytrisque laevibus, rufo-fuscis*.

36. *Aeneus*, der grünlicherzfarbige *Raubkäfer*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 367. No. 17. Le *Staphylin à étuis bronzés*.

Niger; *elytris nigro-aeneis*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1110. Niger; *capite thoraceque nitido; elytris aeneo-virentibus*.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 23. No. 9. *Staphylin à étuis bronzés*.

*STAPHYLINVS (aeneus)*, glaber, *aeneo-viridis*, *nitidus*; *abdomine pedibusque nigris*.

37. *Oculatus*, das *Gelbauge*.\*)

Geoffr. Inf. T. I. p. 371. No. 24. Le *Staphylin Junon*.

Ater; *oculis prominentibus crassis*. — *Idem*; *elytro singulo puncto flavo*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1123. Niger; *thorace cylindriaceo; elytrisque scabris*.

38. *Atro-coerulescens*, der *schwarzblaue Raubkäfer*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 361. No. 2. Le *Staphylin bleu*.

*Extremo antennarum articulo lunulato; magnitudine fere olentis*: No. 19.

39. *Longo-elytratus*, die *Langdecke*.

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 362. No. 4. Le *Staphylin noir à longs étuis*.

Ater; *elytris thorace duplo longioribus*.

40. *Flavo-cephalus*, der *Gelbköpf*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. pag. 363. No. 8. *Le Staphylin à tête jaune.*

*Pubescens; capite flavo; thorace elytrisque fuscō nigroque nebulosis, punctis impressis.*

41. *Punctulatus*, die *punktirte Flügeldecke*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 365. No. 11. *Le Staphylin à étuis marons pointillés.*

*Niger, nitens; pedibus coleoptrisque testaceis; elytris punctatis.*

42. *Curtulus*, die *kurze Flügeldecke*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 365. No. 12. *Le Staphylin à étuis très courts.*

*Niger, nitens; pedibus elytrisque fuscis punctatis; thorace plano marginato.*

43. *Longo-maculatus*, der *Langfleck*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 366. No. 13. *Le Staphylin applati à étuis bruns.*

*Niger, nitens; antennis, pedibus elytris, anōque testaceis; thorace marginato.*

44. *Fusco-maculatus*, der *Braunfleck*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 366. No. 14. *Le Staphylin à pattes fauves, et étuis pointillés.*

*Niger; punctatus; antennis pedibusque ferrugineis.*

45. *Marginato-sulcatus*, der *gerändelte und gefurchte Halschild*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 367. No. 15. *Le Staphylin noir à corcelet sillonné et bordé.*

*Niger; thorace marginato-sulcato; pedibus rufis.*

46. *Flavo-*

46. *Flavo-marginatus*, der Raubkäfer mit braunen gelbgerändelten Flügeldecken.\*)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 368. No. 19. Le Staphylin à étuves bordés de jaune.

Niger; elytris fuscis; margine flavo.

47. *Flavo-maculatus*, der Gelbfleck.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 369. No. 20. Le Staphylin noir à taches jaunes.

Niger; thorace vtrinque, singuloque elytro, macula flava.

48. *Rubro-thoracicus*, der Rothschild.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 370. No. 23. Le Staphylin noir à corcelet rouge.

Atro-coerulescens; thorace rubro.

49. *Subclavatus*, die Halbkeule.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 371. No. 25. Le Staphylin à antennes en demi-massues.

Antennis subclavatis.

50. *Pubescens*, der Bär.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 17. No. 2. Staphylin velouté arrondi.

Villosus, nigro-fuscus; maculis nigris viridi griseisque nitidis, corpore subtus argenteo; abdominis apice subrotundato.

51. *Aeneo-cephalus*, der Raubkäfer mit erzfarbigem Kopf.

de Geer Inf. Tom. IV. pag. 22. No. 8. Staphylin à corcelet bronzé.

Obscure fuscus; capite thoraceque aeneis nitidis; tibiis pedibusque rufa-fuscis.

\*) Ist ungleich größer, als *Flavescent* LINN. No. 13.

218. G E S C H L E C H T. *Forficula*; *Oehrling*; *Ohrwurm.\**)

*Müllers* L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 396. *Ohrwürmer*.

*Börners Samml.* etc. I. p. 479. *Ohrwurm*, *Oehrling*.

*Beckmanns Anfangsgr.* der N. H. pag. 99. gen. 23.

*Zangenkäfer* oder *Ohrwurm*,

*Eberhards Thiergesch.* pag. 204. §. 232. der *Ohrkäfer*.

*Sulzers Kennz.* S. 88. *Ohrwurm*.

— — Gesch. p. 69. *Zangenkäfer*.

*Füeßlins Verz.* schweiz. Inf. p. 21. *Zangenkäfer*.

*Pontopp.* N. G. v. D. p. 212. XXIII. *Forficula*.

*Bonnets* und anderer etc. S. 156. 547.

*Lessers Theol.* der Inf. p. 178. x. *Ohrellen*; p. 69. z. *Forficulæ*; *Forbicinæ*; *Auriculatæ*; *Velliculæ*.

*Gall.* *Aureilliers*; *Perce-oreilles*; *Ohrwurm*; p. 265. m. *Ohrellen*; p. 373. *Ohrellen*.

*Berlin. Samml.* 8. B. p. 342.

*Hamb.*

\*) Bey den Alten hiefs dies Insekt *Forficula*; *Forbicina*; *Forcipula*; *Mordella*; *Vellicula*. Jonstbn frägt: An haec Graecorum *Orfodacna*?

Ihre Naturgeschichte ist bekannt. Sie legen ihre Eyer in die Erde, in Mist, unter Baumrinde u. s. w. Die herauskommende Larve ist anfänglich ganz weiss, sieht schon eben so aus, wie der grosse Ohrwurm, hat aber *keine Flügel*, die sie erst nach überstandnen Häutungen bekommt. Gefährliche Feinde der Blumen; besonders der Nelken, und der reifen Obstfrüchte. Sie sind erstaunlich gefrässig, und man hat Beispiele, dass sich einer seinen eignen Unterleib abgefressen hat. Ihre *Flügel* sind überaus *künstlich* gefaltet. S. *Swammerd.* B. d. N. p. 110. *Bonnets* und anderer etc. Abhandl. aus der Insektol. Anh. p. 547.

Der *Wasserohrwurm* des Jonstons, oder der *Wasserfloh* des Mouffets ist sicher die Nymphe der *Libelle*, oder des *Schillebolds*. S. *Swammerd.* B. d. N. p. 90.

*Hamb. Magaz.* XII. p. 90-92.

*Swammerd.* B. der N. p. 93. 110. *Ohrwurm.*

*Onomat. hist. nat.* P. II. p. 86. *Auricularia; Vermis auricularis;* der *Ohrwurm*; *Ohrengrübler.*

— — — P. III. p. 911. das *Ohrenwieselchen.*

*Koelr.* Diff. de Inf. coleopt. p. 38.

*Act. Nidr.* III. p. 364.

*Bomar.* Dict. des Anim. VIII. pag. 334. *Forbicin;*  
*Perce-oreille.*

*Charlet.* Onom. 48. 50. *Vellicula; Earwigg.*

*Gazett.* salut. 1775. No. 4. p. 30.

*Catholicon* A. p. 663. *Auricularia;* der *Ohrwurm*; *Ohrenhöler*; der *Ohrbohrer.* F. p. 263. *Forficula;* *Perce-oreille;* der *Zangenkäfer*; *Ohrwurm*; *Ohrenhüller*; *Oehrling.*

*Schwenkfeld Theriotr.* Silef. p. 536. *Fullo; Forbicina* VI. *Aldrov.* *Vermis auricularis;* Ein *Ohrling*; *Oehrlin*; *Ohrwürmle.*

*Ionston* hist. nat. Inf. p. 112. de *Forficula.*

*Latin.* recentior. *Auricularia; Priscis Mordella;* *Vellicula.*

*Gall.* *Aureillier; Perce-oreille.*

*German.* *Ohrenwurm.*

*Belgis* Orenvuetel.

*Angl.* Eaarewig.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 234.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 24.

— — Zool. Dan. Prödr. p. 96.

*Scop.* Entom. carn. p. 103.

*Fabric.* S. E. pag. 269. II. *Vlonata.* gen. 84. *Forficula.*

*Geoffr.* Inf. T. I. p. 374. *Forficula; la Perce-oreille.*  
de Geer Inf. Tom. III. p. 543. Des *Perce-oreilles.*

*Commentar.* Lips. Dec. I. Vol. IV. 108. V. 608.

*Brunnichii* Entom. p. 57. Dan. *Oretvist.*

t. *Auri-*

1. *Auricularia*, der große Ohrwurm.

Müller l. c. S. 396. t. 8. f. 9.

Füesslins Verz. S. 21. No. 419.

Sulzers Gesch. pag. 70. t. 7. f. 17. der große Ohrwurm.

Schaeff. Elem. t. 63. *Ohrkäfer*.

— — Icon. t. 144. f. 3. 4.

Frisch Inf. VIII. p. 31. t. 15. f. 1. 2. vom *Ohrwurm*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 860.

Suecis: Tweстиert, Oernmask.

Aet. Vpsal. 1736. p. 15. No. 4 et 6. *Forficula mol-lis cinerea, cauda forcipata (Larva)*.

Catholicon F. pag. 263. No. 1. Holl. Oorkruiper; Oorworm.

Pontopp. N. G. v. D. p. 212. No. 1. Auricularia: Oeretvist; Oereorm; in Jütl. Quinkelstiert: *Ohr-wurm*; *Ohrhöllen*.

Mülleri Faun. Fridt. p. 24. No. 231.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1088.

**FORFICULA major**, ferruginea, elytris testaceis; macula alarum alba. Dan. Oretvist.

*Forcipes ferruginei*: in *mare dentati*; in *foemina* minores et *absque dentibus*.

Aet. Nidr. III. 30. Uebers. p. 364.

Fabric. S. E. p. 269. No. 1.

*Elytris apice albis; antennis 14 articulatis*.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 375. No. 1. t. 7. f. 3. Le grand perce-oreille.

*Antennarum articulis 14.*

de Geer Inf. Tom. III. pag. 545. No. 1. t. 25. f. 16.

*Grand perce-oreille.*

**FORFICULA (major) fusca; pedibus testaceis; an-tennis articulis 14.**

2. *Minor*, der kleinere Ohrwurm.

Müller l. c. S. 398. No. 2.

Füesslins Verz. S. 21. No. 419.

Fabric. S. E. p. 269. No. 2.

*Elytris testaceis, immaculatis, antennis 10 articulatis.*

Müller Faun. Fridr. p. 24. No. 232.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1089.

Schaeff. Icon. t. 41. f. 12. 13.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 376. No. 2. *Le petit perce-oreille.*

*Antennarum articulis vndecim.*

Catholicon F. p. 264. der kleinere Zangenkäfer.

de Geer Inf. Tom. III. p. 553. No. 2. t. 25. f. 26. 27.

*Petit perce-oreille.*

FORFICULA (*minor*), fusca; capite, thoraceque nigris; pedibus flavis; antennis articulis vndecim.

*Neue Oehrlingsarten.*

1. *Riparia*, der Strandöhrling.

Pallas Reis. II. App. No. 75.

*Auricularia duplo major*; pallide grisea, molliuscula. *Thorax* marginatus; *forfices rectiusculi*, subulati, *dente unico* circa medium.

In ripis arenosis ad *Irtin*.

Müllers Suppl. B. p. 262. t. 3. der Uferohrwurm.

2. *Flexuosa*, der kayennische Oehrling mit gebogenen Zangen.

Fabric. S. E. p. 269. No. 3.

*Forcipe flexuosa*; *elytris punctis duobus* flavis.  
*Magnitud.* Auricul.

3. *Den-*

3. *Dentata*, der maderische Oehrling mit unten gezähnelten Zangen.

*Fabrit. S. E. p. 270. No. 4.*

*Magnitudo Auriculariae. Antennis decem articulatis; fusca; thoracis marginibus pedibusque pallidis; forcipe basi dentata.*

4. *Parallelia*, der maderische geradzangigte Oehrling.

*Fabrit. S. E. p. 270. No. 5.*

*Minor praecedente; nigra; thoracis marginibus; elytris pedibusque pallidis, forcipe recta inermi.*

5. *Morio*, der otaheitische schwarze Oehrling.

*Fabrit. S. E. p. 270. No. 6.*

*Atra; antennis fascia alba; Magna. Antennae longae, 18 articulatae.*

6. *Pallipes*, der blaßfüßige Oehrling auf den Inseln des grünen Vorgebürges.

*Fabrit. S. E. p. 270. No. 7.*


*Magna; forcipe elongata, vñidenta, nigra; pedibus albis.*


---











SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01476 4088